

# DĀRZA VABOLES IEROBEŽOŠANA

## PAZĪMES

**Vabole** – apmēram 1 cm gara, tumši brūna, nedaudz saplacinātās ovālas formas, galva metāliski spīdīga tumši zaļa līdz zila

**Kāpurs** – caurspīdīgi balts, saliekts „C” burta veidā, labi saredzami 3 pāri krūšukāju, tumši brūna galva, izstiepoties apmēram 2 cm garš

**Kāpuru bojājumi** parasti parādās augusta beigās – zāliens laukumveidīgi dzeltē un izkalst, parušinot bojāto vietu, zālājs viegli atdalās no augsnes virskārtas, un zem tās ieraugāmi dārza vaboles kāpuri

**Vaboļu bojājumi** redzami kā grauzumi maija beigās/jūnija sākumā uz dažādu kultūraugu virszemes daļām

Reizēm kāpuru pārņemto zālāju izcaurumo eži, putni vai kurmji, meklēdami laupijumu

## IEROBEŽOŠANA

- Mehāniska kāpuru salasišana un likvidēšana, noņemot bojāto zālāja virskārtu
- Dārza vaboļu kāpuru dabīgie ienaidnieki ir putni un eži, kuri tos atrod augsnē vairāku centimetru dziļumā

## DĀRZA VABOLES ATTĪSTĪBA UN KAITĪGUMS

- Viena paaudze gadā
- Pieaugušās dārza vaboles izlido no ziemošanas vietām maija beigās/jūnija sākumā
- Vaboles barojas ar augu lapām, pumpuriem, ziediem un jaunajiem augļaizmetējiem
- Pēc pārošanās vaboles sāk olu dēšanu augsnes virskārtā, galvenokārt zālājos un laukumveidīgi
- Apmēram mēneša laikā izšķilas kāpuri
- Kāpuri barojas ar zālaugu saknēm augsnes virskārtā
- Septembra beigās līdz oktobrī pārvietojas dzīlāk augsnē (apm. 30 cm), kur pārziemo
- Pavasarī kāpuri iekūnojas un pēc kāda laika izšķilas vabole, kas izliet no augsnes

