

MAIJVABOĻU IEROBEŽOŠANA

levērojot pieaugušo maijvaboļu barošanos tuvējos kokos, to notveršanai var izmantot ultravioletās gaismas slazdus. Iestājoties tumsai, koku tuvumā izliek gaismas ķermenī, to aizsedz ar stiklu vai izveido šķērsli, kur vabolēm atsisties, kad tās lidos uz gaismu. Nokritušos kaitēkļus salasa un likvidē. Vieglākai nokritušo vaboļu uztveršanai pie šķēršļa var novietot piemēota izmēra trauku ar ūdeni, kur lidotājām iekrist.

Apmēram ap saules lēktu purināt kokus, kuros vaboles vakarā manītas un salasīt nokritušās. Šim nolūkam zem koka jānoklāj plēve vai gaiša auduma gabals, kur nokritušās vaboles vieglāk pamanāmas un savācamas.

Kāpuru mehāniska ierobežošana, tos salasot vai apstrādājot augsns.

Apmidzinot ozolus maijvaboļu papildbarošanās laikā ar "NeemAzal-T/S" (3.reģ. klase), tiek samazināta maijvaboļu olu dēšanas produktivitāte.

MAIJVABOĻU DABISKIE IENAIDNIEKI

Maijvaboļu kāpurus savā barībā izmanto strazdi, vārnas, kraukļi, kovārņi, eži, kurmji un skrejvaboles. Ar tiem labprāt mielojas mājas pīles un mežacūkas.

