LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

2025

Valsts augu aizsardzības dienests

RĪGA, 2025

UDK 632.95(474.3)
La805

Izdevējs: **Valsts augu aizsardzības dienests**

Izdevumu sagatavojuši
Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta speciālisti:
Līga Brence
Regīna Čūdere
Laila Krupenko
Maija Gudoviča
Laura Židele

Vāka noformējumam izmantota **Māras Bērziņas** fotogrāfija.

Datormaketētājs **Dainis Ieviņš**

Sagatavots un iespiests SIA "Eiro Print"
Artilērijas iela 40, Rīga, LV - 1009

ISBN 978-9934-8739-7-3

SATURS

Ievads **4**
Saīsinājumi un skaidrojumi **5**
Alfabētiskie rādītāji **6**
Latvijas Republikā reģistrētie ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi 6
Latvijas Republikā reģistrētie trešās reģistrācijas klases ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi 16
Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu un paralēlo tirdzniecības atļauju darbīgās vielas 17
Latvijas Republikā reģistrētie mikrobioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi 28
Latvijas Republikā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi ar zemu kaitīguma pakāpi 29
Latvijas Republikā reģistrētie dzīvos organismus saturošie augu aizsardzības līdzekļi 30
Latvijas Republikā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi, kurus atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā 32
Izsniegtās atļaujas augu aizsardzības līdzekļu paralēlajai tirdzniecībai **33**
2023. un 2024. gadā augu aizsardzības līdzekļu reģistrā anulētie ieraksti **34**
2023. un 2024. gadā anulētās atļaujas augu aizsardzības līdzekļu paralēlajai tirdzniecībai **35**
Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ierobežojumi **36**
Latvijas Republikā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi, kuri ir kaitīgi bitēm 36
Latvijas Republikā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi, kuriem ir noteikti lietošanas ierobežojumi attiecībā uz darbīgo vielu 37
Augu aizsardzības līdzekļu lietojumi **40**
Augu augšanas regulatori 40
Desikanti 57
Dezinfekcijas līdzekļi 58
Kodnes 59
Fungicīdi 69
Herbicīdi 163
Insekticīdi un akaricīdi 270
Limacīdi 302
Repelenti 308
Mikrobioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi 311
Dzīvos organismus saturošie augu aizsardzības līdzekļi 330
Feromoni 352
Augu aizsardzības līdzekļi, kuriem paplašināta darbības joma, iekļaujot tajā mazos lietojumus **353**
Fungicīdi kartupeļu lakstu puves *(Phytophthora infestans)* ierobežošanai **360**
Fungicīdi augļu dārziem **361**
Kodnes ziemāju graudaugu sēklu kodināšanai, to devas un ierobežojamās augu slimības **362**
Kodnes vasarāju graudaugu sēklu kodināšanai, to devas un ierobežojamās augu slimības **363**
Fungicīdi graudaugiem **364**
Mieži 364
Kvieši 365
Rudzi 367
Tritikāle 368
Auzas 370
Fungicīdi rapsim **371**
Ziemas rapsis 371
Vasaras rapsis 372
Apstrādājamo kultūraugu un citu objektu rādītājs **374**
Latvijas tirumos izplatītākās nezāles **420**
Augu aizsardzības jomu regulējošie normatīvie akti **422**
Augu aizsardzības likums 422
Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū 432
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi 438
Aizsargjoslu likuma izraksts 442
Valsts augu aizsardzības dienesta telefona numuri **446**
Rapša fenoloģiskās attīstības stadijas **447**
Sēkleņu augļu koku fenoloģiskās attīstības stadijas **448**

IEVADS

Cienījamie augu aizsardzības līdzekļu lietotāji!

Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – VAAD) sagatavojis augu aizsardzības līdzekļu (turpmāk – AAL) sarakstu 2025. gadam. Sarakstā iekļauti 564 Latvijas Republikā reģistrētie AAL, tajā skaitā 480 ķīmiskie, 72 dzīvos organismus saturošie un 11 mikrobioloģiskie līdzekļi.

Latvijā atļauts ievest, izplatīt un lietot tikai AAL reģistrā iekļautos AAL. AAL atļauts iegādāties tikai licencētās AAL izplatīšanas vietās. Lai aizsargātu cilvēku veselību un apkārtējo vidi un novērstu AAL atlieku uzkrāšanos saražotajā produkcijā, augsnē un ūdenī, AAL jālieto saskaņā ar augu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām un jāievēro norādes AAL marķējumā. Rūpīgi jāvērtē konkrētā situācija uz lauka, jāpārliecinās, vai kaitīgais organisms savairojies tādā apjomā, ka jāveic tā ierobežošana ar AAL. Ja pieņemat lēmumu smidzināt AAL, tad papildus visam iepriekš minētajam jāņem vērā vēja ātrums un virziens, ierobežojums pie virszemes ūdensobjektiem, kā arī nedrīkst pieļaut smidzinājuma nonākšanu blakus teritorijā.

Šajā izdevumā atradīsiet 2023. un 2024. gadā anulēto AAL sarakstu, kā arī informāciju par AAL krājumu izplatīšanas un izlietošanas termiņiem. Vielu apstiprinājuma pārskatīšanas lēmumus Eiropas Komisija pieņem visu gadu, tāpēc aicinām lauksaimniekus sekot aktualitātēm VAAD tīmekļvietnē www.vaad.gov.lv un izmaiņām http://registri.vaad.gov.lv sadaļā "Augu aizsardzības līdzekļu saraksts". Lai sarakstu ērtāk atvērtu viedtālrunī, izmantojiet zemāk redzamo QR kodu.

AAL apritē un lietošanā iesaistītajām personām jābūt apmācītām. Plašāku informācija par apmācību veicējiem VAAD tīmekļvietnes sadaļā "Skaidrojumi > Augu aizsardzības līdzekļi > Mācības un apliecības", savukārt mācību norises laiku un vietu atradīsiet Augu aizsardzības apmācību kalendārā.

Ja Jums nepieciešama palīdzība jautājumos par prasībām AAL laišanai tirgū un lietošanai vai citos ar augu aizsardzību saistītos jautājumos, sazinieties ar VAAD speciālistiem, kontaktinformāciju atradīsiet izdevuma nobeigumā un VAAD tīmekļvietnē.

Ražīgu gadu vēlot,
VAAD direktore

K. Lomakina

2025. gada februārī

SAĪSINĀJUMI UN SKAIDROJUMI

A	akaricīds
AAL	augu aizsardzības līdzeklis
AR	augu augšanas regulators
AS	attīstības stadijas:
	decimālā kodu sistēma graudaugu attīstības stadiju noteikšanai Zadoks, Chang, Kozak, 1974
	rapša fenoloģiskās attīstības stadijas, BBCH skala
	sēkleņu augļu koku fenoloģiskās attīstības stadijas, BBCH skala
CS	kapsulu suspensija
D	desikants
Dez	dezinfekcijas līdzeklis
d.g.; WG	disperģējošas granulas
Dz	dzīvos organismus saturošais augu aizsardzības līdzeklis
EG	emulģējošas granulas
e.k.; EC	emulsijas koncentrāts
EW	emulsija ūdenī
F	fungicīds
F/A	fungicīds - akaricīds
FR	feromons
g	grams
GB	ēsmas granulas
H	herbicīds
I	insekticīds
I/A	insekticīds – akaricīds

Liet. kat.	lietošanas kategorija
K	kodne
k.v.v.	koloniju veidojošas vienības
konc.	koncentrācija
Lim	limacīds
l	litrs
ml	mililitrs
OD	dispersija eļļā
prep.	preparāts
R	repelents
Reģ. klase	reģistrācijas klase
Reģ. Nr.	reģistrācijas numurs
s., susp.	suspensija
s.e., SE	suspo-emulsija
SG	šķīstošas granulas
s.k.; SC; FS	suspensijas koncentrāts
š.k.; SL	šķīstošs koncentrāts vai šķīduma koncentrāts
VAAD	Valsts augu aizsardzības dienests
V	viricīds
WP	pulveris suspensijai
ZC	kapsulu suspensijas un suspensijas koncentrāta maisījums
•	reģistrēts kaitīgā organisma ierobežošanai
^{v}•	reģistrēts kaitīgā organisma ierobežošanai vasarāju graudaugos
^{z}•	reģistrēts kaitīgā organisma ierobežošanai ziemāju graudaugos

Nogaidīšanas laiks	Laiks no pēdējās apstrādes līdz ražas novākšanai, dienās.
Aizsargjoslas platums	noteikts joslas platums no ūdenstilpēm un ūdenstecēm, kurā aizliegts lietot augu aizsardzības līdzekļus (10 m). Dažiem augu aizsardzības līdzekļiem tas var būt lielāks, tāpēc jāievēro nosacījumi, kas norādīti lietošanas instrukcijās.
Analogie augu aizsardzības līdzekļi	Reģistrētu augu aizsardzības līdzekļu citi tirdzniecības nosaukumi vai identiski augu aizsardzības līdzekļi, kuriem izsniegta paralēlās tridzniecības atļauja.

ALFABĒTISKIE RĀDĪTĀJI

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE ĶĪMISKIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Reģistrācijas īpašnieks	Reģ. Nr.	Reģ. klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Reģ. beigu termiņš	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1,4 SIGHT	AR	DormFresh Limited	0738	2	1,4-dimetilnaftalīns	993.7 g/l	30.06.2025.	40
2,4-D Nufarm	H	Nufarm GmbH & Co KG	0095	2	2,4-D	600 g/l	31.12.2031.	163
Accurate 200 WG	H	Nufarm GmbH & Co KG	0342	2	metil-metsulfurons	200 g/kg	31.03.2025.	164
Achiba	H	Nissan Chemical Europe S.A.S.	0774	2	etil-kvizalofops-P	100 g/l	28.02.2028.	165
Actellic 50 EC	I/A	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0170	2	metil-pirimifoss	50 %	15.06.2026.	270
Afrodyta 250 SC	F	Pestila Sp. z o.o.	0674	2	azoksistrobīns	250 g/l	31.12.2025.	69
Agil 100 EC	H	ADAMA Registrations B.V.	0003	2	propakvizafops	100g/l	28.02.2028.	165
Agroxone 75	H	Nufarm GmbH & Co KG	0048	2	MCPA	750 g/l	15.08.2027.	167
Aliette	F	Bayer AG	0650	2	alumīnija fosetils	800 g/kg	15.03.2026.	71
Allstar	F	SIA BASF	0772	2	fluksapiroksāds	300 g/l	31.05.2026.	59, 72
Altima 500 s.k.	F	ISK Biosciences Europe N.V.	0176	2	fluazinams	500 g/l	28.02.2025.	72
Amistar 250 SC	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0187	2	azoksistrobīns	250 g/l	31.12.2025.	73
Amistar Gold	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0632	2	azoksistrobīns difenokonazols	125 g/l 125 g/l	31.12.2025.	77
Arbiter	H	Barclay Chemicals (R&D) Ltd.	0603	2	fluroksipirs	200 g/l	31.12.2025.	214
Argos	AR	Arysta LifeScience Benelux Sprl	0841	2	apelsīnu ēteriskā eļļa	843.2 g/l	31.07.2025.	40
Ariane S	H	Corteva Agriscience Denmark A/S	0188	2	fluroksipirs klopiralīds MCPA	40 g/l 20 g/l 200 g/l	31.12.2025.	167
Arrva	H	Barclay Chemicals (R&D) Ltd.	0695	2	MCPA fluroksipirs klopiralīds	233 g/l 50 g/l 28 g/l	31.12.2025.	216
Artina	AR/F	Globachem n.v.	0908	2	metkonazols	90 g/l	15.03.2026.	45, 109
Artina EC	AR/F	Globachem n.v.	0653	2	metkonazols	90 g/l	15.03.2026.	45, 109
Ascra Xpro	F	Bayer AG	0549	2	biksafēns protiokonazols fluopirams	65 g/l 130 g/l 65 g/l	15.08.2026.	77
Attribut	H	Bayer AG	0191	2	nātrija propoksikarbazons	700 g/kg	31.08.2033.	168
Avastel	F	ADAMA Registrations B.V.	0887	2	protiokonazols fluksapiroksāds	150 g/l 75 g/l	15.08.2026.	78
Avoxa	H	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0525	2	pinoksadēns piroksulams	33.3 g/l 8.33 g/l	30.04.2025.	168
Azaka	F	Cheminova A/S	0557	2	azoksistrobīns	250 g/l	31.12.2025.	79
Axial 50 EC	H	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0304	2	pinoksadēns	50 g/l	30.06.2027.	168
Axial One	H	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0904	2	pinoksadēns florasulams	45 g/l 5 g/l	30.06.2027.	169
Azuba	F	Sharda Cropchem España S.L.	0828	2	azoksistrobīns	250 g/l	31.12.2025.	73
Bagira	H	UPL Holdings Coöperatief U.A.	0848	2	tefuril-kvizalofops-P	40 g/l	28.02.2028.	234
Balaya	F	SIA BASF	0750	2	mefentriflukonazols piraklostrobīns	100 g/l 100 g/l	15.09.2026.	80
Banarg	AR	SIA Linde Gas	0627	2	etilēns	4 %	30.11.2027.	40
Banvel 4S	H	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0038	2	dikamba	480 g/l	31.03.2028.	169
Barbarian Biograde 360	H	Barclay Chemicals (R&D) Ltd.	0299	2	glifosāts	360 g/l	31.12.2028.	170
Barbarian Hi-Aktiv	H	Barclay Chemicals (R&D) Ltd.	0289	2	glifosāts	490 g/l	31.12.2028.	171
Barbarian Super 360	H	Barclay Chemicals (R&D) Ltd.	0503	2	glifosāts	360 g/l	31.12.2028.	170
Bariton Super	K	Bayer AG	0612	2	protiokonazols tebukonazols fludioksonils	50 g/l 10 g/l 37.5 g/l	15.08.2026.	59
Barracuda	H	Albaugh TKI d.o.o.	0892	2	mezotrions	100 g/l	31.05.2033.	173
Basagran 480	H	SIA BASF	0024	2	bentazons	480 g/l	31.05.2026.	173
Beflex 500 SC	H	FMC Agricultural Solutions A/S	0844	2	beflubutamīds	500 g/l	31.10.2027.	174
Belkar	H	Corteva Agriscience Denmark A/S	0598	2	metil-halauksifēns piklorams	10 g/l 48 g/l	05.08.2026.	175

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beloukha	D/H	Certis Belchim B.V.	0891	2	pelargonskābe	680 g/l	15.12.2025.	57, 175
Beloukha Garden RTU	H	Certis Belchim B.V.	0899	3	pelargonskābe	21.7 g/l	01.12.2027.	176
Benafar	F	ADAMA Registrations B.V.	0915	2	protiokonazols	250 g/l	15.08.2026.	146
Benevia 100 OD	I	FMC Agricultural Solutions A/S	0856	2	ciāntraniliprols	100 g/l	14.09.2027.	270
Benz	H	Sharda Cropchem España S.L.	0867	2	bentazons	480 g/l	31.05.2026.	177
Beret 025 FS	K	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0852	2	fludioksonils	25 g/l	15.06.2026.	62
Bertego	AR	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0594	2	etil-trineksapaks	250 g/l	15.12.2025.	50
Betanal	H	Bayer AG	0291	2/3	fenmedifams	160 g/l	15.02.2026.	177
Biox-M	AR	XEDA International S.A.	0817	2	krūzmētras eļļa	948 g/l	31.01.2027.	40
Boiler	H	Globachem n.v.	0824	2	prosulfokarbs	800 g/l	31.01.2028.	252
Bolid 250 SE	F	Innvigo Sp. z o.o.	0682	2	azoksistrobīns	250 g/l	31.05.2028.	81
Bonafide	F	Sharda Cropchem España S.L.	0775	2	boskalīds	500 g/kg	15.04.2027.	83
Boom efekt 360 SL	H	Albaugh TKI d.o.o.	0881	2	glifosāts	360 g/l	31.12.2028.	177
Bosca	F	Sharda Cropchem España S.L.	0854	2	boskalīds	500 g/kg	15.04.2027.	83
Botiga	H	Certis Belchim B.V.	0808	2	piridāts mezotrions	300 g/l 90 g/l	31.12.2031.	179
Boxer 800 EC	H	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0271	2	prosulfokarbs	800 g/l	31.01.2028.	179
Brasan 540 EC	H	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0320	2	dimetahlors klomazons	500 g/l 40 g/l	15.06.2026.	180
Broadway Star	H	Corteva Agriscience Denmark A/S	0571	2	piroksulams florasulams	70.8 g/kg 14.2 g/kg	30.04.2025.	180
Buteo Start	K	Bayer AG	0710	2	flupiradifurons	480 g/l	09.12.2026.	60
Butisan 400	H	SIA BASF	0037	2	metazahlors	400 g/l	31.10.2027.	181
Butisan Avant	H	SIA BASF	0497	2	metazahlors dimetēnamīds-P kvinmeraks	300 g/l 100 g/l 100 g/l	31.07.2025.	181
Butisan Kombi	H	SIA BASF	0470	2	metazahlors dimetēnamīds-P	200 g/l 200 g/l	31.10.2027.	182
Butisan Pro	H	SIA BASF	0629	2	dimetēnamīds-P kvinmeraks	333 g/l 167 g/l	31.07.2025.	261
Butisan Star	H	SIA BASF	0258	2	metazahlors kvinmeraks	333 g/l 83 g/l	31.07.2025.	182
Butoxone	H	Nufarm GmbH & Co KG	0138	2	MCPB	400 g/l	15.08.2027.	182
Cadou SC	H	Bayer AG	0893	2	flufenacets	508.8 g/l	15.06.2026.	183
Calibre 50 SX	H	FMC Agricultural Solutions A/S	0301	2	metil-tifensulfurons metil-tribenurons	333 g/kg 167 g/kg	31.12.2025.	183
Callisto 100 SC	H	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0700	2	mezotrions	100 g/l	31.05.2033.	183
Calma	AR	Nufarm GmbH & Co KG	0521	2	etil-trineksapaks	175 g/l	15.12.2025.	56
Camposan Extra	AR	Nufarm GmbH & Co KG	0795	2	etefons	660 g/l	15.11.2025.	41
Candit	F	SIA BASF	0197	2	metil-krezoksims	500 g/kg	31.12.2025.	82
Cantus	F	SIA BASF	0280	2	boskalīds	500 g/kg	15.04.2027.	83
Capalo Revy	F	SIA BASF	0877	2	mefentriflukonazols metrafenons piraklostrobīns	66.7 g/l 100 g/l 80 g/l	15.09.2026.	83
Carnadine Extra	I	Nufarm GmbH & Co KG	0812	2	acetamiprīds	200 g/l	28.04.2034.	272
Caryx	AR	SIA BASF	0440	2	mepikvāta hlorīds metkonazols	210 g/l 30 g/l	15.10.2026.	41
Cayunis	F	Bayer AG	0743	2	biksafēns spiroksamīns trifloksistrobīns	75 g/l 150 g/l 100 g/l	31.05.2026.	84
CCC	AR	Nufarm GmbH & Co KG	0147	2	hlormekvāta hlorīds	750 g/l	28.02.2028.	42
CDQ™ SX	H	FMC Agricultural Solutions A/S	0589	2	metil-metsulfurons metil-tribenurons	111 g/kg 222 g/kg	31.03.2025.	184
Celest Trio 060 FS	K	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0380	2	fludioksonils difenokonazols tebukonazols	25 g/l 25 g/l 10 g/l	15.03.2027.	60
Centurion Plus	H	Arysta LifeScience S.A.S.	0509	2	kletodims	120 g/l	31.08.2027.	184
Cerone	AR	Bayer AG	0122	2	etefons	480 g/l	15.11.2025.	42
Cervacol extra	R	FMC Agricultural Solutions A/S	0337	3	kvarca smiltis	251 g/kg	31.08.2039.	308
Cezix	F	Albaugh TKI d.o.o.	0512	2	tebukonazols	250 g/l	15.08.2027.	87
Chambel 6 FS	K	Nufarm GmbH & Co KG	0309	2	tebukonazols	60 g/l	15.08.2027.	60
Chorus 50 WG	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0339	2	ciprodinils	500 g/kg	15.03.2026.	85
Chwastox 750 SL	H	QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A.	0376	2	MCPA	750 g/l	15.08.2027.	185
Cidely Top	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0472	2	difenokonazols ciflufenamīds	125 g/l 15 g/l	15.03.2027.	86
Ciperkils 500 e.k.	I	Arysta LifeScience Benelux Sprl	0385	2	cipermetrīns	500 g/l	31.12.2025.	273

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Clamox	H	SIA BASF	0496	2	metazahlors imazamoks	375 g/l 17.5 g/l	30.06.2028.	185
Clap	H	Sharda Cropchem España S.L.	0728	2	klopiralīds	300 g/l	31.12.2026.	185
Clap Forte	H	Sharda Europe b.v.b.a.	0643	2	klopiralīds	720 g/kg	31.12.2026.	186
Cleave	H	ADAMA Registrations B.V.	0542	2	florasulams fluroksipirs	2.5 g/l 100 g/l	31.12.2025.	186
Clematis	H	Albaugh TKI d.o.o.	0753	2	klomazons	360 g/l	15.06.2026.	189
Clentiga	H	SIA BASF	0842	2	imzazamokss kvinmeraks	12.5 g/l 250 g/l	31.01.2026.	186
Cleravo	H	SIA BASF	0572	2	imazamokss kvinmeraks	35 g/l 250 g/l	31.01.2026.	187
Cleravo Flex	H	SIA BASF	0792	2	kvinmeraks imazamokss aminopiralīds	125 g/l 12.5 g/l 4 g/l	31.01.2026.	187
Clever	H	Sharda Cropchem España S.L.	0853	2	aklonifēns	600 g/l	31.10.2027.	197
Clinic Up	H	Nufarm GmbH & Co KG	0554	2	glifosāts	360 g/l	31.12.2028.	170
Cliophar 600 SL	H	Arysta LifeScience Benelux Sprl	0665	2	klopiralīds	600 g/l	30.09.2037.	188
Clomate	H	Albaugh TKI d.o.o.	0732	2	klomazons	360 g/l	15.06.2026.	189
Comet Pro	F	SIA BASF	0354	2	piraklostrobīns	200 g/l	15.09.2026.	86
Conaxis	H	SIA BASF	0773	2	dimetēnamīds-P klomazons	400 g/l 50 g/l	15.06.2026.	189
Conclude AZT 250 SC	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0717	2	azoksistrobīns	250 g/l	31.12.2025.	73
Coragen 20 SC	I	FMC Agricultural Solutions A/S	0755	2	hlorantraniliprols	200 g/l	31.12.2025.	274
Corum	H	SIA BASF	0729	2	imazamokss bentazons	22.4 g/l 480 g/l	31.05.2026.	190
Credit Xtreme	H	Nufarm GmbH & Co KG	0801	2	glifosāts	540 g/l	31.12.2028.	190
Croton Flex	F	Bayer AG	0797	2	protiokonazols	250 g/l	15.08.2026.	125
Crown MH	AR	Kreglinger Europe NV	0900	2	maleīnhidrazīds	270 g/l	31.10.2033.	42
Cuadro NT	AR	FMC Agricultural Solutions A/S	0544	2	etil-trineksapaks	250 g/l	15.12.2025.	43
Curbatur	F	Bayer AG	0655	2	protiokonazols	250 g/l	15.08.2026.	125
Cycocel 750	AR	SIA BASF	0096	2	hlormekvāta hlorīds	750 g/l	28.02.2028.	43
Darby	H	Barclay Chemicals (R&D) Ltd.	0786	2	2,4-D	600 g/l	31.12.2031.	163
DARCOS	F	Albaugh TKI d.o.o.	0438	2	tebukonazols	250 g/l	15.08.2027.	87
Decis Forte	I	Bayer AG	0703	2	deltametrīns	100 g/l	15.08.2027.	275
Decis Mega	I	Bayer AG	0310	2	deltametrīns	50 g/l	15.08.2027.	277
Delan Pro	F	SIA BASF	0628	2	ditianons kālija fosfonāts	125 g/l 561 g/l	31.08.2025.	88
Delaro Forte	F	Bayer AG	0766	2	protiokonazols spiroksamīns trifloksistrobīns	93.3 g/l 107 g/l 80 g/l	31.05.2027.	88
Delmetros 100 SC	I	Innvigo SP. z o.o.	0675	2	deltametrīns	100 g/l	15.08.2027.	278
Detia Wühlmausgas	R	Detia Freyberg GmbH	0584	2/3	kalcija karbīds	800 g/kg	30.11.2027.	308
Devrinols s.k.	H	UPL Holdings Coöperatief UA	0252	2	napropamīds	450 g/l	31.03.2028.	191
Dicash	H	Sharda Europe b.v.b.a.	0597	2	dikamba	480 g/l	31.03.2028.	192
Dicoherb Super 750 SL	H	Nufarm GmbH & Co KG	0390	2	MCPA dikamba	660 g/l 90 g/l	31.03.2028.	192
Difcor 250 EC	F	Globachem n.v.	0580	2	difenokonazols	250 g/l	15.03.2027.	90
Difend	K	Globachem n.v.	0439	2	difenokonazols	30 g/l	15.03.2027.	61
Difenzone	F	Sharda Europe b.v.b.a.	0421	2	difenokonazols	250 g/l	15.03.2027.	92
Diflanil 500 SC	H	Globachem n.v.	0530	2	diflufenikans	500 g/l	15.01.2027.	192
DMA 600	H	Corteva Agriscience Denmark A/S	0559	2	2,4-D	600 g/l	31.12.2031.	193
Dominator 480	H	Albaugh TKI d.o.o.	0810	2	glifosāts	480 g/l	31.12.2028.	193
Dominic	F	Sharda Europe b.v.b.a.	0538	2	tebukonazols	250 g/l	15.08.2027.	150
Duplosan Super	H	Nufarm GmbH & Co KG	0084	2	dihlorprops-P MCPA mekoprops-P	310 g/l 160 g/l 130 g/l	15.05.2026.	195
Dynamo	F	Sharda Cropchem España S.L.	0827	2	ditianons	700 g/kg	31.08.2025.	92
Eclaire	H	Sharda Cropchem España S.L.	0838	2	aklonifēns	600 g/l	31.10.2027.	197
Effector	F	SIA BASF	0134	2	ditianons	700 g/kg	31.08.2025.	92
Efilor	F	SIA BASF	0372	2	boskalīds metkonazols	133 g/l 60 g/l	15.03.2026.	94
Elatus Era	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0552	2	benzovindiflupirs protiokonazols	75 g/l 150 g/l	02.08.2027.	94
Elatus Plus	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0574	2	benzovindiflupirs	100 g/l	02.08.2027.	95
Elegant 2FD	H	ADAMA Registrations B.V.	0478	2	florasulams 2,4-D	6.25 g/l 300 g/l	31.12.2028.	195

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Elipris	H	Corteva Agriscience Denmark A/S	0837	2	diflufenikans flufenacets metil-halauksifēns	180 g/l 240 g/l 11.7 g/l	15.01.2027.	195
Elumis 105 OD	H	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0573	2	mezotrions nikosulfurons	75 g/l 30 g/l	31.03.2028.	195
EMCEE	H	Sharda Cropchem España S.L.	0712	2	MCPA	750 g/l	15.08.2027.	196
EMDEE	H	Sharda Cropchem España S.L.	0829	2	MCPA	750 g/l	15.08.2027.	167
Entargo	F	SIA BASF	0756	2	boskalīds	500 g/l	15.04.2027.	96
Erasmus	F	Albaugh TKI d.o.o.	0513	2	tebukonazols	250 g/l	15.08.2027.	87
Ergon	H	Albaugh TKI d.o.o.	0357	2	metil-metsulfurons metil-tifensulfurons	68 g/kg 682 g/kg	31.12.2026.	196
Estet 600 EC	H	Nufarm GmbH & Co KG	0305	2	2,4-D	600 g/l	31.12.2028.	196
Etefone	AR	Sharda Cropchem España S.L.	0759	2	etefons	480 g/l	15.11.2025.	44
Euskatel	F	Albaugh TKI d.o.o.	0836	2	protiokonazols	250 g/l	15.08.2026.	97
Evagio Plus	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0863	2	mandipropamīds amisulbroms	200 g/l 100 g/l	30.09.2025.	98
Everest	AR	Sharda Cropchem España S.L.	0777	2	etefons	480 g/l	15.11.2025.	42
Evure	I	ADAMA Registrations B.V.	0577	2	tau-fluvalināts	240 g/l	31.08.2025.	285
Falcon Forte	F	Bayer AG	0343	2	protiokonazols spiroksamīns tebukonazols	53 g/l 224 g/l 148 g/l	31.05.2027.	98
Fenix	H	Bayer AG	0283	2	aklonifēns	600 g/l	31.10.2027.	197
Ferramol	Lim	W.Neudorff GmbH KG	0395	3	dzelzs (III) fosfāts	9.9 g/kg	31.12.2031.	302
Ferramol Limacide	Lim	W.Neudorff GmbH KG	0745	3	dzelzs (III) fosfāts	9.9 g/kg	31.12.2031.	302
Fibro	I/A	Certis Belchim B.V.	0460	2	parafīneļļa	797 g/l	15.08.2026.	279
Flexity	F	SIA BASF	0265	2	metrafenons	300 g/l	15.12.2025.	99
Flight Forte	H	SIA BASF	0293	2	pendimetalīns pikolinafēns	320 g/l 16 g/l	30.11.2025.	198
Flurostar 180	H	Globachem n.v.	0644	2	fluroksipirs	180 g/l	31.12.2025.	198
Flurostar Forte	H	Globachem n.v.	0874	2	fluroskipirs	400 g/l	31.12.2025.	199
Flyer	H	Sharda Cropchem España S.L.	0818	2	florasulams	50 g/l	31.12.2031.	199
Frequent	H	Sharda Cropchem España S.L.	0691	2	butil-fluazifops-P	125 g/l	31.05.2027.	205
Focus Ultra	H	SIA BASF	0065	2	cikloksidims	100 g/l	31.08.2027.	200
Folicur	F/AR	Bayer AG	0057	2	tebukonazols	250 g/l	15.08.2027.	44, 99
Fopaz	F	Sharda Cropchem España S.L.	0870	2	azoksistrobīns folpets	90.4 g/l 484 g/l	15.02.2026.	100
Fornet 4 OD	H	ISK Biosciences Europe N.V.	0436	2	nikosulfurons	40 g/l	31.03.2028.	225
Fornet Max 6 OD	H	ISK Biosciences Europe N.V.	0433	2	nikosulfurons	60 g/l	31.03.2028.	226
Fortune	H	Sharda Cropchem España S.L.	0776	2	butil-fluazifops-P	150 g/l	31.05.2027.	205
Fox 480 SC	H	ADAMA Registrations B.V.	0375	2	bifenokss	480 g/l	31.03.2028.	204
Foxtrot 69 EW	H	FMC Agricultural Solutions A/S	0408	2	etil-fenoksaprops-P	69 g/l	15.08.2026.	204
Fragma	H	Nufarm GmbH & Co KG	0749	2	florasulams	50 g/l	31.12.2031.	253
Fragma Delta	H	Nufarm GmbH & Co KG	0780	2	florasulams diflufenikans	50 g/l 500 g/l	15.01.2027.	253
Fraxion	H	Albaugh TKI d.o.o.	0902	2	mezotrions	100 g/l	31.05.2033.	173
Frooti	AR	Sharda Cropchem España S.L.	0839	2	1-naftiletiķskābe	77.8 g/l	31.05.2027.	44
Frowncide 500 s.k.	F	ISK Biosciences Europe N.V.	0475	2	fluazinams	500 g/l	28.02.2025.	72
Fuego 500 SC	H	ADAMA Registrations B.V.	0859	2	metazahlors	500 g/l	31.10.2027.	258
Fuego Top	H	ADAMA Registrations B.V.	0483	2	metazahlors kvinmeraks	375 g/l 125 g/l	31.07.2025.	258
Fusilade Forte 150 EC	H	Nufarm GmbH & Co KG	0182	2	butil-fluazifops-P	150 g/l	31.05.2027.	205
Gachinko	F	Nissan Chemical Europe S.A.S.	0733	2	amisulbroms	200 g/l	30.06.2025.	111
Galera	H	Corteva Agriscience Denmark A/S	0313	2	klopiralīds piklorams	267 g/l 67 g/l	15.02.2029.	208
Galistop 200	H	Barclay Chemicals (R&D) Ltd.	0602	2	fluroksipirs	200 g/l	31.12.2025.	214
Gallup 360-K	H	Barclay Chemicals (R&D) Ltd.	0799	2	glifosāts	360 g/l	31.12.2028.	208
Gallup Super 360	H	Barclay Chemicals (R&D) Ltd.	0502	2	glifosāts	360 g/l	31.12.2028.	170
Gamelan 100 FS	K	Innvigo Sp. z o.o.	0907	2	protiokonazols	100 g/l	15.08.2026.	61
Gazelle 20 SG	I	Berner Ltd	0871	2	acetamiprīds	200 g/kg	28.02.2034.	287
Gepard 50 EC	H	Sharda Europe b.v.b.a.	0607	2	etil-kvizalofops-P	50 g/l	28.02.2028.	241
Gift	AR	Sharda Cropchem España S.L.	0843	2	giberelskābe	90 g/kg	15.07.2026.	44
Glacis	F	Bayer AG	0798	2	protiokonazols	250 g/l	15.08.2026.	125
Globaztar 250 SC	F	Globachem n.v.	0626	2	azoksistrobīns	250 g/l	31.12.2025.	100
Glyphomax 480	H	Albaugh TKI d.o.o.	0386	2	glifosāts	480 g/l	31.12.2028.	209
Goltix 700 SC	H	ADAMA Registrations B.V.	0155	2	metamitrons	700 g/l	30.11.2027.	211
Goltix Gold	H	ADAMA Registrations B.V.	0851	2	metamitrons	700 g/l	30.11.2027.	211
Graminis	H	Sharda Europe b.v.b.a.	0592	2	etil-kvizalofops-P	50 g/l	28.02.2028.	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Granprotec	I	Sharda Cropchem España S.L.	0664	2	deltametrīns	25 g/l	15.08.2027.	279
Granstar Premia 50 SX	H	FMC Agricultural Solutions A/S	0255	2	metil-tribenurons	500 g/kg	30.01.2035.	212
Grassrooter	AR	Sharda Cropchem España S.L.	0709	2	etefons	480 g/l	15.11.2025.	44
Grodyl	H	Bayer AG	0028	2	amidosulfurons	75 %	15.08.2026.	213
Gusto	Lim	ADAMA Registrations B.V.	0489	2	metaldehīds	30 g/kg	31.08.2027.	302
Halvetic	H	QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A.	0803	2	glifosāts	180 g/l	31.12.2028.	213
Herbistar 200 EC	H	Innvigo Sp. z o.o.	0804	2	fluroksipirs	200 g/l	15.02.2028.	213
Herbos 110 EC	H	Innvigo Sp. z o.o.	0680	2	etil-fenoksaprops-P	110 g/l	15.08.2026.	214
Hingios	AR	Bayer AG	0895	2	kalcija proheksadions	75 g/l	31.05.2027.	45
Hurler	H	Barclay Chemicals (R&D) Ltd.	0601	2	fluroksipirs	200 g/l	31.12.2025.	214
Hussar Activ Plus OD	H	Bayer AG	0588	2	2,4-D 2-etilheksil esteris nātrija metil-jodosulfurons metil-tiēnkarbazons	300 g/l 10 g/l 7.5 g/l	30.06.2025.	215
Hutton Flex	F	Bayer AG	0840	2	trifloksistrobīns protiokonazols	150 g/l 175 g/l	15.08.2026.	101
Imprid Skog	I	Nisso Chemical Europe GmbH	0855	2	acetamiprīds	200 g/kg	28.02.2034.	280
Imtrex XE	F	SIA BASF	0406	2	fluksapiroksāds	62.5 g/l	31.05.2026.	102
Incelo	H	Bayer AG	0781	2	metil-mezosulfurons metil-tiēnkarbazons	45 g/kg 15 g/kg	30.09.2025.	215
Infinito	F	Bayer AG	0302	2	propamokarbs fluopikolīds	523.8 g/l 62.5 g/l	15.06.2026.	103
Innox	F	ADAMA Registrations B.V.	0872	2	protiokonazols	250 g/l	15.08.2026.	146
Input	F	Bayer AG	0266	2	protiokonazols spiroksamīns	160 g/l 300 g/l	31.05.2027.	104
Input Triple	F	Bayer AG	0651	2	protiokonazols spiroksamīns prokvinazīds	160 g/l 200 g/l 40 g/l	31.05.2027.	106
Ironmax Pro	Lim	De Sangosse S.A.S.	0630	3	dzelzs (III) fosfāts	24.2 g/kg	31.12.2031.	303
Isonet Z	FR	CBC (Europe) S.r.l.	0918	3	(E,Z)-2,13-oktadekadiēn-1-ilacetāts (E,Z)-3,13-oktadekadiēn-1-ilacetāts	755 g/kg 30 g/kg	30.08.2038.	352
Jenot Plus 050 EC	H	Innvigo Sp. z o.o.	0823	2	etil-kvizalofops-P	50 g/l	28.02.2028.	262
Joust	F	Nufarm GmbH & Co KG	0876	2	protiokonazols	250 g/l	15.08.2026.	107
Juventus 90	F	SIA BASF	0221	2	metkonazols	90 g/l	15.03.2026.	45, 109
Kaiso 50 EG	I	Nufarm GmbH & Co KG	0381	2	lambda-cihalotrīns	50 g/kg	31.03.2025.	280
Kalif 360 CS	H	ADAMA Registrations B.V.	0409	2	klomazons	360 g/l	15.06.2026.	215
Kalif Mega	H	ADAMA Registrations B.V.	0410	2	klomazons metazahlors	33 g/l 250 g/l	15.06.2026.	216
Karate Zeon 5 CS	I	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0207	2	lambda-cihalotrīns	50 g/l	31.03.2025.	280
Katoun Gold	H	Certis Belchim B.V.	0898	2	pelargonskābe	500 g/l	01.12.2027.	216
Kinto Plus	K	SIA BASF	0662	2	tritikonazols fluksapiroksāds fludioksonils	33.3 g/l 33.3 g/l 33.3 g/l	15.06.2026.	61
Kinvara	H	Barclay Chemicals (R&D) Ltd.	0672	2	MCPA fluroksipirs klopiralīds	233 g/l 50 g/l 28 g/l	31.12.2025.	216
K-Obiol	I	2022 Environmental Science FR S.A.S.	0394	2	deltametrīns	25 g/l	15.08.2027.	282
Komplet	H	Bayer AG	0393	2	flufenacets diflufenikans	280 g/l 280 g/l	15.01.2027.	217
Koron 100 SC	I	Innvigo Sp. z o.o.	0815	2	deltametrīns	100 g/l	15.08.2027.	278
Korvetto	H	Corteva Agriscience Denmark A/S	0663	2	metil-halauksifēns klopiralīds	5 g/l 120 g/l	31.12.2026.	217
Krypt 540	H	Barclay Chemicals (R&D) Ltd.	0800	2	glifosāts	540 g/l	31.12.2028.	217
Kudos	AR	Fine Agrochemicals Ltd.	0757	2	kalcija proheksadions	100 g/kg	31.05.2027.	46
Kyleo	H	Nufarm GmbH & Co KG	0423	2	glifosāts 2,4 -D	240 g/l 160 g/l	31.12.2028.	219
Lancelot	H	Corteva Agriscience Denmark A/S	0524	2	aminopiralīds florasulams	300 g/kg 150 g/kg	31.12.2025.	219
Latitude XL	K	Certis Belchim B.V.	0485	2	siltiofams	125 g/l	30.06.2034.	62
Leander	F	ADAMA Registrations B.V.	0397	2	fenpropidīns	750 g/l	15.05.2028.	111
Leimay SC	F	Nissan Chemical Europe S.A.S.	0346	2	amisulbroms	200 g/l	30.06.2025.	111
Legacy 500 SC	H	ADAMA Registrations B.V.	0411	2	diflufenikans	500 g/l	15.01.2027.	220
Legacy Pro	H	ADAMA Registrations B.V.	0415	2	diflufenikans pendimetalīns hlortolurons	40 g/l 300 g/l 250 g/l	15.08.2027.	220
Lentagran WP	H	Certis Belchim B.V.	0330	2	piridāts	450 g/kg	31.12.2031.	220
Lenvyor	F	SIA BASF	0909	2	mefentriflukonazols	100 g/l	20.03.2030.	111
Leopard	H	ADAMA Registrations B.V.	0424	2	etil-kvizalofops-P	50 g/l	28.02.2028.	221
Librax	F	SIA BASF	0481	2	fluksapiroksāds metkonazols	62.5 g/l 45 g/l	31.05.2026.	112
Lima Oro	Lim	Sharda Cropchem España S.L.	0568	2	metaldehīds	50 g/kg	31.08.2027.	305
Limgol	Lim	Sharda Cropchem España S.L.	0586	2	metaldehīds	50 g/kg	31.08.2027.	305
Linati 800 EC	H	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0790	2	prosulfokarbs	800 g/l	31.01.2028.	179
Lontrel 72 SG	H	Corteva Agriscience Denmark A/S	0388	2	klopiralīds	720 g/kg	30.09.2037.	222
Lumiposa 625 FS	I	Corteva Agroscience Denmark A/S	0751	2	ciantraniliprols	625 g/l	14.09.2027.	62
Maganic	F	ADAMA Registrations B.V.	0885	2	protiokonazols difenokonazols	175 g/l 125 g/l	15.03.2027.	114
MAGTOXIN TABLET	I/A	Detia Freyberg GmbH	0111	1	magnija fosfīds	66 %	30.11.2027.	283
Maister Power OD	H	Bayer AG	0543	2	foramsulfurons nātrija metil-jodosulfurons metil-tiēnkarbazons	30 g/l 1 g/l 10 g/l	30.09.2025.	223
Mateno Duo	H	Bayer AG	0704	2	aklonifēns diflufenikans	500 g/l 100 g/l	31.10.2027.	223
Maxentis	F	ADAMA Registrations B.V.	0860	2	protiokonazols azoksistrobīns	150 g/l 200 g/l	15.08.2026.	115
Maxim 025 FS	K	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0089	2	fludioksonils	25 g/l	15.06.2026.	62
Maxim Extra 050 FS	K	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0272	2	difenokonazols fludioksonils	25 g/l 25 g/l	15.03.2027.	63
Mavita 250 EC	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0576	2	difenokonazols	250 g/l	15.03.2027.	140
Mavrik	I	ADAMA Registrations B.V.	0526	2/3	tau-fluvalināts	240 g/l	31.08.2025.	285, 286
MCPA 750	H	Nufarm GmbH & Co KG	0135	2	MCPA	750 g/l	15.08.2027.	223
MCPA Classic 750 SL	H	QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A.	0532	2	MCPA	750 g/l	15.08.2027.	185
MCPA Super	H	Nufarm GmbH & Co KG	0119	2	MCPA	500 g/l	15.08.2027.	224
Medax Max	AR	SIA BASF	0511	2	kalcija proheksadions etil-trineksapaks	50 g/kg 75 g/kg	15.12.2025.	46
Medax Top	AR	SIA BASF	0347	2	kalcija proheksadions mepikvāta hlorīds	50 g/l 300 g/l	31.05.2027.	47
Menno Florades	Dez	MENNO Chemie-Vertrieb GmbH	0593	2	benzoskābe	90 g/l	31.08.2033.	58
Mepik 300 SL	AR	Innvigo Sp. z o.o.	0771	2	mepikvāta hlorīds	300 g/l	15.10.2026.	49
Meridian	Lim	Sharda Cropchem España S.L.	0569	2	metaldehīds	50 g/kg	31.08.2027.	305
Metazamix™	H	Corteva Agriscience Denmark A/S	0500	2	metazahlors aminopiralīds piklorams	500 g/l 5.3 g/l 13.3 g/l	31.12.2025.	225
Mezzo WG	H	Nufarm GmbH & Co KG	0322	2	metil-metsulfurons	200 g/kg	31.03.2025.	225
Milagro 4 OD	H	ISK Biosciences Europe N.V.	0223	2	nikosulfurons	40 g/l	31.03.2028.	225
Milagro Extra 6 OD	H	ISK Biosciences Europe N.V.	0361	2	nikosulfurons	60 g/l	31.03.2028.	226
Mirador 250 SC	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0591	2	azoksistrobīns	250 g/l	31.12.2025.	73
Mirador Forte	F	ADAMA Registrations B.V.	0558	2	azoksistrobīns tebukonazols	60 g/l 100 g/l	13.12.2025.	116
Mirador Uni	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0791	2	azoksistrobīns difenokonazols	125 g/l 125 g/l	31.12.2025.	77
Mixin	H	ADAMA Registrations B.V.	0658	2	florasulams fluroksipirs	2.5 g/l 100 g/l	31.12.2025.	186
Mizuki	D/H	Nichino Europe Co., Ltd.	0890	2	etil-piraflufēns	10.6 g/l	31.03.2032.	57, 226
Moddus 250 EC	AR	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0183	2	etil-trineksapaks	250 g/l	15.12.2025.	50
Moddus Start	AR	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0498	2	etil-trineksapaks	250 g/l	15.12.2025.	50
Monex	AR	Sharda Cropchem España S.L.	0742	2	1-naftiletiķskābe	10 g/kg	31.05.2027.	51
Monitor	H	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	0145	2	sulfosulfurons	75 %	31.12.2031.	226
Monosate G	H	Bayer AG	0527	2	glifosāts	360 g/l	31.12.2028.	170
Mospilan 20 SG	I	Nisso Chemical Europe GmbH	0811	2	acetamiprīds	200 g/kg	28.02.2034.	287
Moxa	AR	Globachem n.v.	0562	2	etil-trineksapaks	250 g/l	15.12.2025.	51
Mustangs s.e.	H	Corteva Agriscience Denmark A/S	0184	2	florasulams 2,4-D	6.25 g/l 300 g/l	31.12.2028.	227
Mustangs Forte s.e.	H	Corteva Agriscience Denmark A/S	0334	2	florasulams aminopiralīds 2,4-D	5 g/l 10 g/l 180 g/l	31.05.2028.	227

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nando 500 SC	F	Nufarm GmbH & Co KG	0427	2	fluazinams	500 g/l	28.02.2025.	117
NeemAzal-T/S	I/A	Trifolio-M GmbH	0241	2/3	azadiraktīns-A	10 g/l	31.08.2025.	289, 290
Nervure	H	Nissan Chemical Europe S.A.S.	0752	2	etil-kvizalofops-P	50 g/l	28.02.2028.	227
Nexa 500 EC	AR	Innvigo Sp. z o.o.	0667	2	etil-trineksapaks	500 g/l	15.12.2025.	52
Nexide CS	I	FMC Agricultural Solutions A/S	0715	2	gamma-cihalotrīns	60 g/l	31.03.2026.	292
Next	AR	Sharda Cropchem España S.L.	0624	2	etil-trineksapaks	250 g/l	15.12.2025.	53
Nicogan	H	ADAMA Registrations B.V.	0413	2	nikosulfurons	40 g/l	31.03.2028.	229
Nimbus SE	H	SIA BASF	0328	2	metazahlors klomazons	250 g/l 33.3 g/l	15.06.2026.	229
Nissorun 250 SC	A	Nisso Chemical Europe GmbH	0861	2	heksitiazokss	250 g/l	31.08.2025.	293
Novitron DAMTec	H	FMC Agricultural Solutions A/S	0730	2	aklonifēns klomazons	500 g/kg 30 g/kg	15.06.2026.	229
Nuance 75 WG	H	Nufarm GmbH & Co KG	0403	2	metil-tribenurons	750 g/kg	30.01.2035.	230
Nufarm MCPA 750	H	Nufarm GmbH & Co KG	0045	2	MCPA	750 g/l	15.08.2027.	231
Ohayo 500 s.k.	F	ISK Biosciences Europe N.V.	0473	2	fluazinams	500 g/l	28.02.2025.	72
Onyx	H	Certis Belchim B.V.	0657	2	piridāts	600 g/l	31.12.2031.	231
Optica Trio	H	Nufarm GmbH & Co KG	0248	2	mekoprops-P MCPA dihlorprops-P	130 g/l 160 g/l 310 g/l	15.05.2026.	232
Optimus	AR	Nufarm GmbH & Co KG	0399	2	etil-trineksapaks	175 g/l	15.12.2025.	56
Orius 250 EW	F	Nufarm GmbH & Co KG	0267	2	tebukonazols	250 g/l	15.08.2027.	118
Ouragan System 4	H	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0209	2/3	glifosāts	360 g/l	31.12.2028.	232, 233
Panarex	H	UPL Holdings Coöperatief U.A.	0849	2	tefuril-kvizalofops-P	40 g/l	28.02.2028.	234
Panexion OD	H	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0905	2	pinoksadēns metil-mezosulfurons	120 g/l 28.8 g/l	30.06.2027.	234
Pantera 4 EC	H	UPL Holdings Coöperatief U.A.	0171	2	tefuril-kvizalofops-P	40 g/l	28.02.2028.	234
Patel 300 EC	F	Globachem n.v.	0778	2	protiokonazols	300 g/l	15.08.2026.	130
Pecari 300 EC	F	Globachem n.v.	0748	2	protiokonazols	300 g/l	15.08.2026.	130
PHOSTOXIN TABLET	I/A	Detia Freyberg GmbH	0112	1	alumīnija fosfīds	56 %	30.11.2027.	294
Pico 750 WG	H	SIA BASF	0671	2	pikolinafēns	750 g/kg	30.06.2032.	234
Pictor Active	F	SIA BASF	0642	2	boskalīds piraklostrobīns	150 g/l 250 g/l	15.04.2027.	119
Pilot	H	Nissan Chemical Europe S.A.S.	0765	2	etil-kvizalofops-P	50 g/l	28.02.2028.	262
Pioli	F	SIA BASF	0819	2	fluksapiroksāds	62.5 g/l	31.05.2026.	102
Pixxaro EC	H	Corteva Agriscience Denmark A/S	0545	2	metil-halauksifēns fluroksipirs	12.5 g/l 280 g/l	05.08.2026.	235
Plantskydd	R	Plantskydd AB	0274	3	žāvētu asiņu milti	998 g/kg	31.03.2037.	309
Plexeo 90	F/AR	Globachem n.v.	0677	2	metkonazols	90 g/l	15.03.2026.	45, 109
Plexeo 90 EC	F/AR	Globachem n.v.	0911	2	metkonazols	90 g/l	15.03.2026.	45, 109
Poleci	I	Sharda Cropchem España S.L.	0764	2	deltametrīns	25 g/l	15.08.2027.	296
Poleposition 300 EC	F	Globachem n.v.	0779	2	protiokonazols	300 g/l	15.08.2026.	130
Pontos	H	SIA BASF	0782	2	pikolinafēns flufenacets	100 g/l 240 g/l	15.06.2026.	235
Pony 306 SE	H	Pestila Sp. z o.o.	0864	2	florasulams 2,4-D	6.5 g/l 300 g/l	31.12.2031.	235
Praktis	F	Sharda Cropchem España S.L.	0763	2	protiokonazols	250 g/l	15.08.2026.	121
Prepper	K	Globachem n.v.	0697	2	fludioksonils	25 g/l	15.06.2026.	63
Pret nezālēm Hobby	H	Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.	0784	3	pelargonskābe	43.1 g/l	15.12.2025.	236
Pret nezālēm Ultra	H	Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.	0783	2	pelargonskābe	565.5 g/l	15.12.2025.	236
Previcur Energy	F	Bayer AG	0224	2/3	propamokarbs fosetils	530 g/l 310 g/l	15.06.2026.	121
Priaxor	F	SIA BASF	0514	2	fluksapiroksāds piraklostrobīns	75 g/l 150 g/l	15.09.2026.	124
Primus	H	Corteva Agriscience Denmark A/S	0172	2	florasulams	50 g/l	31.12.2031.	237
Primus 250 WG	H	Corteva Agriscience Denmark A/S	0590	2	florasulams	250 g/kg	31.12.2031.	238
Primus XL	H	Corteva Agriscience Denmark A/S	0387	2	florasulams fluroksipirs	5 g/l 100 g/l	31.12.2025.	239
Pro	H	Corteva Agriscience Denmark A/S	0585	2	florasulams	50 g/l	31.12.2031.	237
Professional	H	Sharda Cropchem España S.L.	0713	2	prosulfokarbs	800 g/l	31.01.2028.	239
Profi MCPA 750 SL	H	QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A.	0531	2	MCPA	750 g/l	15.08.2027.	185
Proline	F	Bayer AG	0637	2	protiokonazols	250 g/l	15.08.2026.	125
Proman	H	Certis Belchim B.V.	0656	2	metbromurons	500 g/l	31.12.2025.	240
Property 180 SC	F	ISK Biosciences Europe N.V.	0567	2	piriofenons	180 g/l	30.06.2028.	127
Propulse	F	Bayer AG	0416	2	fluopirams protiokonazols	125 g/l 125 g/l	30.06.2027.	127

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prosaro	F	Bayer AG	0276	2	tebukonazols protiokonazols	125 g/l 125 g/l	15.08.2026.	128
Protendo 300 EC	F	Globachem n.v.	0714	2	protiokonazols	300 g/l	15.08.2026.	130
Protikon 250 EC	F	Innvigo Sp. z o.o.	0886	2	protiokonazols	250 g/l	15.08.2026.	132
Puma Universal	H	Bayer AG	0131	2	etil-fenoksaprops-P	69 g/l	15.08.2026.	240
Quelex	H	Corteva Agriscience Denmark A/S	0641	2	metil-halauksifēns florasulams	104.2 g/kg 100 g/kg	05.08.2026.	240
Quick 50 EC	H	Sharda Europe b.v.b.a.	0429	2	etil-kvizalofops-P	50 g/l	28.02.2028.	241
Quickphos pellets 56 GE	I	UPL Holdings Coöperatief UA	0504	1	alumīnija fosfīds	56 %	30.11.2027.	296
Quickphos tablets 56 GE	I	UPL Holdings Coöperatief UA	0505	1	alumīnija fosfīds	56 %	30.11.2027.	297
Rango Max	H	Arysta LifeScience S.A.S.	0706	2	etil-kvizalofops-P	50 g/l	28.02.2028.	242
Ranman Top	F	ISK Biosciences Europe N.V.	0355	2	ciazofamīds	160 g/l	31.07.2037.	133
Rapsan 400 SC	H	Globachem n.v.	0617	2	metazahlors	400 g/l	31.10.2027.	181
Rapsan 500 SC	H	Globachem n.v.	0546	2	metazahlors	500 g/l	31.10.2027.	243
Rapsan Plus	H	Globachem n.v.	0636	2	metazahlors kvinmeraks	333 g/l 83 g/l	31.07.2025.	243
Rapsan Plus SC	H	Globachem n.v.	0618	2	metazohlors kvinmeraks	333 g/l 83 g/l	31.07.2025.	182
Rasput	F	Globachem n.v.	0917	2	boskalīds	500 g/kg	15.04.2027.	133
Rassel 100 SC	H	Innvigo Sp. z o.o.	0724	2	florasulams	100 g/l	31.12.2031.	244
Redigo Pro	K	Bayer AG	0553	2	protiokonazols tebukonazols	150 g/l 20 g/l	15.08.2027.	64
Regalis Plus	AR	SIA BASF	0491	2	kalcija proheksadions	100 g/kg	31.05.2027.	53
Regucil	AR	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0595	2	etil-trineksapaks	250 g/l	15.12.2025.	50
Regucil Start	AR	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0833	2	etil-trineksapaks	250 g/l	15.12.2025.	50
Relenya	K	SIA BASF	0831	2	mefentriflukonazols	50 g/l	20.03.2030.	64
Remocco 90	AR/F	SIA BASF	0845	2	metkonazols	90 g/l	15.03.2026.	45, 109
Revus 250 SC	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0312	2	mandipropamīds	250 g/l	31.12.2026.	134
Revus Top	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0453	2	mandipropamīds difenokonazols	250 g/l 250 g/l	15.03.2027.	135
Revydas	F	SIA BASF	0835	2	mefentriflukonazols boskalīds	100 g/l 200 g/l	15.04.2027.	135
Revyona	F	SIA BASF	0806	2	mefentriflukonazols	75 g/l	20.03.2030.	136
Revystar XL	F	SIA BASF	0707	2	mefentriflukonazols fluksapiroksāds	100 g/l 50 g/l	31.05.2026.	137
Revytrex	F	SIA BASF	0708	2	mefentriflukonazols fluksapiroksāds	66.7 g/l 66.7 g/l	31.05.2026.	138
Rexade 440	H	Corteva Agriscience Denmark A/S	0723	2	metil-halauksifēns piroksulams florasulams	104.2 g/kg 240 g/kg 100 g/kg	30.04.2025.	244
RIM 25 WG	H	Sharda Cropchem España S.L.	0747	2	rimsulfurons	250 g/kg	15.08.2026.	244
Riza 200 EC	F	FMC Agricultural Solutions A/S	0507	2	tebukonazols	200 g/l	15.08.2027.	139
Rodeo Plus	H	Bayer AG	0879	2	glifosāts	360 g/l	31.12.2028.	244
Rodeo TF	H	Bayer AG	0889	2	glifosāts	360 g/l	31.12.2028.	259
Rosate 360 TF	H	Albaugh TKI d.o.o.	0639	2	glifosāts	360 g/l	31.12.2028.	170
Rosate Clean 360 SL	H	Albaugh TKI d.o.o.	0882	2	glifosāts	360 g/l	31.12.2028.	177
Roundup Biactive SL	H	Bayer AG	0880	2	glifosāts	360 g/l	31.12.2028.	246
Roundup Dynamic	H	Bayer AG	0878	2	glifosāts	500 g/l	31.12.2028.	247
Roundup Gold ST	H	Bayer AG	0873	2	glifosāts	450 g/l	31.12.2028.	249
Roundup PowerMax	H	Bayer AG	0519	2	glifosāts	720 g/kg	31.12.2028.	251
Roxy EC	H	Globachem n.v.	0914	2	prosulfokarbs	800 g/l	31.01.2028.	179
Roxy 800 EC	H	Globachem n.v.	0518	2	prosulfokarbs	800 g/l	31.01.2028.	252
Samson 4 OD	H	ISK Biosciences Europe N.V.	0437	2	nikosulfurons	40 g/l	31.03.2028.	225
Samson Max 6 OD	H	ISK Biosciences Europe N.V.	0434	2	nikosulfurons	60 g/l	31.03.2028.	226
Saracen	H	Nufarm GmbH & Co KG	0471	2	florasulams	50 g/l	31.12.2031.	253
Saracen Delta	H	Nufarm GmbH & Co KG	0493	2	florasulams diflufenikans	50 g/l 500 g/l	15.01.2027.	253
Scab 80 WG	F	Sharda Europe b.v.b.a.	0582	2	kaptāns	800 g/kg	15.11.2025.	140
Scenic Gold	K	Bayer AG	0705	2	fluoksastrobīns fluopikolīds	150 g/l 200 g/l	15.06.2026.	64
Score 250 EC	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0001	2/3	difenokonazols	250 g/l	15.03.2027.	140, 141
Seedron	K	ADAMA Registrations B.V.	0534	2	fludioksonils tebukonazols	50 g/l 10 g/l	15.06.2026.	65
Sekator OD	H	Bayer AG	0260	2	amidosulfurons nātrija metil-jodosulfurons	100 g/l 25 g/l	15.08.2026.	254

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Select Plus	H	Arysta LifeScience S.A.S.	0846	2	kletodims	120 g/l	31.08.2027.	184
Sentrallas LQM	H	FMC Agricultural Solutions A/S	0875	2	fluroksipirs metil-tifensulfurons	150 g/l 30 g/l	31.12.2025.	254
Shyfo	H	Sharda Cropchem España S.L.	0802	2	glifosāts	360 g/l	31.12.2028.	254
Signum	F	SIA BASF	0269	2	boskalīds piraklostrobīns	26.7 % 6.7 %	15.04.2027.	142
SilicoSec	I/A	Andermatt Group AG	0910	3	diatomīta zeme	1000 g/l	31.01.2037.	298
Siltra Xpro	F	Bayer AG	0479	2	biksafēns protiokonazols	60 g/l 200 g/l	15.08.2026.	144
Silvron	F	Bayer AG	0807	2	biksafēns fluopirams	100 g/l 100 g/l	31.05.2026.	145
Sitara	H	Sharda Cropchem España S.L.	0830	2	fluroksipirs florasulams	100 g/l 2.5 g/l	31.12.2025.	256
SLUXX[HP]	Lim	W.Neudorff GmbH KG	0396	2	dzelzs (III) fosfāts	29.7 g/kg	31.12.2031.	306
SoilGuard 0.5 GR	I	Sharda Cropchem España S.L.	0761	2	teflutrīns	5 g/kg	31.12.2025.	299
Soratel	F	ADAMA Registrations B.V.	0869	2	protiokonazols	250 g/l	15.08.2026.	146
Spitfire 333 HL	H	Corteva Agriscience Denmark A/S	0606	2	fluroksipirs	333 g/l	31.12.2025.	256
Spectrum	H	SIA BASF	0850	2	dimetēnamīds-P	720 g/l	31.08.2035.	255
Sporax	F	Globachem n.v.	0868	2	propamokarbs	605 g/l	15.06.2026.	147
Spotlight Plus	D/H	FMC Agricultural Solutions A/S	0718	2	etil-karfentrazons	60 g/l	31.07.2034.	57, 255
Stabilan 400 SL	AR	Nufarm GmbH & Co KG	0793	2	hlormekvāta hlorīds	400 g/l	28.02.2028.	53
Stabilan 750 SL	AR	Nufarm GmbH & Co KG	0287	2	hlormekvāta hlorīds	750 g/l	28.02.2028.	42
Stapler	H	Barclay Chemicals (R&D) Ltd.	0787	2	2,4-D	600 g/l	31.12.2031.	163
Stakato 500 SC	H	ADAMA Registrations B.V.	0739	2	diflufenikans	500 g/l	15.01.2027.	220
Starane 333 HL	H	Corteva Agriscience Denmark A/S	0605	2	fluroksipirs	333 g/l	31.12.2025.	256
Starane XL	H	Corteva Agriscience Denmark A/S	0277	2	fluroksipirs florasulams	100 g/l 2.5 g/l	31.12.2025.	256
Starship	H	Nufarm GmbH & Co KG	0520	2	mezotrions	100 g/l	31.05.2033.	257
Stemper	AR	ADAMA Registrations B.V.	0821	2	etil-trineksapaks	175 g/l	15.12.2025.	54
Stomp CS	H	SIA BASF	0431	2	pendimetalīns	455 g/l	31.12.2026.	257
STS Cucurbitaceae	AR	STS Cucurbita Hybridization Coöperative U.A.	0896	2	nātrija sudraba tiosulfāts	40 g/l	31.12.2027.	55
Sultan Super	H	ADAMA Registrations B.V.	0457	2	metazahlors kvinmeraks	375 g/l 125 g/l	31.07.2025.	258
Sultan 500 SC	H	ADAMA Registrations B.V.	0245	2	metazahlors	500 g/l	31.10.2027.	258
Sunda	H	Sharda Cropchem España S.L.	0822	2	etil-fenoksaprops-P	69 g/l	15.08.2026.	258
Supero	H	Sharda Europe b.v.b.a.	0587	2	etil-kvizalofops-P	50 g/l	28.02.2028.	241
SuPrim	H	Corteva Agriscience Denmark A/S	0528	2	florasulams	50 g/l	31.12.2031.	237
Surrender	K	Globachem n.v.	0862	2	fludioksonils	100 g/l	15.06.2026.	65
Switch 62.5 WG	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0244	2	fludioksonils ciprodinils	250 g/kg 375 g/kg	15.06.2026.	147
Syllit 544 SC	F	Arysta LifeScience Benelux Sprl	0477	2	dodīns	544 g/l	31.05.2025.	149
Syrius	F	Nufarm GmbH & Co KG	0522	2	tebukonazols	250 g/l	15.08.2027.	118
Systiva	F	SIA BASF	0805	2	fluksapiroksāds	333 g/l	31.05.2026.	66
Širlans 500 s.k.	F	ISK Biosciences Europe N.V.	0177	2	fluazinams	500 g/l	28.02.2025.	72
Taifun B	H	ADAMA Registrations B.V.	0027	2/3	glifosāts	360 g/l	31.12.2028.	259, 261
Talius	F	Corteva Agriscience Denmark A/S	0535	2	prokvinazīds	200 g/l	15.05.2027.	150
Tanaris	H	SIA BASF	0579	2	dimetēnamīds-P kvinmeraks	333 g/l 167 g/l	31.07.2025.	261
Tandus	H	Nufarm GmbH & Co KG	0785	2	fluroksipirs	200 g/l	31.12.2025.	214
Targa Super	H	Bayer AG	0383	2	etil-kvizalofops-P	50 g/l	28.02.2028.	262
TBM 75 WG	H	Sharda Europe b.v.b.a.	0581	2	metil-tribenurons	750 g/kg	31.12.2026.	263
Tebuplius	F	Sharda Europe b.v.b.a.	0539	2	tebukonazols	250 g/l	15.08.2027.	150
Tebusha 25 EW	F	Sharda Europe b.v.b.a.	0432	2	tebukonazols	250 g/l	15.08.2027.	150
Temsa SC	H	Globachem n.v.	0563	2	mezotrions	100 g/l	31.05.2033.	263
Tempo	AR	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0596	2	etil-trineksapaks	250 g/l	15.12.2025.	50
Teppeki	I	ISK Biosciences Europe N.V.	0699	2	flonikamīds	500 g/kg	30.11.2027.	299
Teridox 500 EC	H	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0051	2	dimetahlors	500 g/l	15.10.2027.	263
Terpal	AR	SIA BASF	0144	2	mepikvāta hlorīds etefons	305 g/l 155 g/l	15.11.2025.	55
Tesanto	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0834	2	benzovindiflupirs	100 g/l	02.08.2027.	151
Tetatra	F	ADAMA Registrations B.V.	0916	2	protiokonazols	250 g/l	15.08.2026.	146
Tilmor	F/AR	Bayer AG	0353	2	protiokonazols tebukonazols	80 g/l 160 g/l	15.08.2027.	55, 151
Timeline FX	H	Syngenta Polska Sp. zo.o.	0767	2	fluroksipirs florasulams pinoksadēns	52.5 g/l 1.75 g/l 30 g/l	31.12.2025.	263
Titus 25 d.g.	H	Corteva Agriscience Denmark A/S	0059	2	rimsulfurons	250 g/kg	15.08.2026.	264
Tomahawk 200 EC	H	ADAMA Registrations B.V.	0536	2	fluroksipirs	200 g/l	31.12.2025.	264
Tombo WG	H	Corteva Agriscience Denmark A/S	0335	2	piroksulams florasulams aminopiralīds	50 g/kg 25 g/kg 50 g/kg	31.12.2025.	265
Topas 100 EC	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0009	2	penkonazols	100 g/l	15.10.2027.	152
Toprex 375 SC	F/AR	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0400	2	difenokonazols paklobutrazols	250 g/l 125 g/l	31.08.2027.	56, 153
Toutatis DAMTec	H	FMC Agricultural Solutions A/S	0731	2	aklonifēns klomazons	500 g/kg 30 g/kg	15.06.2026.	229
Torero	F	Cheminova A/S	0600	2	azoksistrobīns	250 g/l	31.12.2025.	79
Tracer	I	Corteva Agriscience Denmark A/S	0740	2	spinosads	480 g/l	15.03.2026.	300
Treso	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0847	2	fludioksonils	500 g/kg	15.06.2026.	154
Trico	R	Kwizda Agro GmbH	0435	3	aitu tauki	65 g/l	30.10.2038.	309
Trimaxx	AR	Nufarm GmbH & Co KG	0398	2	etil-trineksapaks	175 g/l	15.12.2025.	56
Trimmer 500 WG	H	ADAMA Registrations B.V.	0469	2	metil-tribenurons	500 g/kg	30.01.2035.	265
Trimmer 50 SG	H	FMC Agricultural Solutions A/S	0321	2	metil-tribenurons	500 g/kg	30.01.2035.	212
Trinity	H	ADAMA Registrations B.V.	0770	2	pendimetalīns hlortolurons diflufenikans	300 g/l 250 g/l 40 g/l	15.08.2027.	220
Tripali	H	FMC Agricultural Solutions A/S	0551	2	metil-metsulfurons metil-tribenurons florasulams	83 g/kg 83 g/kg 105 g/kg	31.08.2027.	266
Tristar 50 SG	H	Innvigo Sp. z o.o.	0814	2	metil-tribenurons	500 g/kg	31.01.2035.	266
Trolten	H	Corteva Agriscience Denmark A/S	0816	2	metil-halauksifēns	7.81 g/l	05.08.2026.	267
Turret 90	F/AR	Globachem n.v.	0678	2	metkonazols	90 g/l	15.03.2026.	45, 109
Univoq	F	Corteva Agriscience Denmark A/S	0888	2	fenpikoksamīds protiokonazols	50 g/l 100 g/l	15.08.2026.	154
Vantex CS	I	FMC Agricultural Solutions A/S	0716	2	gamma-cihalotrīns	60 g/l	31.03.2026.	292
Variano Xpro	F	Bayer AG	0455	2	biksafēns fluoksastrobīns protiokonazols	40 g/l 50 g/l 100 g/l	15.08.2026.	155
Vazanti	F	ADAMA Registrations B.V.	0912	2	protiokonazols fluksapiroksāds	150 g/l 75 g/l	15.08.2026.	78
Verben	F	Corteva Agriscience Denmark A/S	0825	2	prokvinazīds protiokonazols	50 g/l 200 g/l	15.05.2027.	156
VextaDim 240 EC	H	Vexatchem srl	0906	2	kletodims	240 g/l	31.08.2027.	267
Vibrance Duo	K	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0570	2	sedaksāns fludioksonils	25 g/l 25 g/l	15.06.2026.	66
Vibrance Pro	K	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0631	2	sedaksāns fludioksonils tritikonazols	25 g/l 25 g/l 20 g/l	15.06.2026.	67
Vibrance Star	K	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0679	2	sedaksāns fludioksonils tritikonazols	25 g/l 25 g/l 20 g/l	15.06.2026.	67
Vibrance Trio	K	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0635	2	sedaksāns fludioksonils tebukonazols	25 g/l 25 g/l 10 g/l	15.06.2026.	68
Viking	H	Nufarm GmbH & Co KG	0903	2	metil-tribenurons	750 g/kg	30.01.2035.	230
VitiSan	F	Andermatt Biocontrol AG	0788	3	kālija hidrogēnkarbonāts	990 g/kg	31.10.2037.	157, 159
Vitrol GB	Lim	Bros Sp. z o.o.	0857	3	dzelzs pirofosfāts	24 g/kg	03.08.2036.	306, 307
Vredmix	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0711	2	azoksistrobīns difenokonazols	125 g/l 125 g/l	31.12.2025.	77
WAM extra	R	Witasek PflanzenSchutz GmbH	0482	3	kvarca smiltis	298.5 g/kg	31.08.2039.	310
Winby 500 s.k.	F	ISK Biosciences Europe N.V.	0474	2	fluazinams	500 g/l	28.02.2025.	72
Winotote	F	ADAMA Registrations B.V.	0796	2	fenpropidīns	750 g/l	15.05.2028.	111
Wöbra	R	Flügel GmbH	0575	3	kvarca smiltis	475.2 g/kg	31.08.2039.	310
Xerton	H	UPL Holdings Coöperatief U.A.	0794	2	etofumezāts	417 g/l	31.10.2032.	268
Yodo 100 OD	H	Innvigo Sp. z o.o.	0727	2	nātrija metil-jodosulfurons	100 g/l	31.03.2033.	268
Zenby	F	ISK Biosciences Europe N.V.	0832	2	izofetamīds	400 g/l	15.09.2027.	161
Zetrola	H	ADAMA Registrations B.V.	0578	2	propakvizafops	100 g/l	28.02.2028.	165
Zorro 300 SL	H	Innvigo Sp. z o.o.	0726	2	piklorams	300 g/l	15.02.2029.	268
Zorvec Enicade	F	Corteva Agriscience Denmark A/S	0673	2	oksatiapiprolīns	100 g/l	03.03.2028.	162
Zypar	H	Corteva Agriscience Denmark A/S	0555	2	metil-halauksifēns florasulams	6.254 g/l 5 g/l	05.08.2026.	268

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE TREŠĀS REĢISTRĀCIJAS KLASES ĶĪMISKIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Darbīgā viela	Reģ. Nr. / Atļaujas Nr.	Maksimālais iepakojums l, kg	Lpp.
1	2	3	4	5	6
Beloukha Garden RTU	H	pelargonskābe	0899	15 l	176
Betanal	H	fenmedifams	0291	1.0 l	177
Cervacol extra	R	kvarca smiltis	0337	5 kg	308
Detia Wühlmausgas	R	kalcija karbīds	0584	0.25 kg	308
Emin dārzam Mavrik Vita	I	tau-fluvalināts	31.*	0.005 l	286
Emin dārzam Revus 250 SC	F	mandipropamīds	26.*	0.05 l	134
Emin dārzam Score 250 EC	F	difenokonazols	33.*	0.005 l	141
Emin dārzam Taifun B	H	glifosāts	30.*	0.95 l	261
Ferramol	Lim	dzelzs (III) fosfāts	0395	2.0 kg	302
Ferramol Limacide	Lim	dzelzs (III) fosfāts	0745	2.0 kg	302
Ironmax Pro	Lim	dzelzs (III) fosfāts	0630	400 kg	303
Isonet Z	FR	(E,Z)-2,13-oktadekadiēn-1-ilacetāts (E,Z)-3,13-oktadekadiēn-1-ilacetāts	0918	600 dispenseri	352
Mavrik	I	tau-fluvalināts	0526	0.075 l	286
NeemAzal	I/A	azadiraktīns-A	43.*	mazāks par 1.0 l	290
NeemAzal-T/S	I/A	azadiraktīns-A	0241	mazāks par 1.0 l	290
Ouragan System 4	H	glifosāts	0209	mazāks par 1.0 l	233
Plantskydd	R	žāvētu asiņu milti	0274	1.0 kg	309
Pret nezālēm Hobby	H	pelargonskābe	0784	5.0 l	236
Previcur Energy	F	propamokarbs fosetils	0224	1.0 l	121
Revus 250 SC	F	mandipropamīds	0312	0.25 l	134
Score	F	difenokonazols	61.*	0.1 l	141
Score 250 EC	F	difenokonazols	0001	0.1 l	141
Taifun B	H	glifosāts	0027	0.95 l	261
Trico	R	aitu tauki	0435	10.0 l	309
VitiSan	F	kālija hidrogēnkarbonāts	0788	25 kg	157, 159
Vitrol GB	Lim	dzelzs pirofosfāts	0857	1 kg	307
WAM extra	R	kvarca smiltis	0482	5 kg	310
Wöbra	R	kvarca smiltis	0575	10.0 kg	310

*AAL, kuriem izsniegta paralēlās tirdzniecības atļauja

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU UN PARALĒLO TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJU DARBĪGĀS VIELAS

Darbīgā viela	Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Lpp.
1	2	3	4
(E,Z)-2,13-oktadekadiēn-1-ilacetāts	Isonet Z	755 g/kg	352
(E,Z)-3,13-oktadekadiēn-1-ilacetāts	Isonet Z	30 g/kg	352
1-naftiletiķskābe	Frooti	77.8 g/l	44
	Monex	10 g/kg	51
1,4-dimetilnaftalīns	1,4 SIGHT	993.7 g/l	40
2,4-D	2,4-D Nufarm	600 g/l	163
	Darby	600 g/l	163
	DMA 600	600 g/l	193
	Elegant 2FD	300 g/l	195
	Estet 600 EC	600 g/l	196
	Kyleo	160 g/l	219
	Mustangs Forte s.e.	180 g/l	227
	Mustangs s.e.	300 g/l	227
	Pony 306 SE	300 g/l	235
	Stapler	600 g/	163
2,4-D (etil heksil estera formā)	Hussar Activ Plus OD	300 g/l	215
acetamiprīds	Acetami 20 SG	200 g/kg	287
	Acetazol 20 SG	200 g/kg	287
	Acetazol Extra	200 g/l	272
	Carnadine Extra	200 g/l	272
	Gazelle 20 SG	200 g/kg	287
	Imprid Skog	200 g/kg	280
	Mospilan 20 SG	200 g/kg	287
aitu tauki	Trico	65 g/l	309
aklonifēns	Clever	600 g/l	197
	Eclaire	600 g/l	197
	Fenix	600 g/l	197
	Mateno Duo	500 g/l	223
	Novitron DAMTec	500 g/kg	229
	Toutatis DAMTec	500 g/kg	229
alumīnija fosfīds	AGROPHOS PELLETS 56 GE	56 %	296
	Balticphos pellets GE	56 %	296
	PHOSTOXIN TABLET	56 %	294
	Quickphos pellets 56 GE	56 %	296
	Quickphos tablets 56 GE	56 %	297
amidosulfurons	Grodyl	75 %	213
	Sekator OD	100 g/l	254
aminopiralīds	Cleravo Flex	4 g/l	187
	Lancelot	300 g/kg	219
	Metazamix™	5.3 g/l	225
	Mustangs Forte s.e.	10 g/l	227
	Tombo WG	50 g/kg	265
amisulbroms	Evagio Plus	100 g/l	98
	Gachinko	200 g/l	111
	Leimay SC	200 g/l	111
apelsīnu ēteriskā eļļa	Argos	843.2 g/l	40
azadiraktīns-A	NeemAzal	10 g/l	290
	NeemAzal-T/S	10 g/l	289, 290

1	2	3	4
azoksistrobīns	Afrodyta 250 SC	250 g/l	69
	Amistar 250 SC	250 g/l	73
	Amistar Gold	125 g/l	77
	Azaka	250 g/l	79
	Azuba	250 g/l	73
	Bolid 250 SE	250 g/l	81
	Conclude AZT 250 SC	250 g/l	73
	Fopaz	90.4 g/l	100
	Globaztar 250 SC	250 g/l	100
	Maxentis	200 g/l	115
	Mirador 250 SC	250 g/l	73
	Mirador Forte	60 g/l	116
	Mirador Uni	125 g/l	77
	Torero	250 g/l	79
	Vredmix	125 g/l	77
***Bacillus subtilis*, celms QST 713**	Serenade Aso	13.96 g/l	321
***Bacillus thuringiensis var. kurstaki*, celms ABTS 351**	DiPel DF	540 g/kg	311
***Beauveria bassiana*, celms ATCC 74040**	Naturalis	0.179 g/l	318
beflubutamīds	Beflex 500 SC	500 g/l	174
bentazons	Basagran 480	480 g/l	173
	Benz	480 g/l	177
	Corum	480 g/l	190
benzoskābe	Menno Florades	90 g/l	58
benzovindiflupirs	Elatus Era	75 g/l	94
	Elatus Plus	100 g/l	95
	Tesanto	100 g/l	151
bifenokss	Fox 480 SC	480 g/l	204
biksafēns	Ascra Xpro	65 g/l	77
	Cayunis	75 g/l	84
	Siltra Xpro	60 g/l	144
	Silvron	100 g/l	145
	Variano Xpro	40 g/l	155
boskalīds	Bonafide	500 g/kg	83
	Bosca	500 g/kg	83
	Cantus	500 g/kg	83
	Efilor	133 g/l	94
	Entargo	500 g/l	96
	Pictor Active	150 g/l	119
	Rasput	500 g/kg	133
	Revydas	200 g/l	135
	Signum	26.7 %	142
butil-fluazifops-P	Fortune	150 g/l	205
	Frequent	125 g/l	205
	Fusilade Forte 150 EC	150 g/l	205
ciazofamīds	Ranman Top	160 g/l	133
ciāntraniliprols	Benevia 100 OD	100 g/l	270
	Lumiposa 625 FS	625 g/l	62
ciflufenamīds	Cidely Top	15 g/l	86
cikloksidims	Focus Ultra	100 g/l	200
cipermetrīns	Ciperkils 500 e.k.	500 g/l	273
ciprodinils	Chorus 50 WG	500 g/kg	85
	Switch 62.5 WG	375 g/kg	147
***Clonostachys rosea*, celms J1446**	Lalstop G46 WG	900 g/kg	312
Cydia pomonella Granulovirus (CpGV-V15)	Madex Pro	3 x 10^{13} virioni olbaltumvielu apvalkā/l	316, 317
deltametrīns	Decis Forte	100 g/l	275
	Decis Mega	50 g/l	277
	Delmetros 100 SC	100 g/l	278
	Granprotec	25 g/l	279
	K-Obiol	25 g/l	282
	Koron 100 SC	100 g/l	278
	Poleci	25 g/l	296

1	2	3	4
diatomīta zeme	SilicoSec	1000 g/kg	298
difenokonazols	Amistar Gold	125 g/l	77
	Celest Trio 060 FS	25 g/l	60
	Cidely Top	125 g/l	86
	Difcor 250 EC	250 g/l	90
	Difend	30 g/l	61
	Difenzone	250 g/l	92
	Emin dārzam Score 250 EC	250 g/l	141
	Maganic	125 g/l	114
	Mavita 250 EC	250 g/l	140
	Maxim Extra 050 FS	25 g/l	63
	Mirador Uni	125 g/l	77
	Revus Top	250 g/l	135
	Score	250 g/l	141
	Score 250 EC	250 g/l	140, 141
	Toprex 375 SC	250 g/l	56, 153
	Vredmix	125 g/l	77
diflufenikans	Diflanil 500 SC	500 g/l	192
	Elipris	180 g/l	195
	Fragma Delta	500 g/l	253
	Komplet	280 g/l	217
	Legacy 500 SC	500 g/l	220
	Legacy Pro	40 g/l	220
	Mateno Duo	100 g/l	223
	Saracen Delta	500 g/l	253
	Stakato 500 SC	500 g/l	220
	Trinity	40 g/l	220
dihlorprops-P	Duplosan Super	310 g/l	195
	Optica Trio	310 g/l	232
dikamba	Banvel 4S	480 g/l	169
	Dicash	480 g/l	192
	Dicoherb Super 750 SL	90 g/l	192
dimetahlors	Brasan 540 EC	500 g/l	180
	Teridox 500 EC	500 g/l	263
dimetēnamīds-P	Butisan Avant	100 g/l	181
	Butisan Kombi	200 g/l	182
	Butisan Pro	333 g/l	261
	Conaxis	400 g/l	189
	Spectrum	720 g/l	255
	Tanaris	333 g/l	261
ditianons	Delan Pro	125 g/l	88
	Dynamo	700 g/kg	92
	Effector	700 g/kg	92
dodīns	Syllit 544 SC	544 g/l	149
dzelzs (III) fosfāts	Ferramol	9.9 g/kg	302
	Ferramol Limacide	9.9 g/kg	302
	Ironmax Pro	24.2 g/kg	303
	SLUXX^{HP}	29.7 g/kg	306
dzelzs pirofosfāts	Vitrol GB	24 g/kg	306, 307
etefons	Camposan Extra	600 g/l	41
	Cerone	480 g/l	42
	Etefone	480 g/l	44
	Everest	480 g/l	42
	Grassrooter	480 g/l	44
	Terpal	155 g/l	55
etilēns	Banarg	4 %	40
etil-fenoksaprops-P	Foxtrot 69 EW	69 g/l	204
	Herbos 110 EC	110 g/l	214
	Puma Universal	69 g/l	240
	Sunda	69 g/l	258
etil-karfentrazons	Spotlight Plus	60 g/l	57, 255

1	2	3	4
etil-kvizalofops-P	Achiba	100 g/l	165
	Gepard 50 EC	50 g/l	241
	Graminis	50 g/l	241
	Jenot Plus 050 EC	50 g/l	262
	Leopard	50 g/l	221
	Nervure	50 g/l	227
	Pilot	50 g/l	262
	Quick 50 EC	50 g/l	241
	Rango Max	50 g/l	242
	Supero	50 g/l	241
	Targa Super	50 g/l	262
etil-piraflufēns	Mizuki	10.6 g/l	57, 226
etil-trineksapaks	Bertego	250 g/l	50
	Calma	175 g/l	56
	Cuadro NT	250 g/l	43
	Medax Max	75 g/kg	46
	Moddus 250 EC	250 g/l	50
	Moddus Start	250 g/l	50
	Moxa	250 g/l	51
	Nexa 500 EC	500 g/l	52
	Next	250 g/l	53
	Optimus	175 g/l	56
	Regucil	250 g/l	50
	Regucil Start	250 g/l	50
	Stemper	175 g/l	54
	Tempo	250 g/l	50
	Trimaxx	175 g/l	56
etofumezāts	Xerton	417 g/l	268
fenmedifams	Betanal	160 g/l	177
fenpikoksamīds	Univoq	50 g/l	154
fenpropidīns	Leander	750 g/l	111
	Winotote	750 g/l	111
flonikamīds	Teppeki	500 g/kg	299
florasulams	Axial One	5 g/l	169
	Broadway Star	14.2 g/kg	180
	Cleave	2.5 g/l	186
	Elegant 2FD	6.25 g/l	195
	Flyer	50 g/l	199
	Fragma	50 g/l	253
	Fragma Delta	50 g/l	253
	Lancelot	150 g/kg	219
	Mixin	2.5 g/l	186
	Mustangs s.e.	6.25 g/l	227
	Mustangs Forte s.e.	5 g/l	227
	Pony 306 SE	6.25 g/l	235
	Primme	50 g/l	237
	Primus	50 g/l	237
	Primus 250 WG	250 g/kg	238
	Primus XL	5 g/l	239
	Pro	50 g/l	237
	Quelex	100 g/kg	240
	Rassel 100 SC	100 g/l	244
	Rexade 440	100 g/kg	244
	Saracen	50 g/l	253
	Saracen Delta	50 g/l	253
	Sitara	2.5 g/l	256
	Starane XL	2.5 g/l	256
	SuPrim	50 g/l	237
	Timeline FX	1.75 g/l	263
	Tombo WG	25 g/kg	265
	Tripali	105 g/kg	266
	Zypar	5 g/l	268
fluazinams	Altima 500 s.k.	500 g/l	72
	Frowncide 500 s.k.	500 g/l	72
	Nando 500 SC	500 g/l	117
	Ohayo 500 s.k.	500 g/l	72
	Širlans 500 s.k.	500 g/l	72
	Winby 500 s.k.	500 g/l	72

1	2	3	4
fludioksonils	Bariton Super	37.5 g/l	59
	Beret 025 FS	25 g/l	62
	Celest Trio 060 FS	25 g/l	60
	Kinto Plus	33.3 g/l	61
	Maxim 025 FS	25 g/l	62
	Maxim Extra 050 FS	25 g/l	63
	Prepper	25 g/l	63
	Seedron	50 g/l	65
	Surrender	100 g/l	65
	Switch 62.5 WG	250 g/kg	147
	Treso	500 g/kg	154
	Vibrance Duo	25 g/l	66
	Vibrance Pro	25 g/l	67
	Vibrance Star	25 g/l	67
	Vibrance Trio	25 g/l	68
flufenacets	Cadou SC	508.8 g/l	183
	Elipris	240 g/l	195
	Komplet	280 g/l	217
	Pontos	240 g/l	235
fluksapiroksāds	Allstar	300 g/l	59, 72
	Avastel	75 g/l	78
	Imtrex XE	62.5 g/l	102
	Kinto Plus	33.3 g/l	61
	Librax	62.5 g/l	112
	Pioli	62.5 g/l	102
	Priaxor	75 g/l	124
	Revystar XL	50 g/l	137
	Revytrex	66.7 g/l	138
	Systiva	333 g/l	66
	Vazanti	75 g/l	78
fluoksastrobīns	Scenic Gold	150 g/l	64
	Variano Xpro	50 g/l	155
fluopikolīds	Infinito	62.5 g/l	103
	Scenic Gold	200 g/l	64
fluopirams	Ascra Xpro	65 g/l	77
	Propulse	125 g/l	127
	Silvron	100 g/l	145
flupiradifurons	Buteo Start	480 g/l	60
fluroksipirs	Arbiter	200 g/l	214
	Ariane S	40 g/l	167
	Arrva	50 g/l	216
	Cleave	100 g/l	186
	Flurostar 180	180 g/l	198
	Flurostar Forte	400 g/l	199
	Galistop 200	200 g/l	214
	Herbistar 200 EC	200 g/l	213
	Hurler	200 g/l	214
	Kinvara	50 g/l	216
	Mixin	100 g/l	186
	Pixxaro EC	280 g/l	235
	Primus XL	100 g/l	239
	Sentrallas LQM	150 g/l	254
	Sitara	100 g/l	256
	Spitfire 333 HL	333 g/l	256
	Starane 333 HL	333 g/l	256
	Starane XL	100 g/l	256
	Tandus	200 g/l	214
	Timeline FX	52.5 g/l	263
	Tomahawk 200 EC	200 g/l	264
folpets	Fopaz	484 g/l	100
foramsulfurons	Maister Power OD	30 g/l	223
fosetils	Aliette	800 g/kg	71
	Previcur Energy	310 g/l	121
gamma-cihalotrīns	Nexide CS	60 g/l	292
	Vantex CS	60 g/l	292
giberelskābe	Gift	90 g/kg	44

1	2	3	4
glifosāts	Barbarian Biograde 360	360 g/l	170
	Barbarian Hi-Aktiv	490 g/l	171
	Barbarian Super 360	360 g/l	170
	Boom efekt 360 SL	360 g/l	177
	Clinic Up	360 g/l	170
	Credit Xtreme	540 g/l	190
	Dominator 480	480 g/l	193
	Emin dārzam Taifun B	360 g/l	261
	Gallup 360-K	360 g/l	208
	Gallup Super 360	360 g/l	170
	Glyphomax 480	480 g/l	209
	Halvetic	180 g/l	213
	Krypt 540	540 g/l	217
	Kyleo	240 g/l	219
	Monosate G	360 g/l	170
	Ouragan System 4	360 g/l	232, 233
	Rodeo Plus	360 g/l	244
	Rodeo TF	360 g/l	259
	Rosate 360 TF	360 g/l	170
	Rosate Clean 360 SL	360 g/l	177
	Roundup Biactive SL	360 g/l	246
	Roundup Dynamic	500 g/l	247
	Roundup Gold ST	450 g/l	249
	Roundup PowerMax	720 g/kg	251
	Shyfo	360 g/l	254
	Taifun B	360 g/l	259, 261
heksitiazokss	Nissorun 250 SC	250 g/l	293
hlorantraniliprols	Coragen 20 SC	200 g/l	274
hlormekvāta hlorīds	CCC	750 g/l	42
	Cycocel 750	750 g/l	43
	Stabilan 400 SL	400 g/l	53
	Stabilan 750 SL	750 g/l	42
hlortolurons	Legacy Pro	250 g/l	220
	Trinity	250 g/l	220
imazamokss	Clamox	17.5 g/l	185
	Clentiga	12.5 g/l	186
	Cleravo	35 g/l	187
	Cleravo Flex	12.5 g/l	187
	Corum	22.4 g/l	190
izofetamīds	Zenby	400 g/l	161
kalcija karbīds	Detia Wühlmausgas	800 g/kg	308
kalcija proheksadions	Hingios	75 g/l	45
	Kudos	100 g/kg	46
	Medax Max	50 g/kg	46
	Medax Top	50 g/l	47
	Regalis Plus	100 g/kg	53
kālija fosfonāts	Delan Pro	561 g/l	88
kālija hidrogēnkarbonāts	VitiSan	990 g/kg	157, 159
kaptāns	Scab 80 WG	800 g/kg	140
kletodims	Centurion Plus	120 g/l	184
	Select Plus	120 g/l	184
	VextaDim 240 EC	240 g/l	267
klomazons	Brasan 540 EC	40 g/l	180
	Clematis	360 g/l	189
	Clomate	360 g/l	189
	Conaxis	50 g/l	189
	Kalif 360 CS	360 g/l	215
	Kalif Mega	33 g/l	216
	Nimbus SE	33.3 g/l	229
	Novitron DAMTec	30 g/kg	229
	Toutatis DAMTec	30 g/kg	229

1	2	3	4
klopiralīds	Ariane S	20 g/l	167
	Arrva	28 g/l	216
	Clap	300 g/l	185
	Clap Forte	720 g/kg	186
	Cliophar 600 SL	600 g/l	188
	Galera	267 g/l	208
	Kinvara	28 g/l	216
	Korvetto	120 g/l	217
	Lontrel 72 SG	720 g/kg	222
krūzmētras eļļa	Biox-M	948 g/l	40
kvarca smiltis	Cervacol extra	251 g/kg	308
	WAM extra	298.5 g/kg	310
	Wōbra	475.2 g/kg	310
kvinmeraks	Butisan Avant	100 g/l	181
	Butisan Pro	167 g/l	261
	Butisan Star	83 g/l	182
	Clentiga	250 g/l	186
	Cleravo	250 g/l	187
	Cleravo Flex	125 g/l	187
	Fuego Top	125 g/l	258
	Rapsan Plus	83 g/l	243
	Rapsan Plus SC	83 g/l	182
	Sultan Super	125 g/l	258
	Tanaris	167 g/l	261
lambda-cihalotrīns	Kaiso 50 EG	50 g/kg	280
	Karate Zeon 5 CS	50 g/l	280
magnija fosfīds	MAGTOXIN TABLET	66 %	283
maleīnhidrazīds	Crown MH	270 g/l	42
mandipropamīds	Emin dārzam Revus 250 SC	250 g/l	134
	Evagio Plus	200 g/l	98
	Revus 250 SC	250 g/l	134
	Revus Top	250 g/l	135
MCPA	Agroxone 75	750 g/l	167
	Ariane S	200 g/l	167
	Arrva	233 g/l	216
	Chwastox 750 SL	750 g/l	185
	Dicoherb Super 750 SL	660 g/l	192
	Duplosan Super	160 g/l	195
	EMCEE	750 g/l	196
	EMDEE	750 g/l	167
	Kinvara	233 g/l	216
	MCPA 750	750 g/l	223
	MCPA Classic 750 SL	750 g/l	185
	MCPA Super	500 g/l	224
	Nufarm MCPA 750	750 g/l	231
	Optica Trio	160 g/l	232
	Profi MCPA 750 SL	750 g/l	185
MCPB	Butoxone	400 g/l	182
mefentriflukonazols	Balaya	100 g/l	80
	Capalo Revy	66.7 g/l	83
	Lenvyor	100 g/l	111
	Relenya	50 g/l	64
	Revydas	100 g/l	135
	Revyona	75 g/l	136
	Revystar XL	100 g/l	137
	Revytrex	66.7 g/l	138
mekoprops-P	Duplosan Super	130 g/l	195
	Optica Trio	130 g/l	232
mepikvāta hlorīds	Bill	210 g/l	41
	Caryx	210 g/l	41
	Medax Top	300 g/l	47
	Mepik 300 SL	300 g/l	49
	Terpal	305 g/l	55

1	2	3	4
metaldehīds	Gusto	30 g/kg	302
	Lima Oro	50 g/kg	305
	Limgol	50 g/kg	305
	Meridian	50 g/kg	305
metamitrons	Goltix 700 SC	700 g/l	211
	Goltix Gold	700 g/l	211
metazahlors	Butisan 400	400 g/l	181
	Butisan Avant	300 g/l	181
	Butisan Kombi	200 g/l	182
	Butisan Star	333 g/l	182
	Clamox	375 g/l	185
	Fuego 500 SC	500 g/l	258
	Fuego Top	375 g/l	258
	Kalif Mega	250 g/l	216
	Metazamix™	500 g/l	225
	Nimbus SE	250 g/l	229
	Rapsan 400 SC	400 g/l	181
	Rapsan 500 SC	500 g/l	243
	Rapsan Plus	333 g/l	243
	Rapsan Plus SC	333 g/l	182
	Sultan 500 SC	500 g/l	258
	Sultan Super	375 g/l	258
metil-halauksifēns	Belkar	10 g/l	175
	Elipris	11.7 g/l	195
	Korvetto	5 g/l	217
	Pixxaro EC	12.5 g/l	235
	Quelex	104.2 g/kg	240
	Rexade 440	104.2 g/kg	244
	Trolten	7.81 g/l	267
	Zypar	6.254 g/l	268
metil-krezoksims	Candit	500 g/kg	82
metil-metsulfurons	Accurate 200 WG	200 g/kg	164
	CDQ™ SX	111 g/kg	184
	Ergon	68 g/kg	196
	Mezzo WG	200 g/kg	225
	Tripali	83 g/kg	266
metil-mezosulfurons	Incelo	45 g/kg	215
	Panexion OD	28.8 g/l	234
metil-pirimifoss	Actellic 50 EC	50 %	270
metil-tiēnkarbazons	Hussar Activ Plus OD	7.5 g/l	215
	Incelo	15 g/kg	215
	Maister Power OD	10 g/l	223
metil-tifensulfurons	Calibre 50 SX	333 g/kg	183
	Ergon	682 g/kg	196
	Sentrallas LQM	30 g/l	254
metil-tribenurons	Calibre 50 SX	167 g/kg	183
	CDQ™ SX	222 g/kg	184
	Granstar Premia 50 SX	500 g/kg	212
	Nuance 75 WG	750 g/kg	230
	TBM 75 WG	750 g/l	263
	Tribenocare 75 WG	750 g/kg	230
	Trimmer 50 SG	500 g/kg	212
	Trimmer 500 WG	500 g/kg	265
	Tripali	83 g/kg	266
	Tristar 50 SG	500 g/kg	266
	Viking	750 g/kg	230
metkonazols	Artina	90 g/l	45, 109
	Artina EC	90 g/l	45, 109
	Bill	30 g/l	41
	Caryx	30 g/l	41
	Efilor	60 g/l	94
	Juventus 90	90 g/l	45, 109
	Librax	45 g/l	112
	Plexeo 90	90 g/l	45, 109
	Plexeo 90 EC	90 g/l	45, 109
	Remocco 90	90 g/l	45, 109
	Turret 90	90 g/l	45, 109

1	2	3	4
metobromurons	Proman	500 g/l	240
metrafenons	Capalo Revy	100 g/l	83
	Flexity	300 g/l	99
mezotrions	Barracuda	100 g/l	173
	Botiga	90 g/l	179
	Callisto 100 SC	100 g/l	183
	Elumis 105 OD	75 g/l	195
	Fraxion	100 g/l	173
	Starship	100 g/l	257
	Temsa SC	100 g/l	263
napropamīds	Devrinols s.k.	450 g/l	191
nātrija metil-jodosulfurons	Hussar Activ Plus OD	10 g/l	215
	Maister Power OD	1 g/l	223
	Sekator OD	25 g/l	254
	Yodo 100 OD	100 g/l	268
nātrija propoksikarbazons	Attribut	700 g/kg	168
nātrija sudraba tiosulfāts	STS Cucurbitaceae	40 g/l	55
nikosulfurons	Elumis 105 OD	30 g/l	195
	Fornet 4 OD	40 g/l	225
	Fornet Max 6 OD	60 g/l	226
	Milagro 4 OD	40 g/l	225
	Milagro Extra 6 OD	60 g/l	226
	Nicogan	40 g/l	229
	Samson 4 OD	40 g/l	225
	Samson Max 6 OD	60 g/l	226
oksatiapiprolīns	Zorvec Enicade	100 g/l	162
paklobutrazols	Toprex 375 SC	125 g/l	56, 153
parafīneļļa	Fibro	797 g/l	279
pelargonskābe	Beloukha	680 g/l	57, 175
	Beloukha Garden RTU	21.7 g/l	176
	Katoun Gold	500 g/l	216
	Pret nezālēm Hobby	43.1 g/l	236
	Pret nezālēm Ultra	565.5 g/l	236
pendimetalīns	Flight Forte	320 g/l	198
	Legacy Pro	300 g/l	220
	Stomp CS	455 g/l	257
	Trinity	300 g/l	220
penkonazols	Topas 100 EC	100 g/l	152
***Pepino mosaic* vīrusa celma CH2 izolāts 1906**	PMV-01	>5 x 10^5 vīrusa daļiņas/μL	320
Phlebiopsis gigantea	Rotstop SC	2 x 10^6 – 2 x 10^7 k.v.v./g	321
***Pythium oligandrum* M1**	Polyversum	1000000 oosporas/g	320
piklorams	Belkar	48 g/l	175
	Galera	67 g/l	208
	Metazamix™	13.2 g/l	225
	Zorro 300 SL	300 g/l	268
pikolinafēns	Flight Forte	16 g/l	198
	Pico 750 WG	750 g/kg	234
	Pontos	100 g/l	235
pinoksadēns	Avoxa	33.3 g/l	168
	Axial 50 EC	50 g/l	168
	Axial One	45 g/l	169
	Panexion OD	120 g/l	234
	Timeline FX	30 g/l	263
piraklostrobīns	Balaya	100 g/l	80
	Capalo Revy	80 g/l	83
	Comet Pro	200 g/l	86
	Pictor Active	250 g/l	119
	Priaxor	150 g/l	124
	Signum	6.7 %	142
piridāts	Botiga	300 g/l	179
	Lentagran WP	450 g/kg	220
	Onyx	600 g/l	231

1	2	3	4
piriofenons	Property 180 SC	180 g/l	127
piroksulams	Avoxa	8.33 g/l	168
	Broadway Star	70.8 g/kg	180
	Rexade 440	240 g/kg	244
	Tombo WG	50 g/kg	265
prokvinazīds	Input Triple	40 g/l	106
	Talius	200 g/l	150
	Verben	50 g/l	156
propakvizafops	Agil 100 EC	100 g/l	165
	Zetrola	100 g/l	165
propamokarbs	Infinito	523.8 g/l	103
	Previcur Energy	530 g/l	121
	Sporax	605 g/l	147
prosulfokarbs	Boiler	800 g/l	252
	Boxer 800 EC	800 g/l	179
	Linati 800 EC	800 g/l	179
	Professional	800 g/l	239
	Roxy EC	800 g/l	179
	Roxy 800 EC	800 g/l	252
protiokonazols	Ascra Xpro	130 g/l	77
	Avastel	150 g/l	78
	Bariton Super	50 g/l	59
	Benafar	250 g/l	146
	Croton Flex	250 g/l	125
	Curbatur	250 g/l	125
	Delaro Forte	93.3 g/l	88
	Elatus Era	150 g/l	94
	Euskatel	250 g/l	97
	Falcon Forte	53 g/l	98
	Gamelan 100 FS	100 g/l	61
	Glacis	250 g/l	125
	Hutton Flex	175 g/l	101
	Innox	250 g/l	146
	Input	160 g/l	104
	Input Triple	160 g/l	106
	Joust	250 g/l	107
	Maganic	175 g/l	114
	Maxentis	150 g/l	115
	Patel 300 EC	300 g/l	130
	Pecari 300 EC	300 g/l	130
	Poleposition 300 EC	300 g/l	130
	Praktis	250 g/l	121
	Proline	250 g/l	125
	Propulse	125 g/l	127
	Prosaro	125 g/l	128
	Protendo 300 EC	300 g/l	130
	Protikon 250 EC	250 g/l	132
	Redigo Pro	150 g/l	64
	Siltra Xpro	200 g/l	144
	Soratel	250 g/l	146
	Tetatra	250 g/l	146
	Tilmor	80 g/l	55, 151
	Univoq	100 g/l	154
	Variano Xpro	100 g/l	155
	Vazanti	150 g/l	78
	Verben	200 g/l	156
rimsulfurons	RIM 25 WG	250 g/kg	244
	Titus 25 d.g.	250 g/kg	264
sedaksāns	Vibrance Duo	25 g/l	66
	Vibrance Pro	25 g/l	67
	Vibrance Star	25 g/l	67
	Vibrance Trio	25 g/l	68
siltiofams	Latitude XL	125 g/l	62

1	2	3	4
spinosads	Tracer	480 g/l	300
spiroksamīns	Cayunis	150 g/l	84
	Delaro Forte	107 g/l	88
	Falcon Forte	224 g/l	98
	Input	300 g/l	104
	Input Triple	200 g/l	106
***Streptomyces* strain K61**	Mycostop	5 x 10^8 k.v.v./g	317
sulfosulfurons	Monitor	75 %	226
tau-fluvalināts	Emin dārzam Mavrik Vita	240 g/l	286
	Evure	240 g/l	285
	Mavrik	240 g/l	285, 286
tebukonazols	Bariton Super	10 g/l	59
	Celest Trio 060 FS	10 g/l	60
	Cezix	250 g/l	87
	Chambel 6 FS	60 g/l	60
	DARCOS	250 g/l	87
	Dominic	250 g/l	150
	Erasmus	250 g/l	87
	Falcon Forte	148 g/l	98
	Folicur	250 g/l	44, 99
	Mirador Forte	100 g/l	116
	Orius 250 EW	250 g/l	118
	Prosaro	125 g/l	128
	Redigo Pro	20 g/l	64
	Riza 200 EC	200 g/l	139
	Seedron	10 g/l	65
	Syrius	250 g/l	118
	Tebuplius	250 g/l	150
	Tebusha 25 EW	250 g/l	150
	Tilmor	160 g/l	55, 151
	Vibrance Trio	10 g/l	68
teflutrīns	SoilGuard 0.5 GR	5 g/kg	299
tefuril-kvizalofops-P	Bagira	40 g/l	234
	Panarex	40 g/l	234
	Pantera 4 EC	40 g/l	234
***Trichoderma asperellum*, celms T34**	T34 Biocontrol	120 g/kg	326
***Trichoderma harzianum*, celms T-22**	Trianum-P	10 g/kg	328
trifloksistrobīns	Cayunis	100 g/l	84
	Delaro Forte	80 g/l	88
	Hutton Flex	150 g/l	101
tritikonazols	Kinto Plus	33.3 g/l	61
	Vibrance Pro	20 g/l	67
	Vibrance Star	20 g/l	67
žāvētu asiņu milti	Plantskydd	998 g/kg	309

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE MIKROBIOLOĢISKIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums	Liet. kat.	Reģistrācijas īpašnieks	Reģ. Nr.	Reģ. klase	Aktīvās sastāvdaļas nosaukums	Aktīvās sastāvdaļas saturs	Reģ. beigu termiņš	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DiPel DF	I	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	0760	2	*Bacillus thuringiensis var. kurstaki*, celms ABTS 351	540 g/kg	31.12.2025.	311
Lalstop G46 WG	F	Danstar Ferment AG	0813	3	*Clonostachys rosea*, celms J1446	900 g/kg	31.03.2035.	312
Madex Pro	I	Andermatt Group AG	0762	2/3	*Cydia pomonella Granulovirus (CpGV-V15)*	3×10^{13} virioni olbaltumvielu apvalkā/l	31.10.2039.	316, 317
Mycostop	F	Danstar Ferment AG	0480	3	*Streptomyces*, strain K61	5×10^{8} k.v.v./g	30.04.2025.	317
Naturalis	I	CBC (Europe) S.r.l.	0858	3	*Beauveria bassiana*, celms ATCC 74040	0.179 g/l	30.09.2026.	318
PMV-01	V	De Ceuster Meststoffen n.v.	0701	2	*Pepino mosaic* vīrusa celma CH2 izolāts 1906	> 5×10^{5} vīrusa daļiņas/μL	07.08.2031.	320
Polyversum	F	BIOPREPARÁTY, spol. s r.o.	0719	2	*Pythium oligandrum* M1	1000000 oosporas/g	28.02.2039.	320
Rotstop SC	F	Danstar Ferment AG	0401	3	*Phlebiopsis gigantea*	2×10^{6} – 2×10^{7} k.v.v./g	30.04.2025.	321
Serenade Aso	F	Bayer AG	0556	2	*Bacillus subtilis*, celms QST 713	13.96 g/l	15.08.2025.	321
T34 Biocontrol	F	Biocontrol Technologies, S.L.	0809	2/3	*Trichoderma asperellum*, celms T34	120 g/kg	31.10.2026.	326
Trianum-P	F	Koppert B.V.	0676	3	*Trichoderma harzianum*, celms T-22	10 g/kg	15.04.2026.	328

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI AR ZEMU KAITĪGUMA PAKĀPI

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Reģistrācijas īpašnieks	Reģ. Nr.	Reģ. klase	Darbīgās vielas nosaukums / Aktīvās sastāvdaļas nosaukums / Dzīvais organisms	Darbīgās vielas saturs	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7	8
Cervacol extra	R	FMC Agricultural Solutions A/S	0337	3	kvarca smiltis	251 g/kg	308
Ferramol	Lim	W.Neudorff GmbH KG	0395	3	dzelzs (III) fosfāts	9.9 g/kg	302
Ferramol Limacide	Lim	W.Neudorff GmbH KG	0745	3	dzelzs (III) fosfāts	9.9 g/kg	302
Ironmax Pro	Lim	De Sangosse S.A.S.	0630	3	dzelzs (III) fosfāts	24.2 g/kg	303
Isonet Z	FR	CBC (Europe) S.r.l.	0918	3	(E,Z)-2,13-oktadekadiēn-1-ilacetāts (E,Z)- 3,13-oktadekadiēn-1-ilacetāts	755 g/kg 30 g/kg	352
Lalstop G46 WG	F	Danstar Ferment AG	0813	3	*Clonostachys rosea*, celms J1446	900 g/kg	312
Plantskydd	R	Plantskydd AB	0274	3	žāvētu asiņu milti	998 g/kg	309
PMV-01	V	De Ceuster Meststoffen n.v.	0701	2	*Pepino mosaic* vīrusa celma CH2 izolāts 1906	> 5×10^{5} vīrusa daļiņas/μL	320
SLUXX^{HP}	Lim	W.Neudorff GmbH KG	0396	2	dzelzs (III) fosfāts	29.7 g/kg	306
VitiSan	F	Andermatt Group AG	0788	3	kālija hidrogēnkarbonāts	990 g/kg	157, 159
Vitrol GB	Lim	Bros Sp. z o.o.	0857	3	dzelzs pirofosfāts	24 g/kg	306, 307
WAM extra	R	Witasek PflanzenSchutz GmbH	0482	3	kvarca smiltis	298.5 g/kg	310
Wöbra	R	Flügel GmbH	0575	3	kvarca smiltis	475.2 g/kg	310

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE DZĪVOS ORGANISMUS SATUROŠIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI*

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums	Reģistrācijas īpašnieks	Reģ. Nr.	Reģ. klase	Dzīvā organisma nosaukums	Reģistrācijas beigu termiņš	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7
ABS sistēma	Biobest Group N.V.	0447	3	*Neoseiulus cucumeris*	03.04.2033.	330
Adalia sistēma (Adalia-E sistēma)	Biobest Group N.V.	0463	3	*Adalia bipunctata*	13.04.2034.	330
Afidius sistēma	Biobest Group N.V.	0442	3	*Aphidius colemani*	03.04.2033.	330
Afidiuss	IK “Ciklaneda BS”	0064	3	*Aphidius colemani*	09.04.2026.	330
Afidoletes sistēma	Biobest Group N.V.	0448	3	*Aphidoletes aphidimyza*	03.04.2033.	331
Ambliseiuss	IK “Ciklaneda BS”	0063	3	*Amblyseius cucumeris*	09.04.2026.	331
Ambliseijus sistēma	Biobest Group N.V.	0464	3	*Amblyseius cucumeris*	13.04.2034.	331
Aphidend	Koppert B.V.	0124	3	*Aphidoletes aphidimyza*	02.04.2028.	331
Aphipar	Koppert B.V.	0616	3	*Aphidius colemani*	01.05.2028.	332
Aphiscout	Koppert B.V.	0702	3	*Aphidius colemani* *Aphidius ervi Haliday* *Aphelinius abdominalis* *Praon volucre* *Ephedrus cerasicola*	17.10.2029.	332
Calif PRO5	SIA SPTS	0734	3	*Neoseiulus californicus*	11.06.2030.	332
Calif PRO5 LS	SIA SPTS	0735	3	*Neoseiulus californicus*	11.06.2030.	332
Carpo sistēma	Biobest Group N.V.	0865	3	*Steinernema carpocapsae*	18.09.2033.	333
CBS sistēma	Biobest Group N.V.	0610	3	*Neoseiulus californicus*	09.05.2028.	333
Chrysopa	Koppert B.V.	0883	3	*Chrysoperla carnea*	17.03.2034.	333
Chrysopa-E	Koppert B.V.	0884	3	*Chrysoperla carnea*	17.03.2034.	334
Cryptobug	Koppert B.V.	0683	3	*Cryptolaemus montrouzieri*	26.05.2029.	334
Cryptobug-L	Koppert B.V.	0684	3	*Cryptolaemus montrouzieri*	26.05.2029.	334
Cucum PRO5	SIA SPTS	0768	3	*Neoseiulus cucumeris*	31.10.2031.	334
Cucum PRO5 LS	SIA SPTS	0769	3	*Neoseiulus cucumeris*	31.10.2031.	334
Daknusa sistēma	Biobest Group N.V.	0659	3	*Dacnusa sibirica*	06.12.2028.	335
Diglifus sistēma	Biobest Group N.V.	0443	3	*Diglyphus isaea*	03.04.2033.	335
Enermix	Koppert B.V.	0649	3	*Eretmocerus eremicus, Encarsia formosa*	30.09.2028.	335
Enkarsija	IK “Ciklaneda BS”	0061	3	*Encarsia formosa*	09.04.2026.	335
Enkarsijas sistēma	Biobest Group N.V.	0444	3	*Encarsia formosa*	03.04.2033.	336
En-strip	Koppert B.V.	0125	3	*Encarsia formosa*	02.04.2028.	336
Entomite-M	Koppert B.V.	0615	3	*Stratiolaelaps scimitus*	01.05.2028.	336
Entonem	Koppert B.V.	0619	3	*Steinernema feltiae*	16.05.2028.	336
Ercal	Koopert B.V.	0614	3	*Eretmocerus eremicus*	01.05.2028.	337
Eretmiks sistēma	Biobest Group N.V.	0465	3	*Encarsia formosa, Eretmocerus eremicus*	13.04.2034.	337
Eretmocerus sistēma	Biobest Group N.V.	0466	3	*Eretmocerus eremicus*	13.04.2034.	337
Ervipar	Koppert B.V.	0670	3	*Aphidius ervi Haliday*	11.02.2029.	337
Eupiods sistēma	Biobest N.V.	0725	3	*Eupeodes corollae* (Fabricius, 1794)	19.03.2030.	338
Feltiella sistēma	Biobest Group N.V.	0529	3	*Feltiella acarisuga*	07.04.2026.	338
Fitoseiulus sistēma	Biobest Group N.V.	0449	3	*Phytoseiulus persimilis*	03.04.2033.	339
Fitosējuluss	IK “Ciklaneda BS”	0060	3	*Phytoseiulus persimilis*	09.04.2026.	339
Heterorhabditis sistēma	Biobest Group N.V.	0866	3	*Heterorhabditis bacteriophora*	18.09.2033.	339

1	2	3	4	5	6	7
Hipoaspis sistēma	Biobest Group N.V.	0445	3	*Stratiolaelaps scimitus*	03.04.2033.	339
Kalifornikus sistēma	Biobest Group N.V.	0609	3	*Neoseiulus californicus*	09.05.2028.	340
Kriptolēmus-(L-) sistēma	Biobest Group N.V.	0754	3	*Cryptolaemus montrouzieri* (Mulsant)	08.02.2031.	340
Larvanem	Koppert B.V.	0692	3	*Heterorhabditis bacteriophora*	08.09.2029.	340
Limonikus sistēma	Biobest Group N.V.	0693	3	*Amblydromalus limonicus*	08.09.2029.	341
Macro-Mite	Koppert B.V.	0645	3	*Macrocheles robustulus*	30.09.2028.	341
Makrolofus sistēma (Makrolofus-N sistēma)	Biobest Group N.V.	0446	3	*Macrolophus pygmaeus*	03.04.2033.	341
Miglyphus	Koppert B.V.	0648	3	*Diglyphus isaea*	30.09.2028.	342
Mikromus sistēma	Biobest Group N.V.	0820	3	*Mikromus angulatus*	15.05.2032.	342
Mirical	Koppert B.V.	0127	3	*Macrolophus pygmaeus*	02.04.2028.	342
Montdorensis sistēma	Biobest Group N.V.	0694	3	*Transeius montdorensis*	08.09.2029.	343
NemaFence Phasma	SIA BASF	0894	3	*Phasmarhabditis californica*	09.09.2034.	343
Nemaslug	SIA BASF	0687	3	*Phasmarhabditis hermaphrodita*	10.07.2029.	343
Nemasys	SIA BASF	0688	3	*Steinernema feltiae*	10.07.2029.	344
Nemasys C	SIA BASF	0690	3	*Steinernema carpocapsae*	10.07.2029.	345
Nemasys H	SIA BASF	0686	3	*Heterorhabditis bacteriophora*	10.07.2029.	345
Nemasys L	SIA BASF	0685	3	*Steinernema kraussei*	10.07.2029.	346
Nemasys No Ants	SIA BASF	0689	3	*Steinernema feltiae*	10.07.2029.	346
Orius sistēma	Biobest Group N.V.	0467	3	*Orius laevigatus*	24.04.2034.	346
Pangodiņš	IK “Ciklaneda BS”	0062	3	*Aphidoletes aphidimyza*	09.04.2026.	346
Sferoforia sistēma	Biobest Group N.V.	0660	3	*Spaerophoria rueppellii*	06.12.2028.	347
Spical	Koppert B.V.	0633	3	*Neoseiulus californicus*	12.07.2028.	347
Spical-Plus	Koppert B.V.	0634	3	*Neoseiulus californicus*	12.07.2028.	347
Spidend	Koppert B.V.	0647	3	*Feltiella acarisuga*	30.09.2028.	348
Spidex Vital	Koppert B.V.	0128	3	*Phytoseiulus persimilis*	02.04.2028.	348
Steinernema sistēma	Biobest Group N.V.	0661	3	*Steinernema feltiae*	06.12.2028.	348
Svirski sistēma	Biobest Group N.V.	0441	3	*Amblyseius swirskii*	03.04.2033.	349
Swir PRO5	SIA SPTS	0736	3	*Amblyseius swirskii*	11.06.2030.	349
Swir PRO5 LS	SIA SPTS	0737	3	*Amblyseius swirskii*	11.06.2030.	349
Swirskii-Mite	Koppert B.V.	0620	3	*Amblyseius swirskii*	16.05.2028.	350
Swirskii-Mite LD	Koppert B.V.	0621	3	*Amblyseius swirskii*	16.05.2028.	350
Swirskii-Mite Plus	Koppert B.V.	0622	3	*Amblyseius swirskii*	16.05.2028.	350
Thripor-L	Koppert B.V.	0646	3	*Orius laevigatus*	30.09.2028.	351
Trihogramma	SIA “Bioefekts”	0143	3	*Trichogramma embryophagum*	16.12.2028.	351
Thripex (Thripex-plus)	Koppert B.V.	0129	3	*Neoseiulus cucumeris*	02.04.2028.	351

*Visus dzīvos organismus saturošos augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI, KURUS ATĻAUTS LIETOT BIOLOĢISKAJĀ LAUKSAIMNIECĪBĀ

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Reģistrācijas īpašnieks	Reģ. Nr.	Reģ. klase	Darbīgās vielas nosaukums / Aktīvās sastāvdaļas nosaukums / Dzīvais organisms	Darbīgās vielas saturs	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7	8
Cervacol extra	R	FMC Agricultural Solutions A/S	0337	3	kvarca smiltis	251 g/kg	308
DiPel DF	I	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	0760	2	*Bacillus thuringiensis var. kurstaki*, celms ABTS351	540g/kg	311
Ferramol	Lim	W.Neudorff GmbH KG	0395	3	dzelzs (III) fosfāts	9.9 g/kg	302
Ferramol Limacide	Lim	W.Neudorff GmbH KG	0745	3	dzelzs (III) fosfāts	9.9 g/kg	302
Fibro	I/A	Belchim Crop Protection NV	0460	2	parafīneļļa	797 g/l	279
Ironmax Pro	Lim	De Sangosse S.A.S.	0630	3	dzelzs (III) fosfāts	24.2 g/kg	303
Lalstop G46 WG	F	Danstar Ferment AG	0813	3	*Clonostachys rosea*, celms J1446	900 g/kg	312
Madex Pro	I	Andrematt Group AG	0762	2/3	*Cydia pomonella Granulovirus (CpGV-V15)*	3 x 10^{13} virioni olbaltumvielu apvalkā/l	316, 317
Mycostop	F	Danstar Ferment AG	0480	3	*Streptomyces* strain K61	5 x 10^{8} k.v.v./g	317
Naturalis	I	CBC (Europe) S.r.l.	0858	3	*Beauveria bassiana*, celms ATCC 74040	0.179 g/l	318
NeemAzal	A/I	SIA "Agrimatco Latvia"	43.*	3	azadiraktīns-A	10 g/l	290
NeemAzal-T/S	I/A	Trifolio-M GmbH	0241	2/3	azadiraktīns-A	10 g/l	289, 290
PMV-01	B/V	De Ceuster Meststoffen n.v.	0701	2	*Pepino mosaic* vīrusa celma CH2 izolāts 1906	> 5 x 10^{5} vīrusa daļiņas/µL	320
Polyversum	F	BIOPREPARÁTY, spol. s r.o.	0719	2	*Pythium oligandrum* M1	1000000 oosporas/g	320
Rotstop SC	F	Danstar Ferment AG	0401	3	*Phlebiopsis gigantea*	2 x 10^{6} – 2 x 10^{7} k.v.v./g	321
Serenade Aso	F	Bayer AG	0556	2	*Bacillus subtilis*, celms QST 713	13.96 g/l	321
SilicoSec	I/A	Andermatt Group AG	0910	2	diatomīta zeme	1000 g/kg	298
SLUXX^{HP}	Lim	W.Neudorff GmbH KG	0396	2	dzelzs (III) fosfāts	29.7 g/kg	306
T34 Biocontrol	F	Biocontrol Technologies, S.L.	0809	2/3	*Trichoderma asperellum*, celms T34	120 g/kg	326
Tracer	I	Corteva Agriscience Denmark A/S	0740	2	spinosads	480 g/l	300
Trianum-P	F	Koppert B.V.	0676	3	*Trichoderma harzianum*, celms T-22	10 g/kg	328
Trico	R	Kwizda Agro GmbH	0435	3	aitu tauki	65 g/l	309
VitiSan	F	Andermatt Group AG	0788	3	kālija hidrogēnkarbonāts	990 g/kg	157, 159
Vitrol GB	Lim	Bros Sp. z o.o.	0857	3	dzelzs pirofosfāts	24 g/kg	306, 307
WAM extra	R	Witasek PflanzenSchutz GmbH	0482	3	kvarca smiltis	298.5 g/kg	310
Wöbra	R	Flügel GmbH	0575	3	kvarca smiltis	475.2 g/kg	310

*AAL, kuram izsniegta paralēlās tirdzniecības atļauja

PIEŠĶIRTĀS ATĻAUJAS AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU PARALĒLAI TIRDZNIECĪBAI

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Atļaujas īpašnieks	Atļaujas Nr.	Reģ. klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Atļauja derīga no	Atļaujas derīguma termiņš	Identiskais Latvijas Republikā reģistrētais augu aizsardzības līdzeklis		Lpp.
									Nosaukums	Reģ. Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Acetami 20 SG	I	Agrimotion S.A.	55.	2	acetamiprīds	200 g/kg	29.08.2022.	28.02.2034.	Mospilan 20 SG	0811	287
Acetazol 20 SG	I	Agrozol Chemicals Srl	60.	2	acetamiprīds	200 g/kg	12.01.2023.	28.02.2034.	Mospilan 20 SG	0811	287
Acetazol Extra	I	Agrozol Chemicals Srl	63.	2	acetamiprīds	200 g/l	12.12.2023.	28.02.2034.	Carnadine Extra	0812	272
AGROPHOS PELLETS 56 GE	I	SIA "Fumigare"	48.	1	alumīnija fosfīds	56 %	26.08.2021.	30.11.2027.	Quickphos pellets 56 GE	0504	296
Balticphos pellets GE	I	SIA "KG Latvija"	64.	1	alumīnija fosfīds	56 %	25.04.2024.	30.11.2027.	Quickphos pellets 56 GE	0504	296
Bill	AR	Glo-Quimicos Lda	44.	2	mepikvāta hlorīds metkonazols	210 g/l 30 g/l	03.09.2020.	15.10.2026.	Caryx	0440	41
Emin dārzam Mavrik Vita	I	SIA "Emin dārzam"	31.	3	tau-fluvalināts	240 g/l	09.01.2018.	31.08.2025.	Mavrik	0526	286
Emin dārzam Revus 250 SC	F	SIA "Emin dārzam"	26.	3	mandipropamīds	250g/l	05.09.2017.	31.12.2026.	Revus 250 SC	0312	134
Emin dārzam Score 250 EC	F	SIA "Emin dārzam"	33.	3	difenokonazols	250 g/l	07.02.2018.	15.03.2027.	Score 250 EC	0001	141
Emin dārzam Taifun B	H	SIA "Emin dārzam"	30.	3	glifosāts	360 g/l	09.01.2018.	31.12.2028.	Taifun B	0027	261
NeemAzal	I/A	SIA "Agrimatco Latvia"	43.	3	azadiraktīns-A	10 g/l	14.01.2020.	31.08.2025.	NeemAzal-T/S	0241	290
Primme	H	Becesane s.r.o.	53.	2	florasulams	50 g/l	07.07.2022.	31.12.2031.	Primus	0172	237
Score	F	SIA "Agrimatco Latvia"	61.	3	difenokonazols	250 g/l	31.03.2023.	15.03.2027.	Score 250 EC	0001	141
Tribenocare 75 WG	H	Agrocare Chemicals Kft	65.	2	metil-tribenurons	750 g/kg	23.07.2024.	30.01.2035.	Nuance 75 WG	0403	230

2023. un 2024. GADĀ AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU REĢISTRĀ ANULĒTIE IERAKSTI

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Reģistrācijas īpašnieks	Reģ. Nr.	Reģ. klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Esošo krājumu izplatīšanas beigu termiņš	Esošo krājumu izlietošanas beigu termiņš
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Arrat	H	SIA BASF	0249	2	tritosulfurons dikamba	250 g/kg 500 g/kg	30.06.2025.	07.11.2025.
Banjo Forte	F	ADAMA Registrations B.V.	0510	2	fluazinams dimetomorfs	200 g/l 200 g/l	20.11.2024.	31.12.2024.
Biathlon 4D	H	SIA BASF	0450	2	tritosulfurons florasulams	714 g/kg 54 g/kg	30.06.2025.	07.11.2025.
Cabrio Duo	F	SIA BASF	0508	2	dimetomorfs piraklostrobīns	72 g/l 40 g/l	20.11.2024.	31.12.2024.
Champion 50 WG*	F	Nufarm GmbH & Co KG	0139	2	vara hidroksīds (kā varš)	500 g/kg	31.07.2024.	31.07.2025.
Dynasol	F	Sharda Cropchem España S.L.	0826	2	dimetomorfs	500 g/l	31.08.2024.	31.12.2024.
Landmaster 360 TF	H	Albaugh TKI d.o.o.	0640	2	glifosāts	360 g/l	15.06.2025.	15.06.2026.
Merpan 80 WG	F	ADAMA Registrations B.V.	0499	2	kaptāns	800 g/kg	31.07.2025.	31.12.2025.
Metric ZC	H	Certis Belchim B.V.	0344	2	klomazons metribuzīns	60 g/l 233 g/l	30.06.2025.	24.11.2025.
Mistral 700 WG	H	ADAMA Registrations B.V.	0259	2	metribuzīns	700 g/kg	30.06.2025.	24.11.2025.
Movento SC 100	I	Bayer AG	0758	2	spirotetramāts	100 g/l	30.10.2024.	30.10.2025.
Orvego	F	SIA BASF	0368	2	ametoktradīns dimetomorfs	300 g/l 225 g/l	20.11.2024.	31.12.2024.
Polygandron STP	K	BIOPREPARÁTY, spol. s r.o.	0721	2	*Pythium oligandrum* M1	500000 oosporas/g	30.10.2024.	30.10.2025.
Polygandron TTP	K	BIOPREPARÁTY, spol. s r.o.	0722	2	*Pythium oligandrum* M1	500000 oosporas/g	30.10.2024.	30.10.2025.
Polygandron WP	K	BIOPREPARÁTY, spol. s r.o.	0720	2	*Pythium oligandrum* M1	500000 oosporas/g	30.10.2024.	30.10.2025.
Prolectus	F	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	0458	2	fenpirazamīns	500 g/kg	30.06.2025.	30.06.2026.
Rodeo FL	H	Bayer AG	0515	2	glifosāts	360 g/l	15.06.2025.	15.06.2026.
Roundup B	H	Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.	0516	3	glifosāts	360 g/l	15.06.2025.	15.06.2026.
Roundup Flex	H	Bayer AG	0462	2	glifosāts	480 g/l	15.06.2025.	15.06.2026.
Roundup G	H	Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.	0517	3	glifosāts	120 g/l	15.06.2025.	15.06.2026.
Roundup Quick*	H	Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.	0370	3	glifosāts	7.2 g/l	15.06.2024.	15.06.2025.
Roundup Ultra	H	Bayer AG	0173	2	glifosāts	360 g/l	15.06.2025.	15.06.2026.
Tooler	H	SIA BASF	0284	2	tritosulfurons	714 g/kg	30.05.2025.	07.11.2025.
Vertimec 018 EC	I/A	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0296	2	abamektīns	18 g/l	30.10.2024.	30.10.2025.
Zorvec Endavia	F	Corteva Agriscience Denmark A/S	0746	2	izopropil-bentiavalikarbs oksatiapiprolīns	70 g/l 30 g/l	13.09.2024.	13.12.2024.

*2023. gadā augu aizsardzības līdzekļu reģistrā anulētie ieraksti

2023. un 2024. GADĀ ANULĒTĀS ATĻAUJAS AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU PARALĒLAJAI TIRDZNIECĪBAI

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Atļaujas īpašnieks	Atļaujas Nr.	Reģ. klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Esošo krājumu izplatīšanas beigu termiņš	Esošo krājumu izlietošanas beigu termiņš
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Balticphos pellets 56 GE	I	SIA "KG Latvija"	62.	1	alumīnija fosfīds	56 %	27.08.2024.	27.08.2025.
Buster*	H	ProEuro Sp. z o.o.	40.	2	metil-tribenurons	750 g/kg	30.06.2024.	30.06.2025.

*2023. gadā augu aizsardzības līdzekļu reģistrā anulētie ieraksti

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI, KURI IR KAITĪGI BITĒM

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Reģ. Nr.	Reģ. klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Pasākumi bišu aizsardzībai	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7	8
Acetami 20 SG	I	55.*	2	acetamiprīds	200 g/kg	①; R	287
Acetazol 20 SG	I	60.*	2	acetamiprīds	200 g/kg	①; R	287
Acetazol Extra	I	63.*	2	acetamiprīds	200 g/l	①; R	272
Benevia 100 OD	I	0856	2	ciāntraniliprols	100 g/l	①	270
Carnadine Extra	I	0812	2	acetamiprīds	200 g/l	①; R	272
Ciperkils 500 e.k.	I	0385	2	cipermetrīns	500 g/l	①; R	273
Coragen 20 SC	I	0755	2	hlorantraniliprols	200 g/l	①	274
Decis Forte	I	0703	2	deltametrīns	100 g/l	①; R	275
Decis Mega	I	0310	2	deltametrīns	50 g/l	①; R	277
Delmetros 100 SC	I	0675	2	deltametrīns	100 g/l	①; R	278
Emin dārzam Mavrik Vita	I	31.*	3	tau-fluvalināts	240 g/l	①	286
Evure	I	0577	2	tau-fluvalināts	240 g/l	①; R	285
Gazelle 20 SG	I	0871	2	acetamiprīds	200 g/kg	①; R	287
Imprid Skog	I	0855	2	acetamiprīds	200 g/kg	①	280
Kaiso 50 EG	I	0381	2	lambda-cihalotrīns	50 g/kg	①; R	280
Karate Zeon 5 CS	I	0207	2	lambda-cihalotrīns	50 g/l	①; R	280
Koron 100 SC	I	0815	2	deltametrīns	100 g/l	①; R	278
Mavrik	I	0526	2/3	tau-fluvalināts	240 g/l	①; R	285, 286
Mospilan 20 SG	I	0811	2	acetamiprīds	200 g/kg	①; R	287
Nexide CS	I	0715	2	gamma-cihalotrīns	60 g/l	①; R	292
Poleci	I	0764	2	deltametrīns	25 g/l	①; R	296
Teppeki	I	0699	2	flonikamīds	500 g/kg	①	299
Tracer	I	0740	2	spinosads	480 g/l	①	300
Vantex CS	I	0716	2	gamma-cihalotrīns	60 g/l	①; R	292

① – Personai, kas lieto augu aizsardzības līdzekli, jāievēro konkrētā augu aizsardzības līdzekļa marķējuma tekstā un augu aizsardzības līdzekļa lietošanas instrukcijā noteiktie bišu aizsardzības pasākumi;
R – Augu aizsardzības līdzeklis reģistrēts arī lietojumam rapsī

* AAL, kuram izsniegta paralēlās tirdzniecības atļauja

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI, KURIEM IR NOTIEKTI LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DARBĪGO VIELU

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums	Liet. kat.	Reģ. Nr.	Reģ. klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7
Aminopiralīds: “**SPe1** Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur aminopiralīdu vienā un tajā paša laukā vairāk kā vienu reizi divos gados.”						
Cleravo Flex	H	0792	2	kvinmeraks imazamokss aminopiralīds	125 g/l 12.5 g/l 4 g/l	187
Aminopiralīds: “**SPe1** Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur aminopiralīdu biežāk, kā katru otro gadu tajā pašā laukā.”						
Metazamix™	H	0500	2	metazahlors aminopiralīds piklorams	500 g/l 5.3 g/l 13.3 g/l	225
Bentazons: “**SPe1** Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu bentazonu saturošu augu aizsardzības līdzekli, vairāk kā vienu reizi trijos gados vienā un tajā pašā laukā.”						
Benz	H	0867	2	bentazons	480 g/l	177
Bentazons un Imazamokss: “**SPe1** Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur imazamoksu vai bentazonu, vienā un tajā pašā laukā vairāk kā vienu reizi trijos gados.”						
Corum	H	0729	2	imazamokss bentazons	22.4 g/l 43.1 g/l	190
Ciāntraniliprols: “**SPe1** Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur ciāntraniliprolu, vairāk, kā vienu reizi trijos gados vienā un tajā pašā laukā.”						
Benevia 100 OD	I	0856	2	ciāntraniliprols	100 g/l	270
Dimetahlors: “**SPe1** Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur dimetahloru, vairāk kā 1 kg d.v./ha vienā un tajā pašā laukā reizi trijos gados.”						
Brasan 540 EC	H	0320	2	dimetahlors klomazons	500 g/l 40 g/l	180
Teridox 500 EC	H	0051	2	dimetahlors	500 g/l	263
Dimetēnamīds-P: “**SPe1** Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur dimetēnamīdu-P, vienā un taja pašā laukā vairāk, kā vienu reizi divos gados.”						
Spectrum	H	0850	2	dimetēnamīds-P	720 g/l	255
Dimetēnamīds-P: “**SPe1** Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur dimetēnamīdu-P, vairāk kā vienu reizi trijos gados vienā un tajā pašā laukā.”						
Butisan Kombi	H	0470	2	metazahlors dimetēnamīds-P	200 g/l 200 g/l	182
Conaxis	H	0773	2	dimetēnamīds-P klomazons	400 g/l 50 g/l	189
Dimetēnamīds-P un/vai kvinmeraks: “**SPe1** Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur dimetēnamīdu-P un/vai kvinmeraku, vairāk kā vienu reizi trijos gados vienā un tajā pašā laukā.”						
Butisan Avant	H	0497	2	metazahlors dimetēnamīds-P kvinmeraks	300 g/l 100 g/l 100 g/l	181
Butisan Pro	H	0629	2	dimetēnamīds-P kvinmeraks	333 g/l 167 g/l	261
Tanaris	H	0579	2	dimetēnamīds-P kvinmeraks	333 g/l 167 g/l	261
Etil-karfentrazons: “**SPe1** Lai aizsargātu gruntsūdeni, nelietot, šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur etil-karfentrazonu, vienā un tajā pašā laukā, vairāk kā vienu reizi divos gados, ja sezonā izlieto 60 g d.v./ha, un vairāk, kā vienu reizi trijos gados, ja sezonā izlieto 96 g d.v./ha.”						
Spotlight Plus	D/H	0718	2	etil-karfentrazons	60 g/l	57, 255
Fluazinams: “**SPe1** Lai aizsargātu augsnes organismus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur fluazinamu, biežāk, kā katru otro gadu tajā pašā laukā.”						
Altima 500 s.k.	F	0176	2	fluazinams	500 g/l	72
Frowncide 500 s.k.	F	0475	2	fluazinams	500 g/l	72
Nando 500 SC	F	0427	2	fluazinams	500 g/l	117
Ohayo 500 s.k.	F	0473	2	fluazinams	500 g/l	72
Širlans 500 s.k.	F	0177	2	fluazinams	500 g/l	72
Winby 500 s.k.	F	0474	2	fluazinams	500 g/l	72

1	2	3	4	5	6	7
Hlorantraniliprols: "**SPe1** Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur hlorantraniliprolu, vairāk kā 35 g d.v./ha vienā un tajā pašā laukā trīs gadu periodā."						
Coragen 20 SC	I	0755	2	hlorantraniliprols	200 g/l	274
Imazamokss un Kvinmeraks: "**SPe1** Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur imazamoksu vai kvinmeraku, vienā un tajā paša laukā vairāk kā vienu reizi trijos gados."						
Clentiga	H	0842	2	imazamokss kvinmeraks	12.5 g/l 250 g/l	186
Cleravo Flex	H	0792	2	kvinmeraks imazamokss aminopiralīds	125 g/l 12.5 g/l 4 g/l	187
Klopiralīds: "**SPe1** Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur klopiralīdu, ne vairāk kā vienu reizi trijos gados vienā un tajā pašā laukā."						
Cliophar 600 SL	H	0665	2	klopiralīds	600 g/l	188
Galera	H	0313	2	klopiralīds piklorams	267 g/l 67 g/l	208
Lontrel 72 SG	H	0388	2	klopiralīds	720 g/kg	222
Kvinmeraks: "**SPe1** Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur kvinmeraku vairāk kā vienu reizi vienā un tajā pašā laukā trīs gadu periodā."						
Rapsan Plus	H	0636	2	metazahlors kvinmeraks	333 g/l 83 g/l	243
Metamitrons: "SPe1 Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur metamitronu vairāk, kā 2.1 kg darbīgās vielas vienā un tajā pašā laukā vienā gadā."						
Goltix 700 SC	H	0155	2	metamitrons	700 g/l	211
Metazahlors: "**SPe1** Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur metazahloru vairāk kā 750 g d.v./ha vienā un tajā pašā laukā trīs gadu periodā."						
Butisan 400	H	0037	2	metazahlors	400 g/l	181
Butisan Avant	H	0497	2	metazahlors dimetēnamīds-P kvinmeraks	300 g/l 100 g/l 100 g/l	181
Butisan Kombi	H	0470	2	metazahlors dimetēnamīds-P	200 g/l 200 g/l	182
Butisan Star	H	0258	2	metazahlors kvinmeraks	333 g/l 83 g/l	182
Clamox	H	0496	2	metazahlors imazamokss	375 g/l 17.5 g/l	185
Fuego 500 SC	H	0859	2	metazahlors	500 g/l	258
Fuego Top	H	0483	2	metazahlors kvinmeraks	375 g/l 125 g/l	258
Kalif Mega	H	0410	2	klomazons metazahlors	33 g/l 250 g/l	216
Metazamix™	H	0500	2	metazahlors aminopiralīds piklorams	500 g/l 5.3 g/l 13.3 g/l	225
Nimbus SE	H	0328	2	klomazons metazahlors	33.3 g/l 250 g/l	229
Rapsan 400 SC	H	0617	2	metazahlors	400 g/l	181
Rapsan 500 SC	H	0546	2	metazahlors	500 g/l	243
Rapsan Plus	H	0636	2	metazahlors kvinmeraks	333 g/l 83 g/l	243
Rapsan Plus SC	H	0618	2	metazahlors kvinmeraks	333 g/l 83 g/l	182
Sultan 500 SC	H	0245	2	metazahlors	500 g/l	258
Sultan Super	H	0457	2	metazahlors kvinemraks	375 g/l 125 g/l	258

1	2	3	4	5	6	7
Nikosulfurons: "**SPe1** Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur nikosulfuronu vairāk nekā vienu reizi katru otro gadu tajā pašā laukā."						
Elumis 105 OD	H	0573	2	mezotrions nikosulfurons	75 g/l 30 g/l	195
Fornet 4 OD	H	0436	2	nikosulfurons	40 g/l	225
Fornet Max 6 OD	H	0433	2	nikosulfurons	60 g/l	226
Milagro 4 OD	H	0223	2	nikosulfurons	40 g/l	225
Milagro Extra 6 OD	H	0361	2	nikosulfurons	60 g/l	226
Samson 4 OD	H	0437	2	nikosulfurons	40 g/l	225
Samson Max 6 OD	H	0434	2	nikosulfurons	60 g/l	226
Parafīneļļa: "**SPe1** Lai aizsargātu augsnes organismus, nelietot šo augu aizsardzības līdzekli vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur parafīneļļu vairāk par 8 reizēm sezonā katru trešo gadu vienā un tajā pašā laukā."						
Fibro	I/A	0460	2	parafīneļļa	797 g/l	279
Rimsulfurons: "**SPe1** Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur rimsulfuronu, biežāk, kā katru otro gadu tajā pašā laukā."						
RIM 25 WG	H	0747	2	rimsulfurons	250 g/kg	244

AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOJUMI

AUGU AUGŠANAS REGULATORI

1. 1,4 SIGHT

Reģ. Nr. 0738, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: 1,4-dimetilnaftalīns, 993.7 g/l.
Augu augšanas regulators.
DormFresh Limited

Apstrādājamā kultūra	Preparāta deva, l/t	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5
Kartupeļi (pārtikai, pārstrādei)	0.02	Izmiglot ar speciālu iekārtu tieši kartupeļu glabāšanas telpā, pēc kartupeļu iepildīšanas glabātuvē, ar intervālu 28-42 dienas, pirms asnu parādīšanās kartupeļu bumbuļiem	30	6

2. Argos

Reģ. Nr. 0841, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: apelsīnu ēteriskā eļļa, 843.2 g/l.
Augu augšanas regulators.
Arysta LifeScience Benelux Sprl

Kartupeļi (pārtikai, cietei)	0.1	Apstrādi veikt ar speciālu iekārtu tieši kartupeļu glabāšanas telpā, pēc kartupeļu iepildīšanas noliktavā, kad parādās pirmās kartupeļu bumbuļu asnošanas pazīmes. Intervāls starp apstrādēm 21 diena	-	9

3. Banarg

Reģ. Nr. 0627, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etilēns, 4%.
Augu augšanas regulators.
SIA Linde Gas

Apstrādājamā produkcija	Lietošanas mērķis	Preparāta deva	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Maksimālais apstrāžu skaits, produkcijas partijai
Banāni	Nogatavināt, veicināt augļu krāsas maiņu	11.25-25 l/m^3 (450-1000 ppm)	Produkcijas partijas apstrādes ilgums 24 stundas. Apstrādāt produkcijas partiju 24 stundas	1
Apelsīni, mandarīni, citroni, klementīni, greipfrūti, citi citrusaugļi	Veicināt augļu krāsas maiņu	0.025-0.25 l/m^3 (1-10 ppm)	Produkcijas partijas apstrādes ilgums 72 stundas. Apstrādāt produkcijas partiju 72 stundas	1

4. BIOX-M

Reģ. Nr. 0817, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: krūzmētras eļļa, 948 g/l.
Augu augšanas regulators.
Xeda International S.A.

Kartupeļi (pārtikai, pārstrādei)	Pirmā apstrāde 0.03; nākamās apstrādes 0.09 l/t	<u>1.lietošanas variants - karstā izsmidzināšana</u> Apstrādi veikt ar speciālu iekārtu tieši kartupeļu glabāšanas telpā, pēc kartupeļu iepildīšanas noliktavā, ar intervālu 21 diena, pirms asnu parādīšanās kartupeļu bumbuliem. Kopējais preparāta daudzums ne vairāk kā 0.39 l/t glabāšanas periodā	-	11

1	2	3	4	5
Kartupeļi (pārtikai, pārstrādei)	0.001-0.002 l/t	<u>2.lietošanas variants - aukstā izsmidzināšana</u> Apstrādi veikt speciālu iekārtu tieši kartupeļu glabāšanas telpā, pēc kartupeļu iepildīšanas noliktavā, ikdienu, pirms asnu parādīšanās kartupeļu bumbuliem. Kopējais preparāta daudzums ne vairāk kā 0.39 l/t gabāšanas periodā	-	195

5. Camposan Extra

Reģ. Nr. 0795, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etefons, 660 g/l.
Pretveldres preparāts.
Nufarm GmbH & Co KG

Apstrādājamā kultūra	Deva, l, kg/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5
Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle	0.75	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no pirmā mezgla stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 31-49)	-	1
Vasaras kvieši, cietie kvieši	0.75	Apsmidzināt sējumus, sākot no pirmā mezgla stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 31-49)	-	1
Speltas kvieši	0.6	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no pirmā mezgla stadijas līdz pēdējās lapas maksts uzbriešanas stadijai (AS 31-45)	-	1
Rudzi	1.1	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no pirmā mezgla stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 31-49)	-	1
Vasaras mieži	0.5	Apsmidzināt sējumus, sākot no pirmā mezgla stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 31-49)	-	1

6. Caryx

Reģ. Nr. 0440, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: mepikvāta hlorīds, 210 g/l, metkonazols, 30 g/l.
Augu augšanas regulators.
SIA BASF

<u>Analogie augu aizsardzības līdzekļi:</u>

Bill

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 44, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: mepikvāta hlorīds, 210 g/l, metkonazols, 30 g/l.
Augu augšanas regulators.
Glo-Quimicos Lda

Ziemas rapsis	0.7-1.4	<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus rudenī, sākot no trīs lapu stadijas līdz sānu dzinumu attīstības sākumam (AS 13-20) un atkārtoti apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar sānu dzinumu attīstības sākumu līdz dzelteno pumpuru stadijai (AS 21-59)	-	2
	0.7-1.4	<u>2. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar sānu dzinumu attīstības sākumu līdz dzelteno pumpuru stadijai (AS 21-59)	-	1
Vasaras rapsis	0.7-1.4	Apsmidzināt sējumus, sākot ar stublāja pagarināšanās fāzes sākumu līdz redzamas galvenās ziedkopas (AS 31-55)	-	1

1	2	3	4	5

7. CCC

Reģ. Nr. 0147, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: hlormekvāta hlorīds, 750 g/l.
Pretveldres preparāts.
Nufarm GmbH & Co KG

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Stabilan 750 SL
Reģ. Nr. 0287, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: hlormekvāta hlorīds, 750 g/l.
Pretveldres preparāts.
Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, tritikāle	1.0-1.5	Apsmidzināt sējumus pavasarī, cerošana stadijā līdz pirmā mezgla stadijai. Drīkst apstrādāt arī graudaugu sējumus ar daudzgadīgo stiebrzāļu un āboliņa pasēju	-	1
Vasaras kvieši	0.3-1.0 atkarībā no šķirnes		-	1
Rudzi	1.5-2.0		-	1
Mieži	0.6		-	1
Auzas	1.0-1.5	Apsmidzināt sējumus, sākot ar divu mezglu stadiju līdz skaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 32-49)	-	1

8. Cerone

Reģ. Nr. 0122, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etefons, 480 g/l.
Pretveldres preparāts.
Bayer AG

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Everest[1]
Reģ. Nr. 0777, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etefons, 480 g/l.
Pretveldres preparāts.
Sharda Cropchem España S.L.

Ziemas kvieši	0.50-0.75	Apsmidzināt sējumus, sākot no karoglapas parādīšanās līdz pēdējās lapas maksts uzbriešanas stadijai (AS 37-45)	42	1
Tritikāle	1.0		42	1
Ziemas rudzi	1.0	Apsmidzināt sējumus, sākot no karoglapas parādīšanās līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 37-49)	42	1
Vasaras mieži	0.5	Apsmidzināt sējumus, sākot no otrā mezgla līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 32-49)	42	1
Ziemas mieži	0.75-1.00		42	1

[1]Analogs augu aizsardzības līdzeklim Cerone, jo beidzies datu aizsardzības periods.

9. Crown MH

Reģ. Nr. 0900, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: maleīnhidrazīds, 270 g/l.
Augu augšanas regulators.
Kreglinger Europe NV

Kartupeļi	11.0	Apsmidzināt stādījumus, kad bumbuļi ir sasnieguši vismaz 25 mm lielumu (praktiski, kad 80 % no pārtikā izmantojamajiem bumbuļiem sasnieguši 25-30 mm diametru vai 35-40 mm pārstrādei paredzētie bumbuļi) (AS 44-47/AS 69-89). Nelietot sēklai paredzētajos stādījumos	21	1
Sīpoli, ķiploki*, šalotes sīpoli*	8.9	Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kad kultūraugam 10% lapas noliekušās līdz 50 % lapas noliekušās (AS 47-48). Nelietot sīksīpoliņiem paredzētajos sējumos. Nelietot ķiploku stādījumos, kuri paredzēti stādāmā materiāla ieguvei	14	1

1	2	3	4	5
Burkāni*, pastinaki*	11.0	Apsmidzināt sējumus, kad kultūrauga sakne sasniegusi 80% no šķirnei raksturīgā diametra līdz sakne izveidojusi šķirnei raksturīgo formu un diametru (AS 48-49)	21	1

***Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

10. Cuadro NT

Reģ. Nr. 0544, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 250 g/l.
Augu augšanas regulators.
FMC Agricultural Solutions A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	0.2-0.4	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)	-	1
Ziemas mieži, vasaras mieži, rudzi, tritikāle	0.4-0.6	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)	-	1
Auzas	0.3	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)	-	1
Daudzgadīgā airene, daudzziedu airene, sarkanā auzene, niedru auzene, pļavas timotiņš, parastā kamolzāle (sēklai)	0.4-0.8	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz vārpas vai skaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30-49)	-	1

11. Cycocel 750

Reģ. Nr. 0096, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: hlormekvāta hlorīds, 750 g/l.
Pretveldres preparāts.
SIA BASF

Ziemas kvieši	1.0-1.5	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32)	-	1
Vasaras kvieši	0.8-1.25	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32)	-	1
Tritikāle	1.0-1.5	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32)	-	1
Rudzi	1.0-2.0	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32)	-	1
Auzas	1.0-1.5	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)	-	1
Vasaras mieži	1.0-1.5	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32)	-	1
Stiebrzāles* (sēklai)	1.2-2.0	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32)	-	1

***Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5

12. Folicur

Reģ. Nr. 0057, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l.
Augu augšanas regulators.
Bayer AG

Ziemas rapsis	0.5	Apsmidzināt sējumus rudenī 5-6 lapu attīstības stadijā (AS 15-16)	56	1
	1.0	Apsmidzināt sējumus, sākot no stublāja veidošanā fāzes beigām līdz ziedpumpuru attīstības fāzes vidum (AS 39-55)		
Vasaras rapsis	1.0	Apsmidzināt sējumus, sākot no stublāja veidošanā fāzes beigām līdz ziedpumpuru attīstības fāzes vidum (AS 39-55)	56	1

13. Frooti

Reģ. Nr. 0839, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: 1-naftiletiķskābe, 77.8 g/l.
Augu augšanas regulators.
Sharda Cropchem España S.L.

Ābeles, bumbieres	0.2	1. lietošanas variants Apsmidzināt stādījumus augļaizmetņu retināšanai, sākot ar kultūrauga ziedēšanas beigām līdz augļaizmetņu diametrs sasniedz 20 mm (AS 69-72)	-	1
Ābeles, bumbieres	0.2	2. lietošanas variants Apsmidzināt stādījumus augļu nobires samazināšanai, sākot ar augļaizmetņu diametru līdz 10 mm un līdz novākšanas gatavībai (AS 71-87)	7	2

14. Gift

Reģ. Nr. 0843, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: giberelskābe, 90 g/kg.
Augšanas regulators.
Sharda Cropchem España S.L.

Ābeles, bumbieres	5 tab./ha	Apsmidzināt stādījumu, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)	-	1

15. Grassrooter

Reģ. Nr. 0709, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etefons, 480 g/l.
Pretveldres preparāts.
Sharda Cropchem España S.L.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Etefone

Reģ. Nr. 0759, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etefons, 480 g/l.
Pretveldres preparāts.
Sharda Cropchem España S.L.

Ziemas kvieši, ziemas mieži	1.0	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga karoglapas maksts paplašināšanās stadiju līdz vārpošanas sākumam (AS 41-51)	-	1
Vasaras mieži	0.75	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga karoglapas maksts paplašināšanās stadiju līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 41-49)	-	1

1	2	3	4	5

16. Hingios

Reģ. Nr. 0895, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: kalcija proheksadions, 75 g/l.
Augu augšanas regulators.
Bayer AG

Ziemas rapsis	0.8-1.2	1. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus rudenī, sākot no divu lapu stadijas līdz astoņu lapu stadijai (AS 12-18) un atkārtoti apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar stublāja pagarināšanās sākumu līdz dzelteno pumpuru stadijai (AS 30-59)	-	2
	0.8-1.2	2. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus rudenī, sākot no divu lapu stadijas līdz astoņu lapu stadijai (AS 12-18)	-	1
	0.8-1.2	3. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar stublāja pagarināšanās sākumu līdz dzelteno pumpuru stadijai (AS 30-59)	-	1

17. Juventus 90

Reģ. Nr. 0221, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metkonazols, 90 g/l.
Augu augšanas regulators.
SIA BASF

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Artina[1]

Reģ. Nr. 0908, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metkonazols, 90 g/l.
Augu augšanas regulators.
Globachem n.v.

Artina EC

Reģ. Nr. 0653, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metkonazols, 90 g/l.
Augu augšanas regulators.
Globachem n.v.

Plexeo 90

Reģ. Nr. 0677, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metkonazols, 90 g/l.
Augu augšanas regulators.
Globachem n.v.

Plexeo 90 EC[1]

Reģ. Nr. 0911, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metkonazols, 90 g/l.
Augu augšanas regulators.
Globachem n.v.

Remocco 90

Reģ. Nr. 0845, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metkonazols, 90 g/l.
Augu augšanas regulators.
SIA BASF

Turret 90

Reģ. Nr. 0677, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metkonazols, 90 g/l.
Augu augšanas regulators.
Globachem n.v.

Ziemas rapsis	0.5	Apsmidzināt sējumus rudenī, kultūrauga 4-6 lapu stadijā (AS 14-16)	56	1
	0.5	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar stublāja pagarināšanās fāzes sākumu, līdz redzamas galvenās ziedkopas (AS 31-55)		
Vasaras rapsis	0.5	Apsmidzināt sējumus, sākot ar stublāja pagarināšanās fāzes sākumu, līdz redzamas galvenās ziedkopas (AS 31-55)	56	1

[1]Analogs augu aizsardzības līdzeklim Juventus 90, jo beidzies datu aizsardzības periods.

1	2	3	4	5

18. Kudos

Reģ. Nr. 0757, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: kalcija proheksadions, 100 g/kg.
Augu augšanas regulators.
Fine Agrochemicals Ltd.

Ābeles	1.25	Apsmidzināt stādījumu, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69), atkārtotu apstrādi var veikt pēc 3 līdz 5 nedēļām, līdz augļi sasnieguši pusi no šķirnei raksturīgā augļu lieluma un nokarājas uz leju (AS 75)	55	2

19. Medax Max

Reģ. Nr. 0511, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: kalcija proheksadions, 50 g/kg,
etil-trineksapaks, 75 g/kg.
Augu augšanas regulators / pretveldres preparāts.
SIA BASF

Ziemas kvieši	0.3-0.75	<u>1. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29-39)	-	1
	0.3-0.5	vai apsmidzināt sējumus, sākot no attīstītas karoglapas stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 39-49)		
	0.3-0.75	<u>2. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 29-49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Nelietot vairāk, kā 1 kg/ha sezonā	-	2
Ziemas mieži	0.5-1.0	<u>1. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29-39)	-	1
	0.5-0.75	vai apsmidzināt sējumus, sākot no attīstītas karoglapas stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 39-49)		
	0.5-0.75	<u>2. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 29-49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Nelietot vairāk kā 1 kg/ha sezonā	-	2
Rudzi	0.5- 1.0	<u>1. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29-39)	-	1
	0.5-0.75	vai apsmidzināt sējumus, sākot no attīstītas karoglapas stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 39-49)		
	0.5-0.75	<u>2. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 29-49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Nelietot vairāk kā 1 kg/ha sezonā	-	2

1	2	3	4	5
Ziemas tritikāle	0.3-0.75	<u>1. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29-39)	-	1
	0.5	vai apsmidzināt sējumus, sākot no attīstītas karoglapas stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 39-49)		
	0.3-0.75	<u>2. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 29-49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Nelietot vairāk kā 1 kg/ha sezonā	-	2
Ziemas auzas	0.3-0.75	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29-39)	-	1
Vasaras mieži	0.3-0.5	<u>1. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29-39)	-	1
	0.15-0.35	<u>2. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29-39), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Nelietot vairāk kā 0.5 kg/ha sezonā	-	2
Vasaras kvieši	0.3-0.5	<u>1. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29-39). Veicot apstrādi pēc AS 35, maksimālā deva 0.3 kg/ha	-	1
	0.15-0.35	<u>2. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29-39), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Nelietot vairāk kā 0.5 kg/ha sezonā. Veicot apstrādi pēc AS 35, maksimālā deva 0.3 kg/ha	-	2
Vasaras auzas	0.3-0.5	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz četru mezglu stadijai (AS 29-34)	-	1

20. Medax Top

Reģ. Nr. 0347, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: kalcija proheksadions, 50 g/l,
mepikvāta hlorīds, 300 g/l.
Augu augšanas regulators / pretveldres preparāts.
SIA BASF

Ziemas kvieši	0.75-1.5	<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)	-	1
	0.75+0.75	<u>2. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39), dalītā apstrādē. Nelietot vairāk, kā 1.5 l/ha sezonā.	-	2

1	2	3	4	5
Ziemas mieži	0.75-1.5	1. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)	-	1
	0.75+0.75	2. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39), dalītā apstrādē. Nelietot vairāk, kā 1.5 l/ha sezonā	-	2
Ziemas tritikāle	0.75-1.5	1. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)	-	1
	0.75+0.75	2. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39), dalītā apstrādē. Nelietot vairāk, kā 1.5 l/ha sezonā	-	2
Rudzi	0.75-1.5	1. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)	-	1
	0.75+0.75	2. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39), dalītā apstrādē. Nelietot vairāk, kā 1.5 l/ha sezonā	-	2
Vasaras mieži	0.75-1.5	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)	-	1
Vasaras kvieši	0.5-1.0	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)	-	1
Auzas	0.6-1.0	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)	-	1
Sarkanā auzene, niedru auzene, parastā kamolzāle (sēklai)	1.0-1.5	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)	-	1
Airenes (sēklai)	1.0-1.5	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30-49)	-	1
Ziemas rapsis (rudens apstrāde)	0.6-1.0	1. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga trīs lapu stadijas līdz lapu rozetes izveidošanās stadijai (AS 13-19)	-	1
	0.5+0.5	2. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga trīs lapu stadijas līdz lapu rozetes izveidošanās stadijai (AS 13-19), dalītā apstrādē	-	2

1	2	3	4	5
Ziemas rapsis (rudens + pavasara apstrāde)	0.6-1.0	Rudens apstrāde Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga trīs lapu stadijas līdz lapu rozetes izveidošanās stadijai (AS 13-19)	-	1
	0.6-1.0	Pavasara apstrāde Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga sāndzinumu veidošanās sākuma līdz dzelteno pumpuru stadijai (AS 21-59)	-	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis (pavasara apstrāde)	0.6-1.0	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga sāndzinumu veidošanās sākuma līdz dzelteno pumpuru stadijai (AS 21-59)	-	1
Ziemas ripsis*, vasaras ripsis*, sinepes* (sēklai), eļļas rutks*, sējas idra*	0.6-1.0	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga sāndzinumu veidošanās sākuma līdz dzelteno pumpuru stadijai (AS 21-59)	-	1
Lini*	0.6-1.0	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga eglītes stadiju līdz ziedpumpuru veidošanās fāzes beigām (AS 19-59)	-	1
Magones* (sēklai)	0.6-1.0	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga līdz ziedu veidošanās beigām (AS 19-59)	-	1

*__Mazais lietojums.__ Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

21. Mepik 300 SL

Reģ. Nr. 0771, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: mepikvāta hlorīds, 300 g/l.
Augu augšanas regulators.
Innvigo Sp. z o.o.

Ziemas kvieši	0.8-1.3	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30-49)	-	1
Ziemas tritikāle	0.8-1.0	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30-49)	-	1
Ziemas rapsis	0.6-0.7	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stublāja pagarināšanās sākumu līdz ziedpumpuru veidošanās sākumam (AS 30-50)	-	1

1	2	3	4	5

22. Moddus 250 EC

Reģ. Nr. 0183, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 250 g/l.
Augu augšanas regulators.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Bertego

Reģ. Nr. 0594, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 250 g/l.
Augu augšanas regulators.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Regucil

Reģ. Nr. 0595, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 250 g/l.
Augu augšanas regulators.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Tempo

Reģ. Nr. 0596, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 250 g/l.
Augu augšanas regulators.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši	0.3-0.4	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no pirmā mezgla stadijas līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 31-37)	-	1
Vasaras kvieši	0.3-0.4	Apsmidzināt sējumus, sākot no stiebrošanas sākuma līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 30-37)	-	1
Vasaras mieži, ziemas mieži	0.4	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no cerošanas beigām līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 29-37)	-	1
Tritikāle, rudzi	0.3-0.4	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no trešā mezgla stadijas līdz attīstītas karoglapas parādīšanās stadijai (AS 33-39)	-	1
Auzas	0.4	Apsmidzināt sējumus, sākot no stiebrošanas sākuma līdz otrā mezgla stadijai (AS 30-32)	-	1

23. Moddus Start

Reģ. Nr. 0498, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 250 g/l.
Augu augšanas regulators.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Regucil Start

Reģ. Nr. 0833, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 250 g/l.
Augu augšanas regulators.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	0.3	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 25-49)	-	1
	0.15	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 25-49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas	-	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	0.6	Apsmidzināt sējumus, sākot kultūrauga no cerošanas vidus līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 25-49)	-	1
	0.3	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 25-49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas	-	2

1	2	3	4	5
Tritikāle, rudzi	0.5	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 25-49)	-	1
	0.25	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 25-49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas	-	2
Auzas	0.4	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32)	-	1
	0.2	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas	-	2
Stiebrzāles (sēklai)	0.8	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz vārpskaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30-49)	-	1
	0.4	Apsmidzināt sējumus sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz vārpskaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30-49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas	-	2

24. Monex

Reģ. Nr. 0742, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: 1-naftiletiķskābe, 10 g/kg.
Augu augšanas regulators.
Sharda Cropchem España S.L.

Ābeles	1.0-1.5	Apsmidzināt ābeļu stādījumu augļaizmetņu retināšanai, sākot ar kultūrauga ziedēšanas beigām līdz augļaizmetņu diametrs sasniedz 20 mm (AS 69-72)	-	1
Ābeles	1.0-1.5	Apsmidzināt ābeļu stādījumu augļu nobires samazināšanai, sākot ar, kad augļi sasnieguši 90% no šķirnei raksturīgā lieluma līdz novākšanas gatavībai (AS 79-87)	7	1

25. Moxa

Reģ. Nr. 0562, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 250 g/l.
Augu augšanas regulators.
Globachem n.v.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	0.2-0.4	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 25-39)	-	1
	0.15	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 25-39), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas	-	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	0.4-0.6	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 25-39)	-	1
	0.3	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 25-39), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas	-	2

1	2	3	4	5
Rudzi	0.5-0.6	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 25-39)	-	1
	0.25	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 25-39), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas	-	2
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	0.5	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 25-39)	-	1
	0.25	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 25-39), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas	-	2
Auzas	0.3	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32)	-	1
	0.15	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas	-	2
Stiebrzāles: sarkanā auzene, pļavas auzene, timotiņš, daudzgadīgā airene (sēklai)	0.4-0.8	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga pirmā mezgla līdz vārpskaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 31-49)	-	1
	0.4	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga pirmā mezgla līdz vārpskaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 31-49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas	-	2

26. Nexa 500 EC

Reģ. Nr. 0667, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 500 g/l.
Augu augšanas regulators.
Innvigo Sp. z o.o.

Ziemas kvieši	0.2	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)	-	1
	0.15	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz trešā mezgla stadijai (AS 29-33) un nākamā apstrāde pēc 7-25 dienām, sākot ar trešā mezgla stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 33-39)	-	2
Rudzi	0.15	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām karoglapas parādīšanās stadijai (AS 29-37)	-	1
	0.15	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz piecu mezglu stadijai (AS 29-35) un atkārtoti pēc 6-16 dienām no piecu mezglu stadijas līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 35-39)	-	2
Ziemas tritikāle	0.3	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz sestā mezgla stadijai (AS 30-36)	-	1
Ziemas mieži	0.3	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga pirmā mezgla stadijas līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 31-37)	-	1
Vasaras mieži	0.2	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)	-	1

1	2	3	4	5

27. Next

Reģ. Nr. 0624, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 250 g/l.
Augu augšanas regulators.
Sharda Cropchem España S.L.

Ziemas kvieši	0.3-0.5	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no pirmā mezgla stadijas līdz otrā mezgla stadijai (AS 31-32)	-	1
Ziemas mieži	0.4-0.6	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no pirmā mezgla līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 31-39)	-	1

28. Regalis Plus

Reģ. Nr. 0491, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: kalcija proheksadions, 100 g/kg.
Augu augšanas regulators.
SIA BASF

Ābeles, bumbieres	0.5-2.5	<u>1. apstrādes veids</u> Apsmidzināt stādījumus, sākot ar ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69), maksimālā deva 2.5 kg. Tiek ierobežota bakteriālās iedegas *(Erwinia amylovora)* sekundārās infekcijas izplatība	-	1
	0.5-2.5 un 0.5-1.5	<u>2. apstrādes veids</u>. Apsmidzināt stādījumus dalītā apstrādē, sākot ar ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69), maksimālā deva 2.5 kg un augļu attīstības fāzes vidum (AS 71-75), maksimālā deva 1.5 kg/ha, kopā sezonā nepārsniedzot 3.0 kg/ha. Tiek ierobežota bakteriālās iedegas *(Erwinia amylovora)* sekundārās infekcijas izplatība	-	2

29. Stabilan 400 SL

Reģ. Nr. 0793, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: hlormekvāta hlorīds, 400 g/l.
Pretveldres preparāts.
Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, speltas kvieši*	2.5	<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 21-29)	-	1
	2.5-3.75	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz trīs mezglu stadijai (AS 30-33)		
	1.35	<u>2. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 21-29), dalītā apstrādē	-	2
	1.25-1.875	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz trīs mezglu stadijai (AS 30-33)		

1	2	3	4	5
Vasaras kvieši, cietie kvieši*, vasaras mieži	2.5	1.lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 21-29)	-	1
	2.5-3.75	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz trīs mezglu stadijai (AS 30-33)		
	1.35	2.lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 21-29)	-	2
	1.25-1.875	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz trīs mezglu stadijai (AS 30-33)		
Tritikāle, rudzi	2.5	1.lietošanas variants Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 21-29)	-	1
	2.5-3.75	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 30-37)		
	1.35	2.lietošanas variants Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 21-29), dalītā apstrādē	-	2
	1.25-1.875	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 30-37)		
Auzas	2.5	1.lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 21-29)	-	1
	2.5-3.75	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga_ stiebrošanas sākumu līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 30-37)		
	1.35	2.lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 21-29)	-	2
	1.25-1.875	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 30-37)		

*__Mazais lietojums.__ Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība.__ Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

30. Stemper

Reģ. Nr. 0821, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 175 g/l.
Augu augšanas regulators.
ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši	0.2-0.5	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 29-49)	-	1
Ziemas mieži	0.2-0.5	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 29-49)	-	1
Ziemas tritikāle	0.3-0.5	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 29-49)	-	1

1	2	3	4	5
Ziemas rudzi	0.3-0.4	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 29-49)	-	1
Vasaras kvieši	0.2-0.5	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30-49)	-	1
Vasaras mieži	0.2-0.5	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30-49)	-	1
Auzas	0.2-0.4	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz četru mezglu stadijai (AS 30-34)	-	1
Stiebrzāles (sēklai)	0.4-1.0	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpskaras/skaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30-49)	-	1

31. STS Cucurbitaceae

Reģ. Nr. 0896, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: nātrija sudraba tiosulfāts, 40 g/l.
Sistēmas iedarbība.
STS Cucurbita Hybridization Coöperative U.A.

Apstrādājamie kultūraugi	Preparāta deva, l/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Gurķi, citi ķirbjaugi (sēklu ieguvei, augi selekcijas programmā)	4.8	2.5	Apstrādāt atsevišķus augus, sākot ar kultūrauga pirmo īsto lapu līdz pirmais zieds uz stublāja atvēries. Preparāta deva vienā apstrādes reizē: 0.1 ml/augu vai 0.4 l/ha	-	12

32. Terpal

Reģ. Nr. 0144, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: mepikvāta hlorīds, 305 g/l,
etefons, 155 g/l.
Augu augšanas regulators / pretveldres preparāts.
SIA BASF

Ziemas kvieši, ziemas mieži, vasaras mieži	0.5-1.5	Apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu divu mezglu stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 32-49)	-	1
Rudzi	1.0-1.5			

33. Tilmor

Reģ. Nr. 0353, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: protiokonazols, 80 g/l,
tebukonazols, 160 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Bayer AG

Ziemas rapsis	0.8-1.0	Apsmidzināt sējumus rudenī, 5-6 lapu attīstības stadijā (AS 15-16)	56	1
	1.0	Apsmidzināt sējumus, sākot no stublāja veidošanā fāzes beigām līdz ziedpumpuru attīstības fāzes vidum (AS 39-55)		
Vasaras rapsis	1.0	Apsmidzināt sējumus, sākot no stublāja veidošanā fāzes beigām līdz ziedpumpuru attīstības fāzes vidum (AS 39-55)	56	1

1	2	3	4	5

34. Toprex 375 SC

Reģ. Nr. 0400, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: difenokonazols, 250 g/l,
paklobutrazols, 125 g/l.
Augu augšanas regulators.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas rapsis	0.3	Apsmidzināt sējumus rudenī, rapša četru lapu līdz sešu lapu stadijā (AS 14-16)	-	1
	0.5	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no pirmā starpmezglu posma attīstības līdz stadijai, kad starp lapām redzami ziedpumpuri (AS 31-50)	100	1

35. Trimaxx

Reģ. Nr. 0398, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 175 g/l.
Augu augšanas regulators.
Nufarm GmbH & Co KG

<u>Analogie augu aizsardzības līdzekļi:</u>

Calma

Reģ. Nr. 0521, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 175 g/l.
Augu augšanas regulators.
Nufarm GmbH & Co KG

Optimus

Reģ. Nr. 0399, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 175 g/l.
Augu augšanas regulators.
Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši	0.4	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no pirmā mezgla stadijas līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 31-37)	-	1
Vasaras kvieši	0.4	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no stiebrošanas sākuma līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 30-37)	-	1
Vasaras mieži, ziemas mieži	0.3-0.5	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no cerošanas beigām līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 29-37)	-	1

DESIKANTI

Apstrādājamie kultūraugi	Preparāta deva, l/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5

1. Beloukha

Reģ. Nr. 0891, reģ.klase 2
Darbīgā viela: pelargonskābe, 680 g/l
Pieskares iedarbība.
Certis Belchim B.V.

Kartupeļi (bez lakstu pļaušanas)	16.0	Apsmidzināt stādījumus, kad bumbuļi sasnieguši vēlamo lielumu. Starp apstrādēm ievērot vismaz 5 dienu intervālu (AS 81 – 99)	-	2
Kartupeļi (pēc lakstu pļaušanas)	16.0	Apsmidzināt stādījumus, kad bumbuļi sasnieguši vēlamo lielumu. Kartupeļu lakstus nopļaut, atstājot 15-20 cm augstus stublājus. Apstrādi veic 1-5 dienas pēc lakstu nopļaušanas. Starp apstrādēm ievērot vismaz 5 dienu intervālu (AS 81 – 99)	-	2

2. Mizuki

Reģ. Nr. 0890, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-piraflufēns, 10.6 g/l.
Desikants.
Nichino Europe Co. Ltd.

Kartupeļi, bez lakstu pļaušanas	1.0	<u>1. apstrādes veids</u> Apsmidzināt kartupeļu stādījumus kartupeļu bumbuļu nobriešanas periodā (AS 91-95)	7	1
Kartupeļi, pēc lakstu nopļaušanas	1.0	<u>vai 2. apstrādes veids</u> Apsmidzināt kartupeļu stādījumus pēc lakstu nopļaušanas (AS 91)		
Āboliņš* (sēklu lauki)	1.5	Apsmidzināt sējumus kultūrauga sēklu nogatavošanās laikā	-	1

3. Spotlight Plus

Reģ. Nr. 0718, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-karfentrazons, 60 g/l.
Pieskares iedarbība.
FMC Agricultural Solutions A/S

Kartupeļi	1.0	<u>1. apstrādes vieds</u> Apsmidzināt stādījumus, kartupeļu bumbuļu nobriešanas periodā (AS 91-95)	7	1
	1.0+0.6	<u>2. apstrādes veids</u> Apsmidzināt stādījumu: 1. apstrāde – kartupeļu bumbuļu nobriešanas periodā (AS 91-95); 2. apstrāde - pēc 7 dienām, ja laksti ataugt	7	2

DEZINFEKCIJAS LĪDZEKĻI

1. Menno Florades

Reģ. Nr. 0593, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: benzoskābe, 90 g/l.
Dezinfekcijas līdzeklis.
Menno Chemie-Vertrieb GmbH

Apstrādājamais objekts	Kaitīgais organisms	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Ekspozīcijas laiks	Apstrādes veids, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās
Naži, darbarīki	**Vīrusi:** ArMV, CyMV, PLCV, TSWV, PLPV	4	3 min	Mērcēt darba šķīdumā	-
	Vīrusi: PepMV, MNSV, ZYMV, PFBV				
	Vīrusi: ORSV, TMV, TSV, BePMV, PMMoV, ToMV, ToBRFV				
	Viroīdi: PSTYd, CSVd				
	Sēnes: *Alternaria, Aspergillus, Botrytis, Cercospora, Chalara, Colletotrichum, Cylindrocladium, Dactylium, Didimella, Erysiphe, Fusarium, Helmintosporium, Mucor, Perenospora, Pythium, Phytopthtora, Ramularia, Rhizoctonia, Rhizopus, Thielaviopsis, Trichoderma, Verticillium* **Baktērijas:** *Acidovorax, Agrobacterium, Clavibacter, Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas, Rastonia* (dekoratīvajā dārzkopībā, dārzeņkopībā, sēņu audzēšanā)				
	Baktērijas: Kartupeļu gaišā gredzenpuve *(Clavibacter michiganensis)*, kartupeļu tumšā gredzenpuve *(Rastonia solanacearum)*; **Sēnes:** Kartpeļu laktu puve *(Phytophthora infestans)*, melnais kraupis *(Rhizoctonia solani)* (augkopībā /kartupeļu noliktavās)				
Virsmas: noliktavu telpas, mehānismi, siltumnīcas, tīrīšanas iekārtas, soli, galdi, konteineri, podi, paliktņi, darba virsmas u.c.	**Vīrusi:** ArMV, CyMV, PLCV, TSWV, PLPV	1	16 h	Apsmidzināšana vai pārklāšana ar putām, salaistīšana, saliešana. Darba šķidruma patēriņš 0.2-0.8 l/ m²	-
	Vīrusi: PepMV, MNSV, ZYMV, PFBV	2	16 h		
	Vīrusi: ORSV, TMV, TSV, BePMV, PMMoV, ToMV, ToBRFV	4	16 h		
	Viroīdi: PSTYd, CSVd	1	16 h		
	Sēnes: *Alternaria, Aspergillus, Botrytis, Cercospora, Chalara, Colletotrichum, Cylindrocladium, Dactylium, Didimella, Erysiphe, Fusarium, Helmintosporium, Mucor, Perenospora, Pythium, Phytopthtora, Ramularia, Rhizoctonia, Rhizopus, Thielaviopsis, Trichoderma, Verticillium* **Baktērijas:** *Acidovorax, Agrobacterium, Clavibacter, Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas, Rastonia* (dekoratīvajā dārzkopībā, dārzeņkopībā, sēņu audzēšanā)	1	16 h		
		2	4 h		
Kartupeļu noliktava (grīda, sienas, ventilēšanas kanāli), konteineri, iekraušanas iekārtas, lauksaimniecības tehnika	**Baktērijas:** Kartupeļu gaišā gredzenpuve *(Clavibacter michiganensis)*, kartupeļu tumšā gredzenpuve *(Rastonia solanacearum)*; **Sēnes:** Kartpeļu lakstu puve *(Phytophthora infestans)*, melnais kraupis *(Rhizoctonia solani)*	2	4 h	Apsmidzināt apstrādājamo virsmu. Darba šķidruma patēriņš 0.8 l/m²	-

KODNES

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, l/t	Ieteicamais darba šķidruma patēriņš, l/t	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
1	2	3	4	5

1. Allstar

Reģ. Nr. 0772, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: fluksapiroksāds, 300 g/l.
Sistēmas iedarbība.
SIA BASF

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, l/100 kg	Ieteicamā darba šķidruma patēriņš, l/t	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Kartupeļi	Melnais kraupis *(Rhizoctonia solani),* sudrabotais kraupis *(Helminthosporium solani),* kartupeļu antraknoze *(Colletotrichum coccodes)*	0.02	2.0-30.0	Apstrādāt kartupeļu bumbuļus pirms stādīšanas vai stādīšanas laikā

2. Bariton Super

Reģ. Nr. 0612, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: protiokonazols, 50 g/l,
tebukonazols, 10 g/l,
fludioksonils, 37.5 g/l.
Pieskares un sistēmas iedarbība.
Bayer AG

Ziemas kvieši	Sārtais sniega pelējums *(Monographella nivalis)*, kviešu cietā melnplauka *(Tilletia caries),* sakņu puves *(Fusarium spp.)*	1.0	6.0-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Vasaras kvieši	kviešu cietā melnplauka *(Tilletia caries)*, sakņu puves (*Fusarium spp.)*	1.0	6.0-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Sārtais sniega pelējums *(Monographella nivalis)*, sakņu puves *(Fusarium spp.)*	1.0	6.0-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas tritikāle	Sārtais sniega pelējums *(Monographella nivalis),* sakņu puves *(Fusarium spp.)*	1.0	6.0-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Vasaras tritikāle	Sakņu puves *(Fusarium spp.)*	1.0	6.0-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas mieži	Sārtais sniega pelējums *(Monographella nivalis),* sakņu puves *(Fusarium spp.),* miežu lapu tīklplankumainība *(Pyrenophora teres),* miežu lapu brūnsvītrainība *(Pyrenophora graminea),* miežu putošā melnplauka *(Ustilago nuda f.sp.hordei)*	1.0	6.0-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Vasaras mieži	Sakņu puves *(Fusarium spp.),* miežu lapu tīklplankumainība *(Pyrenophora teres),* miežu lapu brūnsvītrainība *(Pyrenophora graminea),* miežu putošā melnplauka *(Ustilago nuda f.sp.hordei)*	1.0	6.0-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Auzas	Sakņu puves *(Fusarium spp.)*	1.0	6.0-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas

1	2	3	4	5

3. Buteo Start

Reģ. Nr. 0710, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: flupiradifurons, 480 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Bayer AG

Ziemas rapsis, vasaras rapsis, ziemas ripsis*, vasaras ripsis*	Spradži *(Phyllotreta spp.)*, rapša stublāju spradzis *(Psylliodes chrysocephala)*, agrā kāpostu muša *(Delia radicum)*	6.25	6.25	Kodināt sēklas pirms sējas

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

4. Celest Trio 060 FS

Reģ. Nr. 0380, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: fludioksonils, 25 g/l,
difenokonazols, 25 g/l,
tebukonazols, 10 g/l.
Pieskares un sistēmas iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu cietā melnplauka *(Tilletia caries)*, kviešu putošā melnplauka *(Ustilago tritici)*, kviešu pundurmelnplauka *(Tilletia controversa)*	2.0	6-10	Kodināt sēklas pirms sējas
	Kviešu plēkšņu plankumainība *(Septoria nodorum)*, sakņu puves *(Fusarium spp.)*, sniega pelējums *(Microdochium nivale)*	1.5-2.0	5.5-10	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu putošā melnplauka *(Ustilago nuda)*, miežu cietā melnplauka *(Ustilago hordei)*	2.0	6-10	Kodināt sēklas pirms sējas
	Miežu lapu tīklplankumainība *(Pyrenophora teres)*, sakņu puves *(Fusarium spp.)*, sniega pelējums *(Microdochium nivale)*	1.5-2.0	5.5-10	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Rudzu stiebru melnplauka *(Urocystis occulta)*	2.0	6-10	Kodināt sēklas pirms sējas
	Sakņu puves *(Fusarium spp.)*, sniega pelējums *(Microdochium nivale)*	1.5-2.0	5.5.-10	Kodināt sēklas pirms sējas
Tritikāle	Sakņu puves *(Fusarium spp.)*, sniega pelējums *(Microdochium nivale)*	1.5-2.0	5.5-10	Kodināt sēklas pirms sējas
Auzas	Auzu putošā melnplauka *(Ustilago avenae)*	1.5	5.5-9.5	Kodināt sēklas pirms sējas

5. Chambel 6 FS

Reģ. Nr. 0309, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: tebukonazols, 60 g/l.
Sistēmas iedarbība.
ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu cietā melnplauka *(Tilletia caries, Tilletia foetida)*, sakņu puves *(Fussarium spp.)*, sniega pelējums *(Monographella nivalis)*	0.5	5.5	Kodināt sēklas pirms sējas

1	2	3	4	5

6. Difend

Reģ. Nr. 0439, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: difenokonazols, 30 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Globachem n.v.

Ziemas kvieši, ziemas tritikāle, vasaras kvieši, vasaras tritikāle	Kviešu cietā melnplauka (*Tilletia caries)*	2.0	2-6	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas kvieši, ziemas tritikāle	Kviešu pundurmelnplauka *(Tilletia controversa)*	2.5	2.5-6.5	Kodināt sēklas pirms sējas

7. Gamelan 100 FS

Reģ. Nr. 0907, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: protiokonazols, 100 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Innvigo Sp. z o.o.

Ziemas kvieši	Sārtais sniega pelējums *(Monographella nivalis),* sakņu puves *(Fusarium spp.),* kviešu cietā melnplauka *(Tilletia caries),* kviešu putošā melnplauka *(Ustilago tritici)*	1.0	Līdz 8	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas tritikāle	Sārtais sniega pelējums *(Monographella nivalis),* sakņu puves *(Fusarium spp.),*	1.0	Līdz 8	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas rudzi	Sārtais sniega pelējums *(Monographella nivalis),* sakņu puves *(Fusarium spp.),* rudzu stiebru melnplauka *(Urocystis occulta)*	1.0	Līdz 8	Kodināt sēklas pirms sējas

8. Kinto Plus

Reģ. Nr. 0662, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: tritikonazols, 33.3 g/l,
fluksapiroksāds, 33.3 g/l,
fludioksonils, 33.3 g/l.
Pieskares un sistēmas iedarbība.
SIA BASF

Ziemas kvieši	Sārtais sniega pelējums *(Monographella nivalis)*, sakņu un dīgstu puves *(Fusarium spp.),* kviešu cietā melnplauka *(Tilletia caries*)	1.5	1.5-6.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Vasaras kvieši	Sakņu un dīgstu puves *(Fusarium spp.),* kviešu cietā melnplauka *(Tilletia caries*)	1.5	1.5-6.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Sārtais sniega pelējums *(Monographella nivalis)*, sakņu un dīgstu puves *(Fusarium spp.),* rudzu stiebru melnplauka *(Urocystis occulta)*	1.5	1.5-6.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas tritikāle	Sārtais sniega pelējums *(Monographella nivalis),* sakņu un dīgstu puves *(Fusarium spp.)*	1.5	1.5-6.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Vasaras tritikāle	Sakņu un dīgstu puves *(Fusarium spp.)*	1.5	1.5-6.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas mieži	Sārtais sniega pelējums *(Monographella nivalis),* sakņu un dīgstu puves *(Fusarium spp.),* miežu lapu brūnsvītrainība *(Pyrenophora graminea),* miežu putošā melnplauka *(Ustilago segetum var. nuda),* miežu cietā melnplauka *(Ustilago segetum var.hordei),* pelēkais sniega pelējums *(Thyphula graminea)*	1.5	1.5-6.0	Kodināt sēklas pirms sējas

1	2	3	4	5
Vasaras mieži	Sakņu un dīgstu puves *(Fusarium spp.),* miežu lapu brūnsvītrainība *(Pyrenophora graminea),* miežu putošā melnplauka *(Ustilago segetum var. nuda),* miežu cietā melnplauka *(Ustilago segetum var. hordei)*	1.5	1.5-6.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Auzas	Sakņu un dīgstu puves *(Fusarium spp.)*	1.5	1.5-6.0	Kodināt sēklas pirms sējas

9. Latitude XL

Reģ. Nr. 0485, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: siltiofams, 125 g/l.
Pieskares iedarbība.
Certis Belchim B.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Sakņu kakla puve *(Gaeumannomyces graminis var. tritici)*	2.0	līdz 10	Kodināt sēklas pirms sējas

10. Lumiposa 625 FS

Reģ. Nr. 0751, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: ciāntraniliprols, 625 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Corteva Agroscience Denmark A/S

Ziemas rapsis	Spradži *(Phyllotreta spp.),* rapša stublāju spradzis *(Psylliodes chrysocephala)*, krustziežu zāģlapsene *(Athalia rosae),* agrā kāpostu muša *(Delia radicum)*	0.04 l/ 500 000 sēklām	Darba šķidruma daudzums saskaņā ar kodināšanas iekārtas specifikāciju	Kodināt sēklas pirms sējas

11. Maxim 025 FS

Reģ. Nr. 0089, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: fludioksonils, 25 g/l.
Pieskares iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Beret 025 FS

Reģ. Nr. 0852, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: fludioksonils, 25 g/l.
Pieskares iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu cietā melnplauka *(Tilletia caries),* sakņu puves *(Fusarium spp.),* kviešu plēkšņu plankumainība *(Septoria nodorum),* sārtais sniega pelējums *(Microdochium nivale)*	2.0	1.5-6.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu cietā melnplauka *(Ustilago hordei),* sārtais sniega pelējums *(Microdochium nivale)*, sakņu puves *(Fusarium spp.),* miežu lapu brūnsvītrainība *(Pyrenophora graminea),* miežu lapu tīklplankumainība *(Pyrenophora teres)*	2.0	1.5-6.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Kviešu cietā melnplauka *(Tilletia caries),* sakņu puves *(Fusarium spp.),* kviešu plēkšņu plankumainība *(Septoria nodorum),* sārtais sniega pelējums *(Microdochium nivale)*	2.0	1.5-6.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Sārtais sniega pelējums *(Microdochium nivale)*, sakņu puves *(Fusarium spp.),* rudzu stiebru melnplauka *(Urocystis occulta)*	2.0	1.5-6.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Zirņi*, lauka pupas*, lupīna*	Zirņu iedegas *(Ascochyta spp.),* sakņu puves *(Fusarium spp.)*	2.0	1.5-6.0	Kodināt sēklas pirms sējas

1	2	3	4	5
Kartupeļi	Melnais kraupis *(Rhizoctonia solani),* sudrabotais kraupis *(Helmintosporium solani)*, fuzarioze, sausā puve *(Fusarium spp.),* fomoze *(Phoma exigua)**, paugurainais kraupis *(Polyscytalum pustulans)**, parastais kraupis *(Steptomyces scabies)**	0.2	2.0-5.0	Apstrādāt stādīšanai paredzētos bumbuļus pavasarī pirms stādīšanas

***Mazais lietojums**. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

12. Maxim Extra 050 FS

Reģ. Nr. 0272, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: fludioksonils, 25 g/l,
difenokonazols, 25 g/l.
Pieskares un sistēmas iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu cietās melnplaukas *(Tilletia caries, Tilletia foetida),* pundurmelnplauka *(Tilletia contraversa),* sakņu puves *(Fusarium spp.),* sārtais sniega pelējums *(Microdochium nivale),* kviešu plēkšņu plankumainība *(Septoria nodorum),* labību tumšbrūnā plankumainība *(Cochliobolus sativus)*	1.5-2.0	5.0-9.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu brūnsvītrainība *(Pyrenophora graminea),* sārtais sniega pelējums *(Microdochium nivale)*, sakņu puves *(Fusarium spp.)*	1.5-2.0	5.0-9.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Sārtais sniega pelējums *(Microdochium nivale)*, sakņu puves *(Fusarium spp.),* rudzu stiebru melnplauka *(Urocystis occulta)*	1.5-2.0	5.0-9.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Sārtais sniega pelējums *(Microdochium nivale)*, sakņu puves *(Fusarium spp.)*	1.5-2.0	1.0 -7.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Auzas	Sakņu puves *(Fusarium spp.),* auzu putošā melnplauka *(Ustilago avenae)*	1.5-2.0	5.0-9.0	Kodināt sēklas pirms sējas

13. Prepper

Reģ. Nr. 0697, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: fludioksonils, 25 g/l.
Pieskares iedarbība.
Globachem n.v.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Sārtais sniega pelējums *(Monographella nivalis)*, sakņu un dīgstu puves *(Fusarium spp.),* kviešu cietā melnplauka *(Tilletia caries*)	2.0	2.0-6.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas mieži, vasaras mieži	Sārtais sniega pelējums *(Monographella nivalis),* sakņu un dīgstu puves *(Fusarium spp.),* miežu lapu brūnsvītrainība *(Pyrenophora graminea),* miežu lapu tīklplankumainība *(Pyrenophora teres)*	2.0	2.5-6.5	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Sārtais sniega pelējums *(Monographella nivalis)*, sakņu un dīgstu puves *(Fusarium spp.)*	2.0	2.0-6.0	Kodināt sēklas pirms sējas

1	2	3	4	5

14. Redigo Pro

Reģ. Nr. 0553, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: protiokonazols, 150 g/l,
tebukonazols, 20 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Bayer AG

Vasaras kvieši	Kviešu cietās melnplaukas *(Tilletia caries, Tilletia foetida),* kviešu putošā melnplauka *(Ustilago nuda tritici)*	0.5	2.0-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
	Sakņu puves *(Fusarium spp)*	0.667		
Vasaras mieži	Miežu putošā melnplauka *(Ustilago nuda hordei)*	0.5	2.0-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
	Sakņu puves *(Fusarium spp.),* miežu lapu brūnsvītrainība *(Pyrenophora graminea),* miežu lapu tīklplankumainība *(Pyrenophora teres),* labību tumšbrūnā plankumainība *(Cochiobulus sativus)*	0.667		
Vasaras tritikāle	Sakņu puves *(Fusarium spp.)*	0.667	2.0-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Auzas	Auzu putošā melnplauka *(Ustilago avenae)*	0.5	2.0-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
	Sakņu puves *(Fusarium spp.),* auzu lapu brūnplankumainība *(Pyrenophora avenae)*	0.667		

15. Relenya

Reģ. Nr. 0831, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: mefentriflukonazols, 50 g/l.
Sistēmas iedarbība.
SIA BASF

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu cietā melnplauka *(Tilletia caries),* kviešu pundurmelnplauka *(Tilletia controversa)*	1.0	1.0-7.0	Kodināt sēklas pirms sējas

16. Scenic Gold

Reģ. Nr. 0705, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: fluoksastrobīns, 150 g/l,
fluopikolīds, 200 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Bayer AG

Ziemas rapsis, vasaras rapsis, ziemas ripsis*, vasaras ripsis*	Krustziežu sausā puve *(Phoma lingam, Leptosphaeria biglobosa),* krustziežu neīstā miltrasa *(Hayloperonospora barassicae),* krustziežu sauspalnkumainība *(Alternaria brassicae, Alternaria barssicicola),* dīgstu melnkaja *(Rhizoctonia solani)*	10.0	10.0	Kodināt sēklas pirms sējas

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5

17. Seedron

Reģ. Nr. 0534, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: fludioksonils, 50 g/l,
tebukonazols, 10 g/l.
Pieskares un sistēmas iedarbība.
ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Sārtais sniega pelējums *(Microdochium nivale)* (sēklu infekcija), kviešu cietā melnplauka *(Tilletia caries, Tilletia foetida),* putošā melnplauka *(Ustilago nuda f.sp. tritici),* parastā sakņu un dīgstu puve *(Fusarium spp.)*	1.0	1.0 -7.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas mieži, vasaras mieži	Sārtais sniega pelējums *(Microdochium nivale)* (sēklu infekcija), parastā sakņu un dīgstu puve *(Fusarium spp.),* miežu putošā melnplauka *(Ustilago nuda),* miežu lapu brūnsvītrainība *(Pyrenophora graminea),* miežu lapu tīklplankumainība *(Pyrenophora teres)*	1.0	1.0 -7.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Sārtais sniega pelējums *(Microdochium nivale)* (sēklu infekcija), parastā sakņu un dīgstu puve *(Fusarium spp.),* rudzu stiebru melnplauka *(Urocystis occulata)*	1.0	1.0 -7.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Sārtais sniega pelējums *(Microdochium nivale)* (sēklu infekcija), parastā sakņu un dīgstu puve *(Fusarium spp.),*	1.0	1.0 -7.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Auzas	Parastā sakņu un dīgstu puve *(Fusarium spp.),* auzu putošā melnplauka *(Ustilago avenae)*	1.0	1.0 -7.0	Kodināt sēklas pirms sējas

18. Surrender

Reģ. Nr. 0862, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: fludioksonils, 100 g/kg.
Pieskares iedarbība.
Globachem N.V.

Kukurūza	Sakņu puves *(Fusarium spp.)*	0.5	4.5- 8.5	Kodināt sēklas pirms sējas. Sēklu izsējas norma 100-125 tūkst. sēklu/ha
Saldā kukurūza	Sakņu puves *(Fusarium spp.)*	0.5	4.5- 8.5	Kodināt sēklas pirms sējas. Sēklu izsējas norma 65-75 tūkst. sēklu/ha
Saulespuķes	Sakņu puves *(Fusarium spp)*, pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*, neīstā miltrasa *(Plasmopara halstedii)*	1.50	4.0-8.0	Kodināt sēklas pirms sējas. Sēklu izsējas norma 175-225 tūkst. sēklu/ha

1	2	3	4	5

19. Systiva

Reģ. Nr. 0805, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: fluksapiroksāds, 333 g/l.
Sistēmas iedarbība.
SIA BASF

Ziemas kvieši	Sārtais sniega pelējums *(Monographella nivalis),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība *(Septoria tritici)*	1.5	1.5- 12.0	Kodināt sēklas pirms sējas. Maksimālā sēklu izsējas norma 180 kg/ha
Vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis)*, kviešu lapu pelēkplankumainība *(Septoria tritici)*	1.5	1.5-12.0	Kodināt sēklas pirms sējas. Maksimālā sēklu izsējas norma 180 kg/ha
Ziemas mieži	Sārtais sniega pelējums *(Monographella nivalis),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis)*, stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis),* miežu lapu tīklplankumainība *(Pyrenophora teres),* miežu lapu brūnsvītrainība *(Pyrenophora graminis)*	1.5	1.5-12.0	Kodināt sēklas pirms sējas. Maksimālā sēklu izsējas norma 180 kg/ha
Vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis),* miežu lapu tīklplankumainība *(Pyrenophora teres),* miežu lapu brūnsvītrainība *(Pyrenophora graminis)*	0.75	0.75-12.0	Kodināt sēklas pirms sējas. Maksimālā sēklu izsējas norma 180 kg/ha
Ziemas rudzi	Sārtais sniega pelējums *(Monographella nivalis),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis)*	1.0	1.0-12.0	Kodināt sēklas pirms sējas. Maksimālā sēklu izsējas norma 180 kg/ha

20. Vibrance Duo

Reģ. Nr. 0570, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: sedaksāns, 25 g/l,
fludioksonils, 25 g/l.
Pieskares un sistēmas iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Sārtais sniega pelējums *(Monographella nivalis)*, kviešu putošā melnplauka *(Ustilago nuda tritici),* kviešu plēkšņu plankumainība *(Septoria nodorum),* sakņu puves *(Fusarium spp.)*	1.5-2.0	5.5-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
	Kviešu cietā melnplauka *(Tilletia caries),* rizoktonija *(Rhizoctonia spp.)*	2.0	6.0-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Sārtais sniega pelējums *(Monographella nivalis)*, sakņu puves *(Fusarium spp*.), rudzu stiebru melnplauka *(Ustilago occulta)*	2.0	6.0-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Sārtais sniega pelējums *(Monographella nivalis)*, kviešu plēkšņu plankumainība *(Septoria nodorum),* sakņu puves *(Fusarium spp.)*	1.5-2.0	5.5-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
	Kviešu cietā melnplauka *(Tilletia caries)*	2.0	6.0-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas

1	2	3	4	5

21. Vibrance Pro

Reģ. Nr. 0631, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: sedaksāns, 25 g/l,
tritikonazols, 20 g/l,
fludioksonils, 25 g/l.
Pieskares un sistēmas iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

<u>Analogie augu aizsardzības līdzekļi:</u>

Vibrance Star

Reģ. Nr. 0679, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: sedaksāns, 25 g/l,
tritikonazols, 20 g/l,
fludioksonils, 25 g/l.
Pieskares un sistēmas iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, speltas kvieši	Sārtais sniega pelējums *(Monographella nivalis)*, sakņu un dīgstu puves *(Fusarium spp.),* kviešu cietā melnplauka *(Tilletia caries*), kviešu putošā melnplauka *(Ustilago segetum var. tritici),* kviešu plēkšņu plankumainība *(Septoria nodorum),* rizoktonija *(Rhizoctonia spp.)*	1.5-2.0	5.5-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Vasaras kvieši	Sakņu un dīgstu puves *(Fusarium spp.),* kviešu cietā melnplauka *(Tilletia caries*), kviešu putošā melnplauka *(Ustilago segetum var. tritici),* kviešu plēkšņu plankumainība *(Septoria nodorum),* rizoktonija *(Rhizoctonia spp.)*	1.5-2.0	5.5-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Sārtais sniega pelējums *(Monographella nivalis)*, sakņu un dīgstu puves *(Fusarium spp.),* rudzu stiebru melnplauka *(Urocystis occulta)*	1.5-2.0	5.5-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas tritikāle	Sārtais sniega pelējums *(Monographella nivalis),* sakņu un dīgstu puves *(Fusarium spp.),* kviešu plēkšņu plankumainība *(Septoria nodorum),* kviešu cietā melnplauka *(Tilletia caries*)	1.5-2.0	5.5-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Vasaras tritikāle	Sakņu un dīgstu puves *(Fusarium spp.),* kviešu plēkšņu plankumainība *(Septoria nodorum),* kviešu cietā melnplauka *(Tilletia caries*)	1.5-2.0	5.5-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas mieži	Sārtais sniega pelējums *(Monographella nivalis),* sakņu un dīgstu puves *(Fusarium spp.),* miežu lapu brūnsvītrainība *(Pyrenophora graminea),* miežu putošā melnplauka *(Ustilago segetum var. nuda),* miežu cietā melnplauka *(Ustilago segetum var.hordei),* pelēkais sniega pelējums *(Thyphula graminea)*	1.5-2.0	5.5-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Vasaras mieži	Sakņu un dīgstu puves *(Fusarium spp.),* miežu lapu brūnsvītrainība *(Pyrenophora graminea),* miežu putošā melnplauka *(Ustilago segetum var. nuda),* miežu cietā melnplauka *(Ustilago segetum var. hordei)*	1.5-2.0	5.5-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Auzas	Sakņu un dīgstu puves *(Fusarium spp.),* auzu putošā melnplauka *(Ustilago segetum var. avenae)*	1.5	5.5-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas

1	2	3	4	5

22. Vibrance Trio

Reģ. Nr. 0635, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: sedaksāns, 25 g/l,
tebukonazols, 10 g/l,
fludioksonils, 25 g/l.
Pieskares un sistēmas iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši	Sārtais sniega pelējums *(Monographella nivalis)*, sakņu un dīgstu puves *(Fusarium spp.),* kviešu cietā melnplauka *(Tilletia caries*), kviešu putošā melnplauka *(Ustilago segetum var. tritici),* kviešu plēkšņu plankumainība *(Septoria nodorum),* rizoktonija *(Rhizoctonia spp.)*	1.5-2.0	5.5-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Vasaras kvieši	Sakņu un dīgstu puves *(Fusarium spp.),* kviešu cietā melnplauka *(Tilletia caries*), kviešu putošā melnplauka *(Ustilago segetum var. tritici),* kviešu plēkšņu plankumainība *(Septoria nodorum),* rizoktonija *(Rhizoctonia spp.)*	1.5-2.0	5.5-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Sārtais sniega pelējums *(Monographella nivalis)*, sakņu un dīgstu puves *(Fusarium spp.),* rudzu stiebru melnplauka *(Urocystis occulta)*	1.5-2.0	5.5-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas tritikāle	Sārtais sniega pelējums *(Monographella nivalis),* sakņu un dīgstu puves *(Fusarium spp.)*	1.5-2.0	5.5-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas mieži	Miežu putošā melnplauka *(Ustilago segetum var. nuda)*	2.0	5.5-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
	Sārtais sniega pelējums *(Monographella nivalis),* sakņu un dīgstu puves *(Fusarium spp.),* miežu lapu brūnsvītrainība *(Pyrenophora graminea),* miežu cietā melnplauka *(Ustilago segetum var.hordei),* pelēkais sniega pelējums *(Thyphula graminea)*	1.5-2.0		
Vasaras mieži	Miežu putošā melnplauka *(Ustilago segetum var. nuda)*	2.0	5.5-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
	Sakņu un dīgstu puves *(Fusarium spp.),* miežu lapu brūnsvītrainība *(Pyrenophora graminea),* miežu cietā melnplauka *(Ustilago segetum var. hordei)*	1.5-2.0		
Auzas	Sakņu un dīgstu puves *(Fusarium spp.),* auzu putošā melnplauka *(Ustilago segetum var. avenae)*	1.5	5.5-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas

FUNGICĪDI

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, l, kg/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7
1. Afrodyta 250 SC Reģ. Nr. 0674, reģ. klase 2. Darbīgā viela: azoksistrobīns, 250 g/l. Sistēmas iedarbība. ***Pestila Sp. z o.o.***						
Ziemas kvieši	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība *(Septoria tritici),* kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis)*	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmā mezgla stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 31-39)	35	1
Vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība *(Septoria tritici),* kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis)*	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmā mezgla stadiju līdz vārpošanas beigām (AS 31-59)	35	1
Ziemas tritikāle	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis)*	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmā mezgla stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 31-39)	35	1
Vasaras tritikāle	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis),* kviešu lapu pelēkplankumainība *(Septoria tritici)*	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmā mezgla stadiju līdz vārpošanas beigām (AS 31-59)	35	1
Ziemas rudzi	Kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis)*	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmā mezgla stadiju līdz vārpošanas beigām (AS 31-59)	35	1
Vasaras rudzi*	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība *(Septoria tritici),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis,* kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis)*	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmā mezgla stadiju līdz vārpošanas beigām (AS 31-59)	35	1

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas rapsis	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar rapša ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 60-65)	35	1
	Pelēkā puve *(Botrytis spp.),* krustziežu sausplankumainība *(Alternaria brassicae)*	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar rapša ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69)		
Ziedkāposti*, brokoļi*, lapu kāposti*, Briseles kāposti*, galviņkāposti*, Pekinas kāposti*, Ķīnas kāposti*	Kāpostu sausplankumainība (*Alternaria brassicae, A. brassicicola*), krustziežu neīstā miltrasa *(Peronospora parasitica),* krustziežu baltkreves *(Albugo candida),* kāpostu gredzenplankumainība *(Micosphaerella brassicicpla)*	0.8		Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, lapu attīstības stadijā līdz galviņas veidošanās sākumam (AS 19-41)	14	1
Galviņkāposti*, Pekinas kāposti* (glabāšanai)	Kāpostu sausplankumainība *(Alternaria brassicae), pelēkā puve* (Botrytis cinerea)	0.8		Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga galviņas veidošanos, līdz tā sasniegusi 80% šķirnei raksturīgo lielumu un formu (AS 41-48)	14	1
Selerijas* (sakņu)	Seleriju lapu gaišplankumainība (*Septoria apiicola*)	0.8		Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadijas, līdz sakne izveidojusi raksturīgo formu un diametru (AS 13-49)	14	1
Sīpoli*	Sīpolu neīstā miltrasa (*Peronospora destructor),* pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	0.8		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar trīs lapu stadiju līdz 10% lapu noliekušās (AS 13-47)	14	1
Puravi*	Puravu rūsa *(Puccinia porri)*	0.8		Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju, līdz stublājs sasniedzis 70% šķirnei raksturīgo diametru (AS 13-47)	21	1
Zirņi* (svaigam patēriņam bez pākstīm)	Zirņu gaišplankumu iedegas *(Ascochyta pisi),* zirņu neīstā miltrasas *(Peronospora vicae sp. pisi)*	0.8		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu, līdz 60% zirņi nogatavojušies (AS 61-86)	14	1
Pupiņas* (svaigam patēriņam ar pākstīm)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea),* baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*, pupiņu iedegas (*Colletotrichum lindemuthianum)*	0.8		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu, līdz pākstī kļūst redzamas atsevišķas pupas (AS 61-79)	7	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7
2. Aliette Reģ. Nr. 0650, reģ. klase 2. Darbīgā viela: alumīnija fosetils, 800 g/kg. Sistēmas iedarbība. ***Bayer AG***						
Zemenes stādu audzēšanai mātesaugu laukos	Sakņu puve *(Phytophthora fragariae),* sakņu kakla puve *(Phytophthora cactorum)*	-	0.2-0.3	Sakņu iemērkšana īsi pirms stādīšanas uz 15-20 minūtēm	-	2
		4.0		Apsmidzināt augus 4 nedēļas pēc iestādīšanas		
Zemenes (atklātā laukā un segtās platībās)	Sakņu puve *(Phytophthora fragariae),* sakņu kakla puve *(Phytophthora cactorum)*	-	0.2-0.3	Sakņu iemērkšana īsi pirms stādīšanas uz 15-20 minūtēm	42	1
		4.0		Apsmidzināt stādījumu. Pirmā apstrāde 2-3 nedēļas pēc iestādīšanas, otrā apstrāde 20-30 dienas pēc pirmās apstrādes, trešā apstrāde rudenī		3
Avenes* (jaunie stādījumi, atklātā laukā)	Sakņu kakla puve *(Phytophthora cactorum)*	-	0.2-0.3	<u>1. lietošanas variants ar sakņu iemērkšanu:</u> sakņu iemērkšana īsi pirms stādīšanas uz 15-20 minūtēm	42	2
		4.0		Apsmidzināt iestādītos augus joslās 4 nedēļas pēc iestādīšanas		
	Sakņu kakla puve *(Phytophthora cactorum)*	4.0		<u>2. lietošanas variants bez sakņu iemērkšanas</u> Apsmidzināt iestādītos augus joslās. Pirmā apstrāde 2-3 nedēļas pēc stādīšanas, otrā apstrāde 20-30 dienas pēc pirmās apstrādes, trešā apstrāde rudenī	42	3
Gurķi (atklātā laukā)	Gurķu neīstā miltrasa *(Pseudoperonospora cubensis)*	3.0-4.0		Apsmidzināt stādījumu profilaktiski, iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtota apstrāde atkarībā no slimības attīstības intensitātes 8-14 dienas	3	3
Gurķi (segtās platībās)	Gurķu neīstā miltrasa *(Pseudoperonospora cubensis)*		0.3-0.4	Apsmidzināt stādījumu profilaktiski, iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem apstākļiem. Atkārtota apstrāde pie augstas slimības attīstības intensitātes 10 dienas	3	4
Salātu dēsti (izstādīšanai atklātā laukā)	Salātu neīstā miltrasa *(Bremia lactucae)*	0.3-0.7 kg/m^3		Iestrādāt substrātā pirms sējas	14	1
Salāti (atklātā laukā)	Salātu neīstā miltrasa *(Bremia lactucae)*	3.0		Apsmidzināt dēstus tieši pirms pārstādīšanas	14	4
		3.0		Apsmidzināt augus, kad tie ir iesakņojušies un ir 4-6 lapu stadijā. Atkārtoti apsmidzināt ar 7-14 dienu intervālu		
Krāšņumaugi (atklātā laukā un segtās platībās)	Sakņu puves *(Phytium spp., Phytophthora spp.),* stublāju puves *(Phytophthora spp.)*	-	0.05-0.1	Aplaistīt augus pirms vai pēc pārstādīšanas	-	1

1	2	3	4	5	6	7
Krāšņumaugi (atklātā laukā un segtās platībās)	Sakņu puves *(Phytium spp., Phytophthora spp.),* stublāju puves *(Phytophthora spp.)*	-	0.25-0.5	Aplaistīt, smidzinot pirms slimību iespējamās izplatības. Atkārtota apstrāde pēc 7-10 dienām	-	2
Orhidejas	Sakņu puves *(Phytium spp., Phytophthota spp.),* stublāju puves *(Phytophthora spp.)*	-	0.125	Aplaistīt, smidzinot pirms slimību iespējamās izplatības. Atkārtota apstrāde pēc 7-10 dienām.	-	2

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

3. Allstar

Reģ. Nr. 0772, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: fluksapiroksāds, 300 g/l.
Sistēmas iedarbība.
SIA BASF

Kartupeļi	Melnais kraupis *(Rhizoctonia solani),* sudrabotais kraupis *(Helminthosporium solani),* kartupeļu antraknoze *(Colletotrichum coccodes)*	0.6		Apsmidzināt augsni vagās, kartupeļu stādīšanas laikā	-	1

4. Altima 500 s.k.

Reģ. Nr. 0176, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: fluazinams, 500 g/l.
Pieskares iedarbība.
ISK Bioscience Europe N.V.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Frowncide 500 s.k.
Reģ. Nr. 0475, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: fluazinams, 500 g/l.
Pieskares iedarbība.
ISK Bioscience Europe N.V.

Ohayo 500 s.k.
Reģ. Nr. 0473, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: fluazinams, 500 g/l.
Pieskares iedarbība.
ISK Bioscience Europe N.V.

Širlans 500 s.k.
Reģ. Nr. 0177, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: fluazinams, 500 g/l.
Pieskares iedarbība.
ISK Bioscience Europe N.V.

Winby 500 s.k.
Reģ. Nr. 0474, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: fluazinams, 500 g/l.
Pieskares iedarbība.
ISK Bioscience Europe N.V.

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve *(Phytophthora infestans)*	0.4		Apsmidzināt stādījums profilaktiski pēc brīdinājuma signāla par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem apstākļiem. Atkārtoti pēc 7-10 dienām atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	8

1	2	3	4	5	6	7

5. Amistar 250 SC

Reģ. Nr. 0187, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: azoksistrobīns, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Azuba[1]
Reģ. Nr. 0828, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: azoksistrobīns, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Sharda Cropchem España S.L.

Conclude AZT 250 SC
Reģ. Nr. 0717, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: azoksistrobīns, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Mirador 250 SC
Reģ. Nr. 0591, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: azoksistrobīns, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum)*	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
Ziemas mieži, vasaras mieži	Pundurūsa *(Puccinia hordei),* miežu lapu tīklplankumainība *(Pyrenophora teres),* dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis*), stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis)*	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
Rudzi	Brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis)*	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
Tritikāle	Brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis)*	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu sausplankumainība *(Altenaria brassicae)*	0.8-1.0		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar rapša ziedēšanas sākumu līdz ziedēšana beigām (AS 60-69)	21	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	0.8-1.0		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar rapša ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum, kad galvenajā ziedkopā atvērušies 50-60% ziedu (AS 60-65)		
Kartupeļi	Kartupeļu lapu sauspalnkumainība *(Alternaria solani)*	0.5		Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga bumbuļu aizmetņu veidošanas sākumu, līdz bumbuļi sasnieguši 60-70% no paredzamās masas (AS 40-47)	7	2

1	2	3	4	5	6	7
Zirņi (svaigam patēriņam ar/ bez pākstīm, graudiem) pupas (svaigam patēriņam ar/ bez pākstīm, graudiem)	Zirņu gaišplankumu iedegas *(Ascpchyta pisi),* zirņu tumšplankumu iedegas *(Mycosphaerella pinodes),* zirņu īstā miltrasa *(Erysiphe pisi),* zirņu neīstā miltrasa *(Prerenospora vicae sp. pisi),* zirņu rūsa *(Uromyces pisi)*	0.8		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar pirmo ziedpumpuru parādīšanos līdz ziedēšanas beigām (AS 51-69)	14	1
Galviņkāposti, ziedkāposti, brokoļi	Kāpostu sausplankumainība (*Alternaria brassicae, A. brassicicola*), krustziežu neīstā miltrasa *(Peronospora parasitica),* krustziežu īstā miltrasa *(Erysiphe cruciferarum),* krustziežu baltkreves *(Albugo candida)*	0.8		Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar sešu lapu stadiju, līdz kultūrauga galviņa sasniegusi šķirnei raksturīgo lielumu un formu (AS 16-49)	14	1
Pekinas kāposti, Ķīnas kāposti	Kāpostu sausplankumainība (*Alternaria brassicae, A. brassicicola*), krustziežu neīstā miltrasa *(Peronospora parasitica)*, krustziežu īstā miltrasa *(Erysiphe cruciferarum),* krustziežu baltkreves *(Albugo candida)*	0.8		Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga sešu lapu stadiju, līdz kultūraugam izveidojusies 80% šķirnei raksturīgā lapu masa (AS 16-48)	21	1
Selerijas (sakņu), pētersīļi (sakņu), pastinaki	Seleriju lapu gaišplankumainība (*Septoria apiicola*), burkānu lapu sausplankumainība *(Alternaria dauci),* čemurziežu īstā miltrasa *(Erysiphe heraclei),* burkānu lapu brūnplankumainība *(Cercosporium carotae),* seleriju lapu brūnplankumainība *(Cercospora apii),* seleriju rūsa *(Puccinia apii)*	0.8		Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga saknes attīstības sākumu, līdz sakne izveidojusi raksturīgo formu un diametru (AS 40-49)	14	1
Selerijas (kātu)	Seleriju lapu gaišplankumainība (*Septoria apiicola)*, burkānu lapu sausplankumainība *(Alternaria dauci),* čemurziežu īstā miltrasa *(Erysiphe heraclei),* burkānu lapu brūnplankumainība *(Cercosporium carotae),* seleriju lapu brūnplankumainība *(Cercospora apii),* seleriju rūsa *(Puccinia apii)*	0.8		Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga kātu veidošanas sākumu, līdz tie sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu (AS 41-49)	14	1
Kāļi. rāceņi	Lapu sauspalnkumainības *(Alternaria spp.)*	0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga saknes attīstības sākumu, līdz sakne izveidojusi šķirnei raksturīgo formu un diametru (AS 40-49)	14	1
Burkāni	Burkānu lapu sausplankumainība (*Alternaria dauci)*, čemurziežu īstā miltrasa (*Erysiphe heraclei*), burkānu lapu brūnplankumainība (*Cercospora carotae)*	0.8		Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga saknes attīstības sākumu, līdz sakne izveidojusi šķirnei raksturīgo formu un diametru (AS 40-49)	14	1

1	2	3	4	5	6	7
Sīpoli, ķiploki*	Sīpolu neīstā miltrasa (*Peronospora destructor*), lapu plankumainība *(Alternaria porri),* sīpolu kakla puves (*Botryotinia squamosa, Botrytis alli),* rūsas *(Puccinia spp.)*	0.8		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar sešu lapu stadiju līdz 50% lapu noliekušās (AS 16-48)	14	1
Ķirbji*, melones*, arbūzi*	Ķirbjaugu īstā miltrasa *(Erysiphe cichoracearum),* kvēpainā miltrasa *(Sphaerotheca fuliginea)*	0.8		Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga sešu lapu stadiju, līdz augļi sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu un formu (AS 16-79)	3	1
Puravi	Sīpolu rūsa *(Puccinia allii),* melnais sodrējums *(Cladosporium allii),* lapu plankumainība *(Alternaria porri),* puravu neīstā miltrasa *(Phytophthora porri)*	0.8		Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga stublāja veidošanas sākumu, līdz tas sasniedzis šķirnei raksturīgo diametru (AS 41-49)	21	1
Gurķi, kabači (arī cukīni) (segtās platībās)	Gurķu neīstā miltrasa (*Pseudoperonospora cubensis*)		0.08	Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga sešu lapu stadiju, līdz augļi sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu un formu (AS 16-79)	3	2
Gurķi, kabači (arī cukīni) (segtās platībās)	Ķirbjaugu īstā miltrasa (*Erysiphe cichoracearum),* kvēpainā miltrasa (*Sphaerotheca fuliginea*), gurķu kraupis *(Cladosporium cucumerinum),* gurķu stublāju iedegas *(Didymella bryoniae),*		0.08	Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga sešu lapu stadiju, līdz augļi sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu un formu (AS 16-79)		
Tomāti (segtās platībās)	Tomātu augļu brūnā puve *(Phytophthora infestans)*		0.08	Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga sešu lapu stadiju, līdz augļi pilnīgi gatavi (AS 16-89)	3	2
Tomāti, paprika* (segtās platībās)	Tomātu īstā miltrasa *(Oidium lycopersici),* tomātu lapu brūnais pelējums *(Cladosporium fulvum),* tomātu lapu sausplankumainība *(Alternaria solani)*		0.08	Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga sešu lapu stadiju, līdz augļi pilnīgi gatavi (AS 16-89)		
Salāti* (atklātā laukā)	Salātu neīstā miltrasa *(Bremia lactucae)* dīgstu melnkāja *(Rhizoctonia solani)*	0.8		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar sešu lapu stadiju, līdz izveidojies kultūrauga šķirnei raksturīgais lapojuma lielums (AS 16-49)	14	1
Salāti* (segtās platībās)	Salātu neīstā miltrasa *(Bremia lactucae),* dīgstu melnkāja *(Rhizoctonia solani)*	0.8		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar sešu lapu stadiju, līdz izveidojies kultūrauga šķirnei raksturīgais lapojuma lielums (AS 16-49)	14	2

1	2	3	4	5	6	7
Skuju koki kokaudzētavās	Skujbire *(Lophodermium spp.)*	0.8	0.1	Apsmidzināt sējeņus vai ietvarstādus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzina pēc 7-10 dienām	-	2
Lapu koki kokaudzētavās	Rūsas (*Puccinia spp.)*, bērzu tumšbrūnā plankumainība *(Marssonina betulae),* sausplankumainības *(Alternaria spp.)*, īstā miltrasa *(Erysiphe spp.)*, iedegas *(Colletotrichum spp.),* lapu plankumainības *(Cercospora spp.)*	0.8	0.1	Apsmidzināt sējeņus vai ietvarstādus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzina pēc 7-10 dienām	-	2
Krāšņumaugi (atklātā laukā)	Rūsas *(Puccinia spp.)*, sausplankumainības *(Alternaria spp.)*, īstā miltrasa *(Erysiphe spp.)*, iedegas *(Colletotrichum spp.),* lapu plankumainības *(Cercospora spp.)*	0.8	0.1	Apsmidzināt sējumu vai stādījumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm	-	1
Krāšņumaugi (segtās platībās)	Rūsas *(Puccinia spp.),* sausplankumainības *(Alternaria spp.),* īstā miltrasa *(Erysiphe spp.),* iedegas *(Colletotrichum spp.),* lapu plankumainības *(Cercospora spp.)*	0.8	0.1	Apsmidzināt sējumu vai stādījumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzina pēc 7-10 dienām	-	2
Krizantēmas* (atklātā laukā)	Krizantēmu baltā rūsa *(Puccinia horiana)*	0.48- augi līdz 50 cm; 0.72- augi līdz 125 cm; 0.96- augi virs 125 cm	0.1	Apsmidzināt stādījumus profilaktiski	-	1
Krizantēmas* (segtās platībās)	Krizantēmu baltā rūsa (*Puccinia horiana*)	0.48- augi līdz 50 cm; 0.72- augi līdz 125 cm; 0.96- augi virs 125 cm	0.1	Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, atkārtoti pēc 4 nedēļām	-	2
Zāliens, zāliens golfa laukumā	Fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.0		Apsmidzināt zālienu rudenī profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm	-	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

[1]Analogs augu aizsardzības līdzeklim Amistar 250 SC, jo beidzies datu aizsardzības periods.

1	2	3	4	5	6	7

6. Amistar Gold

Reģ. Nr. 0632, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: azoksistrobīns, 125 g/l,
difenokonazols, 125 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Mirador Uni

Reģ. Nr. 0791, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: azoksistrobīns, 125 g/l,
difenokonazols, 125 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Vredmix

Reģ. Nr. 0711, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: azoksistrobīns, 125 g/l,
difenokonazols, 125 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas rapsis	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	0.75		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69)	21	1
Vasaras rapsis	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	0.75		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69)	21	1
Cukurbietes, lopbarības bietes*, galda bietes*	Biešu lapu sīkplankumainība *(Cercospora beticola)*, biešu rūsa *(Uromyces betae),* biešu miltrasa *(Erysiphe betae),* biešu lapu sarmplankumainība *(Ramularia beticola)*	0.75		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar lapotnes izveidošanās stadiju, līdz sakne sasniegusi šķirnei raksturīgo lielumu (AS 39-49)	35	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

7. Ascra Xpro

Reģ. Nr. 0549, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: biksafēns, 65 g/l,
protiokonazols, 130 g/l,
fluopirams, 65 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Bayer AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība *(Mycosphaerella graminicola),* kviešu plēkšņu plankumainība *(Leptosphaeria nodorum*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), dzeltenā rūsa (*Puccinia striiformis*), kviešu lapu dzeltenplankumainība (*Drechslera tritici-repentis*)	0.75-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30-61)	42	1

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), pundurrūsa (*Puccinia hordei*), graudzāļu miltrasa (*Blumeria graminis*), ramulārija *(Ramularia collo-cygni)*	0.6-1.2		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30-61)	42	1
Tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība *(Mycosphaerella graminicola),* kviešu plēkšņu plankumainība (*Leptosphaeria nodorum*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), dzeltenā rūsa (*Puccinia striiformis)*, stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria gramnis)*, kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis)*	0.75-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošana ssākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30-61)	42	1
Rudzi	Stiebrzāļu gredzenplanku-mainība (*Rhynchosporium secalis*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis)*	0.75-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30-61)	42	1
Auzas	Auzu brūnplankumainība *(Pyrenophora avenae),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* auzu vainagrūsa *(Puccinia coronata)*	0.6-1.2		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30-61)	42	1

8. Avastel
Reģ. Nr. 0887, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: protiokonazols, 150 g/l, fluksapiroksāds, 75 g/l.
Sistēmas iedarbība.
ADAMA Registrations B.V.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Vazanti
Reģ. Nr. 0912, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: protiokonazols, 150 g/l, fluksapiroksāds, 75 g/l.
Sistēmas iedarbība.
ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Zymoseptoria tritici*), kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis*), kviešu plēkšņu plankumainība *(Parastagonospora nodorum)*	1.0-1.25		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.0-1.25		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)		

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis),* pundurrūsa *(Puccinia hordei),* ramulārija *(Ramularia collo-cygni),* kviešu plēkšņu plankumainība *(Parastagonospora nodorum)*	1.0-1.25		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 30-65)	35	1
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.0-1.25		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 61-65)		
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Zymoseptoria tritici*), kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis),* kviešu plēkšņu plankumainība *(Parastagonospora nodorum),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* dzeltenā rūsa (*Puccinis striiformis)*	1.0-1.25		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
Rudzi	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis)*	1.0-1.25		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 30-65)	35	1

9. Azaka
Reģ. Nr. 0557, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: azoksistrobīns, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Cheminova A/S

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Torero
Reģ. Nr. 0600, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: azoksistrobīns, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Cheminova A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis)*	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30-59)	35	1
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis),* pundurrūsa *(Puccinia hordei),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria gramnis)*	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30-59)	35	1
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle, ziemas rudzi, vasaras rudzi	Brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis)*	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30-59)	35	1

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu sausplankumainība *(Alternaria barssicae)*	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69)	56	1
	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, kultūrauga pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 65)		

10. Balaya

Reģ. Nr. 0750, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: mefentriflukonazols, 100 g/l,
piraklostrobīns, 100 g/l.
Sistēmas iedarbība.
SIA BASF

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Zymoseptoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība *(Septoria nodorum),* brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* kviešu lapu dzeltenplankumainība (*Pyrenophora tritici-repentis*)	0.5-1.5		1. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
		0.5-1.0		2. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69). Atkārtoti pēc 14 līdz 21 dienas. Kopējais preparāta daudzums maksimāli 1.5 l/ha sezonā	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), pundurrūsa (*Puccinia hordei*), ramulārija *(Ramularia collo-cygni)*	0.5-1.5		1. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
		0.5-1.0		2. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69). Atkārtoti pēc 14 līdz 21 dienas. Kopējais preparāta daudzums maksimāli 1.5 l/ha sezonā	35	2
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Zymoseptoria tritici*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*, stiebrzāļu gredzenplanlumainība *(Rhynchosporium secalis)*	0.5-1.5		1. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
		0.5-1.0		2. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69). Atkārtoti pēc 14 līdz 21 dienas. Kopējais preparāta daudzums maksimāli 1.5 l/ha sezonā	35	2

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas rudzi, vasaras rudzi	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*	0.5-1.5		1. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
		0.5-1.0		2. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69). Atkārtoti pēc 14 līdz 21 dienas. Kopējais preparāta daudzums maksimāli 1.5 l/ha sezonā	35	2
Auzas	Auzu lapu brūnplankumainība *(Pyrenophora avenae),* auzu vainagrūsa *(Puccinia coronata),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria gramins)*	0.5-1.5		1. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
		0.5-1.0		2. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69). Atkārtoti pēc 14 līdz 21 dienas. Kopējais preparāta daudzums maksimāli 1.5 l/ha sezonā	35	2

11. Bolid 250 SE

Reģ. Nr. 0682, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: azoksistrobīns, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Innvigo Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, ziemas tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība *(Septoria tritici),* kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis),* brūna rūsa *(Puccinia recondita)*	1.0		Apsmidznāt sējumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 30-65)	35	1
Vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība *(Pyrenophora teres),* pundurrūsa *(Puccinia hordei),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis)*	1.0		Apsmidznāt sējumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30-59)	35	1
Ziemas rapsis	Krustziežu sauspalnkumainība *(Alternaria brassicae),* pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ar dzelteno pumpuru stadiju līdz pāksteņu veidošanās sākumam (AS 59-71)	35	1
	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar dzelteno pumpuru stadiju līdz sāk nobirt pirmās ziedlapiņas (AS 59-65)		

1	2	3	4	5	6	7

12. Candit

Reģ. Nr. 0197, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metil-krezoksims, 500 g/kg.
Lokāla sistēmas iedarbība.
SIA BASF

Ābeles, bumbieres	Ābeļu kraupis *(Venturia inaequalis),* bumbieru kraupis *(Venturia pirina)*	0.2		Apsmidzināt saskaņā ar kraupja ierobežošanas programmu, sākot ar kultūrauga „zaļā konusa" sākumu līdz augļu nogatavošanās sākumam (AS 07/53-81). Minimālais intervāls starp apstrādēm 7 dienas	28	3
Ābeles, bumbieres	Ābeļu miltrasa *(Podosphaera leucotricha)*	0.2		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga „zaļā konusa" sākumu līdz augļu nogatavošanās sākumam (AS 07/53-81). Minimālais intervāls starp apstrādēm 7 dienas		
Zemenes (atklātā laukā un segtās platībās)	Īstā miltrasa *(Podosphaera macularis)*	0.2		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar lapu attīstības fāzes sākumu līdz ogu nogatavošanās beigām (AS 11-89)	7	2
Jāņogas, ērkšķogas, upenes, krūmmellenes, dzērvenes	Īstā miltrasas *(Podosphaera mors-uvae, Microsphaera spp.)*	0.2		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar lapu/ ziedpumpuru attīstības fāzes sākumu līdz ogu krāsošanās sākumam (AS 11/51-85)	14	2
Rozes (atklātā laukā un segtās platībās)	īstā miltrasa *(Podosphaera pannosa),* rožu lapu tumšplankumainība *(Diplocarpon rosae)*	0.06-0.2		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm	-	3
Krizantēmas (atklātā laukā* un segtās platībās)	Baltā rūsa *(Puccinia horiana)*	0.06-0.2		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm	-	3
Begonijas* (atklātā laukā un segtās platībās)	Begoniju īstā miltrasa *(Microsphaera begoniae)*	0.06-0.2		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm	-	2
Neļķes* (atklātā laukā un segtās platībās)	Neļķu rūsa *(Uromyces dianthi)*	0.06-0.2		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm	-	2
Gerberas* (atklātā laukā un segtās platībās)	Sakņu kakla puve *(Phytophthora cryptogea)*		0.1	Apliet dēstus pēc izstādīšanas. Uz vienu augu izlietot 60 ml 0.1% darba šķidruma	-	1
Ozoli*	Ozolu īstā miltrasa *(Microsphaera alphitoides)*	0.2		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm	-	2
Tomāti*, paprika* (segtās platībā)	Īstā miltrasa *(Leveillula taurica)*	0.2		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm	3	2

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

13. Cantus

Reģ. Nr. 0280, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: boskalīds, 500 g/kg.
Sistēmas iedarbība.
SIA BASF

<u>Analogie augu aizsardzības līdzekļi:</u>

Bonafide[1]

Reģ. Nr. 0775, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: boskalīds, 500 g/kg.
Sistēmas iedarbība.
Sharda Cropchem España S.L.

Bosca[1]

Reģ. Nr. 0854, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: boskalīds, 500 g/kg.
Sistēmas iedarbība.
Sharda Cropchem España S.L.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum),* krustziežu sausplankumainība *(Alternaria brassicae)*	0.5		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos rapša agrā ziedēšanas stadijā līdz pilnas ziedēšanas stadijā, kad galvenajā ziedkopā atvērušies 50-60% ziedu (AS 63-65)	56	1

[1]Analogs augu aizsardzības līdzeklim Cantus, jo beidzies datu aizsardzības periods.

14. Capalo Revy

Reģ. Nr. 0877, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: mefentriflukonazols, 66.7 g/l,
metrafenons, 100 g/l,
piraklostrobīns, 80 g/l.
Sistēmas iedarbība.
BASF SIA

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Stiebru lūšana *(Oculimacula yallundae)*	0.75-1.50		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)	56	2
	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Zymoseptoria tritici*), kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*	0.75-1.50		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30-59)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis),* pundurrūsa *(Puccinia hordei)*, ramulārija *(Ramularia collo-cygni)*	0.75-1.50		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30-59)	56	2

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Stiebru lūšana *(Oculimacula yallundae)*	0.75-1.50		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)	56	2
	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība *(Zymoseptoria tritici*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis)*	0.75-1.50		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30-59)		
Ziemas rudzi, vasaras rudzi	Stiebru lūšana *(Oculimacula yallundae)*	0.75-1.50		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)	56	2
	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis)*	0.75-1.50		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30-59)		
Auzas	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* auzu vainagrūsa *(Puccinia coronata)*	0.75-1.50		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30-59)	56	2

15. Cayunis

Reģ. Nr. 0743, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: biksafēns, 75 g/l,
spiroksamīns, 150 g/l,
trifloksistrobīns, 100 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Bayer AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Zymoseptoria tritici*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* kviešu lapu dzeltenplankumainība (*Pyrenophora tritici-repentis*)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	42	1
		0.8			42	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), pundurrūsa (*Puccinia hordei*)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30-61)	42	1
		0.8			42	2

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Zymoseptoria tritici*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*, kviešu lapu dzeltenplankumainība (*Pyrenophora tritici-repentis*), stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis)*	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	42	1
		0.8			42	2
Ziemas rudzi, vasaras rudzi	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	42	1

16. Chorus 50 WG

Reģ. Nr. 0339, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: ciprodinils, 500 g/kg.
Sistēmas iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ābeles	Ābeļu kraupis (*Venturia inaequalis)*	0.3-0.45		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, pēc signāla par iespējamo infekcijas izplatīšanos vai slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no kultūrauga peļausu stadijas (AS 55). Atkārtoti ar 7-10 dienu intervālu	7	3
Bumbieres	Bumbieru kraupis *(Venturia pyrina)*	0.45		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, pēc signāla par iespējamo infekcijas izplatīšanos vai slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no kultūrauga peļausu stadijas (AS 55). Atkārtoti ar 7-10 dienu intervālu	7	3
Ķirši	Kauleņkoku pelēkā puve *(Monilinia laxa)*	0.45		Apsmidzināt stādījumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos sākot ar ziedēšanas sākumu (AS 60). Atkārtoti ar 7-10 dienu intervālu	7	3
Plūmes	Augļu puves *(Monilinia spp.)*	0.45		Apsmidzināt stādījumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos sākot ar ziedēšanas sākumu (AS 60). Atkārtoti ar 7-10 dienu intervālu	14	3

1	2	3	4	5	6	7

17. Cidely Top

Reģ. Nr. 0472, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: difenokonazols, 125 g/l,
ciflufenamīds, 15 g/l.
Lokāla sistēmas iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Tomāti, paprika (segtās platībās)	Īstās miltrasas *(Leveilula taurica, Erysiphe lycopersici),* tomātu lapu sausplankumainība *(Alternaria solani),* tomātu lapu brūnais pelējums *(Fulvia fulva)*	1.0		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Substrātā audzētiem kultūraugiem apstrāde (AS 20-89), augsnē audzētiem kultūraugiem apstrāde (AS 40-89). Intervāls starp apstrādēm 10 dienas	3	2
Gurķi, cukīni (segtās platībās)	Īstās miltrasas *(Podosphaera xanthii, Erysiphe cichoracearum),* ķirbjaugu sausplankumainība *(Alternaria cucumerina)*, stublāju iedegas *(Didimella bryoniae),* gurķu kraupis *(Cladosporium cucumerium)*	1.0		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Substrātā audzētiem kultūraugiem apstrāde (AS 20-89), augsnē audzētiem kultūraugiem apstrāde (AS 40-89). Intervāls starp apstrādēm 10 dienas	3	2
Zemenes (segtās platībās)	Zemeņu miltrasa *(Podosphaera macularis*), zemeņu antraknoze *(Colletotrichum acutatum),* sausplankumainība *(Alternaria sp.)*	1.0		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Substrātā audzētām zemenēm apstrāde (AS 20-89), augsnē audzētām zemenēm apstrāde (AS 40-89). Intervāls starp apstrādēm 10 dienas	3	2

18. Comet Pro

Reģ. Nr. 0354, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: piraklostrobīns, 200 g/l.
Lokāla sistēmas iedarbība.
SIA BASF

Ziemas kvieši, vasaras kvieši,	Brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* kviešu lapu pelēkplankumainība *(Septoria tritici),* kviešu plēkšņu plankumainība *(Septoria nodorum),* kviešu dzeltenplanku-mainība *(Drechslera tritici-repentis)*	1.25		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25-69)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Pundurrūsa *(Puccinia hordei),* miežu lapu tīklplankumainība *(Pyrenophora teres),* dzeltenā rūsa (*Puccinia striiformis*)	1.25		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz ziedēšanas sākumam (AS 25-61)	35	2
Auzas	Auzu vainagrūsa *(Puccinia coronata)*	1.25		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz ziedēšanas sākumam (AS 25-61)	35	2

1	2	3	4	5	6	7

19. DARCOS

Reģ. Nr. 0438, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Albaugh TKI d.o.o.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Cezix

Reģ. Nr. 0512, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Albaugh TKI d.o.o.

Erasmus

Reģ. Nr. 0513, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Albaugh TKI d.o.o.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), kviešu lapu dzeltenplankumainība (*Pyrenophora tritici-repentis*)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 61-65)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), pundurrūsa (*Puccinia hordei*), graudzāļu miltrasa (*Blumeria graminis*)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 61-65)		
Ziemas rapsis	Krustziežu sausā puve *(Phoma lingam),* krustziežu sausplankumainība *(Alternaria barssicae),* pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	0.75		Apsmidzināt sējumus rudenī, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no rapša 4 lapu stadijas līdz 8 lapu stadijai (AS 14-18)	56	2
	Krustziežu sausā puve *(Phoma lingam)*	1.0-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stublāja pagarināšanās beigu stadijas, līdz redzama galvenā ziedkopa (AS 39-55)		
	Krustziežu sausplankumainība *(Alternaria brassicae),* pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stublāja pagarināšanās beigu stadijas, līdz redzama galvenā ziedkopa (AS 39-55)		

1	2	3	4	5	6	7

20. Delan Pro

Reģ. Nr. 0628, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: ditianons, 125 g/l,
kālija fosfonāts, 561 g/l.
Pieskares un sistēmas iedarbība.
SIA BASF

Ābeles, bumbieres	Ābeļu kraupis *(Venturia inaequalis),* bumbieru kraupis *(Venturia pirina)*	2.5		Apsmidzināt profilaktiski pēc brīdinājuma par asku sporu izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem, sākot ar kultūrauga pumpuru plaukšanas stadiju līdz augļu nogatavošanās sākumam (AS 53-83). Atkārtoti apsmidzināt pēc 8 dienām	35	6

21. Delaro Forte

Reģ. Nr. 0766, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: protiokonazols, 93.3 g/l,
spiroksamīns, 106.7 g/l,
trifloksistrobīns, 80 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Bayer AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Stiebru lūšana *(Oculimacula yallundae)*	1.3		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)	42	1
	Kviešu lapu pelēkplankumainība (*Zymoseptoria tritici*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* kviešu plēkšņu plankumainība *(Parastagonospora nodorum),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis)*	1.3		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)		
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.3		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)		

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas mieži, vasaras mieži	Stiebru lūšana *(Oculimacula yallundae)*	1.3		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)	42	1
	Miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis),* pundurrūsa *(Puccinia hordei),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria gramnis)*	1.3		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas sākumam (AS 30-61)		
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.3		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot ar kultūrauga vārpošanas beigām līdz ziedēšanas sākumam (AS 59-61)		
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Stiebru lūšana *(Oculimacula yallundae)*	1.3		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)	42	1
	Kviešu lapu pelēkplankumainība *(Zymoseptoria tritici),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* kviešu plēkšņu plankumainība *(Parastagonospora nodorum),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis)*	1.3		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)		
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.3		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)		

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas rudzi, vasaras rudzi	Stiebru lūšana *(Oculimacula yallundae)*	1.3		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)	42	1
	Brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria gramnis),* kviešu plēkšņu plankumainība *(Parastagonospora nodorum)*	1.3		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)		
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.3		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)		

22. Difcor 250 EC

Reģ. Nr. 0580, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: difenokonazols, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Globachem n.v.

Ābeles	Ābeļu kraupis *(Venturia inaequalis)*	0.2		Apsmidzināt profilaktiski kraupja sporu lidošanas laikā vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem apstākļiem, sākot no sarkano pumpuru stadijas līdz augļu pilngatavībai (AS 57-89)	14	4
	Ābeļu miltrasa *(Podosphaera leucotricha)*	0.2		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no sarkano pumpuru stadijas līdz augļu pilngatavībai (AS 57-89)		
Bumbieres	Bumbieru kraupis *(Venturia pirina)*	0.2		Apsmidzināt profilaktiski kraupja sporu lidošanas laikā vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem apstākļiem, sākot no balto pumpuru stadijas līdz augļu pilngatavībai (AS 57-89)	14	4
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu sasplankumainība *(Alternaria brassicae)*	0.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu, līdz sāk nobirt pirmās ziedlapiņas (AS 60-65)	56	1
	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	0.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu, līdz sāk nobirt pirmās ziedlapiņas (AS 60-65)		
Galviņkāposti*, ziedkāposti*, brokoļi*, Briseles kāposti*	Krustziežu sausplankumainības (*Alternaria spp.*), krustziežu īstā miltrasa *(Erysiphe cruciferarum),* kāpostu gredzenplankumainība *(Mycosphaerella brassiciola)*	0.5		Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga galviņas veidošanās sākumu, līdz galviņa sasniegusi šķirnei raksturīgo lielumu un formu (AS 41-49)	21	2
Selerijas* (kātu)	Seleriju lapu gaišplankumainība (*Septoria apiicola)*, burkānu lapu sausplankumainība *(Alternaria dauci),* čemurziežu īstā miltrasa *(Erysiphe heraclei),* seleriju rūsa *(Puccinia apii)*	0.5		Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga kātu veidošanas sākumu, līdz tie sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu (AS 41-49)	14	2
Burkāni*, pētersīļi* (sakņu), pastinaki*, mārrutki*	Lapu sausplankumainības (*Alternaria spp.)*, čemurziežu īstā miltrasa (*Erysiphe heraclei*)	0.5		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga saknes attīstības sākumu, līdz sakne izveidojusi šķirnei raksturīgo formu un diametru (AS 41-49)	14	2
Selerijas* (sakņu)	Seleriju lapu baltplankumainība *(Septoria appicola),* burkānu lapu sausplankumainība *(Alternaria dauci),* čemurziežu īstā miltrasa *(Erysiphe heraclei),* seleriju rūsa *(Puccinia apii)*	0.5		Apsmidzināt stādījumus parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga saknes attīstības sākumu, līdz sakne izveidojusi raksturīgo formu un diametru (AS 41-49)	14	2
Kāļi*, rāceņi*, melnie rutki*	Lapu sausplankumainības *(Alternaria spp.),* kāpostu gredzenplankumainība *(Mycosphaerella brassiciola)*	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga saknes attīstības sākumu, līdz sakne izveidojusi raksturīgo formu un diametru (AS 41-49)	14	2
Galda bietes*	Rūsa *(Uromyces betae),* biešu miltrasa *(Erysiphe communis)*	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga saknes attīstības sākumu, līdz sakne izveidojusi raksturīgo formu un diametru (AS 41-49)	14	2
Cigoriņi* (sakņu)	Rūsa *(Puccinia hieracii),* īstā miltrasa *(Erysiphe cichoracearum)*, sausplankumainības *(Alternaria spp.)*	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga saknes attīstības sākumu, līdz sakne izveidojusi raksturīgo formu un diametru (AS 41-49)	14	2
Sparģeļi*	Rūsa *(Puccinia asparagi),* plankumainība *(Stemphylium vesicarium)*	0.5		Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm pēc ražas novākšanas	-	1
Puravi*	Sīpolu rūsa *(Puccinia allii),* lapu plankumainība *(Alternaria porri)*	0.5		Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga stublāja veidošanas sākumu, līdz tas sasniedzis šķirnei raksturīgo diametru (AS 41-49)	21	2
Mangolds*	Lapu sauspankumainības *(Alternaria spp.),* rūsa *(Puccinia spp.),* īstā miltrasa *(Leveilulla taurica)*	0.5		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga lapojuma veidošanos, līdz izveidojies šķirnei raksturīgais lapojuma lielums AS (41-49)	14	2
Rozes* (atklātā laukā un segtās platībās)	Īstā miltrasa *(Spaeroteca pannosa),* rūsa, *(Phragmidium mucronatum)*	0.5		Apsmidzināt stādījumu, parādoties slimības pirmajām pazīmēm	-	2

1	2	3	4	5	6	7
Krāšņumaugi* (atklātā laukā un segtās platībās)	Īstās miltrasas *(Erysiphales),* rūsas *(Pucciniales)* sausplankumainības *(Alternaria spp.)*	0.5		Apsmidzināt sējumu vai stādījumu, parādoties slimības pirmajām pazīmēm	-	2

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

23. Difenzone

Reģ. Nr. 0421, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: difenokonazols, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Sharda Europe b.v.b.a.

Ābeles	Ābeļu kraupis (*Venturia inaequalis*)	0.2		Apsmidzināt stādījumus, sākot no peļausu stadijas (AS 55), atkārtoti pēc 7-14 dienām	21	2

24. Effector

Reģ. Nr. 0134, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: ditianons, 700 g/kg.
Pieskares iedarbība.
SIA BASF

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Dynamo[1]
Reģ. Nr. 0827, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: ditianons, 700 g/kg.
Pieskares iedarbība.
Sharda Cropchem España S.L.

Ābeles	Augļu parastā puve *(Monilia fructigena),* augļu rūgtā puve *(Gleosporium spp.)*	0.5		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar augļu briešanas sākumu, līdz augļiem izveidojies raksturīgais krāsojums (AS 75-85). Atkārtota apstrāde pēc 5-7 dienām	28	3
	Ābeļu kraupis *(Venturia inaequalis)*			Apsmidzināt stādījumus pēc signāla par iespējamo infekcijas parādīšanos, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar pumpuru briešanas sākumu, līdz augļiem izveidojies raksturīgais krāsojums (AS 51-85) Atkārtota apstrāde pēc 5-7 dienām		
Bumbieres	Augļu parastā puve *(Monilia fructigena)*	0.5		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar augļu briešanas sākumu, līdz augļiem izveidojies raksturīgais krāsojums (AS 75-85). Atkārtota apstrāde pēc 5-7 dienām	28	3
	Rūsa *(Gymnosporangium fuscum)*			Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar bumbieru lapu plaukšanu līdz augļaizmetņu veidošanās sākumam (AS 55-72). Atkārtota apstrāde pēc 5-7 dienām		
	Bumbieru kraupis *(Venturia pyrina)*			Apsmidzināt stādījumus pēc signāla par iespējamo infekcijas parādīšanos, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar pumpuru briešanas sākumu, līdz augļiem izveidojies raksturīgais krāsojums (AS 51-85). Atkārtota apstrāde pēc 5-7 dienām		

1	2	3	4	5	6	7
Ķirši	Augļu parastā puve *(Monilia fructigena)*	0.5		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar augļu briešanas sākumu līdz augļu gatavošanās sākumam (AS 75-81). Atkārtota apstrāde pēc 7-10 dienām	21	3
	Ķiršu lapbire *(Blumeriella jaapii)*			Apsmidzināt stādījumus, slimības attīstību veicinošos apstākļos, pirms ziedēšanas līdz augļu gatavošanās sākumam (AS 59-81) vai pēc ražas novākšanas		
	Ķiršu kraupis *(Venturia cerasi)*			Apsmidzināt stādījumus pēc signāla par iespējamo infekcijas parādīšanos, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar pumpuru briešanas sākumu līdz augļu gatavošanās sākumam (AS 51-81). Atkārtota apstrāde pēc 7-10 dienām		
	Kauleņkoku sausplankumainība *(Clasterosporium carpophilum)*			Apsmidzināt stādījumus pavasarī sākoties ziedēšanai (AS 60-64) un atkārtoti rudenī		
Plūmes*	Plūmju rūsa *(Tranzschelia pruni-spinosae)*	0.5		Apsmidzināt stādījumu, sākoties augļaizmetņu nobiršanai un atkārtoti pēc mēneša vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm līdz augļu gatavošanās sākumam (AS 72-81)	21	3
	Kauleņkoku sausplankumainība *(Clasterosporium carpophilum)*			Apsmidzināt stādījumus pavasarī, sākoties ziedēšanai (AS 60-64) un atkārtoti rudenī		
Upenes*, jāņogas*, ērkšķogas*	Rūsa *(Cronartium ribicola),* lapu plankumainība *(Drepanopeziza ribis)*	0.5		Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas	-	3
Avenes*	Avenāju mizas plaisāšana *(Dydymella applanata),* dzinumu iedegas *(Sphaceloma necator)*	0.5		Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas	-	3

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

[1]Analogs augu aizsardzības līdzeklim Effector, jo beidzies datu aizsardzības periods.

1	2	3	4	5	6	7

25. Efilor

Reģ. Nr. 0372, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: boskalīds, 133 g/l,
metkonazols, 60 g/l.
Sistēmas iedarbība.
SIA BASF

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu stublāju puve *(Phoma lingam)*	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no rapša 7 lapu stadijas līdz rapša pilnas ziedēšanas stadijai, kad sāk nobirt pirmās ziedlapiņas (AS 17-65)	42	1
	Krustziežu sausplankumainība *(Alternaria brassicae)*	0.7-1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no rapša 7 lapu stadijas līdz rapša pilnas ziedēšanas stadijai, kad sāk nobirt pirmās ziedlapiņas (AS 17-65)		
	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	0.7-1.0		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no agras ziedēšanas stadijas līdz rapša ziedēšanas fāzes vidum, kad sāk nobirt pirmās ziedlapiņas (AS 63-65		

26. Elatus Era

Reģ. Nr. 0552, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: benzovindiflupirs, 75 g/l,
protiokonazols, 150 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*	0.75-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40-69)	42	1
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis),* pundurrūsa *(Puccinia hordei),* ramulārija *(Ramularia collo-cygni)*	0.75-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 40-59)	42	1
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis)*	0.75-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40-69)	42	1

1	2	3	4	5	6	7

Rudzi	Brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis)*	0.75-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40-69)	42	1
Zirņi, lēcas* (graudiem)	Zirņu iedegas *(Ascochyta spp.),* zirņu rūsa *(Uromyces pisi)*	0.66		Apsmidzināt sējumu, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmā ziedpumpura parādīšanos, līdz 20% pākstu sasnieguši šķirnei raksturīgo garumu (AS 51-72)	35	1
Lauka pupas (graudiem)	Pupu koncentriskā plankumainība *(Didymella fabae),* pupu rūsa *(Uromyces viciae-fabae),* pupu brūnplankumainība *(Botrytis fabae)*	0.66		Apsmidzināt sējumu, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmā ziedpumpura parādīšanos, līdz 20% pākstu sasnieguši šķirnei raksturīgo garumu (AS 51-72)	35	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

27. Elatus Plus

Reģ. Nr. 0574, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: benzovindiflupirs, 100 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*	0.375-0.750		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmā mezgla stadiju līdz ziedēšanas beigām (AS 31-69)	35	1
Vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība *(Septoria tritici),* kviešu plēkšņu plankumainība *(Septoria nodorum),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*	0.375-0.750		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga karoglapas maksts paplašināšanos līdz ziedēšanas beigām (AS 41-69)	35	1
Ziemas mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis),* pundurrūsa *(Puccinia hordei),* ramulārija *(Ramularia collo-cygni)*	0.375-0.750		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmā mezgla stadiju līdz vārpošanas beigām (AS 31-59)	35	1
Vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība *(Pyrenophora teres),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis),* pundurrūsa (*Puccinia hordei),* ramulārija *(Ramularia collo-cygni)*	0.375-0.750		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga karoglapas maksts paplašināšanos līdz vārpošanas beigām (AS 41-59)	35	1

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis)*	0.375-0.750		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmā mezgla stadiju līdz ziedēšanas beigām (AS 31-69)	35	1
Vasaras tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība *(Septoria tritici),* kviešu plēkšņu plankumainība *(Septoria nodorum),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis*)	0.375-0.750		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga karoglapas maksts paplašināšanos līdz ziedēšanas beigām (AS 41-69)	35	1
Rudzi	Brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis)*	0.375-0.750		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmā mezgla stadiju līdz ziedēšanas beigām (AS 31-69)	35	1

28. Entargo

Reģ. Nr. 0756, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: boskalīds, 500 g/l.
Sistēmas iedarbība.
SIA BASF

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Stiebru lūšana *(Oculimacula yallundae)*	0.4-0.7		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)	56	1
	Kviešu lapu pelēkplankumainība *(Zymoseptoria tritici)*	0.4-0.7		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30-49)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība *(Pyrenophora teres)*	0.4-0.7		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30-49)	56	1

29. Euskatel

Reģ. Nr. 0836, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: protiokonazols, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Albaugh TKI d.o.o.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība *(Septoria tritici),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*	0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	0.8		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no kultūrauga ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (61-65)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Pundurrūsa *(Puccinia hordei),* miežu lapu tīklplankumainība *(Pyrenophora teres),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis)*	0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 30-65)	35	1
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	0.8		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no kultūrauga ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (61-65)		
Rudzi	Brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis)*	0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 30-65)	35	1
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība *(Septoria tritici),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis),*	0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 30-65)	35	1
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	0.8		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no kultūrauga ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (61-65)		
Auzas	Auzu vainagrūsa *(Puccinia coronata)*	0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1

1	2	3	4	5	6	7

30. Evagio Plus

Reģ. Nr. 0863, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: mandipropamīds, 200 g/l,
amisulbroms, 100 g/l.
Pieskares un lokāla sistēmas iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve *(Phytopthora infestans)*	0.6		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Minimālais intervāls starp apstrādēm 6 dienas	7	3

31. Falcon Forte

Reģ. Nr. 0343, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: protiokonazols, 53 g/l,
spiroksamīns, 224 g/l,
tebukonazols, 148 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Bayer AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība *(Septoria nodorum*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* kviešu lapu dzeltenplankumainība (*Pyrenophora tritici-repentis*)	0.6-0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), pundurrūsa (*Puccinia hordei*), graudzāļu miltrasa (*Blumeria graminis*), kviešu plēkšņu pelēkplankumainība *(Septoria nodorum)*	0.6-0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30-61)	35	2
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* kviešu lapu dzeltenplankumainība (*Pyrenophora tritici-repentis*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*)	0.6-0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
Rudzi	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*	0.6-0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2

1	2	3	4	5	6	7

32. Flexity

Reģ. Nr. 0265, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metrafenons, 300 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Bayer AG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Graudzāļu miltrasa *(Erysiphe graminis)*	0.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz pilnas ziedēšanas stadijai (AS 30-65)	35	2

33. Folicur

Reģ. Nr. 0057, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Bayer AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība *(Septoria nodorum),* dzeltenā rūsa (*Puccinia striiformis*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, kviešu lapu dzeltenplanku-mainība (*Pyrenophora tritici-repentis*)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 61-65)	35	1
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 61-65)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis)*	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 61-65)	35	1
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 61-65)		
Ziemas rapsis	Krustziežu sausā puve *(Phoma lingam),* krustziežu gaišplankumainība *(Pyrenopeziza brassicae)*, krustziežu sausplankumainība *(Alternaria brassicae)*	0.5		Apsmidzināt rudenī, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no 4 lapu stadijas	56	2
	Krustziežu gaišplankumainība *(Pyrenopeziza brassicae),* krustziežu sausā puve *(Phoma lingam)*	1.0		Apsmidzināt pavasarī, parādoties slimības pirmajām pazīmēm līdz ziedēšanas sākumam (AS 60)		
	Krustziežu sausplankumainība *(Alternaria brassicae)*	1.0		Apsmidzināt pavasarī, parādoties slimības pirmajām pazīmēm līdz ziedlapiņu nobiršanas sākumam (AS 65)		
	Baltā puve (*Sclerotinia sclerotiorum),* pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	1.0		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos rapša pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 65)		

1	2	3	4	5	6	7
Vasaras rapsis	Krustziežu sausā puve *(Phoma lingam),* krustziežu gaišplankumainība *(Pyrenopeziza brassicae)*	1.0		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga 4 lapu stadiju līdz ziedēšanas sākumam (AS 14-60)	56	2
	Krustziežu sausplankumainība *(Alternaria brassicae)*	1.0		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga 4 lapu stadiju līdz ziedlapiņu nobiršanas sākumam (AS 14-65)		
	Baltā puve (*Sclerotinia sclerotiorum),* pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	1.0		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos rapša pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 65)		

34. Fopaz

Reģ. Nr. 0870, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: azoksistrobīns, 90.4 g/l,
folpets, 484 g/l.
Pieskares un sistēmas iedarbība.
Sharda Cropchem España S.L.

Vīnogas	Vīnogu neīstā miltrasa *(Plasmopara viticola)*	1.6		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga ziedkopas attīstības fāzes sākumu līdz ogu attīstības fāzes beigām (AS 50-79)	28	1

35. Globaztar 250 SC

Reģ. Nr. 0626, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: azoksistrobīns, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Globachem n.v.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lappu pelēkplankumainība *(Septoria tritici),* kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis),* dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum)*	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
		0.5+0.5			35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Pundurūsa *(Puccinia hordei),* miežu lapu tīklplankumainība *(Pyrenophora teres),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis)*	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30-59)	35	1
		0.5+0.5			35	2
Rudzi	Stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis)*	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30-59)	35	1
		0.5+0.5			35	2

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Kviešu lappu pelēkplankumainība *(Septoria tritici),* kviešu plēkšņu plankumainība *(Septoria nodorum),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis),* dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis)*	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
		0.5+0.5			35	2
Auzas	Auzu vainagrūsa *(Puccinia coronata),* auzu lapu brūnplankumainība *(Pyrenophora avenae)*	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30-59)	35	1

36. Hutton Flex

Reģ. Nr. 0840, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: trifloksistrobīns, 150 g/l,
protiokonazols, 175 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Bayer AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (*Zymoseptoria tritici*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis),* kviešu plēkšņu plankumainība *(Septoria nodorum)*	0.6-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 61-65)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis),* pundurrūsa *(Puccinia hordei),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria gramnis),* ramulārija *(Ramularia collo-cygni)*	0.6-0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas sākumam (AS 30-61)	35	1
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	0.8		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos kultūrauga ziedēšanas sākumā (AS 61)		

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība *(Zymoseptoria tritici),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis),* kviešu plēkšņu plankumainība *(Septoria nodorum)*	0.6-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 61-65)		
Rudzi	Brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis)*	0.6-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 61-65)		
Auzas	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis)*	0.6-0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas sākumam (AS 30-61)	35	1
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	0.8		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, kultūrauga ziedēšanas sākumā (AS 61)		

37. Imtrex XE

Reģ. Nr. 0406, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: fluksapiroksāds, 62.5 g/l.
Sistēmas iedarbība.
SIA BASF

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Pioli

Reģ. Nr. 0819, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: fluksapiroksāds, 62.5 g/l.
Sistēmas iedarbība.
SIA BASF

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība *(Septoria tritici),* kviešu plēkšņu plankumainība *(Septoria nodorum),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*	2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas mieži, vasaras mieži	Pundurrūsa *(Puccinia hordei),* miežu lapu tīklplankumainība *(Pyrenophora teres),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis)*, ramulārija *(Ramularia collo-cygni),* dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*	1.0-2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
Rudzi	Brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis)*	2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
Tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība *(Septoria tritici),* kviešu plēkšņu plankumainība *(Septoria nodorum),* kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis)*	2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
Auzas	Auzu vainagrūsa *(Puccinia coronata),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* auzu lapu brūnplankumainība *(Pyrenophora avenae)*	1.0-2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2

38. Infinito

Reģ. Nr. 0302, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: propamokarbs, 523.8 g/l (propamokarba hidrohlorīds, 626 g/l), fluopikolīds, 62.5 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Bayer AG

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve *(Phytophthora infestans)*	1.2-1.6		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc signāla par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7-12 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	4
Gurķi (atklātā laukā)	Gurķu neīstā miltrasa *(Pseudoperonospora cubensis)*	1.6		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga sānu dzinumu parādīšanos, līdz visi augļi pilnīgi gatavi (AS 21-89). Atkārtoti pēc 10 dienām	3	3

1	2	3	4	5	6	7
Gurķi (segtās platībās)	Gurķu neīstā miltrasa *(Pseudoperonospora cubensis)*		0.14	Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga sānu dzinumu parādīšanos, līdz visi augļi pilnīgi gatavi (AS 21-89). Atkārtoti pēc 10 dienām	1	3
Galviņkāposti, Briseles kāposti, ziedkāposti, brokoļi	Krustziežu neīstā miltrasa *(Peronospora parasitica)*	1.6		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga trešo īsto lapu, līdz kāpostu galviņa sasniegusi šķirnei raksturīgo izmēru, formu un stingrību (AS 13-49). Atkārtoti pēc 10- 14 dienām	14	3
Sīpoli	Sīpolu neīstā miltrasa *(Peronospora destructor)*	1.6		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar loku kakliņa paresninašanās stadiju, līdz kad 10% lapas ir atliekušās (AS 41-47). Atkārtoti pēc 14 -21 dienas	7	3
Puravi	Puravu neīstā miltrasa *(Phytophthora porri)*	1.6		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar lapu pamatnes uzbriešanu un pagarināšanos līdz stadijai, kad stublājs sasniedzis 70% no plānotā garuma un diametra (AS 41-47). Atkārtoti pēc 14 -21 dienas	14	2

39. Input

Reģ. Nr. 0266, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: protiokonazols, 160 g/l,
spiroksamīns, 300 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Bayer AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Stiebru lūšana *(Pseudocercosporella herpotrichoides),* sakņu puves *(Fusarium spp.)*	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)	35	1
	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), kviešu lapu dzeltenplankumainība (*Pyrenophora tritici-repentis*)	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)		
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59-69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Stiebru lūšana *(Pseudocercosporella herpotrichoides),* sakņu puves *(Fusarium spp.)*	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)	35	1
	Graudzāļu miltrasa (*Blumeria graminis*), miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), pundurrūsa (*Puccinia hordei*)	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30-61)		
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes sākumam (AS 59-61)		
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Stiebru lūšana *(Pseudocercosporella herpotrichoides),* sakņu puves *(Fusarium spp.)*	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)	35	1
	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), kviešu lapu dzeltenplankumainība (*Pyrenophora tritici-repentis*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*)	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)		
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59-69)		
Rudzi	Stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59-69)		

1	2	3	4	5	6	7

40. Input Triple

Reģ. Nr. 0651, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: prokvinazīds, 40 g/l,
protiokonazols, 160 g/l,
spiroksamīns, 200 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Bayer AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši, spelta kvieši	Stiebru lūšana *(Oculimacula yallundae)*	0.75		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)	35	1
	Kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis)*			Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30-49)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Stiebru lūšana *(Oculimacula yallundae)*	0.75		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)	35	1
	Miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis),* pundurrūsa *(Puccinia hordei),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria gramnis)*			Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30-49)		
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Stiebru lūšana *(Oculimacula yallundae)*	0.75		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)	35	1
	Kviešu lapu pelēkplankumainība *(Septoria tritici),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis)*			Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30-49)		
Rudzi	Stiebru lūšana *(Oculimacula yallundae)*	0.75		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)	35	1
	Brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria gramnis)*			Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30-49)		

1	2	3	4	5	6	7

41. Joust

Reģ. Nr. 0876, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: protiokonazols, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Nufarm GmbH& Co KG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Zymoseptoria tritici*), kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*	0.6-0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	0.6-0.8		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis),* pundurrūsa *(Puccinia hordei)*, ramulārija *(Ramularia coloo-cygni)*	0.6		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas sākumam (AS 30-61)	35	2
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	0.6		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga vārpošanas beigām līdz ziedēšanas sākumam (AS 59-61)		
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība *(Zymoseptoria tritici*), kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis)*	0.6-0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	0.6-0.8		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)		
Rudzi	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis)*	0.6-0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2

1	2	3	4	5	6	7
Auzas	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* auzu vainagrūsa *(Puccinia coronata)*	0.6		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas sākumam (AS 30-61)	35	2
Ziemas rapsis, ziemas ripsis*	Krustziežu sausplankumainība *(Alternaria brassicae),* sausā puve *(Plenodomus lingam)*	0.6-0.7		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus rudenī, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga četru lapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 14-18)	56	2
		0.6-0.7		<u>2. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus pavasarī, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga sāndzinumu veidošanās sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 20-69)		
	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	0.6-0.7		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69)		
Vasaras rapsis, vasaras ripsis*, sinepes* (sēklai)	Krustziežu sausplankumainība (*Alternaria brassicae),* sausā puve *(Plenodomus lingam)*	0.6-0.7		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga sāndzinumu veidošanās sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 20-69)	56	2
	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	0.6-0.7		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69)		
Lini* (šķiedrai)	Īstā miltrasa *(Golovinomyces orontii)*	0.6-0.7		Apsmidzināt sējumu, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebra veidošanās fāzes sākumu līdz pumpurošanās sākumam (AS 33-51)	56	2

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

42. Juventus 90

Reģ. Nr. 0221, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metkonazols, 90 g/l.
Sistēmas iedarbība.
SIA BASF

<u>Analogie augu aizsardzības līdzekļi:</u>

Artina[1]
Reģ. Nr. 0908, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metkonazols, 90 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Globachem n.v.

Artina EC
Reģ. Nr. 0653, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metkonazols, 90 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Globachem n.v.

Plexeo 90
Reģ. Nr. 0677, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metkonazols, 90 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Globachem n.v.

Plexeo 90 EC[1]
Reģ. Nr. 0911, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metkonazols, 90 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Globachem n.v.

Remocco 90
Reģ. Nr. 0845, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metkonazols, 90 g/l.
Sistēmas iedarbība.
SIA BASF

Turret 90
Reģ. Nr. 0678, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metkonazols, 90 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Globachem n.v.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* kviešu lapu dzeltenplankumainība (*Pyrenophora tritici-repentis*)	0.7		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40-69)	35	1
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūraugu ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), pundurrūsa (*Puccinia hordei*), dzeltenā rūsa *(Puccina striiformis)*	0.7		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40-69)	35	1

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*, kviešu lapu dzeltenplankumainība (*Pyrenophora tritici-repentis*)	0.7		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40-69)	35	1
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūraugu ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)		
Rudzi	Stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* dzeltenā rūsa *(puccinia striiformis)*	0.7		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40-69)	35	1
Auzas	Auzu lapu brūnplankumainība *(Pyrenophora avenae)*	0.7		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no skaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40-69)	35	1
Ziemas rapsis	Krustziežu sausā puve *(Phoma lingam),* krustziežu sausplankumainība *(Alternaria brassicae)*	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga 4 lapu stadijas līdz ziedēšana sākumam (AS 14-60)	56	1
	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum),* krustziežu sausplankumainība *(Alternaria brassicae)*	0.7		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, kultūrauga pilnas ziedēšanas stadijā, kad 50-60% ziedu atvērušies (AS 63-65)		
Vasaras rapsis	Krustziežu sausplankumainība *(Alternaria brassicae)*	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga sāndzinumu veidošanās fāzes sākuma līdz ziedēšana sākumam (AS 21-60)	56	1
	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum),* krustziežu sausplankumainība *(Alternaria brassicae)*	0.7		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, kultūrauga pilnas ziedēšanas stadijā, kad 50-60% ziedu atvērušies (AS 63-65)		

[1]Analogs augu aizsardzības līdzeklim Juventus 90, jo beidzies datu aizsardzības periods.

1	2	3	4	5	6	7

43. Leander

Reģ. Nr. 0397, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: fenpropidīns, 750 g/l.
Pieskares iedarbība.
ADAMA Registrations B.V.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Winotote
Reģ. Nr. 0796, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: fenpropidīns, 750 g/l.
Pieskares iedarbība.
ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30-59)	42	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* pundurrūsa *(Puccinia hordei),* dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30-59)	42	2
Rudzi	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30-59)	42	2
Tritikāle	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30-59)	42	2

44. Leimay SC

Reģ. Nr. 0346, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: amisulbroms, 200 g/l.
Pieskares iedarbība.
Nissan Chemical Europe S.A.S.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Gachinko
Reģ. Nr. 0733, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: amisulbroms, 200 g/l.
Pieskares iedarbība.
Nissan Chemical Europe S.A.S.

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve *(Phytophthora infestans)*	0.5		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7-10 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	4

45. Lenvyor

Reģ. Nr. 0909, reģ. klase 2
Darbīgā viela: mefentriflukonazols 100 g/l
Sistēmas iedarbības.
SIA BASF

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (*Zymoseptoria tritici*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), dzeltenā rūsa (*Puccinia striiformis*), graudzāļu miltrasa (*Blumeria graminis*), kviešu lapu dzeltenplankumainība (*Pyrenophora tritici-repentis*)	0.75-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu pundurrūsa (*Puccinia* hordei), graudzāļu miltrasa (*Blumeria graminis*), ramulārija (*Ramularia collo-cygni*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*)	0.75-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
Rudzi	Brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), graudzāļu miltrasa (*Blumeria graminis*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*)	0.75-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
Ziemas tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (*Zymoseptoria tritici*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), dzeltenā rūsa (*Puccinia striiformis*), graudzāļu miltrasa (*Blumeria graminis*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*)	0.75-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
Auzas	Auzu vainagrūsa (*Puccinia coronata*), graudzāļu miltrasa (*Blumeria graminis*), auzu lapu brūnplankumainība (*Pyrenophora avenae*)	0.75-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2

46. Librax

Reģ. Nr. 0481, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: fluksapiroksāds, 62.5 g/l,
metkonazols, 45 g/l.
Sistēmas iedarbība.
SIA BASF

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), dzeltenā rūsa (*Puccinia striiformis*), kviešu lapu dzeltenplankumainība (*Pyrenophora tritici-repentis*)	1.33		<u>1. lietošanas paņēmiens</u> Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 40-60)	35	1
		1.0+1.0		<u>2. lietošanas paņēmiens</u> Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40-69). Atkārtoti pēc 14 dienām	35	2
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	2.0		<u>3. lietošanas paņēmiens</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)	35	1

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), pundurrūsa (*Puccinia hordei*), graudzāļu miltrasa (*Blumeria graminis*), ramulārija *(Ramularia collo-cygni)*	1.33		<u>1. lietošanas paņēmiens</u> Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 40-60)	35	1
		1.0+1.0		<u>2. lietošanas paņēmiens</u> Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40-69). Atkārtoti pēc 14 dienām	35	2
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	2.0		<u>3. lietošanas paņēmiens</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)	35	1
Tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), dzeltenā rūsa (*Puccinia striiformis),* stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), graudzāļu miltrasa (*Blumeria graminis*)	1.33		<u>1. lietošanas paņēmiens</u> Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 40-60)	35	1
		1.0+1.0		<u>2. lietošanas paņēmiens</u> Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40-69). Atkārtoti pēc 14 dienām	35	2
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	2.0		<u>3. lietošanas paņēmiens</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)	35	1

1	2	3	4	5	6	7
Rudzi	Stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība *(Septoria tritici)*	1.33		<u>1. lietošanas paņēmiens</u> Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 40-60)	35	1
		1.0+1.0		<u>2. lietošanas paņēmiens</u> Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40-69). Atkārtoti pēc 14 dienām	35	2
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	2.0		<u>3. lietošanas paņēmiens</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)	35	1
Auzas	Auzu lapu brūnplankumainība *(Pyrenophora avenae)*	1.33		<u>1. lietošanas paņēmiens</u> Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no skaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 40-60)	35	1
		1.0+1.0		<u>2. lietošanas paņēmiens</u> Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no skaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40-69). Atkārtoti pēc 14 dienām	35	2
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	2.0		<u>3. lietošanas paņēmiens</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)	35	1

47. Maganic

Reģ. Nr. 0885, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: protiokonazols, 175 g/l,
difenokonazols, 125 g/l.
Sistēmas iedarbība.
ADAMA Registrations B.V.

Ziemas rapsis, ziemas ripsis	Krustziežu sausā puve *(Plenodomus lingam),* krustziežu sausplankumainība *(Alternaria brassicae),* krustziežu neīstā miltrasa *(Hyaloperonospora parasitica)*	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus rudenī, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga četru lapu stadiju līdz izveidojusies lapu rozete (AS 14-19)	-	1

1	2	3	4	5	6	7

48. Maxentis

Reģ. Nr. 0860, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: protiokonazols, 150 g/l,
azoksistrobīns, 200 g/l.
Sistēmas iedarbība.
ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Zymoseptoria tritici*), kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*	0.4		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	0.4		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis),* pundurrūsa *(Puccinia hordei)*	0.4		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiegrošanās sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 30-65)	35	1
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	0.4		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 60-65)		
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Zymoseptoria tritici*), kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis)*	0.4		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	0.4		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69)		
Auzas	Vārpu fuzarioze (*Fusarium spp.)*	0.4		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 60-65)	35	1

Fungicīdi

1	2	3	4	5	6	7
Rudzi	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis)*	0.4		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 30-65)	35	1
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	0.4		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 60-65)		
Ziemas rapsis, ziemas ripsis*	Baltā puve (*Sclerotinia sclerotiorum)*	0.4		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 60-65)	56	1
	Krustziežu sausplankumainība *(Alternaria brassicae)* sausā puve *(Plenodomus lingam)*	0.4		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ziedpumpuru veidošanās sākumu līdz 30% pākšteņu pilnībā attīstīti (AS 50-73)		
Vasaras rapsis, vasaras ripsis*	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	0.4		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 60-65)	56	1
	Krustziežu sausplankumainība (*Alternaria brassicae)* sausā puve *(Plenodomus lingam)*	0.4		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ziedpumpuru veidošanās sākumu līdz 30% pākšteņu pilnībā attīstīti (AS 50-73)		

*__Mazais lietojums.__ Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

49. Mirador Forte

Reģ. Nr. 0558, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: azoksistrobīns, 60 g/l,
tebukonazols, 100 g/l.
Pieskares iedarbība.
ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis)*	1.5-2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma, līdz vārpošanas beigām (AS 30-59)	35	1
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis),* pundurrūsa *(Puccinia hordei),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria gramnis)*	1.5-2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu, līdz vārpošanas beigām (AS 30-59)	35	1

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis)*	1.5-2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma, līdz vārpošanas beigām (AS 30-59)	35	1
Rudzi	Brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria gramnis)*	1.5-2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu, līdz vārpošanas beigām (AS 30-59)	35	1
Auzas	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis)*	1.5-2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu, līdz vārpošanas beigām (AS 30-59)	35	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu sausplankumainība *(Alternaria barssicae),* pelēkā puve *(Botrytis cenerea)*	2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu, līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69)	56	1
	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	2.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, kultūrauga pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 65)		

50. Nando 500 SC

Reģ. Nr. 0427, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: fluazinams, 500 g/l.
Pieskares iedarbība.
Nufarm GmbH & Co KG

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (*Phytophtora infestans*)	0.3-0.4		Apsmidzināt profilaktiski, pēc brīdinājuma signāla vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem, atkārtoti apsmidzināt pēc 7-10 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	1	8

1	2	3	4	5	6	7

51. Orius 250 EW

Reģ. Nr. 0267, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Nufarm GmbH & Co KG

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Syrius
Reģ. Nr. 0522, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (*Blumeria graminis*), miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), pundurrūsa (*Puccinia hordei*)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 30-65)	35	1
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 60-65)		
Rudzi	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria gramins)* stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 30-69)	35	1
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu ziedēšanas fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69)		
Auzas	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* auzu vainagrūsa *(Puccina coronata)*	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšana fāzes vidum (AS 30-65)	35	1

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas rapsis	Krustziežu sausā puve *(Phoma lingam)*	0.5		Apsmidzināt sējumus rudenī, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no 4 lapu stadijas	56	1
	Krustziežu sausā puve *(Phoma lingam)*	1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, līdz ziedēšanas sākumam (AS 60)	56	1
	Krustziežu sausplankumainība *(Alternaria brassicae)*	1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, līdz ziedēšanas beigām (AS 69)		
	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum),* pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	1.0		Apsmidzināt sējumus kultūrauga pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 65)		
Vasaras rapsis	Krustziežu sausā puve *(Phoma lingam)*	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no 4 lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 14-60)	56	1
	Krustziežu sausplankumainība *(Alternaria brassicae)*	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no 4 lapu stadijas līdz ziedēšanas beigām (AS 14-69)		
	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum),* pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	1.0		Apsmidzināt kultūrauga pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 65)		

52. Pictor Active

Reģ. Nr. 0642, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: boskalīds, 150 g/l,
piraklostrobīns, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
SIA BASF

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	0.6-1.0		1. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69)	42	1
	Krustziežu sausplankumainība *(Alternaria brassicae)*			Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69)		
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	0.5+0.5		2. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus profilaktiski dalītā apstrādē, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69)	42	2
	Krustziežu sausplankumainība *(Alternaria brassicae)*			Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69)		

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas ripsis*, vasaras ripsis*, sinepes*, eļļas rutks*, kaņepes*, lini*	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum),* sausplankumainības *(Alternaria spp.),* sausā puve *(Phoma spp.),* neīstā miltrasa *(Hyaloperonospora parasitica)*	0.6-1.0		1. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar ziedkopas veidošanās fāzes sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 51-69)	42	1
Ziemas ripsis*, vasaras ripsis*, sinepes*, eļļas rutks*, kaņepes*, lini*	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum),* sausplankumainības *(Alternaria spp.),* sausā puve *(Phoma spp.)*, neīstā miltrasa *(Hyaloperonospora parasitica)*	0.5+0.5		2. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar ziedkopas veidošanās fāzes sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 51-69)	42	2
Lauka pupas* (graudiem)	Pupu brūnplankumainība *(Botrytis fabae),* pupu rūsa *(Uromyces vicia-fabae),* pupu koncentriskā plankumainība *(Ascochyta fabae)*	0.6-1.0		1. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmo ziedpumpuru parādīšanos, līdz 50% pākstu sasniegušas šķirnei raksturīgo garumu (AS 51-75)	42	1
		0.5+0.5		2. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga pirmo ziedpumpuru parādīšanos, līdz 50% pākstu sasniegušas šķirnei raksturīgo garumu (AS 51-75)	42	2
Zirņi* (graudiem)	Zirņu gaišplankumu iedegas *(Ascochyta pisi),* pelēkā puve *(Botrytis cinerea),* zirņu rūsa *(Uromyces pisi),* zirņu neīstā miltrasa *(Peronospora viciae)*	0.6-1.0		1. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmo ziedpumpuru parādīšanos, līdz 50% pākstu sasniegušas šķirnei raksturīgo garumu (AS 51-75)	42	1
		0.5+0.5		2. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga pirmo ziedpumpuru parādīšanos, līdz 50% pākstu sasniegušas šķirnei raksturīgo garumu (AS 51-75)	42	2

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

53. Praktis

Reģ. Nr. 0763, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: protiokonazols, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Sharda Cropchem España S.L.

Ziemas kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*	0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 30-65)	35	2
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	0.8		Apsmidzināt sējumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no kultūrauga vārpošanas beigām līdz ziedēšanas vidum (AS 59-65)		
Ziemas rapsis	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	0.7		Apsmidzināt sējumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no kultūrauga ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)	56	2

54. Previcur Energy

Reģ. Nr. 0224, reģ. klase 2., iepakojumiem 1.0 l, reģ. klase 3.
Darbīgās vielas: propamokarbs, 530 g/l,
fosetils, 310 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Bayer AG

Galviņkāposti, ziedkāposti, lapu kāposti (dēsti segtās platībās)	Sakņu un stublāju puves *(Pythium spp., Phytophthora spp.)*	3 ml/m^2	0.15	Lieto laistīšanas sistēmā Apstrāde pēc sējas līdz kultūraugu sadīgšanai; intervāls 7-10 dienas. Darba šķidruma patēriņš: 2 l/m^2 (20000 l/ha)	-	2
	Sakņu un stublāju puves *(Pythium spp., Phytophthora spp.)*	6 ml/m^2	0.3	*vai* Lieto laistīšanas sistēmā Apstrāde pēc sējas līdz kultūraugu sadīgšanai. Darba šķidruma patēriņš: 2 l/m^2 (20000 l/ha)	-	1
Tomāti, gurķi segtās platībās (audzējot augsnē)	Sakņu un stublāju puves *(Pythium spp., Phytophthora spp.)*	3 ml/m^2	0.15	Lieto laistīšanas sistēmā Apstrāde pēc sējas līdz kultūraugu sadīgšanai; intervāls 7-10 dienas. Darba šķidruma patēriņš: 2 l/m^2 (20000 l/ha)	-	2
	Sakņu un stublāju puves *(Pythium spp., Phytophthora spp.)*	1. apstrāde: 0.1 ml/m^2; 2. apstrāde: 0.3 ml/m^2		*un* Lieto pilienu sistēmā Apstrādi sākt pēc dēstu pārstādīšanas, intervāls 10-15 dienas. Darba šķidruma patēriņš 1000- 3000 l/ha	3	2

1	2	3	4	5	6	7
Tomāti, gurķi segtās platībās (audzējot akmens vatē)	Sakņu un stublāju puves *(Pythium spp., Phytophthora spp.)*	3 ml/m^2	0.15	Lieto laistīšanas sistēmā Apstrāde pēc sējas līdz kultūraugu sadīgšanai; intervāls 7-10 dienas. Darba šķidruma patēriņš: 2 l/m2 (20000 l/ha)	-	2
	Sakņu un stublāju puves *(Pythium spp., Phytophthora spp.)*	1. apstrāde: 0.1 ml/m^2; 2.- 4. apstrāde: 0.1- 0.3 ml/m^2		*un* Lieto pilienu sistēmā Apstrādi sākt pēc dēstu pārstādīšanas, intervāls 10-15 dienas. Trešo apstrādi veic, kad augi sāk ražot. Pēdējā apstrāde pēc 7 dienām. Darba šķidruma patēriņš 1000-3000 l/ha	3	4
Pipari segtās platībās (audzējot augsnē)	Sakņu un stublāju puves *(Pythium spp., Phytophthora spp.)*	1. apstrāde 6 ml/m^2 2. apstrāde 3 ml/m^2	0.3 0.15	Lieto laistīšanas sistēmā Apstrāde pēc sējas līdz kultūraugu sadīgšanai; intervāls 7-10 dienas. Darba šķidruma patēriņš: 2 l/m^2 (20000 l/ha)	-	2
	Sakņu un stublāju puves *(Pythium spp., Phytophthora spp.)*	1. apstrāde: 0.1 ml/m^2; 2. apstrāde: 0.3 ml/m^2		*un* Lieto pilienu sistēmā Apstrādi sākt pēc dēstu pārstādīšanas, intervāls 10-15 dienas. Darba šķidruma patēriņš 1000-3000 l/ha	3	2
Pipari segtās platībās (audzējot akmens vatē)	Sakņu un stublāju puves *(Pythium spp., Phytophthora spp.)*	1. apstrāde 6 ml/m^2 2. apstrāde 3 ml/m^2	0.3 0.15	Lieto laistīšanas sistēmā Apstrāde pēc sējas līdz kultūraugu sadīgšanai, intervāls 7-10 dienas. Darba šķidruma patēriņš: 2 l/m^2 (20000 l/ha)	-	2
	Sakņu un stublāju puves *(Pythium spp., Phytophthora spp.)*	0.1- 0.3 ml/m^2		*un* Lieto pilienu sistēmā Apstrādi sākt pēc dēstu pārstādīšanas, intervāls 10-15 dienas. Trešo apstrādi veic, kad augi sāk ražot. Pēdējā apstrāde pēc 7 dienām. Darba šķidruma patēriņš 1000-3000 l/ha	3	4
Salāti segtās platībās	Sakņu un stublāju puves *(Pythium spp.)*	3 ml/m^2	0.15	Lieto laistīšanas sistēmā Apstrāde pēc sējas līdz kultūraugu sadīgšanai; intervāls 7-10 dienas. Darba šķidruma patēriņš: 2 l/m^2 (20000 l/ha)	-	2
	Salātu neīstā miltrasa (*Bremia lactucae)*	2.5 l/ha		*un* Smidzinot pa augu lapām Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar augu 2 lapu attīstību līdz pilnīgai lapu masas izaugšanai (AS 12-49); intervāls starp apstrādēm 15 dienas. Ūdens patēriņš 400-1000 l/ha	14	2
Redīsi segtās platībās	Krustziežu neīstā miltrasa *(Peronospora parasitica)*	2.5 l/ha		Smidzinot pa augu lapām Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar augu 2 lapu attīstību līdz pilnīgai saknes izaugšanai (AS 12-49); intervāls starp apstrādēm 7-10 dienas. Ūdens patēriņš 500-1000 l/ha	14	2

1	2	3	4	5	6	7
Krāšņumaugi segtās platībās	Sakņu un stublāju puves *(Pythium spp., Phytophthora spp.,)*	3 ml/m^2	0.15	1.lietošanas veids. Lieto laistīšanas sistēmā Apstrāde pēc sējas līdz kultūraugu sadīgšanai; intervāls 7-10 dienas. Darba šķidruma patēriņš: 2 l/m^2 (20000 l/ha)	-	2
Krāšņumaugi segtās platībās	Sakņu un stublāju puves *(Pythium spp., Phytophthora spp.)*	3 ml/m^2	0.15	2.lietošanas veids. Lieto laistīšanas sistēmā Apstrāde pēc sējas līdz kultūraugu sadīgšanai; intervāls 7-10 dienas. Darba šķidruma patēriņš: 2 l/m^2 (20000 l/ha)	-	2
	Sakņu un stublāju puves *(Pythium spp., Phytophthora spp.)*	0.3 ml/m^2		*un* Lieto pilienu sistēmā Apstrādi sākt pēc dēstu pārstādīšanas, intervāls 10-15 dienas. Darba šķidruma patēriņš 1000-3000 l/ha	-	2
Krāšņumaugi segtās platībās	Sakņu un stublāju puves *(Pythium spp., Phytophthora spp.)*	3 ml/m^2	0.15	3. lietošanas veids. Lieto laistīšanas sistēmā Apstrāde pēc sējas līdz kultūraugu sadīgšanai; intervāls 7-10 dienas. Darba šķidruma patēriņš: 2 l/m^2 (20000 l/ha)	-	2
	Neīstās miltrasas *(Peronospora spp.)*	2.5 l/ha		*un* Smidzinot pa augu lapām Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar augu 2 lapu attīstību līdz pilnai ziedēšanai (AS 12-65); intervāls 15 dienas. Darba šķidruma patēriņš 400-1000 l/ha	-	2
Krāšņumaugi atklātā laukā	Sakņu un stublāju puves *(Pythium spp., Phytophthora spp.)*	3 ml/m^2		1. lietojuma veids. Lieto pilienu sistēmā Apstrādi sāk pēc dēstu pārstādīšanas; intervāls 10-15 dienas. Darba šķidruma patēriņš: 1000-3000 l/ha	-	2
Krāšņumaugi atklātā laukā	Sakņu un stublāju puves *(Pythium spp., Phytophthora spp.)*	3 ml/m^2	0.15	2. lietojuma veids. Lieto laistīšanas sistēmā Apstrāde pēc sējas līdz kultūraugu sadīgšanai; intervāls 7-10 dienas. Darba šķidruma patēriņš: 2 l/m^2 (20000 l/ha)	-	2
	Neīstās miltrasas *(Peronospora spp.)*	2.5 l/ha		*un* Smidzinot pa augu lapām Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar augu 2 lapu attīstību līdz pilnai ziedēšanai (AS 12-65); intervāls 15 dienas. Darba šķidruma patēriņš 400-1000 l/ha	-	2
Gurķi atklātā laukā	Gurķu neīstā miltrasa *(Pseudoperonospora cubensis)*	2.5 l/ha		Smidzinot pa augu lapām. Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar augu 2 lapu attīstību līdz augļu nogatavošanās fāzes vidum (AS 12-85); intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Ūdens patēriņš: 600 l/ha	3	2

1	2	3	4	5	6	7

55. Priaxor

Reģ. Nr. 0514, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: fluksapiroksāds, 75 g/l,
piraklostrobīns, 150 g/l.
Sistēmas iedarbība.
SIA BASF

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* kviešu lapu dzeltenplankumainība (*Pyrenophora tritici-repentis*)	0.75-1.5		1. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25-69)	35	1
		0.75+ 0.75		2. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25-69). Minimālais intervāls starp apstrādēm 21 diena	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), pundurrūsa (*Puccinia hordei*), dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* graudzāļu miltrasa (*Blumeria graminis*), ramulārija (*Ramularia collo-cygni)*	0.75-1.5		1. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25-69)	35	1
		0.75+ 0.75		2. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25-69). Minimālais intervāls starp apstrādēm 21 diena	35	2
Tritikāle	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* kviešu lapu dzeltenplankumainība (*Pyrenophora tritici-repentis*)	0.75-1.5		1. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25-69)	35	1
		0.75+ 0.75		2. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25-69). Minimālais intervāls starp apstrādēm 21 diena	35	2
Rudzi	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*	0.75-1.5		1. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25-69)	35	1
		0.75+ 0.75		2. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25-69). Minimālais intervāls starp apstrādēm 21 diena	35	2

1	2	3	4	5	6	7
Auzas	Auzu lapu brūnplankumainība *(Pyrenophora avenae)*	0.75 -1.5		1. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25-69)	35	1
		0.75+ 0.75		2. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25-69). Minimālais intervāls starp apstrādēm 21 diena	35	2

56. Proline

Reģ. Nr. 0637, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: protiokonazols, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Bayer AG

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Croton Flex

Reģ. Nr. 0797, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: protiokonazols, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Bayer AG

Curbatur

Reģ. Nr. 0655, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: protiokonazols, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Bayer AG

Glacis

Reģ. Nr. 0798, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: protiokonazols, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Bayer AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši, spelta kvieši	Stiebru lūšana *(Pseudocerco-sporella herpotrichoides)*	0.6-0.8		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)	35	1
	Kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis)*			Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)		
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*			Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 61-65)		

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas mieži, vasaras mieži	Stiebru lūšana *(Pseudocercosporella herpotrichoides)*	0.6-0.8		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)	35	1
	Miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis),* pundurrūsa *(Puccinia hordei),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria gramnis)*			Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 30-65)		
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*			Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākum līdz ziedēšanas vidum (AS 61-65)		
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Stiebru lūšana *(Pseudocercosporella herpotrichoides)*	0.6-0.8		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)	35	1
	Kviešu lapu pelēkplankumainība *(Septoria tritici),* kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis)*			Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 30-65)		
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*			Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 61-65)		
Rudzi	Stiebru lūšana *(Pseudocercosporella herpotrichoides)*	0.6-0.8		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)	35	1
	Brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria gramnis)*			Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 30-65)		
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*			Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 61-65)		

57. Property 180 SC

Reģ. Nr. 0567, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: piriofenons, 180 g/l.
Lokāla sistēmas iedarbība.
ISK Biosciences Europe N.V.

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas tritikāle, vasaras tritikāle, rudzi, speltas kvieši	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis)*	0.5		Apsmidzināt sējumus pavasarī profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai slimības attīstības sākumā, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 30-65)	35	2
Vasaras mieži, ziemas mieži, auzas	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis)*	0.5		Apsmidzināt sējumus pavasarī profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai slimības attīstības sākumā, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas sākumam (AS 30-50)	35	2

58. Propulse

Reģ. Nr. 0416, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: fluopirams, 125 g/l,
protiokonazols, 125 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Bayer AG

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 63-65)	56	1
	Krustziežu sausplankumainība *(Alternaria brassicae)*	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar rapša ziedpumpuru attīstības fāzes beigām līdz ziedēšanas beigām (AS 57-69)		
	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar rapša ziedpumpuru attīstības fāzes beigām līdz ziedēšanas beigām (AS 57-69)		
Lauka pupas* graudiem	Pupu brūnplankumainība *(Botrytis fabae),* pelēkā puve *(Botrytis cinerea),* pupu koncentriskā plankumainība *(Didymella fabae),* pupu rūsa *(Uromyces vicia-fabae),* sausplankumainība *(Alternaria spp.),* baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumu, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar stublāja pagarināšanās sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
Zirņi* graudiem	Zirņu gaišplankumu iedegas *(Didymella pisi),* pelēkā puve *(Botrytis cinerea),* zirņu rūsa *(Uromyces pisi),* sausplankumainība *(Alternaria spp.),* baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumu, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar stublāja pagarināšanās sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2

1	2	3	4	5	6	7
Kukurūza	Kukurūzas lapu plankumainības *(Setosphaeria turtica, Helmintosporium carbonum),* kukurūzas acsveida plankumainība *(Kabatiella zeae)*	0.8-1.0		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar 3 mezglu stadiju līdz ziedēšanas beigām (AS 33-69)	30	2
Kartupeļi	Kartupeļu lapu sausplankumainības *(Alternaria solani, Alternaria alternata)*	0.3-0.5		Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ar bumbuļu aizmetņu veidošanās sākumu, līdz bumbuļi sasnieguši 60-70% no paredzamās masas (AS 40-47), atkārtoti pēc 10-14 dienām	21	2

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

59. Prosaro

Reģ. Nr. 0276, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: protiokonazols, 125 g/l,
tebukonazols, 125 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Bayer AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa *(Erysiphe graminis),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* kviešu lapu pelēkplankumainība *(Septoria tritici),* kviešu plēkšņu plankumainība *(Septoria nodorum),* kviešu dzeltenplankumainība *(Drechslera tritici-repentis)*	0.75-1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp., Monographella nivalis)*	0.75-1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59-69)		
Rudzi	Graudzāļu miltrasa *(Erysiphe graminis),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis),* dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*	0.75-1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp, Monographella nivalis)*	0.75-1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59-69)		
Tritikāle	Graudzāļu miltrasa *(Erysiphe graminis),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* kviešu lapu pelēkplankumainība *(Septoria tritici),* kviešu plēkšņu plankumainība *(Septoria nodorum)*	0.75-1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp., Monographella nivalis)*	0.75-1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59-69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa *(Erysiphe graminis),* pundurrūsa *(Puccinia hordei),* miežu lapu tīklplankumainība *(Pyrenophora teres),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis),* dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* labību tumšbrūnā plankumainība *(Bipolaris sorokiniana)*	0.75-1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30-61)	35	2
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp., Monographella nivalis)*	0.75-1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas sākumam (AS 59-61)		
Auzas	Graudzāļu miltrasa *(Erysiphe graminis),* auzu vainagrūsa *(Puccinia coronata),* auzu pelēkplankumainība *(Stagonospora avenae)*	0.75-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz graudaugu ziedēšanas sākumam (AS 30-61)	35	2
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu sausā puve *(Phoma lingam),* krustziežu gaišplankumainība *(Pyrenopeziza brassicae)*	1.0		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga 4 lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 13-60)	56	2
	Krustziežu sausplankumainība *(Alternaria brassicae)*	1.0		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga 4 lapu stadijas līdz ziedlapiņu nobiršanas sākumam (AS 13-65)		
	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum),* pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	1.0		Apsmidzināt kultūrauga pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 65)		
Pupas graudiem* (lauka pupas, kāršu pupas, kanavālijas, sviesta pupas, lopbarības pupas)	Pupu koncentriskā plankumainība *(Ascochyta fabae,* pupu rūsa *(Uromyces fabae)*	1.0		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar ziedkopu veidošanos līdz ziedēšanas beigām (AS 50-69). Intervāls starp apstrādēm 14 dienas	35	2

1	2	3	4	5	6	7
Zirņi graudiem*	Zirņu gaišplankumu iedegas *(Ascochyta pisi),* zirņu rūsas *(Uromyces pisi)*	1.0		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar ziedkopu veidošanos līdz ziedēšanas beigām (AS 50-69). Intervāls starp apstrādēm 14 dienas	35	2

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

60. Protendo 300 EC

Reģ. Nr. 0714, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: protiokonazols, 300 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Globachem n.v.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Patel 300 EC

Reģ. Nr. 0778, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: protiokonazols, 300 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Globachem n.v.

Pecari 300 EC

Reģ. Nr. 0748, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: protiokonazols, 300 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Globachem n.v.

Poleposition 300 EC

Reģ. Nr. 0779, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: protiokonazols, 300 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Globachem n.v.

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība *(Septoria nodorum),* brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* kviešu lapu dzeltenplankumainība (*Pyrenophora tritici-repentis*)	0.33-0.65		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	0.33-0.65		Apsmidzināt sējumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), pundurrūsa (*Puccinia hordei*)	0.33-0.65		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	0.33-0.65		Apsmidzināt sējumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)		
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība *(Septoria nodorum),* brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*, kviešu lapu dzeltenplankumainība (*Pyrenophora tritici-repentis*), stiebrzāļu gredzenplanlumainība *(Rhynchosporium secalis)*	0.33-0.65		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	0.33-0.65		Apsmidzināt sējumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)		
Rudzi	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*	0.33-0.65		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	0.33-0.65		Apsmidzināt sējumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)		
Auzas	Auzu lapu brūnplankumainība *(Pyrenophora avenae),* auzu vainagrūsa *(Puccinia coronata)*	0.33-0.65		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	0.33-0.65		Apsmidzināt sējumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)		
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu sauspalnkumainība *(Alternaria brassicae)*	0.3-0.6		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)	56	1
	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	0.3-0.6		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 65)		
Ziemas ripsis*, vasaras ripsis*	Krustziežu sauspalnkumainība *(Alternaria brassicae)*	0.3-0.6		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)	56	1
	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	0.3-0.6		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 65)		

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

61. Protikon 250 EC

Reģ. Nr. 0886, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: protiokonazols, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Innvigo Sp. z o.o.

Ziemas kvieši	Stiebru lūšana *(Oculimacula yallundae)*	0.7-0.8		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)	35	1
	Kviešu lapu pelēkplankumainība *(Zymoseptoria tritici),* kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici- repentis),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis)*	0.7-0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga cerošanas fāzes vidu līdz ziedēšanas beigām (AS 25-69)		
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	0.7-0.8		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām AS 61-69)		
Ziemas rapsis	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	0.7-0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 61-65)	56	1
	Krustziežu sausplankumainība *(Alternaria brassicae)*	0.7-0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga ziedēšanas vidu līdz ziedēšanas beigām (AS 65-69)		
Vasaras rudzi*	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*	0.7-0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga cerošanas fāzes vidu līdz ziedēšanas beigām (AS 25-69).	35	1
Soja*	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum),* lapu brūnplankumainība *(Septoria glycines),* lapu sausplankumainība *(Alternaria spp.)*	0.7-0.8		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga ziedkopas veidošanās sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 51-69)	56	1
Baltās sinepes*	Krustziežu sausplankumainība *(Alternaria brassicae),* baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	0.7-0.8		Apsmidzināt kultūrauga sējumus, sākot ar dzelteno pumpuru stadiju līdz ziedēšanas beigām (AS 59-69)	56	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

62. Ranman Top

Reģ. Nr. 0355, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: ciazofamīds, 160 g/l.
Pieskares iedarbība.
ISK Biosciences Europe N.V.

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve *(Phytophthora infestans)*	0.5		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pirms slimības pazīmju parādīšanās, pēc brīdinājuma par laktu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-10 dienām atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	3
Gurķi*, cukīni*, kabači*, patisoni*, ķirbji*, melones*, arbūzi* (atklātā laukā, segtās platībās)	Gurķu neīstā miltrasa *(Pseudoperonospora cubensis)*	0.5		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7-10 dienām atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	3	3
Krāšņumaugi* (atklātā laukā, segtās platībās)	Dīgstu melnkāja *(Pythium sp.),* neīstās miltrasas (*Pseudoperonospora sp., Peronosporaceae)*	0.5		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7-10 dienām atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	-	3
Dekoratīvie koki* (atklātā laukā, segtās platībās)	Neīstās miltrasas *(Pseudoperonospora sp., Peronosporaceae*)	0.5		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7-10 dienām atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	-	3

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

63. Rasput

Reģ. Nr. 0917, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: boskalīds, 500 g/kg.
Sistēmas iedarbība.
Globachem N.V.

Ziemas rapsis	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	0.3-0.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69)	56	2

1	2	3	4	5	6	7

64.1. Revus 250 SC

Reģ. Nr. 0312, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: mandipropamīds, 250 g/l.
Lokāla sistēmas iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (*Phytophthora infestans)*	0.6		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves parādīšanos vai slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos. Atkārtoti pēc 7-10 dienām	3	6
Tomāti (atklātā laukā un segtās platībās)	Tomātu augļu brūnā puve *(Phytophthora infestans)*	0.6		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, atkārtoti pēc 7-10 dienām	3	4
Salāti (atklātā laukā)	Salātu neīstās miltrasas *(Bremia lactucae, Peronospora parasitica)*	0.6		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, atkārtoti pēc 7-10 dienām	7	2
Salāti* (segtās platībās)	Salātu neīstās miltrasas *(Bremia lactucae, Peronospora parasitica)*	0.6		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos	7	1
Gurķi*, kabači*, cukīni*, patisoni*, ķirbji* (segtās platībās)	Neīstā miltrasa *(Pseudoperonospora cubensis)*	0.6		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 7-10 dienām	3	2

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

64.2. Revus 250 SC

Reģ. Nr. 0312, reģ. klase 3.
Darbīgā viela: mandipropamīds, 250 g/l.
Lokāla sistēmas iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Emin dārzam Revus 250 SC

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 26, reģ. klase 3.
Darbīgā viela: mandipropamīds, 250 g/l.
Lokāla sistēmas iedarbība.
SIA "Emin dārzam"

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva ml/10 l	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (*Phytophthora infestans)*	12		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves parādīšanos vai slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos. Atkārtoti pēc 7-10 dienām. 10 litri darba šķidruma jāizsmidzina uz ne mazāk kā 200 m^2	3	3
Tomāti (segtās platībās)	Tomātu augļu brūnā puve *(Phytophthora infestans)*	6		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, atkārtoti pēc 7-10 dienām. 10 litri darba šķidruma jāizsmidzina uz ne mazāk kā 100 m^2	3	3

1	2	3	4	5	6	7
Tomāti (atklātā laukā)	Tomātu augļu brūnā puve *(Phytophthora infestans)*	12		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, atkārtoti pēc 7-10 dienām. 10 litri darba šķidruma jāizsmidzina uz ne mazāk kā 200 m^2	3	3
Gurķi*, kabači*, cukīni*, patisoni*, ķirbji* (segtās platībās)	Neīstā miltrasa *(Pseudoperonospora cubensis)*	6		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 7-10 dienām. 10 litri darba šķidruma jāizsmidzina uz ne mazāk kā 100 m^2	3	2

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

65. Revus Top

Reģ. Nr. 0453, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: mandipropamīds, 250 g/l,
difenokonazols, 250 g/l.
Lokāla sistēmas iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve *(Phytophthora infestans),* kartupeļu lapu sausplankumainība *(Alernaria solani, Alternaria alternata)*	0.6		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc signāla par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7-10 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	3	3

66. Revydas

Reģ. Nr. 0835, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: mefentriflukonazols, 100 g/l,
boskalīds, 200 g/l.
Sistēmas iedarbība.
SIA BASF

Ziemas rapsis, vasaras rapsis ziemas ripsis*, vasaras ripsis*, eļļas rutks* (sēklai)	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum,*	0.6-1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 60-65)	-	1
	Krustziežu sauplankumainība *(Alternaria brassicae),* krustziežu miltrasa *(Erysiphe cruciferarum)*	0.6-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar sekundāro ziedkopu parādīšanās stadiju, līdz 50% pāksteņu sasnieguši raksturīgo lielumu (AS 57-75)		

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

67. Revyona

Reģ. Nr. 0806, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: mefentriflukonazols, 75 g/l.
Sistēmas iedarbība.
SIA BASF

Ābeles, bumbieres	Ābeļu kraupis *(Venturia inaequalis),* bumbieru kraupis *(Venturia pyrina),* ābeļu miltrasa *(Podosphaera leucotricha),* lapu plankumainības *(Stemhylium spp.)*	1.3 l/ 10 000 LVL, bet ne vairāk kā 2 l/ ha		Apsmidzināt stādījumu profilaktiski pēc signāla par iespējamo infekcijas izplatīšanos, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedpumpuru zaļā konusa stadiju līdz augļi sasnieguši pusi no šķirnei raksturīgā lieluma (AS 53-75). Ja nepieciešams, atkārtoti apsmidzināt pēc 7 dienām	28	2
Plūmes, ķirši	Kauleņkoku pelēkā puve *(Monilinia laxa),* augļu parastā puve *(Monilinia fructigena)*	1.0 l/ 10 000 LVL, bet ne vairāk kā 1.8 l/ ha		Apsmidzināt stādījumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedpumpuru atdalīšanās stadiju līdz augļu lietošanas gatavībai (AS 55-89). Ja nepieciešams, atkārtoti apsmidzināt pēc 7 dienām	3	2
Kartupeļi	Kartupeļu lapu sausplankumainība *(Alternaria spp.)*	0.75-1.25		Apsmidzināt, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar sāndzinumu veidošanās sākumu līdz lapu dzeltēšanas sākumam (AS 21-91)	3	3
Kukurūza (lopbarībai)	Kukurūzas lapu plankumainība *(Setosphaeria turcica),* kukurūzas acsveida plankumainība *(Kabatiella zaae),* fuzarioze *(Fusarium spp.),* kukurūzas rūsa *(Puccinia sorghi)*	0.75-1.25		1. apstrādes veids Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no pirmā mezgla stadijas līdz ziedēšanas beigām (AS 31-69)	56	1
		0.375-0.625		2. apstrādes veids Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no pirmā mezgla stadijas līdz ziedēšanas beigām (AS 31-69). Starp apstrādēm ievērot 14 dienu intervālu	56	2
Ziemas rapsis	Krustziežu sausā puve *(Plenodomus lingam),* krustziežu gaišplankumainība *(Pyrenopeziza brassicae),* neīstā miltrasa *(Hyaloperonospora parasitica),* krustziežu verticilārā vīte *(Verticillium longisporium)*	0.75-1.5		1. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus rudenī, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju līdz 8 lapu stadijai (AS 13-18)	-	1
		0.75		2. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus rudenī dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju līdz 8 lapu stadijai (AS 13-18). Intervāls starp apstrādēm 7-14 dienas	-	2
Ziemas rapsis	Krustziežu sausā puve *(Plenodomus lingam),* krustziežu gaišplankumainība *(Pyrenopeziza brassicae)*, krustziežu verticilārā vīte *(Verticillium longisporium)*	0.75-1.5		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga pirmā starpmezgla posma stadiju, līdz redzama galvenā ziedkopa, pumpuri atdalījušies, bet aizvērti (AS 31-55)	49	1
	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum),* krustziežu sausplankumainība *(Alternaria brassicae)*	1.0-2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga sekundāro ziedkopu parādīšanos līdz ziedēšanas beigām (AS 57-69)	49	1

1	2	3	4	5	6	7
Vasaras rapsis	Krustziežu sausā puve *(Plenodomus lingam),* krustziežu gaišplankumainība *(Pyrenopeziza brassicae)*	0.75-1.5		1. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju, līdz redzama galvenā ziedkopa, pumpuri atdalījušies, bet aizvērti (AS 13-55)	49	1
		0.75		2. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju, līdz redzama galvenā ziedkopa, pumpuri atdalījušies, bet aizvērti (AS 13-55). Intervāls starp apstrādēm 7-14 dienas	49	2
Vasaras rapsis	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum),* krustziežu sausplankumainība *(Alternaria brassicae)*	1.0-2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga sekundāro ziedkopu parādīšanos līdz ziedēšanas beigām (AS 57-69)	49	1

68. Revystar XL

Reģ. Nr. 0707, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: mefentriflukonazols, 100 g/l,
fluksapiroksāds, 50 g/l.
Sistēmas iedarbība.
SIA BASF

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Zymoseptoria tritici*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* kviešu lapu dzeltenplankumainība (*Pyrenophora tritici-repentis*)	0.75-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), pundurrūsa (*Puccinia hordei*), ramulārija *(Ramularia collo-cygni)*	0.75-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Zymoseptoria tritici*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*, kviešu lapu dzeltenplankumainība (*Pyrenophora tritici-repentis*), stiebrzāļu gredzenplanlumainība *(Rhynchosporium secalis)*	0.75-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
Rudzi	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*	0.75-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1

1	2	3	4	5	6	7
Auzas	Auzu lapu brūnplankumainība *(Pyrenophora avenae)*	0.75-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
Cukurbietes, lopbarības bietes	Biešu rūsa *(Uromyces betae),* biešu lapu sarmplankumainība *(Ramularia beticola),* biešu miltrasa *(Erysiphe betae),* biešu lapu sīkplankumainība *(Cercospora beticola)*	0.7-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga lapotnes izveidošanos, līdz saknes sasniegušas šķirnei raksturīgo lielumu (AS 39-49)	28	2

69. Revytrex

Reģ. Nr. 0708, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: mefentriflukonazols, 66.7 g/l,
fluksapiroksāds, 66.7 g/l.
Sistēmas iedarbība.
SIA BASF

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Zymoseptoria tritici*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* kviešu lapu dzeltenplankumainība (*Pyrenophora tritici-repentis*)	0.75-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), pundurrūsa (*Puccinia hordei*), ramulārija *(Ramularia collo-cygni)*	0.75-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Zymoseptoria tritici*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*, kviešu lapu dzeltenplankumainība (*Pyrenophora tritici-repentis*), stiebrzāļu gredzenplanlumainība *(Rhynchosporium secalis)*	0.75-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
Rudzi	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*	0.75-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
Auzas	Auzu lapu brūnplankumainība *(Pyrenophora avenae)*	0.75-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1

1	2	3	4	5	6	7

70. Riza 200 EC

Reģ. Nr. 0507, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: tebukonazols, 200 g/l.
Sistēmas iedarbība.
FMC Agricultural Solutions A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*	1.25		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz graudu veidošanās sākumam (AS 30-71)	35	2
	Vārpu fuzarioze (*Fusarium spp.)*	1.25		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), pundurrūsa (*Puccinia hordei*), graudzāļu miltrasa (*Blumeria graminis*)	1.25		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30-61)	35	2
Tritikāle	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*	1.25		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
	Vārpu fuzarioze (*Fusarium spp.)*	1.25		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)		
Rudzi	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*	1.25		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
	Vārpu fuzarioze (*Fusarium spp.)*	1.25		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)		
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu sausplankumainība *(Alternaria brassicae),* pelēkā puve *(Botrytis cinerea),* krustziežu sausā puve *(Phoma lingam)*	1.25		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga sāndzinumu veidošanos līdz ziedēšanas beigām (AS 21-69)	56	2
	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	1.25		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanu līdz pirmo ziedlapiņu nobiršanas sākumam (AS 60-65)		

1	2	3	4	5	6	7

71. Scab 80 WG

Reģ. Nr. 0582, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: kaptāns, 800 g/kg.
Pieskares iedarbība.
Sharda Europe b.v.b.a.

Ābeles, bumbieres	Ābeļu kraupis *(Venturia inaequalis),* bumbieru kraupis *(Venturia pirina)*	1.88		Apsmidzināt stādījumus pēc signāla par iespējamo infekcijas izplatīšanos, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot ar pumpuru briešanas sākumu, līdz augļiem izveidojies raksturīgais krāsojums (AS 51-85)	21	4

72.1. Score 250 EC

Reģ. Nr. 0001, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: difenokonazols, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Mavita 250 EC

Reģ. Nr. 0576, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: difenokonazols, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ābeles	Ābeļu kraupis *(Venturia inaequalis)*	0.2		Apsmidzināt profilaktiski kraupja sporu lidošanas laikā vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem, sākot no ziedēšanas sākuma līdz augļu veidošanās stadijai (AS 61-84). Atkārtoti apsmidzināt pēc 10 dienām	21	2
Bumbieres	Bumbieru kraupis *(Venturia pirina)*	0.2		Apsmidzināt profilaktiski kraupja sporu lidošanas laikā vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem, sākot no ziedēšanas sākuma līdz augļu veidošanās stadijai (AS 61-84). Atkārtoti apsmidzināt pēc 10 dienām	21	2
	Bumbieru-kadiķu rūsa *(Gymnosporangium fuscum)**	0.2		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos lapu plaukšanas laikā		
Ķirši	Kauleņkoku pelēkā puve *(Monilinia laxa),* parastā augļu puve *(Monolinia fructigena)*	0.2		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar atsevišķu ziedpumpuru atdalīšanos, līdz izveidojies šķirnei raksturīgais augļu krāsojums (AS 56-85), atkārtoti pēc 10-14 dienām	14	2
Plūmes	Parastā augļu puve *(Monolinia fructigena)*	0.2		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma, līdz izveidojies šķirnei raksturīgais augļu krāsojums (AS 61-85), atkārtoti pēc 10-14 dienām	14	2
Burkāni*	Burkānu lapu sausplankumainība *(Alternaria dauci)*	0.4		Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 14 dienām	21	3
Selerijas (sakņu)*	Seleriju lapu gaišplankumainība *(Septoria apiicola)*	0.4		Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm	21	1

1	2	3	4	5	6	7
Sīpoli, ķiploki, šalotes*	Sīpolu lapu plankumainība *(Alternaria porri),* sīpolu rūsa *(Puccinia alli)*	0.4		Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm	21	1
Galda bietes*	Lapu plankumainības *(Cercospora beticola, Ramularia beticola)*	0.4		Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm	28	1
Krizantēmas* (atklātā laukā)	Krizantēmu baltā rūsa *(Puccinia horiana)*	0.4		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski	-	1
Krizantēmas* (segtās platībās)	Krizantēmu baltā rūsa *(Puccinia horiana)*	0.4- augi līdz 50 cm, 0.6- augi līdz 125 cm augsti		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, atkārtoti pēc 4 nedēļām	-	2

***Mazais lietojums**. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

72.2. Score 250 EC

Reģ. Nr. 0001, reģ. klase 3.
Darbīgā viela: difenokonazols, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Emin dārzam Score 250 EC

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 33, reģ. klase 3.
Darbīgā viela: difenokonazols, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
SIA "Emin dārzam"

Score

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 61, reģ. klase 3.
Darbīgā viela: difenokonazols, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
SIA "Agrimatco Latvia"

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, ml/10 l ūdens	Ar 10 l darba šķidrumu apstrādājamā platība, m^2	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ābeles	Ābeļu kraupis *(Venturia inaequalis)*	2	100	Apsmidzināt profilaktiski kraupja sporu lidošanas laikā vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem, sākot no ziedēšanas sākuma līdz augļu veidošanās stadijai (AS 61-84). Atkārtoti apsmidzināt pēc 10 dienām	21	2
Bumbieres	Bumbieru kraupis *(Venturia pirina)*	2	100	Apsmidzināt profilaktiski kraupja sporu lidošanas laikā vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem, sākot no ziedēšanas sākuma līdz augļu veidošanās stadijai (AS 61-84). Atkārtoti apsmidzināt pēc 10 dienām	21	2
	Bumbieru-kadiķu rūsa *(Gymnosporangium fuscum)**			Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos lapu plaukšanas laikā		

1	2	3	4	5	6	7
Ķirši	Kauleņkoku pelēkā puve *(Monilinia laxa),* parastā augļu puve *(Monolinia fructigena)*	2	100	Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar atsevišķu ziedpumpuru atdalīšanos, līdz izveidojies šķirnei raksturīgais augļu krāsojums (AS 56-85), atkārtoti pēc 10-14 dienām	14	2
Plūmes	Parastā augļu puve *(Monolinia fructigena)*	2	100	Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma, līdz izveidojies šķirnei raksturīgais augļu krāsojums (AS 61-85), atkārtoti pēc 10-14 dienām	14	2
Burkāni*	Burkānu lapu sausplankumainība *(Alternaria dauci)*	10	250	Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 14 dienām	21	3
Selerijas (sakņu)*	Seleriju lapu gaišplankumainība *(Septoria apiicola)*	10	250	Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm	21	1
Sīpoli*, ķiploki*, šalotes*	Sīpolu lapu plankumainība *(Alternaria porri),* sīpolu rūsa *(Puccinia alli)*	10	250	Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm	21	1
Galda bietes*	Lapu plankumainības *(Cercospora beticola, Ramularia beticola)*	10	250	Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm	28	1
Krizantēmas* (atklātā laukā)	Krizantēmu baltā rūsa *(Puccinia horiana)*	10	250	Apsmidzināt stādījumus profilaktiski	-	1
Krizantēmas* (segtās platībās)	Krizantēmu baltā rūsa *(Puccinia horiana)*	10 - augi līdz 50 cm, 15 - augi līdz 125 cm augsti	250	Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, atkārtoti pēc 4 nedēļām	-	2

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

73. Signum

Reģ. Nr. 0269, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: boskalīds, 26.7 %,
piraklostrobīns, 6.7 %.
Sistēmas iedarbība.
SIA BASF

Kartupeļi	Kartupeļu lapu sausplankumainība *(Alternaria solani)*	0.25		Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 7-14 dienām	3	4
Galviņkāposti, Briseles kāposti	Kāpostu sausplankumainība *(Alternaria brassicicola, Alternaria brassicae),* krustziežu lapu baltplankumainība (*Pseudocercosporella capsellae),* krustziežu baltkreves *(Albugo candida)*	1.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm. Nepieciešamības gadījumā atkārtoti apsmidzināt pēc 3-4 nedēļām	21	2

1	2	3	4	5	6	7
Burkāni	Čemurziežu melnā puve *(Alternaria radicina),* baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	0.75		Apsmidzināt, parādoties pirmajām slimības pazīmēm. Nepieciešamības gadījumā atkārtoti apsmidzināt pēc 2 nedēļām	14	2
Zirņi	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea),* zirņu gaišplankumu iedegas *(Ascochyta pisi)*	1.0		Apsmidzināt profilaktiski, ziedēšanas sākumā vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm. Nepieciešamības gadījumā atkārtoti apsmidzināt pākstu veidošanās sākumā	14	2
Sīpoli	Puves *(Botrytis cinrea, Botrytis squamosa, Botrytis allii, Fusarium oxysporum)*, sīpolu baltā puve *(Sclerotinia cepivorum*), melnais sodrējums *(Alternaria porri, Cladosporium allii–cepae)*	1.5		Apsmidzināt stādījumu profilaktiski, pirmo reizi 6 nedēļas pirms ražas novākšanas, atkārtoti pēc 5-10 dienām	14	2
Plūmes, ķirši	Kauleņkoku pelēkā puve *(Monilinia laxa),* augļu parastā *puve (Moniilinia fructigena*), rūgtā puve *(Colletotrichum gloesporioides)* ķiršu lapbire *(Blumeriella jaapi)*	0.75-1.0		Apsmidzināt stādījumus ziedēšanas sākumā un atkārtoti apsmidzināt pēc 5-10 dienām	-	2
Zemenes	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea),* zemeņu miltrasa *(Sphaerotheca macularis),* zemeņu lapu baltplankumainība *(Mycosphaerella fragariae)*	1.8		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski ziedēšanas sākumā, atkārtoti pēc 10-14 dienām	3	2
Dzērvenes	Vertikālo dzinumu galu atmiršana *(Phomopsis vaccini,)*, ogu puves *(Colletotrichum gloesporioides, Botryosphaeria vaccinii)*	0.5-1.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski ziedēšanas sākumā. Atkārtoti apsmidzināt pēc 10-14 dienām	-	2
Krūmmellenes	Lapu un dzinumu bojājumi*(Phomopsis vaccinii, Botryosphaeria spp),* dzinumu vēzis *(Gloeosporium minus),* ogu puve (*Colletotrichum gloeosporioides)*	1.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski ziedēšanas sākumā. Atkārtoti apsmidzināt ziedēšanas beigās	-	2
Pupas* graudiem (lauka pupas, kāršu pupas, kanavālijas, sviesta pupas, lopbarības pupas)	Pupu koncentriskā plankumainība *(Ascochyta fabae)*, pupu rūsas *(Uromyces fabae*), pupu brūnplankumainības *(Botrytis fabae),* pelēkās puves *(Botrytis cinerea)*	0.75-1.0		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar ziedpumpuru veidošanos līdz ziedēšanas beigām (AS 50- 69). Atkārtoti pēc 10-14 dienām	21	2
Ķiploki*	Puves (*Botrytis cinerea, Botrytis squamosa, Botrytis allii, Fusarium oxysporum*), baltā puve (*Sclerotinia cepivorum*)	1.5		Apsmidzināt stādījumu profilaktiski, pirmo reizi 6 nedēļas pirms ražas novākšanas, atkārtoti pēc 5-10 dienām	14	2

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

74. Siltra Xpro

Reģ. Nr. 0479, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: biksafēns, 60 g/l,
protiokonazols, 200 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Bayer AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība *(Mycosphaerella graminicola),* kviešu plēkšņu plankumainība *(Leptosphaeria nodorum*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), dzeltenā rūsa (*Puccinia striiformis*), kviešu lapu dzeltenplankumainība (*Drechslera tritici-repentis*)	0.75-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40-69)	35	2
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59-69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), pundurrūsa (*Puccinia hordei*), graudzāļu miltrasa (*Blumeria graminis*), ramulārija *(Ramularia collo-cygni)*	0.75-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 40-61)	35	2
Tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība *(Mycosphaerella graminicola),* kviešu plēkšņu plankumainība (*Leptosphaeria nodorum*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), dzeltenā rūsa (*Puccinia striiformis)*, stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis)*	0.75-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40-69)	35	2
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59-69)		
Rudzi	Stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*	0.75-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40-69)	35	2
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59-69)		

1	2	3	4	5	6	7
Auzas	Auzu brūnplankumainība *(Pyrenophora avenae)*	0.75-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 40-61)	35	2
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes sākumam (AS 59-61)		

75. Silvron

Reģ. Nr. 0807, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: biksafēns, 100 g/l,
fluopirams, 100 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Bayer AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (*Zymoseptoria tritici*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis)*	0.75-1.25		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30-59)	35	1
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis),* pundurrūsa *(Puccinia hordei),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria gramnis),* ramulārija *(Ramularia collo-cygni)*	0.75-1.25		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30-59)	35	1
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība *(Zymoseptoria tritici),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis)*	0.75-1.25		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30-59)	35	1
Ziemas rudzi, vasaras rudzi	Brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis)*	0.75-1.25		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30-59)	35	1
Auzas	Auzu lapu brūnplankumainība *(Pyrenophora avenae),* auzu vainagrūsa *(Puccinia coronata)*	0.75-1.25		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30-59)	35	1
Speltas kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība *(Zymoseptoria tritici),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)	35	1

1	2	3	4	5	6	7

76. Soratel

Reģ. Nr. 0869, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: protiokonazols, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
ADAMA Registrations B.V.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Benafar

Reģ. Nr. 0915, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: protiokonazols, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
ADAMA Registrations B.V.

Innox

Reģ. Nr. 0872, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: protiokonazols, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
ADAMA Registrations B.V.

Tetatra

Reģ. Nr. 0916, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: protiokonazols, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Zymoseptoria tritici*), kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*	0.6-0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	0.6-0.8		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis),* pundurrūsa *(Puccinia hordei)*, ramulārija *(Ramularia collo-cygni)*	0.6-0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 30-65)	35	1
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība *(Zymoseptoria tritici*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*	0.6-0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
Rudzi	Brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis)*	0.6-0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 30-65)	35	1
Auzas	Auzu vainagrūsa (*Puccinia coronata),* auzu lapu brūnplankumainība *(Pyrenophora avenae)*	0.45		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 30-65)	35	1

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas rapsis, ziemas ripsis*	Baltā puve (*Sclerotinia sclerotiorum)*	0.6-0.7		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 60-65)	56	1
	Krustziežu sausplankumainība *(Alternaria brassicae)*	0.6-0.7		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ar ziedpumpuru veidošanās sākumu līdz 30% pākšteņu pilnībā attīstīti (AS 50-73)		
Vasaras rapsis, vasaras ripsis*	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	0.6-0.7		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 60-65)	56	1
	Krustziežu sausplankumainība (*Alternaria brassicae)*	0.6-0.7		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ar ziedpumpuru veidošanās sākumu līdz 30% pākšteņu pilnībā attīstīti (AS 50-73)		

***Mazais lietojums**. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu un nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

77. Sporax

Reģ. Nr. 0868, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: propamokarba hidrohlorīds, 722 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Globachem N.V.

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve *(Phytophthora infestans)*	1.4		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, pirms slimības pazīmju parādīšanās, pēc signāla par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem, sākot ar kultūrauga sāndzinumu veidošanās sākumu līdz lapu dzeltēšanas sākumam (AS 21-91). Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-7 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	14	6

78. Switch 62.5 WG

Reģ. Nr. 0244, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: ciprodinils, 375 g/kg,
fludioksonils, 250 g/kg.
Sistēmas un pieskares iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Tomāti (segtās platībās)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*, baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	1.0		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkāroti pēc 7-14 dienām	3	3
Gurķi (atklātā laukā un segtās platībās)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*, baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	1.0		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti pēc 7-10 dienām	3	3

1	2	3	4	5	6	7
Zemenes (atklātā laukā)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea),* zemeņu antraknoze *(Colletotrichum acutatum)*	1.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski ziedēšanas sākumā. Atkārtota apstrāde nepieciešama, ja ir labvēlīgi apstākļi slimības attīstībai. Intervāls starp apstrādēm 10 dienas	7	3
Zemenes (segtās platībās)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea),* zemeņu antraknoze *(Colletotrichum acutatum)*	1.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski ziedēšanas sākumā. Atkārtota apstrāde nepieciešama, ja ir labvēlīgi apstākļi slimības attīstībai. Intervāls starp apstrādēm 10 dienas	7	3
Avenes, kazenes (atklātā laukā un segtās platībās)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea),* aveņu mizas plaisāšana *(Didymella applanta)*	1.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski ziedēšanas sākumā. Atkārtota apstrāde nepieciešama, ja ir labvēlīgi apstākļi slimības attīstībai. Intervāls starp apstrādēm 10 dienas	7	3
Krāšņumaugi (atklātā laukā un segtās platībās)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	1.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti pēc 10-14 dienām	-	3
Skuju koki*, lapu koki*, dekoratīvie krūmi* (kokaudzētavās)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea),* plankumainības *(Cylindrocladium spp.)*	1.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti pēc 10-14 dienām	-	2
Baklažāni* (segtās platībās)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*, baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	1.0		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti pēc 7-14 dienām	3	3
Paprika* (segtās platībās)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*, baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	1.0		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti pēc 10-14 dienām	3	3
Kabači*, cukīni* (atklātā laukā un segtās platībās)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea),* baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	1.0		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkāroti pēc 7-10 dienām	3	3
Ķirbji*, melones* (atklātā laukā)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*, baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum),* stublāju iedegas *(Didymella bryoniae)*	1.0		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti pēc 7-10 dienām	3	3
Salāti*, endīvijas* (atklātā laukā un segtās platībās)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*, baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	0.6		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti pēc 10 dienām	7	3
Burkāni*, sakņu pētersīļi*, melnsakne*, pastinaki*, galda bietes*, mārrutki* (atklātā laukā)	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum),* lapu plakumainība *(Alternaria dauci)*	1.0		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 12 dienām	14	3
Selerijas* (sakņu) (atklātā laukā)	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	1.0		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 12 dienām	14	2

1	2	3	4	5	6	7
Sīpoli*, šalotes*, ķiploki* (atklātā laukā)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*, baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum),* kakla puve *(Botrytis squamosa)*	1.0		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti pēc 14 dienām	14	3
Zirņi*, pupas*, pupiņas* (svaigi, ar un bez pākstīm)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*, baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	1.0		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti pēc 10-14 dienām	14	3
Zirņi*, pupas*, pupiņas* (graudi)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*, baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	1.0		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti pēc 10 dienām	28	2
Zāliens* (golfa laukumā)	Sārtais sniega pelējums *(Fusarium nivale),* pelēkais sniega pelējums *(Typhula incarnata),* sakņu puves *(Fusarium spp.)*	1.0		Apsmidzināt zālienu profilaktiski rudenī (oktobrī-novembrī) vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm. Atkārtoti pēc 10-14 dienām	-	3

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

79. Syllit 544 SC

Reģ. Nr. 0477, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: dodīns, 544 g/l.
Lokāla sistēmas iedarbība.
Arysta LifeScience Benelux Sprl

Ābeles, bumbieres	Ābeļu kraupis *(Venturia ineaqualis),* bumbieru kraupis *(Venturia piri)*	1.25		Apsmidzināt profilaktiski, iestājoties labvēlīgiem apstākļiem slimības attīstībai vai 24-48 stundu laikā pēc iespējamās inficēšanās, sākot ar lapu pumpuru briešanas sākumu, līdz augļi sasnieguši 70% no šķirnei raksturīgā lieluma (AS 01-77). Atkārtoti apsmidzināt pēc 7 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	60	2
Ķirši	Ķiršu lapbire *(Blumeriella jaapii)*	1.25		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedēšanas sākumu līdz augļu attīstības fāzes beigām (AS 60-79) un/vai pēc ražas novākšanas. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	14	2

1	2	3	4	5	6	7

80. Talius

Reģ. Nr. 0535, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: prokvinazīds, 200 g/l.
Lokāla sistēmas iedarbība.
Corteva Agriscience Denmark A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas tritikāle, vasaras tritikāle, rudzi	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis)*	0.125-0.250		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām (AS 25-59)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (*Blumeria graminis*)	0.125		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 25-49)	35	2
		0.250		<u>2. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 25-49)	35	1

81. Tebusha 25 EW

Reģ. Nr. 0432, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Sharda Europe b.v.b.a.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), graudzāļu miltrasa (*Blumeria graminis*), vārpu fuzarioze *(Fussarium spp.)*	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), pundurrūsa (*Puccinia hordei*), graudzāļu miltrasa (*Blumeria graminis*)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2

<u>**Analogie augu aizsardzības līdzekļi:**</u>

Dominic

Reģ. Nr. 0538, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Sharda Europe b.v.b.a.

Tebuplius

Reģ. Nr. 0539, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Sharda Europe b.v.b.a.

1	2	3	4	5	6	7

82. Tesanto

Reģ. Nr. 0834, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: benzovindiflupirs, 100 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*	0.375-0.750		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmā mezgla stadiju līdz ziedēšanas beigām (AS 31-69)	35	1
Vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība *(Septoria tritici),* kviešu plēkšņu plankumainība *(Septoria nodorum),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*	0.375-0.750		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga karoglapas maksts paplašināšanos līdz ziedēšanas beigām (AS 41-69)	35	1

83. Tilmor

Reģ. Nr. 0353, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: protiokonazols, 80 g/l,
tebukonazols, 160 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Bayer AG

Ziemas rapsis	Krustziežu sausā puve (*Phoma lingam*)	0.8-1.2		Apsmidzināt sējumus rudenī, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no rapša četru lapu stadijas (AS 14)	56	2
		1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī atkārtoti, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no rapša stublāja veidošanās fāzes beigām līdz ziedpumpuru attīstības fāzes vidum (AS 39-55)		
	Krustziežu gaišplankumainība (*Pyrenopeziza brassicae*)	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no rapša četru lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 14-60)		
	Krustziežu sausplankumainība (*Alternaria brassicae*)	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no rapša četru lapu stadijas līdz ziedlapiņu nobiršanas sākumam (AS 14-65)		
	Baltā puve (*Sclerotinia sclerotiorum*), pelēkā puve (*Botrytis cinerea)*	1.0		Apsmidzināt sējumus rapša ziedēšanas sākumā – pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 62-65)		

1	2	3	4	5	6	7
Vasaras rapsis	Krustziežu sausā puve (*Phoma lingam*)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no rapša četru lapu stadijas līdz ziedpumpuru attīstības fāzes vidum (AS 14-55)	56	2
	Krustziežu gaišplankumainība (*Pyrenopeziza brassicae*)	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no rapša četru lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 14-60)		
	Krustziežu sausplankumainība (*Alternaria brassicae*)	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no rapša četru lapu stadijas līdz ziedlapiņu nobiršanas sākumam (AS 14-65)		
	Baltā puve (*Sclerotinia sclerotiorum*), pelēkā puve (*Botrytis cinerea)*	1.0		Apsmidzināt sējumus rapša ziedēšanas sākumā – pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 62-65)		

84. Topas 100 EC

Reģ. Nr. 0009, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: penkonazols, 100 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Gurķi (atklātā laukā)	Īstā miltrasa *(Erysiphe cichoracearum)*	0.5		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 8 dienām	3	2
Gurķi, cukīni, melones (segtās platībās)	Īstā miltrasa *(Erysiphe cichoracearum, Spaerotheca fuliginea)*	0.5		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 8 dienām	3	2
Tomāti, paprika (segtās platībās)	Īstā miltrasa *(Leveillula taurica)*	0.5		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 10 dienām	3	2
Ābeles	Ābeļu miltrasa *(Podosphaera leucotricha)*	0.5		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm	14	1
Bumbieres	Ābeļu miltrasa *(Podosphaera leucotricha)*	0.5		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm	14	1
	Bumbieru-kadiķu rūsa *(Gymnosporangium fuscum)**	0.5		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, pumpuru plaukšanas laikā		
Upenes, ērkšķogas	Ēkšķogu Amerikas miltrasa *(Sphaerotheca mors-uvae)*	0.5		Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 7 dienām vai, ja nepieciešams, pēc ražas novākšanas	20	2
	Ogulāju stabiņrūsa *(Cronartium ribicola)**, ogu krūmu kausiņrūsa *(Puccinia rebesii-caricis)**	0.5		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 7 dienām		
Vīnogas	Īstā miltrasa *(Uncinula necator)*	0.3		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 8 dienām	28	3
Zemenes (atklātā laukā)	Zemeņu miltrasa *(Sphaerotheca macularis)*	0.5		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm	3	1
Zemenes (segtās platībās)	Zemeņu miltrasa *(Sphaerotheca macularis)*	0.5		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 10 dienām	3	2

1	2	3	4	5	6	7
Krāšņumaugi (atklātā laukā)	Īstās miltrasas *(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca pannosa, Oidium spp., Uncinula necator),* rūsas *(Puccinia spp.),* lapu plankumainības *(Marssonina panattoniana, Guignardia spp.)*	0.5		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm	-	1
Krāšņumaugi (segtās platībās)	Īstās miltrasas *(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca pannosa, Oidium spp., Uncinula necator),* rūsas *(Puccinia spp., Uromyces dianthi),* lapu plankumainības *(Marssonina panattoniana, Guignardia spp.)*	0.5		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm	-	1
Jāņogas*	Ogulāju stabiņrūsa *(Cronartium ribicola),* ogu krūmu kausiņrūsa *(Puccinia rebesii-caricis)*	0.5		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 7 dienām	20	2
Ķirši*	Ķiršu lapbire *(Blumeriella jaapii)*	0.5		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm pēc ražas novākšanas	-	1
Lapu koki kokaudzētavās*	Īstās miltrasas *(Uncinula bicornis, Microsphaera alphitoides)*, rūsas (*Melampsora populnea, Melampsoridium betulinum)*	0.5		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm	-	1
Dekoratīvie kokaugi*	Īstās miltrasas *(Uncinula bicornis, Microsphaera alphitoides, Sphaerotheca macularis)*	0.5		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm	-	1
Ķirbji, cukīni, melones, arbūzi* (atklātā laukā)	Īstā miltrasa *(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)*	0.5		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 8 dienām	3	2
Krizantēmas* (atklātā laukā un segtās platībās)	Krizantēmu rūsa *(Puccinia tanaceti),* krizantēmu baltā rūsa *(Puccinia horiana)*	0.5		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm	-	1

***Mazais lietojums**. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

85. Toprex 375 SC

Reģ. Nr. 0400, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: difenokonazols, 250 g/l,
paklobutrazols, 125 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas rapsis	Krustziežu sausā puve (*Phoma lingam*), krustziežu sausplankumainība (*Alternaria brassicae*), krustziežu gaišplankumainība (*Pyrenopeziza brassicae*)	0.3		Apsmidzināt sējumus rudenī rapša četru lapu līdz sešu lapu stadijā (AS 14-16)	-	1
		0.5		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no pirmā starpmezglu posma attīstības līdz stadijai, kad starp lapām redzami ziedpumpuri (AS 31-50)	100	1

1	2	3	4	5	6	7

86. Treso

Reģ. Nr. 0847, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: fludioksonils, 500 g/kg.
Pieskares iedarbība.
Syngenta Polska sp. z o.o.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	0.75		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)	56	1

87. Univoq

Reģ. Nr. 0888, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: protiokonazols, 100 g/l,
fenpikoksamīds, 50 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Corteva Agriscience Denmark A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši, spelta kvieši	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Zymoseptoria tritici*), kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*	1.2-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.2-1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)		
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība (*Zymoseptoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība *(Parastagonospora nodorum),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, dzeltenā rūsa (*Puccinis striiformis)*	1.2-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.2-1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)		
Ziemas rudzi, vasaras rudzi	Brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis)*	1.2-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.2-1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)		

1	2	3	4	5	6	7

88. Variano Xpro

Reģ. Nr. 0455, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: biksafēns, 40 g/l,
fluoksastrobīns, 50 g/l,
protiokonazols, 100 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Bayer AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība *(Mycosphaerella graminicola)*, kviešu plēkšņu plankumainība (*Leptosphaeria nodorum*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), kviešu lapu dzeltenplankumainība (*Pyrenophora tritici-repentis*)	1.0-1.25		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.0-1.25		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos attīstības apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (*Blumeria graminis*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), pundurrūsa (*Puccinia hordei*), miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*)	1.0-1.25		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30-61)	35	2
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.0-1.25		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos attīstības apstākļos, sākot no vārpošanas beigām līdz ziedēšanas sākumam (AS 59- 61)		
Tritikāle	Graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu pelēkplankumainība *(Mycosphaerella graminicola),* kviešu plēkšņu plankumainība *(Leptosphaeria nodorum*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), kviešu lapu dzeltenplankumainība (*Pyrenophora tritici-repentis*)	1.0-1.25		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.0-1.25		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos attīstības apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)		
Rudzi	Stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* graudzāļu miltrasa (*Blumeria graminis*)	1.0-1.25		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
	Vārpu fuzarioze *(Fusarium spp.)*	1.0-1.25		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos attīstības apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)		

1	2	3	4	5	6	7

89. Verben

Reģ. Nr. 0825, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: prokvinazīds, 50 g/l,
protiokonazols, 200 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Corteva Agriscience Denmark A/S

Ziemas kvieši, speltas kvieši	Stiebru lūšana (*Oculimacula yallundae)*	0.6-1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32)	35	1
Ziemas kvieši, vasaras kvieši, speltas kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (*Zymoseptoria tritici*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis)*	0.6-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz ziedēšanas vidum (AS 25-65)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis),* pundurrūsa *(Puccinia hordei),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis)*	0.6-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30-49)	35	1
Ziemas tritikāle	Stiebru lūšana *(Oculimacula yallundae)*	0.6-1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32)		
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle*	Kviešu lapu pelēkplankumainība *(Zymoseptoria tritici),* brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis),* kviešu lapu dzeltenplankumainība *(Pyrenophora tritici-repentis),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis)*	0.6-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz ziedēšanas vidum (AS 25-65)	35	1
Ziemas rudzi	Stiebru lūšana *(Oculimacula yallundae)*	0.6-1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32)		
Ziemas rudzi vasaras rudzi*	Brūnā rūsa *(Puccinia recondita),* stiebrzāļu gredzenplankumainība *(Rhynchosporium secalis),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis)*	0.6-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30-49)	35	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

90.1. VitiSan

Reģ. Nr. 0788, reģ. klase 3.
Darbīgā viela: kālija hidrogēnkarbonāts, 990 g/kg.
Pieskares iedarbība.
Andermatt Group AG

Ar preparāta devu kg/ha:

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, kg/ha	Ieteicamā darba šķīduma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7
Ābeles, bumbieres, cidonijas*	Ābeļu kraupis *(Venturia inaequalis),* bumbieru kraupis *(Venturia pyrina),* ābeļu miltrasa* *(Podosphaera leucotricha)*	2.5 kg/ha uz 1 m vainaga augstuma		Apsmidzināt stādījumu profilaktiski pēc signāla par iespējamo infekcijas izplatīšanos, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar pumpuru briešanas sākumu līdz izveidojies raksturīgais augļa krāsojums (AS 51-85). Atkārtoti apsmidzināt pēc 3-7 dienām	-	6
Ābeles, bumbieres, cidonijas*	Dzinumu vēzis *(Gleosporium spp.)*	2.5 kg/ha uz 1 m vainaga augstuma		Apsmidzināt stādījumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot augļu diametru 40 mm līdz augļu novākšanas gatavībai (AS 74-87). Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-7 dienām	1	6
Ķirši*, plūmes*, aprikozes*, persiki*	Īstā miltrasa* *(Podosphaera spp.),* kauleņkoku sausplankumainība* *(Stigmina carpophila),* kauleņkoku pelēkā puve* *(Monilinia laxa),* augļu puves* *(Monilinia spp.)*	2.5 kg/ha uz 1 m vainaga augstuma		Apsmidzināt stādījumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz novākšanas gatavībai (AS 61-87). Atkārtoti apsmidzināt pēc 3-7 dienām	-	6
Zemenes (atklātā laukā un segtās platībās)	Īstā miltrasa* *(Sphaerotheca macularis),* pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	5.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos rindās ar trīs sprauslu stieni, sākot ar kultūrauga ziedkopu attīstības fāzes beigām līdz ogu nogatavošanās fāzes beigām (AS 59-89). Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-7 dienām	1	6
Jāņogas, upenes, ērkšķogas, (atklātā laukā)	Īstā miltrasa* *(Podosphaera mors-uvae),* pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	5.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot kultūrauga ziedkopu attīstības fāzes beigām līdz ogu nogatavošanās fāzes beigām (AS 59-89). Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-7 dienām	1	6
Bārbeles*, korintes*, smiltsērkšķi*, plūškoks*, pīlādži*, vilkābeles*, aronijas*	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*, īstā miltrasa* *(Erysiphaeceae)*	5.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot kultūrauga ziedkopu attīstības fāzes beigām līdz augļu un ogu nogatavošanās fāzes beigām (AS 59-89). Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-7 dienām	1	6

1	2	3	4	5	6	7
Avenes, kazenes, krūmmellenes* (atklātā laukā un segtās platībās)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea),* īstā miltrasa* *(Podosphaera macularis, Erysiphe vaccinii)*	5.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot kultūrauga ziedkopu attīstības fāzes beigām līdz augļu nogatavošanās fāzes beigām (AS 59-89). Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-7 dienām	1	6
Vīnogas	Pelēkā puve* *(Botrytis cinerea),* vīnogu īstā miltrasa *(Uncinula necator)*	3.0-12.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot kultūrauga lapu attīstības fāzes sākumu līdz ogu nogatavošanās fāzes vidum (AS 12-85). Atkārtoti apsmidzināt pēc 3-7 dienām	-	6
Gurķi, ķirbji, kabači, melones*, arbūzi* (atklātā laukā)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea),* īstā miltrasa* *(Erysiphe cichoracearum, Spaerotheca fuliginea)*	5.0		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar pirmā zieda aizmetņa parādīšanos (AS 51). Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-7 dienām	1	6
Gurķi, ķirbji, kabači, tomāti, baklažāni, melones*, arbūzi* (segtās platībās)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea),* īstā miltrasa* *(Erysiphe cichoracearum, Spaerotheca fuliginea, Oidium lycopersici)*	2.5-5.0		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar pirmā zieda aizmetņa parādīšanos (AS 51). Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-7 dienām	1	6
Salāti, endīvijas*, garšaugi* (atklātā laukā un segtās platībās)	Pelēkā puve* *(Botrytis cinerea),* īstā miltrasa *(Erysiphe cichoracearum, Podosphaera spp.)*	3.0		Apsmidzināt sējumus un stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz kultūraugs sasniedzis novākšanas gatavību (AS 12-49) Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-7 dienām	1	10
Pupiņas, zirņi* (atklātā laukā un segtās platībās)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*, zirņu īstā miltrasa* *(Erysiphe pisi)*	2.5-5.0		Apsmidzināt sējumus un stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar pirmo ziedpumpuru parādīšanos (AS 51). Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-7 dienām	1	6
Burkāni*	Pelēkā puve* *(Botrytis cinerea),* čemurziežu īstā miltrasa* *(Erysiphe heraclei)*	2.5-5.0		Apsmidzināt sējumus infekcijas izplatīšanās sākumā vai kad redzamas pirmās slimības pazīmes, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju līdz kultūraugs sasniedzis novākšanas gatavību (AS 13-49). Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-7 dienām	1	6
Sīpoli, šalotes sīpoli, ķiploki* (atklātā laukā)	Puves *(Botrytis spp.)*	5.0		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus infekcijas izplatīšanās sākumā vai kad redzamas pirmās slimības pazīmes. Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-7 dienām	1	6
Sparģeļi	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	5.0		Apsmidzināt stādījumu infekcijas izplatīšanās sākumā vai kad ir redzamas slimības pirmās pazīmes pēc ražas novākšanas.	-	6

1	2	3	4	5	6	7
Krāšņumaugi (atklātā laukā un segtās platībās)	Īstā miltrasa *(Uncinula bicornis, Microsphaera alphitoides, Sphaerotheca macularis)*	2.5-5.0		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus infekcijas izplatīšanās sākumā vai kad ir redzamas pirmās slimības pazīmes. Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-7 dienām	-	10
Dekoratīvie koki* un krūmi* (atklātā laukā)	Īstā miltrasa *(Unicula aceris, Microsphaera alphitoides)*	2.5-5.0		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus infekcijas izplatīšanās sākumā vai kad ir redzamas pirmās slimības pazīmes. Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-7 dienām	-	10

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

90.2. VitiSan

Reģ. Nr. 0788, reģ. klase 3.
Darbīgā viela: kālija hidrogēnkarbonāts, 990 g/kg.
Pieskares iedarbība.
Andermatt Group AG

Ar preparāta devu g/100 m²:

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, g/100 m²	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7
Ābeles, bumbieres, cidonijas*	Ābeļu kraupis *(Venturia inaequalis),* bumbieru kraupis *(Venturia pyrina),* ābeļu miltrasa* *(Podosphaera leucotricha)*	25 g/ 100m² uz 1 m vainaga augstuma		Apsmidzināt stādījumu profilaktiski pēc signāla par iespējamo infekcijas izplatīšanos, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar pumpuru briešanas sākumu līdz izveidojies raksturīgais augļa krāsojums (AS 51-85). Atkārtoti apsmidzināt pēc 3-7 dienām	-	6
Ābeles, bumbieres, cidonijas*	Dzinumu vēzis *(Gleosporium spp.)*	25 g/ 100m² uz 1 m vainaga augstuma		Apsmidzināt stādījumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot augļu diametru 40 mm līdz augļu novākšanas gatavībai (AS 74-87). Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-7 dienām	1	6
Ķirši*, plūmes*, aprikozes*, persiki*	Īstā miltrasa* *(Podosphaera spp.),* kauleņkoku sausplankumainība* *(Stigmina carpophila),* kauleņkoku pelēkā puve* *(Monilinia laxa),* augļu puves* *(Monilinia spp.)*	25 g/ 100m² uz 1 m vainaga augstuma		Apsmidzināt stādījumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz izveidojies raksturīgais augļa krāsojums (AS 61-85). Atkārtoti apsmidzināt pēc 3-7 dienām	-	6

1	2	3	4	5	6	7
Zemenes (atklātā laukā un segtās platībās)	Īstā miltrasa* *(Sphaerotheca macularis),* pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	50		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos rindās ar trīs sprauslu stieni, sākot ar kultūrauga ziedkopu attīstības fāzes beigām līdz ogu nogatavošanās fāzes beigām (AS 59-89). Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-7 dienām	1	6
Jāņogas, upenes, ērkšķogas, (atklātā laukā)	Īstā miltrasa* *(Podosphaera mors-uvae),* pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	50		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot kultūrauga ziedkopu attīstības fāzes beigām līdz ogu nogatavošanās fāzes beigām (AS 59-89). Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-7 dienām	1	6
Bārbeles*, korintes*, smiltsērkšķi*, plūškoks*, pīlādži*, vilkābeles*, aronijas*	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*, īstā miltrasa* *(Erysiphaeceae)*	50		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot kultūrauga ziedkopu attīstības fāzes beigām līdz augļu un ogu nogatavošanās fāzes beigām (AS 59-89). Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-7 dienām	1	6
Avenes, kazenes, krūmmellenes* (atklātā laukā un segtās platībās)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea),* īstā miltrasa* *(Podosphaera macularis, Erysiphe vaccinii)*	50		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot kultūrauga ziedkopu attīstības fāzes beigām līdz augļu nogatavošanās fāzes beigām (AS 59-89). Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-7 dienām	1	6
Vīnogas	Pelēkā puve* *(Botrytis cinerea),* vīnogu īstā miltrasa *(Uncinula necator)*	30-120		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot kultūrauga lapu attīstības fāzes sākumu līdz ogu nogatavošanās fāzes vidum (AS 12-85). Atkārtoti apsmidzināt pēc 3-7 dienām	-	6
Gurķi, ķirbji, kabači, melones*, arbūzi* (atklātā laukā)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea),* īstā miltrasa* *(Erysiphe cichoracearum, Spaerotheca fuliginea)*	50		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar pirmā zieda aizmetņa parādīšanos (AS 51). Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-7 dienām	1	6
Gurķi, ķirbji, kabači, tomāti, baklažāni, melones*, arbūzi* (segtās platībās)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea),* īstā miltrasa* *(Erysiphe cichoracearum, Spaerotheca fuliginea, Oidium lycopersici)*	25-50		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar pirmā zieda aizmetņa parādīšanos (AS 51). Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-7 dienām	1	6
Salāti, endīvijas*, garšaugi* (atklātā laukā un segtās platībās)	Pelēkā puve* *(Botrytis cinerea),* īstā miltrasa *(Erysiphe cichoracearum, Podosphaera spp.)*	30		Apsmidzināt sējumus un stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz kultūraugs sasniedzis novākšanas gatavību (AS 12-49) Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-7 dienām	1	10

1	2	3	4	5	6	7
Pupiņas, zirņi* (atklātā laukā un segtās platībās)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea),* zirņu īstā miltrasa* *(Erysiphe pisi)*	25-50		Apsmidzināt sējumus un stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar pirmo ziedpumpuru parādīšanos (AS 51). Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-7 dienām	1	6
Burkāni*	Pelēkā puve* *(Botrytis cinerea),* čemurziežu īstā miltrasa* *(Erysiphe heraclei)*	25-50		Apsmidzināt sējumus infekcijas izplatīšanās sākumā vai kad redzamas pirmās slimības pazīmes, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju līdz kultūraugs sasniedzis novākšanas gatavību (AS 13-49). Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-7 dienām	1	6
Sīpoli, šalotes sīpoli, ķiploki* (atklātā laukā)	Puves *(Botrytis spp.)*	50		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus infekcijas izplatīšanās sākumā vai kad redzamas pirmās slimības pazīmes. Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-7 dienām	1	6
Sparģeļi	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	50		Apsmidzināt stādījumu infekcijas izplatīšanās sākumā vai kad ir redzamas slimības pirmās pazīmes pēc ražas novākšanas.	-	6
Krāšņumaugi (atklātā laukā un segtās platībās)	Īstā miltrasa *(Uncinula bicornis, Microsphaera alphitoides, Sphaerotheca macularis)*	25-50		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus infekcijas izplatīšanās sākumā vai kad ir redzamas pirmās slimības pazīmes. Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-7 dienām	-	10
Dekoratīvie koki* un krūmi* (atklātā laukā)	Īstā miltrasa *(Unicula aceris, Microsphaera alphitoides)*	25-50		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus infekcijas izplatīšanās sākumā vai kad ir redzamas pirmās slimības pazīmes. Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-7 dienām	-	10

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

91. Zenby

Reģ. Nr. 0832, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: izofetamīds, 400 g/l.
Lokāla sistēmas iedarbība.
ISK Biosciences Europe N.V.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis, ziemas ripsis*, vasaras ripsis*	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	0.8		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu, līdz galvenajā ziedkopā atvērušies 50-60% ziedu (AS 60-65)	-	1
Ķirši*, plūmes*	Kauleņkoku pelēkā puve *(Monilinia laxa)*	0.9		Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar ziedlapu parādīšanos līdz ziedēšanas beigām (AS 57-69). Minimālais intervāls starp apstrādēm 9 dienas	-	2

1	2	3	4	5	6	7
Plūmes*	Augļu parastā puve *(Monilinia fructigena)*	0.9		Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, kad augļi sasnieguši 90% raksturīgā lieluma līdz novākšanas gatavībai (AS 79-87). Minimālais intervāls starp apstrādēm 10 dienas	7	2
Vīnogas*	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	1.5		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedēšanas sākumu līdz ogu nogatavošanās vidum (AS 61-85). Minimālais intervāls starp apstrādēm 21 diena	21	2
Zemenes* (atklātā laukā un segtās platībās)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	1.2		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedēšanas sākumu, līdz lielākā daļa ogu ir nogatavojušās (AS 61-87). Minimālais intervāls starp apstrādēm 7 dienas	1	2
Salāti*, spināti* (atklātā laukā un segtās platībās)	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorm),* pelēkā puve (*Botrytis cinerea)*	1.0		Apsmidzināt sējumus un stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai (AS 12-19). Minimālais intervāls starp apstrādēm 10 dienas	21	2

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

92. Zorvec Enicade

Reģ. Nr. 0673, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: oksatiapiprolīns, 100 g/l.
Lokāla sistēmas iedarbība.
Corteva Agriscience Denmark A/S

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve *(Phytophthora infestans)*	0.15		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc signāla par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7-10 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	4

HERBICĪDI

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, l, kg/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7

1. 2,4-D Nufarm

Reģ. Nr. 0095, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: 2,4-D, 600 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Nufarm GmbH & Co KG

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Darby

Reģ. Nr. 0786, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: 2,4-D, 600 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

Stapler

Reģ. Nr. 0787, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: 2,4-D, 600 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, tritikāle	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.6-1.25		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai līdz divu mezglu stadijai (AS 32)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.6-1.25		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20-32)	-	1
Pļavu lapsaste*, bezakotu lāčauza*, kamolzāle* (sēklai)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.6-0.8		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 20-29)	-	1
Augstā dižauza* (sēklai)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.0-1.25		Apsmidzināt sējumus kultūrauga 2-4 lapu stadijā (AS 12-14)	-	1
Timotiņš* (sēklai)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.0-1.25		Apsmidzināt sējumus kultūrauga 2-3 lapu stadijā (AS 12-13)	-	1
Pļavas skarene* (sēklai)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.0-1.25		Apsmidzināt sējumus kultūrauga 1-2 lapu stadijā (AS 11-12)	-	1
Pļavas auzene* (sēklai)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.25		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 20-29)	-	1
Pļavas auzene, kas pasēta zem miežiem	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.0-1.25		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 20-29)	-	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7
2. Accurate 200 WG Reģ. Nr. 0342, reģ. klase 2. Darbīgā viela: metil-metsulfurons, 200 g/kg. Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm. ***Nufarm Gmbh & Co KG***						
Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.01		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 20-29)	-	1
		0.02		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)		
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.01-0.02		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20-32)	-	1
Lini*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.02		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu pāri līdz 30 cm augstumam vai pirms ziedpumpuri kļūst redzami, atkarībā no tā, kas notiek agrāk	-	1
Ceļa malas*, mežmalas*, lauksaimniecībā neizmantojamās zemes*, zemes zem elektrolīniju pārvadiem*	Latvāņi	0.03		Apsmidzina: <u>1. lietošanas veids</u> Agri pavasarī, atsākoties veģetācijai, latvāņiem dīgstot, dīgļlapu veidošanas stadijā <u>2. lietošanas veids</u> Agri pavasarī, atsākoties veģetācijai, kad lielāko pārziemojušo latvāņu rozešu diametrs- 20 cm <u>3. lietošanas veids</u> Vasarā pēc nopļaušanas, kad latvāņi ataug un to rozetes ir diametrā ap 20-25 cm <u>4. lietošanas veids</u> Latvāņu centrālo dzinumu tā ziedēšanas laikā, kamēr vēl nav izveidojušās sēklas <u>5. lietošanas veids</u> Atsevišķi augošu latvāņu rozetes. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Kontakts 100 ml uz 200 l ūdens uz ha.	-	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7
3. Achiba Reģ. Nr. 0774, reģ. klase 2. Darbīgā viela: etil-kvizalofops-P, 100 g/l. Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām. ***Nissan Chemical Europe S.A.S.***						
Cukurbietes	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi	0.5-0.6		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu pāri, līdz lapas sedz 90 % no augsnes virskārtas rindstarpās (AS 11-39)	60	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.0-1.25				
Kartupeļi	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi	0.5-0.6		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu veidošanos, līdz lapas sedz 90 % no augsnes virskārtas rindstarpās (AS 10-39)	45	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.0				
Ziemas rapsis	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi	0.5-0.6		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu pāri līdz stublāja pagarināšanās beigām (AS 11-39)	90	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.0-1.25				
Burkāni	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi	0.5-0.6		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu, līdz sakne sasniedz šķirnei raksturīgo saknes diametru (AS 11-49)	40	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.0-1.25				

4. Agil 100 EC
Reģ. Nr. 0003, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: propakvizafops, 100 g/l.
Sistēmas iedarbība.
ADAMA Registrations B.V.

<u>Analogie augu aizsardzības līdzekļi:</u>

Zetrola
Reģ. Nr. 0578, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: propakvizafops, 100 g/l.
Sistēmas iedarbība.
ADAMA Registrations B.V.

Ābeles, bumbieres, kartupeļi, burkāni, sīpoli, ķiploki, brokoļi, galviņkāposti, kāļi	Labības - sārņaugi	0.5-0.75		Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus pa sadīgušām nezālēm, sākot ar nezāļu 3 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām	30	1
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.5-1.0				
	Parastā rudzusmilga *(Apera spica-venti)*	1.0-1.5				
	Ložņu vārpata *(Elytrigia repens)*, daudzgadīgā airene *(Lolium perenne)*	1.0-1.5		Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, sākot ar daudzgadīgo nezāļu 4-6 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām		
Zemenes, avenes, ērkšķogas, upenes, jāņogas	Labības - sārņaugi	0.5-0.75		Apsmidzināt kultūraugu stādījumus pa sadīgušām nezālēm, sākot ar nezāļu 3 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām	35	1
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.5-1.0				
	Parastā rudzusmilga *(Apera spica-venti)*	1.0-1.5				
	Ložņu vārpata *(Elytrigia repens)*, daudzgadīgā airene *(Lolium perenne)*	1.0 -1.5		Apsmidzināt kultūraugu stādījumus, sākot ar daudzgadīgo nezāļu 4-6 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām		
Sinepes (sēklai), lini, ziemas rapsis, vasaras rapsis	Labības -sārņaugi	0.5-0.75		Apsmidzināt kultūraugu sējumus pa sadīgušām nezālēm, sākot ar nezāļu 3 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām	90	1
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.5-1.0				
	Parastā rudzusmilga *(Apera spica-venti)*	1.0-1.5				
	Ložņu vārpata *(Elytrigia repens)*, daudzgadīgā airene *(Lolium perenne)*	1.0-1.5		Apsmidzināt kultūraugu sējumus, sākot ar daudzgadīgo nezāļu 4-6 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām		

1	2	3	4	5	6	7
Zirņi (svaigam patēriņam), zirņi (graudiem), pupas (graudiem), āboliņš (sēklai), sarkanā auzene (sēklai), lucerna	Labības- sārņaugi	0.5-0.75		Apsmidzināt kultūraugu sējumus pa sadīgušām nezālēm, sākot ar nezāļu 3 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām	45	1
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.5-1.0				
	Parastā rudzusmilga *(Apera spica –venti)*	1.0-1.5				
	Ložņu vārpata *(Elytrigia repens),* daudzgadīgā airene *(Lolium perenne)*	1.0-1.5		Apsmidzināt kultūraugu sējumus, sākot ar daudzgadīgo nezāļu 4-6 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām		
Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes	Labības-sārņaugi	0.5-0.75		Apsmidzināt kultūraugu sējumus pa sadīgušām nezālēm, sākot ar nezāļu 3 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām	60	1
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.5-1.0				
	Parastā rudzusmilga *(Apera spica-venti)*	1.0-1.5				
	Ložņu vārpata *(Elytrigia repens)* daudzgadīgā airene *(Lolium perenne)*	1.0-1.5		Apsmidzināt kultūraugu sējumus, sākot ar daudzgadīgo nezāļu 4-6 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām		
Divdīgļlapju krāšņumaugi, divdīgļlapju krāšņumaugu stādi stādaudzētavās	Labība- sārņaugi	0.5-0.75		Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus pa sadīgušām nezālēm, sākot ar nezāļu 3 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām	-	1
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.5-1.0				
	Parastā rudzusmilga *(Apera spica-venti)*	1.0-1.5				
	Ložņu vārpata *(Elytrigia repens),* daudzgadīgā airene *(Lolium perenne)*	1.0-1.5		Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, sākot ar daudzgadīgo nezāļu 4-6 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām		
Ķimenes* (sējas gadā, ražas gādā sēklai)	Labības-sārņaugi	0.5-0.75		Apsmidzināt ķimenes pa sadīgušām nezālēm, sākot ar nezāļu 3 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām	60	1
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.5-1.0				
	Parastā rudzusmilga *(Apera spica-venti)*	1.0-1.5				
	Ložņu vārpata *(Elytrigia repens),* daudzgadīgā airene *(Lolium perenne)*	1.0-1.5		Apsmidzināt ķimeņu sējumu, sākot ar daudzgadīgo nezāļu 4-6 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām		
Meža kultūru stādi, augļu koku un ogulāju stādi stādaudzētavās	Labības -sārņaugi	0.5-0.75		Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus pa sadīgušām nezālēm, sākot ar nezāļu 3 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām	-	1
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.5-1.0				
	Parastā rudzusmilga *(Apera spica-venti)*	1.0-1.5				
	Ložņu vārpata *(Elytrigia repens),* daudzgadīgā airene *(Lolium perenne)*	1.0-1.5		Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, sākot ar daudzgadīgo nezāļu 4-6 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām		

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

5. Agroxone 75

Reģ. Nr. 0048, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: MCPA, 750 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība,
augi uzņem caur lapām.
Nufarm GmbH & Co KG

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

EMDEE[1]
Reģ. Nr. 0829, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: MCPA, 750 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Sharda Cropchem España S.L.

Ziemāju un vasarāju graudaugi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.3-2.0		Apsmidzināt sējumus, ziemājos - atjaunojoties veģetācijai, vasarājos - kad graudaugiem 3-4 lapas, līdz stiebrošanai	-	1
Vasarāju graudaugi ar āboliņa pasēju	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.8		Apsmidzināt sējumus, kad graudaugiem 3-4 lapas (āboliņam 1-2 lapas), līdz stiebrošanai	-	1
Vasarāju graudaugi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, tīruma usne, tīruma mīkstpiene	2.5-3.0		Apsmidzināt sējumus, kad usnei un mīkstpienei izveidojusies lapu rozete (spēcīgākie augi 15-25 cm augsti), līdz graudaugu stiebrošanai	-	1
Lini	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.8-1.3		Apsmidzināt sējumus pēc nezāļu dīgšanas, kad lini 3-8 cm gari	-	1
Āboliņš	Divdīgļlapju nezāles	0.8		Apsmidzināt sējumus, kad āboliņam ir 1-2 īstās lapas	-	1
Ganības un pļavas	Divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt laukus pēc nezāļu dīgšanas (daudzgadīgajām nezālēm izveidojusies lapu rozete)	20	1
Daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.2-1.8		Apsmidzināt sējumus pēc nezāļu dīgšanas, kad stiebrzāles ir attīstījušas 3-4 lapas	-	1

[1]Analogs augu aizsardzības līdzeklim Agroxone 75, jo beidzies datu aizsardzības periods.

6. Ariane S

Reģ. Nr. 0188, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: fluroksipirs, 40 g/l,
klopiralīds, 20 g/l,
MCPA, 200 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Corteva Agriscience Denmark A/S

Ziemas kvieši, ziemas rudzi, ziemas mieži, ziemas tritikāle ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.5-2.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 21-29)	-	1
		2.0-3.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz pirmā mezgla stadijai (AS 30-31)		
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	2.0-2.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz pirmā mezgla stadijai (AS 21-31)	-	1
Stiebrzāles (sēklai, ražas gadā)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	2.0-3.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai no stiebrzāļu cerošanas sākuma līdz pirmā mezgla stadijai (AS 21-31)	-	1
Ganības	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	2.0-3.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai no stiebrzāļu cerošanas sākuma līdz pirmā mezgla stadijai (AS 21-31)	30	1

1	2	3	4	5	6	7

7. Attribut

Reģ. Nr. 0191, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: nātrija propoksikarbazons, 700 g/kg.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
Bayer AG

Ziemas kvieši, ziemas tritikāle, rudzi	Viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.06-0.10		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20-32)	-	1
Vasaras kvieši	Viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.06		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz divu mezglu stadijai (AS 13-32)	-	1

8. Avoxa

Reģ. Nr. 0525, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: pinoksadēns, 33.3 g/l,
piroksulams, 8.33 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle	Īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.35-1.80		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga diviem sāndzinumiem līdz kultūrauga divu mezglu stadijai (AS 22-32)	-	1
Vasaras kvieši	Īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.35-1.80		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga diviem sāndzinumiem līdz kultūrauga divu mezglu stadijai (AS 22-32)	-	1

9. Axial 50 EC

Reģ. Nr. 0304, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: pinoksadēns, 50 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, ziemas tritikāle	Parastā rudzusmilga *(Apera spica venti)*, vējauza *(Avena fatua)*, daudzziedu airene *(Lolium multiflorum)*	0.6-1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 25-39)	-	1
	Peļastīšu lapsaste *(Alopecurus myosuroides)*	0.9		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32)		
	Peļastīšu lapsaste *(Alopecurus myosuroides)*	1.2		Apsmidzināt, sākot no kultūrauga trīs mezglu stadijas līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 33-39)		
Vasaras kvieši, vasaras mieži, vasaras tritikāle	Parastā rudzusmilga *(Apera spica venti)*, vējauza *(Avena fatua)*, daudzziedu airene *(Lolium multiflorum)*	0.6-1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 25-39)	-	1

1	2	3	4	5	6	7

10. Axial One

Reģ. Nr. 0904, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: pinoksadēns, 45 g/l,
florasulams, 5 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas rudzi, ziemas tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, parastā rudzusmilga *(Apera spica-venti)*, vējauza *(Avena fatua)*	1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot no kultūraugu cerošanas vidus līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 25-37)	-	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas rudzi, ziemas tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, peļastīšu lapsaste *(Alopecurus myosuroides)*, daudzziedu airene *(Lolium multiflorum)*	1.3		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot no kultūraugu cerošanas vidus līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 25-37)		
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, parastā rudzusmilga *(Apera spica-venti)*, vējauza *(Avena fatua)*	1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūraugu cerošanas vidus līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 25-37)	-	1

11. Banvel 4S

Reģ. Nr. 0038, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: dikamba, 480 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža un divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt sējumu pavasarī, atsākoties veģetācijai, graudaugu cerošanas fāzē (AS 21-29)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.15-0.20		Apsmidzināt sējumus graudaugu cerošanas fāzē (AS 21-29)	-	1
Kukurūza	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.3-0.6		Apsmidzināt sējumus kukurūzas 3 līdz 8 lapu stadijā (AS 13-18)	-	1
Papuves, lauksaimniecībā neizmantojamās platības, dzelzceļi	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.75		Apsmidzināt platības nezāļu aktīvas augšanas laikā	-	1
Zālāji, ganības	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.3-1.0		Apsmidzināt platības pavasarī, īsmūža nezāļu 2-4 lapu stadijā, daudzgadīgajām nezālēm, kad rozetes diametrs 5 cm	14	1

1	2	3	4	5	6	7

12. Barbarian Biograde 360

Reģ. Nr. 0299, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.
Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Barbarian Super 360

Reģ. Nr. 0503, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.
Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

Clinic Up

Reģ. Nr. 0554, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.
Nufarm GmbH & Co KG

Gallup Super 360

Reģ. Nr. 0502, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.
Barclay Chemicals (R&D) Ltd

Monosate G

Reģ. Nr. 0527, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.
Bayer AG

Rosate 360 TF

Reģ. Nr. 0639, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.
Albaugh TKI d o.o.

Kvieši, mieži, auzas, cietie kvieši, rapsis, eļļas lini, sinepes, zirņi (graudiem), lauka pupas, cukurbietes, kāļi, rāceņi, sīpoli pirms sadīgšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.5		Apsmidzināt sējumus pēc tiešās sējas, pirms kultūrauga sadīgšanas. Kviešiem, miežiem, auzām un cietajiem kviešiem apsmidzināt ne vēlāk kā 72 stundas pirms kultūrauga sadīgšanas, pārējām kultūrām apsmidzināt 48 stundu laikā pēc sējas	-	1
Tīrumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad viendīgļlapju nezāles ir vismaz 10 cm un divdīgļlapju nezālēm ir divas īstās lapas	-	1
	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	2.0-4.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad vārpatai ir vismaz 6 lapas		
Zālāji	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0-6.0		Apsmidzināt zālāju pēc ataugšanas, nezāļu aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas	-	1
Papuves	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5-6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas	-	1
Ābeles, bumbieres	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	5.0		Apsmidzināt stādījumus nezāļu aktīvas augšanas periodā, pavasarī pirms kultūrauga zaļā konusa stadijas vai pēc ražas novākšanas. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz stumbra augstāk par 30 cm no zemes vai augļu koku zariem	-	1

1	2	3	4	5	6	7
Pirms koku jaunaudžu ierīkošanas mežā	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā. Nogaidīt 7 dienas pirms jebkuriem zemes darbiem vai stādīšanas	-	1
Koku jaunaudzes pēc ierīkošanas mežā	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus	-	1
	Divdīgļalapju kokaugi-sārņaugi, ērgļpapaprdes	3.0		Apsmidzināt kokaugus-sārņaugus no jūnija līdz augustam pirms lapu novecošanas, bet pēc kultūrauga jauno dzinumu nobriešanas. Ērgļpapardes apsmidzināt pēc lapu atritināšanās, bet pirms novecošanās., aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus		
Celmu apstrāde	Skuju koku celmi	-	20	Apstrādāt celmus uzreiz pēc krūmu vai koku nociršanas no novembra līdz martam	-	1
Celmu apstrāde	Lapu koku celmi	-	10	Apstrādāt celmus uzreiz pēc krūmu vai koku nociršanas. Nelietot sulu cirkulācijas laikā	-	1
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības/ industriālās teritorijas (elektropārvades līnijas, naftas cauruļvadi, gāzes maģistrāles, ceļmalas, dzelzceļi)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0- 6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas	-	1

13. Barbarian Hi-Aktiv

Reģ. Nr. 0289, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 490 g/l.
Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds.
Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

Kvieši, mieži, auzas, cietie kvieši, rapsis, eļļas lini, sinepes, zirņi (graudiem), lauka pupas, cukurbietes, kāļi, rāceņi, sīpoli pirms sadīgšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.1		Apsmidzināt sējumus pēc tiešās sējas, pirms kultūrauga sadīgšanas. Kviešiem, miežiem, auzām un cietajiem kviešiem apsmidzināt ne vēlāk kā 72 stundas pirms kultūrauga sadīgšanas, pārējām kultūrām apsmidzināt 48 stundu laikā pēc sējas. Kultūrauga sēklām jābūt pilnībā nosegtām ar augsni	-	1
Tīrumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.1		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad viendīgļlapju nezāles ir vismaz 10 cm un divdīgļlapju nezālēm ir divas īstās lapas	-	1
	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	2.2-2.9		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad vārpatai ir vismaz 6 lapas		
Zālāji	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.2-4.4		Apsmidzināt zālāju pēc ataugšanas, nezāļu aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas. Nepieļaut ganīšanu uz apstrādātās platības	-	1

1	2	3	4	5	6	7
Papuves	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.1-4.4		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas	-	1
Ābeles, bumbieres	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.7		Apsmidzināt stādījumus nezāļu aktīvas augšanas periodā, pavasarī pirms kultūrauga zaļā konusa stadijas vai pēc ražas novākšanas. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz stumbra augstāk par 30 cm no zemes vai augļu koku zariem	-	1
Pirms koku jaunaudžu ierīkošanas mežā	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.2		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā. Nogaidīt 7 dienas pirms jebkuriem zemes darbiem vai stādīšanas	-	1
Koku jaunaudzes pēc ierīkošanas mežā	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.2		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus	-	1
	Divdīgļlapju kokaugi-sārņaugi, ērgļpapaprdes	2.2		Apsmidzināt kokaugus-sārņaugus no jūnija līdz augustam pirms lapu novecošanas, bet pēc kultūrauga jauno dzinumu nobriešanas. Ērgļpapardes apsmidzināt pēc lapu atritināšanās, bet pirms novecošanās, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus		
Celmu apstrāde	Skuju koku celmi	-	15	Apstrādāt celmus uzreiz pēc krūmu vai koku nociršanas no novembra līdz martam	-	1
Celmu apstrāde	Lapu koku celmi	-	7.5	Apstrādāt celmus uzreiz pēc krūmu vai koku nociršanas. Nelietot sulu cirkulācijas laikā	-	1
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības/ industriālās teritorijas (elektropārvades līnijas, naftas cauruļvadi, gāzes maģistrāles, ceļmalas, dzelzceļi)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.9-4.4		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas	-	1

1	2	3	4	5	6	7

14. Barracuda

Reģ. Nr. 0892, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: mezotrions, 100 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur saknēm un lapām.
Albaugh TKI d.o.o.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Fraxion

Reģ. Nr. 0902, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: mezotrions, 100 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur saknēm un lapām.
Albaugh TKI d.o.o.

Kukurūza, saldā kukurūza*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.5		1. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz astoņu lapu attīstības stadijai (AS 12-18)	-	1
		1.2				
		1.0				
		0.75		2. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, dalītā apstrāde, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz astoņu lapu attīstības stadijai (AS 12-18)	-	2

*__Mazais lietojums.__ Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

15. Basagran 480

Reģ. Nr. 0024, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: bentazons, 480 g/l.
Selektīvs, pieskares iedarbība.
SIA BASF

Vasaras kvieši, vasaras mieži, vasaras tritikāle ar lucernas, āboliņa vai daudzgadīgo stiebrzāļu pasēju	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz cerošanas beigām (AS 12-29)	-	1
		1.0+1.0		Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz cerošanas beigām (AS 12-29)	-	2
Lauka pupas (svaigas zaļas ar/bez pākstīm, graudiem)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz stublāja pagarināšanās sākumam (AS 12-30)	35	1
		1.0+1.0		Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz stublāja pagarināšanās sākumam (AS 12-30)	35	2
Dārza pupiņas*, dārza pupas* (svaigas ar/ bez pākstīm, graudiem)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga pirmo īsto lapu stadiju līdz trīs īsto stadijai (līdz 15 cm augstas) (AS 12-13)	35	1
		1.0+1.0		Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga pirmo īsto lapu stadiju līdz trīs īsto stadijai (līdz 15 cm augstas) (AS 12-13)	35	2
Zirņi (svaigi ar / bez pākstīm)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņu posmu stadijai (AS 12-39)	42	1
		1.0+1.0		Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņu posmu stadijai (AS 12-39)	42	2

1	2	3	4	5	6	7
Zirņi (graudiem)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņu posmu stadijai (AS 12-39)	49	1
		1.0+1.0		Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņu posmu stadijai (AS 12-39)	49	2
Zirņu-graudaugu mistri* (graudiem)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu divu lapu stadiju līdz cerošanas beigām (AS 12-29)	-	1
		1.0+1.0		Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar graudaugu divu lapu stadiju līdz cerošanas beigām (AS 12-29)	-	2
Kartupeļi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņām lapām uz galvenā stublāja (AS 12-19)	-	1
		1.0+1.0		Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņām lapām uz galvenā stublāja (AS 12-19)	-	2
Lini	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga otro lapu pāri līdz eglītes stadijai (AS 12-19), lini 3-10 cm gari	-	1
Saldā kukurūza, kukurūza (zaļbarībai, graudiem)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai (AS 12-19)	-	1
Āboliņš, lucerna* (sēklu lauki)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.0		Sējas gadā apsmidzināt sējumus kultūrauga trīs lapu stadijā, ražas gadā – ataugšanas sākumā, kad kultūraugi ir 5-15 cm augsti	-	1
Soja*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus kultūrauga divu līdz triju īsto lapu stadijā (AS 12-13), līdz kultūraugs sasniedz 10 cm	-	1
Sīpoli*, šalotes sīpoli*, ķiploki*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.5-2.0		Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, kultūrauga divu līdz četru lapu stadijā (AS 12-14) un kad kultūraugs ir lielāks par 10 cm	-	1

*__Mazais lietojums.__ Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

16. Beflex 500 SC

Reģ. Nr. 0844, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: beflubutamīds, 500 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur saknēm un lapām.
FMC Agricultural Solutions A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, ziemas tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, parastā rudzusmilga *(Apera spica-venti)*	0.25-0.5		Apsmidzināt sējumus rudenī pēc kultūrauga sadīgšanas līdz cerošanas vidum (AS 10-25)	-	1

17. Belkar

Reģ. Nr. 0598, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: metil-halauksifēns, 10 g/l,
piklorams, 48 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Corteva Agriscience Denmark A/S

Ziemas rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.25		<u>1. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz 5 lapu stadijai (AS 12-15)	-	1
		0.5		Apsmidzināt sējumus rudenī, sākot ar kultūrauga sešu lapu stadiju līdz lapu rozetes izveidošanās beigām (AS 16-19)		
		0.25		<u>2. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus dalīti, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz piecu lapu stadijai (AS 12-15) un atkārtoti, ja nepieciešams, sākot ar sešu lapu stadiju līdz lapu rozetes izveidošanās beigām (AS 16-19)	-	2

18. Beloukha

Reģ. Nr. 0891, reģ.klase 2
Darbīgā viela: pelargonskābe, 680 g/l
Neselektīvs, pieskares iedarbība.
Certis Belchim B.V.

Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes, aprikozes, persiki	Īsmūža divdīgļlapju, dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	16.0		Apsmidzināt starprindas stādījumā, kad nezāles ir aktīvi augošas līdz to 8 cm garumam vai 4 cm rozešu diametram. Nepieļaut smidzinājuma nonākšanu uz augu lapām, zariem un stumbriem. Starp apstrādēm ievērot vismaz 14 dienu intervālu	-	2
Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes, aprikozes, persiki	Kultūrauga atvases	16.0		Apsmidzināt kultūrauga atvases, līdz 15 cm garumam, pirms to pārkoksnēšanās. Nepieļaut smidzinājuma nonākšanu uz kultūrauga lapām un nenobriedušiem zariem. Starp apstrādēm ievērot vismaz 14 dienu intervālu	-	2
Avenes, kazenes, krūmmellenes, ērkšķogas, upenes, jāņogas, cidonijas	Īsmūža divdīgļlapju, dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	16.0		Apsmidzināt starprindas stādījumā, kad nezāles ir aktīvi augošas līdz to 8 cm garumam vai 4 cm rozešu diametram. Nepieļaut smidzinājuma nonākšanu uz augu lapām un zariem. Starp apstrādēm ievērot vismaz 14 dienu intervālu	-	2
Avenes, kazenes, ērkšķogas, upenes, jāņogas	Kultūrauga atvases	16.0		Apsmidzināt kultūrauga atvases, līdz 15 cm garumam, pirms to pārkoksnēšanās. Nepieļaut smidzinājuma nonākšanu uz kultūrauga lapām un nenobriedušiem zariem. Starp apstrādēm ievērot vismaz 14 dienu intervālu	-	2

1	2	3	4	5	6	7
Zemenes	Īsmūža divdīgļlapju, dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	16.0		Apsmidzināt kultūrauga starprindas pēc ražas novākšanas pa sadīgušām nezālēm, līdz to 8 cm garumam vai 4 cm diametram rozetēm. Nepieļaut smidzinājuma nonākšanu uz kultūrauga. Starp apstrādēm ievērot vismaz 14 dienu intervālu	-	2
Sīpoli, burkāni, cukurbietes, soja, pētersīļi, zirņi, kukurūza (pirms kultūrauga sadīgšanas)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	16.0		Apstrādāt pēc sējas/ stādīšanas, pirms kultūrauga sadīgšanas, pa sadīgušām nezālēm, līdz to 8 cm garumam, vai 4 cm diametram rozetēm	-	1
Tīrumi pirms kultūraugu sējas vai stādīšanas	Īsmūža divdīgļlapju, dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	16.0		Apsmidzināt aktīvi augošas nezāles, līdz to 8 cm garumam vai 4 cm rozešu diametram. Starp apstrādēm ievērot vismaz 14 dienu intervālu	-	2
Dārzeņi, ārstniecības augi, krāšņumaugi, dekoratīvie koki un krūmi	Īsmūža divdīgļlapju, dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	16.0		Apsmidzināt starprindas stādījumā vai sējumā, kad nezāles ir aktīvi augošas līdz to 8 cm garumam vai 4 cm rozešu diametram. Nepieļaut smidzinājuma nonākšanu uz kultūraugiem. Starp apstrādēm ievērot vismaz 7 dienu intervālu	-	2

19. Beloukha Garden RTU

Reģ. Nr. 0899, reģ. klase 3.
Darbīgā viela: pelargonskābe, 21.7 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Certis Belchim B.V.

Ceļi, takas, laukumi, kuriem ir caurlaidīga virsma, dekoratīvo koku un krūmu stādījumi, krāšņumaugu stādījumi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1 l/ 10 m^2		Apsmidzināt aktīvi augošas nezāles, līdz to 10 cm garumam. Aizsargāt koku un krūmu lapotni un auga daļas, kuras nav pārkoksnējušās. Nepieļaut smidzinājuma nonākšanu uz augu lapotnes. Starp apstrādēm ievērot vismaz 14 dienu intervālu	-	6
	Sūnas	1 l/ 10 m^2		Apsmidzināt sūnas to augšanas laikā. Aizsargāt koku un krūmu lapotni un auga daļas, kuras nav pārkoksnējušās. Nepieļaut smidzinājuma nonākšanu uz augu lapotnes. Starp apstrādēm ievērot vismaz 14 dienu intervālu	-	4
Dārzeņu sējumu un stādījumu rindstarpas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1 l/ 10 m^2		Apsmidzināt aktīvi augošas nezāles, līdz to 10 cm garumam. Nepieļaut smidzinājuma nonākšanu uz kultūraugiem. Starp apstrādēm ievērot vismaz 14 dienu intervālu	-	6
Koki	Sūnas	1 l/ 10 m^2		Apsmidzināt sūnas to augšanas laikā. Starp apstrādēm ievērot vismaz 14 dienu intervālu	-	4

1	2	3	4	5	6	7

20. Benz

Reģ. Nr. 0867, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: bentazons, 480 g/l.
Selektīvs, pieskares iedarbība.
Sharda Cropchem España S.L.

Kukurūza	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz sešu lapu stadijai (AS 12-16)	-	1
Zirņi*, pupas* (zaļi ar/bez pākstīm, graudiem)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga pirmo īsto lapu līdz piecu lapu stadijai (AS 11-15)	-	1

*__Mazais lietojums.__ Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

21. Betanal

Reģ. Nr. 0291, reģ. klase 2., iepakojumiem 1.0 l un mazākiem, reģ. klase 3.
Darbīgā viela: fenmedifams, 160 g/l.
Selektīvs, pieskares iedarbība.
Bayer AG

Zemenes	Īsmūža divdīgļlapju un dažas viendīgļlapju nezāles	2.0		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt stādījumus pavasarī, kad sadīgušas pirmās nezāles, līdz zemeņu ziedēšanas sākumam, nezāļu dīgļlapu stadijā. Atkārtoti pēc jaunu nezāļu sadīgšanas pēc 5-14 dienām	-	3
Zemenes	Īsmūža divdīgļlapju un dažas viendīgļlapju nezāles	3.0		<u>2. lietošanas variants</u> Apsmidzināt stādījumus pavasarī, kad sadīgušas pirmās nezāles, līdz zemeņu ziedēšanas sākumam, nezāļu pirmo īsto lapu stadijā. Atkārtoti pēc jaunu nezāļu sadīgšanas pēc 5-14 dienām	-	2
Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes	Īsmūža divdīgļlapju un dažas viendīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējums nezāļu dīgļlapu stadijā neatkarīgi no biešu attīstības stadijas, ne vēlāk kā biešu 8 lapu attīstības stadijā. Atkārtoti pēc jaunu nezāļu sadīgšanas pēc 5-14 dienām	-	3

22. Boom efekt 360 SL

Reģ. Nr. 0881, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Albaugh TKI d.o.o

<u>Analogie augu aizsardzības līdzekļi:</u>

Rosate Clean 360 SL

Reģ. Nr. 0882, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Albaugh TKI d.o.o.

Tīrumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir 3-6 lapas un tās ir 10-15 cm garas	-	1
Tīrumi pirms kultūraugu sējas vai stādīšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-4.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas	-	1
Cukurbietes, lopbarības bietes, pirms sadīgšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-4.0		Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga sadīgšanas 48 stundu laikā pēc sējas	-	1

1	2	3	4	5	6	7
Kartupeļi pirms sadīgšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-4.0		Apsmidzināt kartupeļu stādījumus vai kukurūzas sējumus pirms sadīgšanas	-	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-4.0		Apsmidzināt sējumus kultūrauga pilngatavības stadijā. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis, sinepes, lini pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-3.0		Apsmidzināt rapša sējumus, kad sēklu mitrums ir zem 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Lauka pupas, zirņi, lupīna pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-3.0		Apsmidzināt sējumus, kad 75% kultūrauga pākstis ir nobrūnējušas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Papuves	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0-6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 8.0 l/ha	-	1-2
Ganību, zālāju atjaunošana	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0-6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ataugušas pēc noganīšanas vai nopļaušanas	-	1
Ābeles, bumbieres	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5-5.3		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 10-15 cm garas, aizsargājot koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus. Neapstrādāt augļu nogatavošanās un novākšanas laikā. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 8.0 l/ha	30	1-3
Ķirši, plūmes, persiki, aprikozes, lazdas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5-5.3		Apsmidzināt pēc ražas novākšanas, kad nezāles ir aktīvi augošas, aizsargājot koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 8.0 l/ha	-	1-3
Jāņogas*, upenes*, ērkšķogas*, krūmmellenes*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5-5.3		Apsmidzināt starprindas stādījumā, kad nezāles ir aktīvi augošas līdz kultūrauga ziedēšanai vai pēc ražas novākšanas Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz ogu krūmiem. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 8.0 l/ha	-	1-2
Skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-3.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 10-15 cm garas, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 8.0 l/ha	-	1-3
Kokaudzētavas, mežā pirms stādījumu ierīkošanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-3.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 10-15 cm garas. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 8.0 l/ha	-	1-3

1	2	3	4	5	6	7
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības/ industriālās teritorijas (elektropārvades līnijas, naftas cauruļvadi, gāzes maģistrāles, ceļmalas, dzelzceļi)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5-6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 8.0 l/ha	-	1-3

*__Mazais lietojums.__ Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība.__ Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

23. Botiga

Reģ. Nr. 0808, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: piridāts, 300 g/l,
mezotrions, 90 g/l,
Selektīvs, pieskares un sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Certis Belchim B.V.

Kukurūza	Īsmūža un viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.67-1.0		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 12-18)	-	1
	Īsmūža un viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5		<u>2. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 12-18)	-	2

24. Boxer 800 EC

Reģ. Nr. 0271, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: prosulfokarbs, 800 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur saknēm un dzinumiem.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

<u>Analogie augu aizsardzības līdzekļi:</u>

Linati 800 EC

Reģ. Nr. 0790, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: prosulfokarbs, 800 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur saknēm un dzinumiem.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Roxy EC[1]

Reģ. Nr. 0914, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: prosulfokarbs, 800 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur saknēm un dzinumu.
Globachem N.V.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-2.5		Apsmidzināt sējumus rudenī pirms nezāļu sadīgšanas, tūlīt pēc kultūrauga sējas līdz kultūrauga sadīgšanai (AS 00-10)	-	1
		3.0-4.0		Apsmidzināt sējumus rudenī pēc sadīgšanas līdz cerošanas sākumam (AS 11-21)		
Kartupeļi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt stādījumus pirms nezāļu sadīgšanas, pirms kartupeļu sadīgšanas (AS 00-10)	42	1
Ķimenes	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas	-	1
Zirņi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas	75	1

1	2	3	4	5	6	7
Lupīna* (graudiem)	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas	-	1
Pupas, lauka*	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas	75	1
Burkāni*	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt sējumus burkānu 2 īsto lapu stadijā (AS 12)	90	1
Sīpoli* (sēti, stādīti no sīksīpoliem), ķploki*	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kad sētajiem (sīpoliem) pirmā lapa karodziņa formā un stādītajiem sīpoliem, ķiplokiem pirmā lapa 3-4 cm (AS 11-13)	90	1
Selerijas* (sakņu)	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt stādījumu 7 dienas pēc pārstādīšanas	90	1
Selerijas* (kātu)	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt stādījumu 7 dienas pēc pārstādīšanas	60	1
Saulespuķes*	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt sējumu pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas	-	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.
[1]Analogs augu aizsardzības līdzeklim Boxer 800 EC, jo beidzies datu aizsardzības periods.

25. Brasan 540 EC

Reģ. Nr. 0320, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: dimetahlors, 500 g/l,
klomazons, 40 g/l.
Selektīvs, sistēmas un augsnes iedarbība, augi uzņem caur dīgstiem un saknēm.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas - pirms nezāļu un kultūrauga sadīgšanas (AS 00-09). Pieļaujamais maksimālais darbīgās vielas dimetahlors daudzums ir 1 kg /ha reizi trijos gados tajā pašā laukā, neatkarīgi no lietotā preparāta, kura sastāvā ir dimetahlors	-	1

26. Broadway Star

Reģ. Nr. 0571, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: florasulams, 14.2 g/kg,
piroksulams, 70.8 g/kg.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
Corteva Agriscience Denmark A/S

Ziemas kvieši, tritikāle, rudzi	Viendīgļlapju nezāles un īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.160-0.265		<u>1. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20-32). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1
	Neauglīgā jumtauza *(Bromus sterilis)*	0.105		<u>2. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20-32). Atkārtotu apstrādi veikt pēc 10-14 dienām. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	2

1	2	3	4	5	6	7
Vasaras kvieši	Viendīgļlapju nezāles un īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.150		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20-32). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1

27. Butisan 400

Reģ. Nr. 0037, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metazahlors, 400 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
SIA BASF

<u>**Analogie augu aizsardzības līdzekļi:**</u>

Rapsan 400 SC
Reģ. Nr. 0617, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metazahlors, 400 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
Globachem n.v.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis, ripsis, sinepes	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un atsevišķas īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.875		Apsmidzināt sējumus pēc sējas (AS 00-09) vai pēc rapša sadīgšanas līdz 8 lapu stadijai (AS 10-18) nezāļu dīgšanas laikā vai vēlākais, nezāļu dīgļlapu stadijā, līdz nezāles sasniedz pirmo īsto lapu stadiju	-	1
Galviņkāposti, ziedkāposti, Briseles kāposti, brokoļi, lopbarības kāposti, Pekinas kāposti*, Ķīnas kāposti*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un atsevišķas īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.875		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas vai stādījumus 8-10 dienas pēc kultūrauga izstādīšanas, līdz kultūrauga 6 lapu stadijai (AS16)	-	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

28. Butisan Avant

Reģ. Nr. 0497, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: metazahlors, 300 g/l,
dimetēnamīds-P, 100 g/l,
kvinmeraks, 100 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
SIA BASF

Ziemas rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.0-2.5		Apsmidzināt sējumu pēc sējas līdz kultūrauga sadīgšanai (AS 00-09), nezāļu dīgšanas laikā vai vēlākais, nezāļu dīgllapu stadijā līdz tās sasniedz pirmo līdz otro īsto lapu stadiju	-	1
		1.8		Apsmidzināt sējumu pēc kultūrauga sadīgšanas līdz 8 lapu stadijai (AS 10-18) nezāļu dīgšanas laikā vai vēlākais, nezāļu dīgllapu stadijā līdz tās sasniedz pirmo līdz otro īsto lapu stadiju		
Vasaras rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.0-2.5		Apsmidzināt sējumu pēc kultūrauga sadīgšanas līdz 8 lapu stadijai (AS 10-18) nezāļu dīgšanas laikā vai vēlākais, nezāļu dīgllapu stadijā līdz tās sasniedz pirmo līdz otro īsto lapu stadiju	-	1

1	2	3	4	5	6	7

28. Butisan Kombi

Reģ. Nr. 0470, reģ. klase 2.
Darbīgā vielas: metazahlors, 200 g/l,
dimetēnamīds-P, 200 g/l
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
SIA BASF

Ziemas rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un atsevišķas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.0-2.5		Apsmidzināt sējumu pēc sējas līdz kultūrauga sadīgšanai (AS 00-09) nezāļu dīgšanas laikā vai vēlākais, nezāļu dīgļlapu stadijā līdz tās sasniedz pirmo līdz divu īsto lapu stadiju	-	1
Vasaras rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un atsevišķas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.0-2.5		Apsmidzināt sējumu pēc kultūrauga sadīgšanas līdz 8 lapu stadijai (AS 10-18) nezāļu dīgšanas laikā vai vēlākais, nezāļu dīgļlapu stadijā līdz tās sasniedz pirmo līdz divu īsto lapu stadiju	-	1

30. Butisan Star

Reģ. Nr. 0258, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: metazahlors, 333 g/l,
kvinmeraks, 83 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
SIA BASF

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Rapsan Plus SC

Reģ. Nr. 0618, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: metazahlors, 333 g/l,
kvinmeraks, 83 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
Globachem n.v.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un atsevišķas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.0-2.25		Apsmidzināt sējumus pēc sējas (AS 00-09) vai pēc rapša sadīgšanas līdz 4 lapu stadijai (AS 10-14) nezāļu dīgšanas laikā vai vēlākais, nezāļu dīgļlapu stadijā, līdz nezāles sasniedz pirmo īsto lapu stadiju	-	1

31. Butoxone

Reģ. Nr. 0138, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: MCPB, 400 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Nufarm GmbH & Co KG

Zirņi, pupas*	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	3.0-4.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju līdz 6 lapu stadijai (AS 13-16)	-	1
Baltais āboliņš*, sarkanais āboliņš*, galega*	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	3.0-4.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 3 īstajām lapām	-	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

32. Cadou SC

Reģ. Nr. 0893, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: flufenacets, 508.8 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur saknēm un hipokotilu.
Bayer AG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, rudzi	Parastā rudzusmilga *(Apera spica-venti)*, maura skarene *(Poa annua)*	0.035		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu līdz trīs lapu stadijai (AS 10-13)	-	1

33. Calibre 50 SX

Reģ. Nr. 0301, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: metil-tifensulfurons, 333 g/kg,
metil-tribenurons, 167 g/kg.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
FMC Agricultural Solutions A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Divdīgļlapju nezāles	0.0225-0.0300		Apsmidzināt sējumus pavasarī veģetācijai atjaunojoties līdz graudaugu attīstītas karoglapas stadijai (AS 39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu, 50 ml uz 100 l darba šķidruma	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Divdīgļlapju nezāles	0.015-0.030		Apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu 2 lapu stadijas līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12-39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu, 50 ml uz 100 l darba šķidruma	-	1

34. Callisto 100 SC

Reģ. Nr. 0700, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: mezotrions, 100 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur saknēm un lapām.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Kukurūza	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.5		Apsmidzināt kultūrauga sējumu, sākot ar vienas lapas attīstības stadiju līdz 8 lapu attīstības stadijai (AS 11-18) 1. lietošanas veids Apstākļos, kad nav iespējams veikt dalīto apstrādi, nezāļu 3-4 lapu stadijā	90	1
		0.75		2. lietošanas veids Dalītā apstrādē, kad nezāles ir 1-2 lapu stadijā. Atkārtoti apsmidzināt, sadīgstot jaunām nezālēm, pēc 8-12 dienām	90	2
		0.5		3. lietošanas veids Dalītā apstrādē, kad nezāles ir 1-2 lapu stadijā. Atkārtoti apsmidzināt, sadīgstot jaunām nezālēm, pēc 8-12 dienām	90	3

1	2	3	4	5	6	7

35. CDQ™ SX

Reģ. Nr. 0589, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: metil-metsulfurons, 111 g/kg,
metil-tribenurons, 222 g/kg.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
FMC Agricultural Solutions A/S

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.016-0.034		Apsmidzināt kultūraugu sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga sāndzinumu veidošanās sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1
Ziemas mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.016-0.034		Apsmidzināt kultūraugu sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga sāndzinumu veidošanās sākumu līdz stiebrošanas sākumam (AS 20-30). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.016-0.034		Apsmidzināt kultūraugu sējumus, sākot ar kultūrauga sāndzinumu veidošanās sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1
Auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.016-0.018		Apsmidzināt kultūraugu sējumus, sākot ar kultūrauga sāndzinumu veidošanās sākumu līdz stiebrošanas sākumam (AS 20-30). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1

36. Centurion Plus

Reģ. Nr. 0509, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: kletodims, 120 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Arysta LifeScience S.A.S.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Select Plus

Reģ. Nr. 0846, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: kletodims, 120 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Arysta LifeScience S.A.S.

Zemenes	Labības – sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.0-2.0		Apsmidzināt zemeņu stādījumus, sākot ar lapu stadiju līdz ziedkopu attīstības fāzes beigām (AS 12-59) vai pēc ražas novākšanas	30	1
Kartupeļi	Labības – sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.0-2.0		Apsmidzināt kartupeļu stādījumus pēc kartupeļu sadīgšanas līdz lakstu saskaršanās vagās sākumam (AS 12-31)	56	1
Burkāni	Labības – sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.0-2.0		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju, līdz burkāni sasnieguši 50 % no sakņu raksturīgā diametra (AS 12-45)	40	1
Sīpoli, ķiploki, šalotes sīpoli	Labības – sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.0-2.0		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju, līdz sīpoli sasnieguši 50 % no bumbuļu raksturīgā diametra (AS 12-45)	56	1
Galviņkāposti, Briseles kāposti, Savojas kāposti	Labības – sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.0-2.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz kultūraugu galviņu attīstības sākumam (AS 12-41)	28	1
Pupas (svaigam patēriņam un graudiem)	Labības – sārņaugi, īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai (AS 12-19)	30	1
Zirņi (graudiem)	Labības – sārņaugi, īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz sāndzinumu attīstības beigām (AS 12-29)	56	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Labības – sārņaugi, īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz ziedpumpuru veidošanās sākumam (AS 12-50)	90	1
Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes	Labības – sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.0-2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju, līdz lapas nosedz 30% no augsnes virskārtas rindās (AS 12-33)	56	1
Lini	Labības – sārņaugi, īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar otro lapu pāri, līdz augi sasnieguši 20 cm garumu	70	1

37. Chwastox 750 SL

Reģ. Nr. 0376, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: MCPA, 750 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

MCPA Classic 750 SL

Reģ. Nr. 0532, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: MCPA, 750 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A.

Profi MCPA 750 SL

Reģ. Nr. 0531, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: MCPA, 750 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, ziemas tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai līdz kultūrauga cerošanas beigām (AS 29)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, vasaras tritikāle, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.75		Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas sākuma līdz cerošanas beigām (AS 20-29)		

38. Clamox

Reģ. Nr. 0496, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: metazahlors, 375 g/l,
imazamokss, 17.5 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
SIA BASF

Ziemas rapsis*, vasaras rapsis*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, labības sārņaugi	1.5-2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz 8 lapu stadijai (AS 10-18)	-	1

*Clearfield ziemas rapsis un vasaras rapsis

39. Clap

Reģ. Nr. 0728, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: klopiralīds, 300 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Sharda Cropchem España S.L.

Ziemas rapsis	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.4		Apsmidzināt sējumus, pavasarī no rapša stublāja veidošanās sākuma līdz zaļo pumpuru stadijai (AS 31-51)	-	1

1	2	3	4	5	6	7

40. Clap Forte

Reģ. Nr. 0643, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: klopiralīds, 720 g/kg.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām
Sharda Europe b.v.b.a.

Ziemas rapsis	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.165		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atjaunojoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stublāja pagarināšanās sākumu līdz zaļo pumpuru stadijai (AS 30-51)	-	1
Vasaras rapsis	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.165		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz zaļo pumpuru stadijai (AS 12-51)	-	1

41. Cleave

Reģ. Nr. 0542, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: florasulams, 2.5 g/l,
fluroksipirs, 100 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
ADAMA Registrations B.V.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Mixin

Reģ. Nr. 0658, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: florasulams, 2.5 g/l,
fluroksipirs, 100 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, rudzi	Īsmūža un atsevišķas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.0-1.2		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz kultūrauga karoglapas maksts piebriedusi (AS 45)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras tritikāle, vasaras mieži, auzas	Īsmūža un atsevišķas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz kultūrauga karoglapas maksts piebriedusi (AS 20-45)	-	1
Stiebrzāles (sēklai un lopbarībai), ganības (zelmenī stiebrzāles)	Īsmūža un atsevišķas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.5-1.8		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz kultūrauga karoglapas maksts piebriedusi (AS 45)	7	1

42. Clentiga

Reģ. Nr. 0842, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: imazamokss, 12.5 g/l,
kvinmeraks, 250 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
SIA BASF

Ziemas rapsis*, ziemas ripsis*/**	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi	1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga dīgļlapu atvēršanās stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1
		1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga stublāja pagarināšanās stadiju līdz ziedpumpuru veidošanās sākumam (AS 30-50). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu		

1	2	3	4	5	6	7

Vasaras rapsis*, vasaras ripsis*/**	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga dīgļlapu atvēšanās stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1

*Clearfield ziemas rapsis, ziemas ripsis, vasaras rapsis, vasaras ripsis

****Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

43. Cleravo

Reģ. Nr. 0572, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: imazamokss, 35 g/l,
kvinmeraks, 250 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
SIA BASF

Ziemas rapsis*, ziemas ripsis*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, labības sārņaugi, dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.7		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga dīgļlapu atvēršanās stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1
		1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stublāja pagarināšanās sākumu līdz ziedpumpuru veidošanās sākumam (AS 30-50). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu		
Vasaras rapsis*, vasaras ripsis*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.7		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga dīgļlapu atvēšanos līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1

*Clearfield ziemas rapsis, vasaras rapsis un vasaras ripsis

44. Cleravo Flex

Reģ. Nr. 0792, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: kvinmeraks, 125 g/l,
imazamokss, 12.5 g/l,
aminopiralīds, 4 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
SIA BASF

Ziemas rapsis*, ziemas ripsis*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi, dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.4-2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga dīgļlapu atvēršanos līdz sešu lapu stadijai (AS 10-16)	-	1
	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stublāja pagarināšanās stadiju līdz trīs starpmezglu posmu stadijai (AS 30-33)		
Vasaras rapsis*, vasaras ripsis*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.4-2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga dīgļlapu atvēršanos līdz sešu lapu stadijai (AS 10-16)	-	1

*Clearfield ziemas rapsis, ziemas ripsis, vasaras rapsis un vasaras ripsis

Herbicīdi

1	2	3	4	5	6	7

45. Cliophar 600 SL

Reģ. Nr. 0665, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: klopiralīds, 600 g/l.
Selektīvs, augsnes iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Arysta LifeScience Benelux Sprl

Cukurbietes, lopbarības bietes	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt sējumos tikai daļu no rindstarpas platuma, kur apsmidzināmais joslas platums ir 12.5 cm un kopējais rindstarpas platums ir 50 cm, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai (AS 12-19)	-	1
Galda bietes	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt sējumos tikai daļu no rindstarpas platuma, kur apsmidzināmais joslas platums ir 12.5 cm un kopējais rindstarpas platums ir 50 cm, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai (AS 12-19)	42	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis, ziemas ripsis, vasaras ripsis	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stublāja pagarināšanās sākumu līdz ziedpumpuru veidošanās sākumam (AS 30-50)	-	1
Lini	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.135		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebra veidošanās fāzes beigām līdz pumpurošanās sākumam (AS 40-51)	-	1
Galviņkāposti, Savojas kāposti, ziedkāposti	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt stādījumā tikai daļu no rindstarpas platuma, kur apsmidzināmais joslas platums ir puse no kopējā rindstarpas platuma, 2-3 nedēļas pēc kultūrauga iesakņošanās, kad daudzgadīgās nezāles ir rozetes stadijā – laika posmā no aprīļa līdz jūnijam (ieskaitot)	42	1
Stiebrzāles (sēklai, ražas gadā)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt sējumus no stiebrzāļu cerošanas sākuma līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 21-37), arī maisījumā ar piemērotu preparātu	-	1
Ganības	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt ganības nezāļu aktīvas augšanas fāzē, kad ierobežojamās nezāles sasniegušas 15-20 cm (rozetes stadija)	7	1
Zemenes*	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt stādījumā tikai daļu no rindstarpas platuma, kur apsmidzināmais joslas platums ir puse no kopējā rindstarpas platuma, pēc kultūrauga ražas novākšanas, kad usnes ir 15-20 cm garas – laika posmā no jūnija līdz jūlijam (ieskaitot)	-	1
Egles*, baltegles* (kokaudzētavās)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt stādījumus, kad stādi iesakņojušies un apkarojamās nezāles ir 10-20 cm garas – laika posmā no aprīļa līdz jūnijam (ieskaitot)	-	1
Egles*, baltegles* (kokaudzētavās)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.1		Apsmidzināt stādījumus jūlijā, kad stādi iesakņojušies un apkarojamās nezāles ir 10-20 cm garas	-	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

46. Clomate

Reģ. Nr. 0732, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: klomazons, 360 g/l.
Selektīvs, augsnes iedarbība, augi uzņem caur saknēm un dīgstiem.
Albaugh TKI d.o.o.

<u>Analogie augu aizsardzības līdzekļi:</u>

Clematis

Reģ. Nr. 0753, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: klomazons, 360 g/l.
Selektīvs, augsnes iedarbība, augi uzņem caur saknēm un dīgstiem.
Albaugh TKI d.o.o.

Ziemas rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.25		Apsmidzināt sējumus ne vēlāk kā 5 dienas pirms rapša un nezāļu sadīgšanas	-	1
Spināti* (sēklai)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.25		Apsmidzināt sējumus ne vēlāk kā 3-5 dienas pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas	-	1
Redīsi* (sēklai)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt sējumus ne vēlāk kā 3 dienas pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas	-	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

47. Conaxis

Reģ. Nr. 0773, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: dimetēnamīds-P, 400 g/l,
klomazons, 50 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām, saknēm un dīgstiem.
SIA BASF

Ziemas rapsis	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0-1.25		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas pirms tā sadīgšanas (AS 00-09)	-	1
Vasaras rapsis	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.25		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas pirms tā sadīgšanas (AS 00-09)	-	1
Soja*	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0-1.5		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas pirms tā sadīgšanas (AS 00-09)	-	1
Zirņi, pupas (zaļie ar / bez pākstīm, graudiem)	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0-1.5		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas pirms tā sadīgšanas (AS 00-09)	-	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

48. Corum

Reģ. Nr. 0729, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: imazamokss, 22.4 g/l,
bentazons, 480 g/l.
Selektīvs, sistēmas un pieskares iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
SIA BASF

Zirņi (svaigam patēriņam ar/ bez pākstīm, graudiem), lauka pupas, lēcas*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.625-1.25		<u>1. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai (AS 12-19). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1
		0.625		<u>2. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai (AS 12-19). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	2
Dārza pupiņas (svaigam patēriņam ar/ bez pākstīm, graudiem), soja*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.625-1.25		<u>1. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz izveidojušies pieci sāndzinumi (AS 12-25). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1
		0.625		<u>2. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot kultūrauga ar divu lapu stadiju, līdz izveidojušies pieci sāndzinumi (AS 12-25). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	2

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

49. Credit Xtreme

Reģ. Nr. 0801, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 540 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.
Nufarm GmbH & Co KG

Pirms kultūraugu sējas vai stādīšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi	2.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas	-	1
Pirms kukurūzas un cukurbiešu sadīgšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi	1.2-2.0		Apsmidzināt nezāles pēc kultūrauga sējas pirms tā sadīgšanas, ne vēlāk ka 5 dienas pēc sējas	-	1
Zirņi, soja (pirms ražas novākšanas)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-2.66		Apsmidzināt sējumus pirms ražas novākšanas, kad kultūraugi sasnieguši 85-87 % gatavību un mitruma saturs sēklās ir zemāks par 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Tīrumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi	2.0-4.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas	-	1
Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-3.5		Apsmidzināt stādījumus nezāļu aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas, aizsargājot koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus. Smidzināt drīkst apdobes augļu kokiem, kuri nav jaunāki par 3-4 gadiem	-	1
Ganību, zālāju atjaunošana	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-2.67		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ataugušas pēc noganīšanas vai nopļaušanas	-	1
Papuves	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-3.33		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas	-	1
Mežā pirms stādījumu ierīkošanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā	-	1
Skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt stādījumu veģetācijas periodā (maijs-septembris), kad nezāles ir aktīvi augošas, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus	-	1
Skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt stādījumu vienlaidus smidzinājumā, pavasarī kociņu miera periodā, kad skuju koki vēl nav atsākuši augšanu, vai rudenī, kad dzinumi ir pilnīgi nobrieduši (pārkoksnējušies), un kociņiem iestājies miera periods	-	1
Kokaudzētavas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-3.5		Apsmidzināt stādījumu veģetācijas periodā (maijs-septembris) starp rindām, kad nezāles ir aktīvi augošas, aizsargājot jaunos kociņus	-	1
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības/ industriālās teritorijas (elektropārvades līnijas, naftas cauruļvadi, gāzes maģistrāles, ceļmalas, dzelzceļi)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.33-4.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas	-	1

50. Devrinols s.k.

Reģ. Nr. 0252, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: napropamīds, 450 g/l.
Selektīvs, augsnes iedarbība, augi uzņem caur saknēm.
UPL Holdings Coöperatief U.A.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt augsni pirms kultūrauga sējas. Iestrādāt augsnē 2-3 cm dziļumā 30 minūšu laikā pēc izsmidzināšanas	-	1
Galviņkāposti*, ziedkāposti*, brokoļi*, Briseles kāposti*, Ķīnas kāposti*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt augsni pirms kultūrauga izstādīšanas. Iestrādāt augsnē 2-3 cm dziļumā 30 minūšu laikā pēc izsmidzināšanas	-	1

1	2	3	4	5	6	7
Upenes*, jāņogas*, ērkšķogas*, avenes*, krūmmellenes*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	5.0-7.0		Apsmidzināt apdobes agri pavasarī pirms nezāļu dīgšanas	-	1
Ābeles*, bumbieres*, plūmes*, ķirši*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	5.0-7.0		Apsmidzināt apdobes agri pavasarī pirms nezāļu dīgšanas	-	1
Zemenes*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt agri pavasarī pirms nezāļu dīgšanas	-	1
Zirņi*, pupas*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt augsni pirms kultūrauga sējas. Iestrādāt augsnē 2-3 cm dziļumā 30 minūšu laikā pēc izsmidzināšanas	-	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

51. Dicash

Reģ. Nr. 0597, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: dikamba, 480 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Sharda Europe b.v.b.a.

Kukurūza	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.6		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz piecu lapu stadijai (AS 13-15)	-	1

52. Dicoherb Super 750 SL

Reģ. Nr. 0390, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: MCPA, 660 g/l,
dikamba, 90 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, rudzi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0-1.25		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz kultūraugu cerošanas fāzes beigām (AS 29)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0-1.25		Apsmidzināt sējumus sākot no kultūrauga 3 lapu stadijas līdz cerošanas fāzes beigām (AS 13-29)	-	1

53. Diflanil 500 SC

Reģ. Nr. 0530, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: diflufenikans, 500 g/l.
Selektīvs, pieskares iedarbība un augsnes herbicīds.
Globachem n.v.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle, rudzi, speltas kvieši	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.125-0.25		Apsmidzināt sējumus rudenī pēc kultūrauga sadīgšanas vai pavasarī atsākoties veģetācijai līdz graudaugu cerošanas beigām (AS 11-29)	-	1

54. DMA 600

Reģ. Nr. 0559, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: 2,4-D, 600 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Corteva Agriscience Denmark A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle, rudzi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5-0.75		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 20-29)	-	1
		1.25		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)		
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 20-29)	-	1
		0.75-1.25		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20-32)		

55. Dominator 480

Reģ. Nr. 0810, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 480 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.
Albaugh TKI d.o.o.

Zirņi pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5-2.25		Apsmidzināt sējumus aptuveni 2 nedēļas pirms ražas novākšanas, kad 75 % no pākstīm brūnas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Pupas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5-2.25		Apsmidzināt sējumus aptuveni 2 nedēļas pirms ražas novākšanas, kad 2/3-3/4 no pākstīm brūnas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Tīrumu apstrāde pirms kultūraugu sējas vai stādīšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	0.75-1.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 6.0 l/ha	-	1-2
	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	2.25-3.0				
Tīrumu apstrāde pēc ražas novākšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.125-1.5		Apsmidzināt nezāles pēc to ataugšanas, kad vārpatai ir 3-6 lapas. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 6.0 l/ha	-	1-2
	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	2.25-3.0				
Tīrumu apstrāde pēc sējas, bet pirms kultūraugu dīgšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.125		Apsmidzināt augošas nezāles / labības -sārņaugus vienu dienu pēc kultūrauga sējas. Kultūrauga sēklām jābūt pilnība nosegtām ar augsni	-	1
	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	2.25-3.0				
Tīrumu apstrāde pēc zālāju sēklu novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.25-4.5		Apsmidzināt nezāles pēc to ataugšanas, vārpatai ir 3-6 lapas. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 6.0 l/ha	-	1-2

1	2	3	4	5	6	7
Papuves	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.25-4.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad vārpatai ir 3-6 lapas. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 6.0 l/ha	-	1-2
Ābeles, bumbieres	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5-3.875		Apsmidzināt stādījumus nezāļu aktīvas augšanas periodā, pavasarī pirms zaļā konusa stadijas vai pēc ražas novākšanas, aizsargājot koku lapotni un stumbrus. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 6.0 l/ha	-	1-3
Ķirši, plūmes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5-3.875		Apsmidzināt stādījumus nezāļu aktīvas augšanas periodā, pavasarī pirms plūmju un ķiršu ziedpumpuru atvēršanās vai pēc ražas novākšanas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu atvases. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 6.0 l/ha	-	1-3
Skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5-2.25		Apsmidzināt stādījumus rudenī, kad koku dzinumi pilnībā nobrieduši. Apsmidzināt aktīvi augošas nezāles, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 6.0 l/ha	-	1-3
Lauksaimniecībā neizmantojamās platībās/ industriālās teritorijās (elektropārvades līnijas, naftas cauruļvadi, gāzes maģistrāles, ceļmalas, dzelzceļi)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.25-4.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 6.0 l/ha	-	1-2
Celmu apstrāde	Lietošanas mērķis-atvašu augšanas novēršana pēc nociršanas	-	20	Apstrādāt celmus uzreiz pēc krūmu vai koku nociršanas. Apstrāde veicama laikā, kad koku sulas kustība ir virzienā uz saknēm, parasti no oktobra līdz februāra beigām	-	1
Kultūraugu sējumi un stādījumi, skuju koku jaunie stādījumi, lauksaimniecībā neizmantojamās platības/ industriālās teritorijas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.15 l preparāta 0.8 l ūdens	15%	Apstrādāt ar aplikatoru atsevišķas nezāles. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz kultūrauga	-	1

1	2	3	4	5	6	7

56. Duplosan Super

Reģ. Nr. 0084, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: dihlorprops-P, 310 g/l,
mekoprops-P, 130 g/l,
MCPA, 160 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Divdīgļlapju nezāles	2.5		Apsmidzināt sējumus pavasarī, nezāļu dīgļlapu līdz 2-4 īsto lapu stadijai	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas	Divdīgļlapju nezāles	1.5-2.0		Apsmidzināt sējumus nezāļu dīgļlapu līdz 2-4 īsto lapu stadijai	-	1

57. Elegant 2FD

Reģ. Nr. 0478, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: florasulams, 6.25 g/l,
2,4-D, 300 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.5-0.6		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu 2 mezglu stadijai (AS 32)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža divdīgļlapju un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.4		Apsmidzināt sējumus sākot ar graudaugu divu lapu stadiju līdz 2 mezglu stadijai (AS 12-32)	-	1

58. Elipris

Reģ. Nr. 0837, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: diflufenikans, 180 g/l,
flufenacets, 240 g/l,
metil-halauksifēns, 11.7 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība augi uzņem caur lapām un dīgstiem.
Corteva Agriscience Denmark A/S

Ziemas kvieši	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.25		Apsmidzināt sējumus rudenī pēc sējas līdz kultūrauga pirmās lapas parādīšanas stadijai (AS 00-10)	-	1

59. Elumis 105 OD

Reģ. Nr. 0573, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: mezotrions, 75 g/l,
nikosulfurons, 30 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Kukurūza	Viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 12-18)	-	1

1	2	3	4	5	6	7

60. EMCEE

Reģ. Nr. 0712, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: MCPA 750 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Sharda Cropchem España S.L.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, ziemas tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga pirmā mezgla stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 31-39)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz divu mezglu stadijai (AS 13-32)	-	1

61. Ergon

Reģ. Nr. 0357, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: metil-metsulfurons, 68 g/kg,
metil-tifensulfurons, 628 g/kg.
Sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm.
Albaugh TKI d.o.o.

Ziemas kvieši	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.015		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai līdz graudaugu pirmā mezgla stadijai (AS 31). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.010		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 3 lapu stadiju līdz pirmā mezgla stadijai (AS 13-31). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1

62. Estet 600 EC

Reģ. Nr. 0305, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: 2,4-D, 600 g/l, (905 g/l 2,4-D 2-etilheksil estera formā).
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, ziemas rudzi, tritikāle	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.5-1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī veģetācijai atjaunojoties līdz divu mezglu stadijai (AS 32)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.5-1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot no graudauga 4 lapu stadijas līdz divu mezglu stadijai (AS 14-32)	-	1
Kukurūza	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.5		Apsmidzināt sējumus, sākot no kukurūzas 2 lapu stadijas līdz 6 lapu stadijai (AS 12-16)	-	1
Daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.0-2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas sākuma līdz karoglapas maksts paplašināšanās stadijai (AS 21-41)	-	1
Ganības, pļavas (bez tauriņziežiem)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.0-2.0		Pavasarī, no kultūraugu cerošanas līdz karoglapas maksts paplašināšanās stadijai (AS 21-41), daudzgadīgās nezāles agrīnā attīstības stadijā vai tām izveidojusies lapu rozete	28	1

1	2	3	4	5	6	7

61. Fenix

Reģ. Nr. 0283, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: aklonifēns, 600 g/l.
Selektīvs, pieskares iedarbība, augi dīgstot uzņem caur hipokotilu, koleoptili un dīgļlapām.
Bayer AG

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Eclaire[1]

Reģ. Nr. 0838, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: aklonifēns, 600 g/l.
Selektīvs, pieskares iedarbība, augi dīgstot uzņem caur hipokotilu, koleoptili un dīgļlapām.
Sharda Cropchem España S.L.

Clever[1]

Reģ. Nr. 0853, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: aklonifēns, 600 g/l.
Selektīvs, pieskares iedarbība, augi dīgstot uzņem caur hipokotilu, koleoptili un dīgļlapām.
Sharda Cropchem España S.L.

Kartupeļi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.5-3.0		Apsmidzināt stādījumu vismaz vienu nedēļu pirms kartupeļu sadīgšanas, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai	-	1
Zirņi, lauka pupas (graudiem)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	3.0		Apsmidzināt sējumu vismaz vienu nedēļu pirms kultūrauga sadīgšanas, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai	75	1
Burkāni, pastinaki	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.5		1. lietošanas veids Apsmidzināt sējumu pirms kultūrauga sadīgšanas, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai	70	1
		1.5+1.0		2. lietošanas veids 1.reizi apsmidzināt sējumu pirms kultūrauga sadīgšanas, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai; 2.reizi – kultūrauga 2 lapu stadijā, dīgstot jaunām nezālēm	70	2
Sīpoli	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.5		1. lietošanas veids Apsmidzināt stādījumu pirms sīpolu sadīgšanas, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai	90	1
		1.5+1.0		2. lietošanas veids 1.reizi apsmidzināt stādījumu pirms sīpolu sadīgšanas, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai; 2.reizi – sīpolu 1-2 lapu stadijā, dīgstot jaunām nezālēm	90	2
Ķiploki	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.5		1. lietošanas veids Apsmidzināt stādījumu pirms ķiploku sadīgšanas, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai	130	1
		1.5+1.0		2. lietošanas veids 1.reizi apsmidzināt stādījumu pirms ķiploku sadīgšanas, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai; 2.reizi –ķiploku 1-2 lapu stadijā, dīgstot jaunām nezālēm	130	2
Ķimenes	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.5		Apsmidzināt sējumu pirms kultūrauga sadīgšanas, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai	-	1

1	2	3	4	5	6	7
Dilles	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.5-3.0		Apsmidzināt sējumu pirms kultūrauga sadīgšanas, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai	50	1
Saulespuķes	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.5-3.0		Apsmidzināt sējumu vismaz vienu nedēļu pirms kultūrauga sadīgšanas, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai	-	1
Egles, priedes, Ziemassvētku eglītes, lapegles (kokaudzētavās)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.0-3.0		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus agri pavasarī, kad vēl nav sākusies jauno dzinumu augšana, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai	-	1
Kārkli (stādījumi)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.5-2.5		Apsmidzināt pēc iestādīšanas, pirms sākusies jauno dzinumu augšana	-	1

[1]Analogs augu aizsardzības līdzeklim Fenix, jo beidzies datu aizsardzības periods.

64. Flight Forte

Reģ. Nr. 0293, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: pendimetalīns, 320 g/l,
pikolinafēns, 16 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
SIA BASF

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5-2.5		Apsmidzināt sējumus rudenī, kultūrauga 1-3 lapu stadijā (AS 11-13), kad nezāles ir dīgļlapu līdz pirmo īsto lapu stadijā	-	1

65. Flurostar 180

Reģ. Nr. 0644, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: fluroksipirs, 180 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Globachem n.v.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, rudzi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.6-0.8		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar trīs sāndzinumu stadiju, līdz kultūrauga karoglapas maksts piebriedusi (AS 23-45)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, vasaras tritikāle, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.46-0.60		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 13-39)	-	1
Daudzgadīgās stiebrzāles (sēklai un lopbarībai), ganības (zelmenī stiebrzāles), zāliens	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.6-0.8		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar trīs sāndzinumu stadiju, līdz kultūrauga karoglapas maksts piebriedusi (AS 23-45)	7	1
Stiebrzāles sēklai (sējas gadā), ganības (sējas gadā, zelmenī stiebrzāles), zāliens	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.46-0.60		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 13-39)	7	1

1	2	3	4	5	6	7

66. Flurostar Forte

Reģ. Nr. 0874, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: fluroksipirs, 400 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Globachem N.V.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, rudzi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.3		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga sāndzinumu veidošanās sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, vasaras tritikāle, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.3		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga sāndzinumu veidošanās sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39)	-	1
Kukurūza	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.15		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz sešu lapu stadijai (AS 13-16)	-	1
Daudzgadīgās stiebrzāles (sējas gadā), ganības (sējas gadā, zelmenī stiebrzāles)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.3		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga sāndzinumu veidošanās sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39)	7	1
Daudzgadīgās stiebrzāles (sēklai, lopbarībai), ganības (zelmenī stiebrzāles)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.75		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga sāndzinumu veidošanās sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39)	7	1

67. Flyer

Reģ. Nr. 0818, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: florasulams, 50 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Sharda Cropchem España S.L.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.10-0.15		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 21-39)	-	1
Vasaras mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.1		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 13-39)	-	1

68. Focus Ultra

Reģ. Nr. 0065, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: cikloksidims, 100 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
SIA BASF

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas rapsis, vasaras rapsis, vasaras ripsis*	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz izveidojušie divi starpmezglu posmi (AS 12-32), kad nezāles un labības - sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha	-	1
	Ložņu vārpata *(Elymus repens)*	2.0-5.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz izveidojušie divi starpmezglu posmi (AS 12-32), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)		
Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes, mārrutki*, pastinaki*, selerijas* (sakņu), kāļi*, rāceņi*, turnepši*	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi	1.0-2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz lapas sedz 30 % no augsnes starprindās (AS 12-33), kad nezāles un labības -sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha	35	1
	Ložņu vārpata *(Elymus repens)*	2.0-5.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz lapas sedz 30 % no augsnes starprindās (AS 12-33), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)		
Zirņi (graudi), pupas (graudi)	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz izveidojušies deviņi stublāju posmi (AS 12-39), kad nezāles un labības -sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha	56	1
	Ložņu vārpata *(Elymus repens)*	2.0-5.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz izveidojušie deviņi stublāju posmi (AS 12-39), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)		
Zirņi (zaļi, ar vai bez pākstīm)	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz izveidojušies deviņi stublāju posmi (AS 12-39), kad nezāles un labības -sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha	35	1
	Ložņu vārpata *(Elymus repens)*	2.0-5.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz izveidojušie deviņi stublāju posmi (AS 12-39), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)		
Pupas (zaļas, ar vai bez pākstīm)	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz izveidojušies deviņi stublāju posmi (AS 12-39), kad nezāles un labības -sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha	28	1
	Ložņu vārpata *(Elymus repens)*	2.0-5.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz izveidojušie deviņi stublāju posmi (AS 12-39), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)		
Ziedkāposti, galviņkāposti, Savojas kāposti,	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-2.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju, līdz sāk veidoties galviņa (AS 13-41), kad nezāles un labības - sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha	28	1
	Ložņu vārpata *(Elymus repens)*	2.0-5.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju, līdz sāk veidoties galviņa (AS 13-41), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)		
Briseles kāposti	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-2.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz sāk veidoties galviņas (AS 12-41), kad nezāles un labības - sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha	56	1
	Ložņu vārpata *(Elymus repens)*	2.0-5.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz sāk veidoties galviņas (AS 12-41), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)		
Burkāni	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz sakne sasniegusi 50 % no raksturīgā lieluma (AS 12-45), kad nezāles un labības - sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha	35	1
	Ložņu vārpata *(Elymus repens)*	2.0-5.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz sakne sasniegusi 50 % no raksturīgā lieluma (AS 12-45), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)		
Sīpoli, ķiploki*	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-2.0		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz sīpols sasniedzis 50 % no raksturīgā lieluma (AS 12-45), kad nezāles un labības - sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha	28	1
	Ložņu vārpata *(Elymus repens)*	2.0-5.0		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz sīpols sasniedzis 50 % no raksturīgā lieluma (AS 12-45), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)		

1	2	3	4	5	6	7
Puravi	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-2.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz stublājs sasniedzis 50 % no raksturīgā lieluma (AS 12-45), kad nezāles un labības - sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha	42	1
	Ložņu vārpata *(Elymus repens)*	2.0-5.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz stublājs sasniedzis 50 % no raksturīgā lieluma (AS 12-45), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)		
Āboliņš, lucerna (sēklai)	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz ziedpumpuru attīstībai (AS 12-51), kad nezāles un labības - sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha	-	1
	Ložņu vārpata *(Elymus repens)*	2.0-5.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz ziedpumpuru attīstībai (AS 12-51), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)		
Sarkanā auzene (sēklai)	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga četru lapu stadiju līdz piecu mezglu attīstībai (AS 14-35), kad nezāles un labības - sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha	-	1
	Ložņu vārpata *(Elymus repens)*	2.0-5.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga četru lapu stadiju līdz piecu mezglu attīstībai (AS 14-35), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)		
Lini	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz stiebra veidošanās sākumam (AS 12-31), kad nezāles un labības - sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha	-	1
	Ložņu vārpata *(Elymus repens)*	2.0-5.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz stiebra veidošanās sākumam (AS 12-31), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)		
Kartupeļi	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-2.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga sadīgšanu līdz augu saskaršanās vagā sākumam (AS 11-31), kad nezāles un labības - sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha	56	1
	Ložņu vārpata *(Elymus repens)*	2.0-5.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga sadīgšanu līdz augu saskaršanās vagā sākumam (AS 11-31), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)		
Zemenes	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-2.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu līdz sešu lapu stadijai (AS 11-16), kad nezāles un labības - sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha	42	1
	Ložņu vārpata *(Elymus repens)*	2.0-5.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu līdz sešu lapu stadijai (AS 11-16), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)		
Ķīnas kāposti, lapu kāposti	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-2.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju, līdz lapu rozete sasniegusi 30 % šķirnei raksturīgā diametra (AS 13-33), kad nezāles un labības - sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha	42	1
	Ložņu vārpata *(Elymus repens)*	2.0-5.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju, līdz lapu rozete sasniegusi 30 % šķirnei raksturīgā diametra (AS 13-33), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)		
Dekoratīvie koki, krūmi, (stādaudzētavā, stādījumos), krāšņumaugi*	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-2.0		Apsmidzināt stādījumus, kad nezāles un labības -sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha	-	1
	Ložņu vārpata *(Elymus repens)*	2.0-5.0		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)		
Pētersīļi* (lapu), selerijas* (kātu, lapu)	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-2.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai (AS 13-19), kad nezāles un labības -sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha	28	1
	Ložņu vārpata *(Elymus repens)*	2.0-5.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai (AS 13-19), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)		
Salāti*	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-2.0		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju, līdz izveidojusies lapu masa 50 % no sagaidāmās lapu masas lieluma (AS 12-45), kad nezāles un labības - sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha	28	1
	Ložņu vārpata *(Elymus repens)*	2.0-5.0		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju izveidojusies lapu masa 50 % no sagaidāmās lapu masas lieluma (AS 12-45), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)		
Ābeles, bumbieres	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-2.0		Apsmidzināt stādījumu apdobes veģetācijas periodā, kad nezāles un labības - sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha	28	1
	Ložņu vārpata *(Elymus repens)*	2.0-5.0		Apsmidzināt stādījumu apdobes veģetācijas periodā, kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)		

1	2	3	4	5	6	7
Upenes*, jāņogas*, ērkšķogas*, avenes*, krūmmellenes*	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-2.0		Apsmidzināt stādījumus pēc ražas novākšanas, pa sadīgušām nezālēm, to 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha	-	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles, ložņu vārpata (*Elymus repens)*	1.5-3.0		<u>1. lietošanas veids</u> Apsmidzināt stādījumus pēc ražas novākšanas, sākot ar daudzgadīgo nezāļu 3-5 lapu stadiju. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha	-	1
		1.0-1.5		<u>2. lietošanas veids</u> Apsmidzināt stādījumus pēc ražas novākšanas, sākot ar daudzgadīgo nezāļu 3-5 lapu stadiju, atkārtoti, kad nezāles ataugušas. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha	-	2

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

69. Fox 480 SC

Reģ. Nr. 0375, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: bifenokss, 480 g/l.
Pieskares iedarbības herbicīds.
ADAMA Registrations B.V.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.75-1.0		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no rapša 3 lapu stadijas līdz 6 lapu stadijai (AS 13-16)	-	1
		0.5		<u>2. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no rapša 3 lapu stadijas līdz 6 lapu stadijai (AS 13-16), nezāļu dīgļlapu līdz divu īsto lapu stadijā. Atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām	-	2

70. Foxtrot 69 EW

Reģ. Nr. 0408, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-fenoksprops-P, 69 g/l.
Selektīvs pieskares un sistēmas iedarbības herbicīds.
FMC Agricultural Solutions A/S

Ziemas kvieši, rudzi, tritikāle	Parastā rudzusmilga, vējauza un citas īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.0-1.2		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu divu mezglu stadijai (AS 32), nezāļu 2 lapu stadijā līdz cerošanas fāzes beigām	-	1
Ziemas mieži	Parastā rudzusmilga, vējauza un citas īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu divu mezglu stadijai (AS 32), nezāļu 2 lapu stadijā līdz cerošanas fāzes beigām	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Parastā rudzusmilga, vējauza un citas īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu divu lapu stadijas līdz graudaugu divu mezglu stadijai (AS 12-32), nezāļu 2 lapu stadijā līdz cerošanas fāzes beigām	-	1

71. Frequent

Reģ. Nr. 0691, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: butil-fluazifops-P, 125 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Sharda Cropchem España S.L.

Ziemas rapsis	Labības-sārņaugi, īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz stublāja pagarināšanās sākumam (AS 12-30)	90	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	3.0				
Pupas, zirņi (graudiem)	Labības-sārņaugi, īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu līdz stublāja pagarināšanās sākumam (AS 11-30)	90	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	2.5				
Pupas (svaigam patēriņam ar/ bez pākstīm), zirņi (svaigam patēriņam ar/ bez pākstīm)	Labības-sārņaugi, īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu līdz stublāja pagarināšanās sākumam (AS 11-30)	45	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	2.5				

72. Fusilade Forte 150 EC

Reģ. Nr. 0182, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: butil-fluazifops-P, 150 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Nufarm GmbH & Co KG

<u>**Analogie augu aizsardzības līdzekļi:**</u>

Fortune[1]
Reģ. Nr. 0776, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: butil-fluazifops-P, 150 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Sharda Cropchem España S.L.

Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5		Apsmidzināt apdobes veģetācijas periodā, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas	28	1
Krūmcidonijas*, smiltsērkšķi*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5		Apsmidzināt apdobes pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas	-	1
Upenes, jāņogas, ērkšķogas, krūmmellenes*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5		Apsmidzināt apdobes pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas	90	1
Dzērvenes*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-1.25		Apsmidzināt apdobes pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas	90	1
Avenes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5		Apsmidzināt apdobes pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas	56	1
Zemenes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5		Apsmidzināt stādījumus pirms zemeņu ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas	42	1

1	2	3	4	5	6	7
Kartupeļi	Labības-sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-1.6		Apsmidzināt stādījumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, līdz augu sakļaušanās vagās sākumam (AS 08-31)	90	1
Burkāni, galda bietes, mārrutki, rāceņi, kāļi, rutki, selerijas (sakņu), pētersīļi (sakņu), pastinaki	Labības-sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-1.6		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz saknes veidošanās sākumam (AS 12-41)	49	1
Cigoriņi* (sakņu)	Labības-sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-1.6		Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz saknes veidošanās sākumam (AS 12-41)	56	1
Sīpoli, ķiploki, šalotes sīpoli	Labības-sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz sīpola veidošanās sākumam (AS 12-41)	28	1
Salāti, selerijas (kātu), pētersīļi (lapu)	Labības-sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-1.25		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 12-18)	42	1
Pupas (graudiem)	Labības-sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-1.25		Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz stublāja pagarināšanās sākumam (AS 12-30)	90	1
Zirņi (svaigam patēriņam ar pākstīm), pupas (svaigam patēriņam ar pākstīm)	Labības-sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.0		Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz stublāja pagarināšanās sākumam (AS 12-30)	28	1
Sparģeļi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-1.25		Apsmidzināt stādījumus pēc ražas novākšanas, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas	-	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Labības-sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5		Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz stublāja pagarināšanās fāzes sākumam (AS 12-30)	90	1
Zirņi (graudiem), lupīna (graudiem), soja*	Labības-sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.0		Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz stublāja pagarināšanās sākumam (AS 12-30)	90	1

1	2	3	4	5	6	7
Lini	Labības-sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.0		Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga otrā lapu pāra stadiju līdz stiebra veidošanās sākumam (AS 12-31)	90	1
Cukurbietes, lopbarības bietes	Labības-sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5		Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz augu sakļaušanās vagās sākumam (AS 12-31)	56	1
Lapu koki, skuju koki kokaudzētavās un jaunaudzēs	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5		Apsmidzināt apdobes veģetācijas periodā, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas	-	1
Dekoratīvie koki, dekoratīvie krūmi, krāšņumaugi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5		Apsmidzināt veģetācijas periodā, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas	-	1
Sarkanais āboliņš*, baltais āboliņš*, bastarda āboliņš*, sarkanā auzene* (sēklai)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-1.5		Apsmidzināt veģetācijas periodā, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas	-	1
Griķi*	Labības-sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-1.6		Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 -4 lapu stadijā (AS 12-14)	90	1
Ķimenes* (sējas gadā)	Labības-sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-1.6		Apsmidzināt sējumus sējas gadā, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas	-	1
Papuves	Labības-sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6-2.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad īsmūža nezālēm ir 2-3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2-4 lapas un tās ir 10-15 cm garas	-	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.
[1]Analogs augu aizsardzības līdzeklim Fusilade Forte 150 EC, jo beidzies datu aizsardzības periods.

1	2	3	4	5	6	7

73. Galera

Reģ. Nr. 0313, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: klopiralīds, 267 g/l,
piklorams, 67 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Corteva Agriscience Denmark A/S

Ziemas rapsis	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.3		Apsmidzināt sējumus pavasarī pēc veģetācijas atjaunošanās, sākot ar stublāja pagarināšanās sākumu līdz ziedpumpuru veidošanās sākumam (AS 30-50)	-	1

74. Gallup 360-K

Reģ. Nr. 0799, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.
Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

Burkāni, sīpoli pirms sadīgšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.5-3.0		Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga sadīgšanas 48 stundu laikā pēc sējas. Kultūrauga sēklām jābūt nosegtām ar vismaz 15 mm biezu augsnes kārtu	-	1
Kartupeļi pirms sadīgšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-3.0		Apsmidzināt stādījumus pēc stādīšanas pirms kultūrauga sadīgšanas	-	1
Tīrumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.5-6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas	-	1
Ābeles, bumbieres, vīnogulāji	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-5.0		Apsmidzināt stādījumus nezāļu aktīvas augšanas periodā, pavasarī pirms kultūrauga zaļā konusa stadijas vai pēc ražas novākšanas. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz stumbra augstāk par 30 cm no zemes vai augļu koku un vīnogulāju zariem. Augļu kokiem un vīnogulājiem jābūt vecākiem par 2 gadiem	-	1
Ķirši, plūmes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-5.0		Apsmidzināt stādījumus nezāļu aktīvas augšanas periodā, pavasarī pirms kultūrauga ziedpumpuru atvēršanās vai pēc ražas novākšanas. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz stumbra augstāk par 30 cm no zemes vai koku zariem. Augļu kokiem jābūt vecākiem par 2 gadiem	-	1
Zālāji	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0-6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās atraugušas pēc noganīšanas vai nopļaušanas	-	1
Papuves	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas.	-	1
Pirms koku jaunaudžu ierīkošanas mežā	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā. Nogaidīt 7 dienas pirms jebkuriem zemes darbiem vai stādīšanas	-	1
Koku jaunaudzes pēc ierīkošanas mežā	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus	-	1
	Divdīgļlapju kokaugi-sārņaugi, ērgļpapaprdes	3.0		Apsmidzināt kokaugus-sārņaugus no jūnija līdz augustam pirms lapu novecošanas, bet pēc kultūrauga jauno dzinumu nobriešanas. Ērgļpapardes apsmidzināt pēc lapu atritināšanās, bet pirms novecošanās, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus		
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības/ industriālās teritorijas (elektropārvades līnijas, naftas cauruļvadi, gāzes maģistrāles, ceļmalas, dzelzceļi)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5-6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas	-	1

75. Glyphomax 480

Reģ. Nr. 0386, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 480 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.
Albaugh TKI d.o.o.

Zirņi pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5-2.25		Apsmidzināt sējumus aptuveni 2 nedēļas pirms ražas novākšanas, kad 75 % no pākstīm brūnas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Pupas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5-2.25		Apsmidzināt sējumus aptuveni 2 nedēļas pirms ražas novākšanas, kad 2/3-3/4 no pākstīm brūnas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5-2.25		Apsmidzināt sējumus pilngatavības stadijā, aptuveni 2 nedēļas pirms ražas novākšanas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis, ziemas ripsis, vasaras ripsis pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.25		Apsmidzināt sējumus aptuveni 2-3 nedēļas pirms ražas novākšanas, kad sēklu mitrums ir zem 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Tīrumu apstrāde pirms kultūraugu sējas vai stādīšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	0.75-1.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 6.0 l/ha	-	1-2
	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	2.25-3.0				

1	2	3	4	5	6	7
Tīrumu apstrāde pēc ražas novākšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.125-1.5		Apsmidzināt nezāles pēc to ataugšanas, kad vārpatai ir 3-6 lapas. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 6.0 l/ha	-	1-2
	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	2.25-3.0				
Tīrumu apstrāde pēc sējas, bet pirms kultūraugu dīgšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.125		Apsmidzināt augošas nezāles / labības -sārņaugus vienu dienu pēc kultūrauga sējas. Kultūrauga sēklām jābūt pilnība nosegtām ar augsni	-	1
	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	2.25-3.0				
Tīrumu apstrāde pēc zālāju sēklu novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.25-4.5		Apsmidzināt nezāles pēc to ataugšanas, vārpatai ir 3-6 lapas. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 6.0 l/ha	-	1-2
Papuves	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.25-4.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad vārpatai ir 3-6 lapas. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 6.0 l/ha	-	1-2
Ābeles, bumbieres	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5-3.875		Apsmidzināt stādījumus nezāļu aktīvas augšanas periodā, pavasarī pirms zaļā konusa stadijas vai pēc ražas novākšanas, aizsargājot koku lapotni un stumbrus. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 6.0 l/ha	-	1-3
Ķirši, plūmes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5-3.875		Apsmidzināt stādījumus nezāļu aktīvas augšanas periodā, pavasarī pirms plūmju un ķiršu ziedpumpuru atvēršanās vai pēc ražas novākšanas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu atvases. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 6.0 l/ha	-	1-3
Skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5-2.25		Apsmidzināt stādījumus rudenī, kad koku dzinumi pilnībā nobrieduši. Apsmidzināt aktīvi augošas nezāles, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 6.0 l/ha	-	1-3
Lauksaimniecībā neizmantojamās platībās/ industriālās teritorijās (elektropārvades līnijas, naftas cauruļvadi, gāzes maģistrāles, ceļmalas, dzelzceļi)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.25-4.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 6.0 l/ha	-	1-2
Celmu apstrāde	Lietošanas mērķis-atvašu augšanas novēršana pēc nociršanas	-	20	Apstrādāt celmus uzreiz pēc krūmu vai koku nociršanas. Apstrāde veicama laikā, kad koku sulas kustība ir virzienā uz saknēm, parasti no oktobra līdz februāra beigām	-	1

1	2	3	4	5	6	7
Kultūraugu sējumi un stādījumi, skuju koku jaunie stādījumi, lauksaimniecībā neizmantojamās platības/ industriālās teritorijas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.15 l prepa-rāta 0.8 l ūdens	15 %	Apstrādāt ar aplikatoru atsevišķas nezāles. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz kultūrauga	-	1

76. Goltix 700 SC

Reģ. Nr. 0155, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metamitrons, 700 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
ADAMA Registrations B.V.

Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un atsevišķas īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.25		Apsmidzināt biešu sējumus pēc sējas līdz to sadīgšanai (AS 00-09) pa nezālēm dīgļlapu stadijā. Atkārtoti apsmidzināt, pēc jaunu nezāļu sadīgšanas, līdz biešu 8 lapu stadijai (AS 10-18), nezāļu dīgļlapu stadijā. Nepieciešamības gadījumā lieto maisījumā ar piemērotu preparātu	-	3

77. Goltix Gold

Reģ. Nr. 0851, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metamitrons, 700 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
ADAMA Registrations B.V.

Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	pirms sadīg-šanas: 0.5-1.0; pēc sadīg-šanas: 0.5-1.0		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt kultūrauga sējumu pēc sējas līdz to sadīgšanai (AS 00-09) pa nezālēm dīgļlapu līdz pirmo lapu stadijai, atkārtoti pēc jaunu nezāļu sadīgšanas līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18). Maksimālā preparāta deva sezonā 3 l/ha	-	1 reize pirms sadīg-šanas un 3 reizes pēc sadīg-šanas
		0.5-1.0		<u>2. lietošanas variants</u> Apsmidzināt kultūrauga sējumus pēc sadīgšanas līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18), pa nezālēm dīgļlapu līdz pirmo lapu stadijai, atkārtoti pēc jaunu nezāļu sadīgšanas. Maksimālā preparāta deva sezonā 3 l/ha	-	4
Parastās egles*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt stādījumu agri pavasarī (aprīlis-maijs) vai rudenī (augusts-septembris), augu augstums mazāks par 50 cm	-	1
Ķimenes* (sējas gada)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.75		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt kultūraugu pirmo reizi pirms sadīgšanas (AS 00-09) un otro reizi pēc tā sadīgšanas līdz deviņu lapu stadijai (AS 11-19)	-	2
	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0		<u>2. lietošanas variants</u> Apsmidzināt kultūraugu pēc sadīgšanas līdz deviņu lapu stadijai (AS 11-19), nezāles līdz 2 lapu stadijai.	-	1

1	2	3	4	5	6	7
Ķimenes* (ražas gadā)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.75		Apsmidzināt sējumu pavasarī līdz kultūrauga galvenais dzinums sāk izstiepties (rozete 15 cm augsta) (AS 31), nezāļu dīgšanas sākumā, atkārtoti ne ātrāk kā pēc 7 dienām	60	2
Zemenes* (jaunie stādījumi)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5-1.0		Apsmidzināt stādījumu 14 dienas pēc stādīšanas, pirms ziedēšanas. Atkārtoti pēc 10 dienām	-	3
Zemenes* (ražojoši stādījumi)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5-1.0		Apsmidzināt stādījumu pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas. Atkārtoti pēc 10 dienām	-	3
Spināti* (sēklai)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt kultūrauga sējumu pirms tā sadīgšanas (AS 00-09)	-	1

***Mazais lietojums**. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

78. Granstar Premia 50 SX

Reģ. Nr. 0255, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metil-tribenurons, 500 g/kg.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
FMC Agricultural Solutions A/S

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Trimmer 50 SG

Reģ. Nr. 0321, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metil-tribenurons, 500 g/kg.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
FMC Agricultural Solutions A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, ziemas tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.015		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 21-29). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 darba šķidruma	-	1
		0.015-0.0225		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 darba šķidruma		
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.015		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz cerošanas beigām (AS 12-29). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 darba šķidruma	-	1
		0.0150-0.0225		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 darba šķidruma		
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar sarkanās auzenes vai ganību airenes pasēju	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.0150		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12-39), kad stiebrzāles ir 2-3 lapu stadijā (AS 12-13). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 25 ml uz 100 darba šķidruma	-	1

1	2	3	4	5	6	7

79. Grodyl

Reģ. Nr. 0028, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: amidosulfurons, 75 %.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Bayer AG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Ķeraiņu madara un citas īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.02-0.04		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 49)	56	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Ķeraiņu madara un citas īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.02-0.04		Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga trīs lapu stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 13-49)	56	1
Lini	Ķeraiņu madara un citas īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.02-0.04		Apsmidzināt sējumus, kad lini ir 3-12 cm gari	90	1
Daudzgadīgās stiebrzāles	Daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.06		Apsmidzināt nezāļu lapu rozetes stadijā	21	1

80. Halvetic

Reģ. Nr. 0803, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 180 g/l.
Vispārējs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A.

Kukurūza	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5-3.0		Apsmidzināt pirms kultūrauga sējas vai sējumus pēc sējas, pirms kultūrauga sadīgšanas	-	1
Ābeles, bumbieres	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0-6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas, aizsargājot koku lapotni, un stumbrus	-	1
Tīrumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, ložņu vārpata, labības - sārņaugi	2.5-4.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas	-	1
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības/ industriālās teritorijas (elektropārvades līnijas, naftas cauruļvadi, gāzes maģistrāles, ceļmalas, dzelzceļi)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0-6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas	-	1

81. Herbistar 200 EC

Reģ. Nr. 0804, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: fluroksipirs, 200 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Innvigo Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.6-1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz divu mezglu stadijai (AS 24-32)	-	1

1	2	3	4	5	6	7

82. Herbos 110 EC

Reģ. Nr. 0680, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-fenoksaprops-P, 110 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Innvigo Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle	Parastā rudzusmilga, vējauza un citas viendīgļlapju nezāles	0.7		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz pirmā mezgla stadijai (AS 20-31)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Parastā rudzusmilga, vējauza un citas viendīgļlapju nezāles	0.7		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz pirmā mezgla stadijai (AS 20-31)	-	1

81. Hurler

Reģ. Nr. 0601, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: fluroksipirs, 200 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Arbiter

Reģ. Nr. 0603, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: fluroksipirs, 200 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

Galistop 200

Reģ. Nr. 0602, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: fluroksipirs, 200 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

Tandus

Reģ. Nr. 0785, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: fluroksipirs, 200 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, ziemas mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.6		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar cerošanas sākumu līdz kultūrauga attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz karoglapas maksts uzbriedusi (AS 12-45)	-	1
Viengadīgās un daudzgadīgās stiebrzāles (sējas gadā)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.75		Apsmidzināt sējumu, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz cerošanas sākumam (AS 12-21)	7	1
Daudzgadīgās stiebrzāles (sēklai, lopbarībai)	Daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.8		Apsmidzināt sējumu pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu, līdz karoglapas maksts uzbriedusi (AS 21-45)	7	1

1	2	3	4	5	6	7

84. Hussar Activ Plus OD

Reģ. Nr. 0588, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: 2,4-D 2-etilheksil esteris, 300 g/l,
nātrija metil-jodosulfurons, 10 g/l,
metil-tiēnkarbazons, 7.5 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām, nedaudz ar saknēm.
Bayer AG

Ziemas kvieši, ziemas tritikāle	Parastā rudzusmilga, īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga trīs sāndzinumu stadiju līdz viena mezgla stadijai (AS 23-31)	-	1
Rudzi	Parastā rudzusmilga, īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga trīs sāndzinumu stadiju līdz cerošanas beigām (AS 23-29)	-	1
Vasaras kvieši	Vējauza, īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.75		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 21-29)	-	1

85. Incelo

Reģ. Nr. 0781, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: metil-mezosulfurons, 45 g/kg,
metil-tiēnkarbazons, 15 g/kg.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Bayer AG

Ziemas kvieši, ziemas tritikāle	Īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20-32), viendīgllapju nezāles līdz cerošanas beigām (AS 29). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1
Rudzi	Īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.1		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20-32), viendīgllapju nezāles līdz cerošanas beigām (AS 29). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1
Vasaras kvieši	Īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.1		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga sāndzinumu veidošanās sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20-32), viendīgļlapju nezāles līdz cerošanas beigām (AS 29). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu		

86. Kalif 360 CS

Reģ. Nr. 0409, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: klomazons, 360 g/l,
Selektīvs, augsnes iedarbība, augi uzņem caur saknēm un dīgstiem.
ADAMA Registrations B.V.

Ziemas rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.25-0.33		Apsmidzināt sējumus ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc sējas, pirms rapša un nezāļu sadīgšanas	-	1
Vasaras rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.25		Apsmidzināt sējumus ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc sējas, pirms rapša un nezāļu sadīgšanas	-	1
Kartupeļi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.25		Apsmidzināt stādījumus ne vēlāk kā 5 dienas pirms kartupeļu un nezāļu sadīgšanas	-	1

1	2	3	4	5	6	7

87. Kalif Mega

Reģ. Nr. 0410, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: metazahlors, 250 g/l,
klomazons, 33 g/l.
Selektīvs, sistēmas un augsnes iedarbība, augi uzņem caur saknēm un dīgstiem.
ADAMA Registrations B.V.

Ziemas rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.5-3.0		Apsmidzināt sējumus ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc sējas, pirms rapša sadīgšanas	-	1
Vasaras rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.5		Apsmidzināt sējumus ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc sējas, pirms rapša sadīgšanas	-	1

88. Katoun Gold

Reģ. Nr. 0898, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: pelargonskābe, 500 g/l.
Nav selektīvs, pieskares iedarbība.
Certis Belchim B.V.

Lauksaimniecībā neizmantojamās platības/ industriālās teritorijas (ceļmalas un dzelzceļi)	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	22.5		Apsmidzināt sējumus ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc sējas, pirms rapša sadīgšanas	-	4
	Sūnas			Apsmidzināt sūnas to augšanas laikā. Starp apstrādēm ievērot vismaz 14 dienu intervālu	-	2
Ceļi, takas un laukumi, kuriem ir caurlaidīga virsma. Apkārt kokiem, krūmiem, krāšņumaugiem	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	22.5		Apsmidzināt aktīvi augošas nezāles, līdz to 10 cm garumam. Nepieļaut smidzinājuma nonākšanu uz augu lapotnes un nepārkoksnētiem zariem. Starp apstrādēm ievērot vismaz 14 dienu intervālu	-	4
	Sūnas	22.5		Apsmidzināt sūnas, to augšanas laikā. Aizsargāt koku un krūmu lapotni un auga daļas, kuras nav pārkoksnējušās. Starp apstrādēm ievērot vismaz 14 dienu intervālu	-	2
Koki	Sūnas	22.5		Apsmidzināt sūnas to augšanas laikā. Starp apstrādēm ievērot vismaz 14 dienu intervālu	-	2

89. Kinvara

Reģ. Nr. 0672, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: MCPA, 233 g/l,
fluroksipirs, 50 g/l,
klopiralīds, 28 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Arrva
Reģ. Nr. 0695, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: MCPA, 233 g/l,
fluroksipirs, 50 g/l,
klopiralīds, 28 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

Ziemas kvieši, ziemas tritikāle, rudzi, ziemas mieži ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	2.5		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atjaunojoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 21-39)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	2.25		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 21-39)	-	1
Stiebrzāles (sēklai sējas gadā), zāliens* (sējas gadā)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 21-39)	-	
Stiebrzāles (lopbarībai sējas gadā un vecākas), ganības (sējas gadā un vecākas)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 21-39)	7	1
Stiebrzāles (sēklu lauki), zāliens*	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 21-39)	-	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

90. Komplet

Reģ. Nr. 0393, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: flufenacets, 280 g/l,
diflufenikans, 280 g/l.
Pieskares un augsnes iedarbības herbicīds.
Bayer AG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.4-0.5		Apsmidzināt sējumus rudenī, sākot no kultūraugu vienas lapas stadijas līdz triju lapu stadijai (AS 11-13)	-	1

91. Korvetto

Reģ. Nr. 0663, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: metil-halauksifēns, 5 g/l,
klopiralīds, 120 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Corteva Agriscience Denmark A/S

Ziemas rapsis	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī atjaunojoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stublāja pagarināšanos līdz ziedpumpuru veidošanās sākumam (AS 30-50)	-	1

92. Krypt 540

Reģ. Nr. 0800, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 540 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.
Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

Burkāni, sīpoli pirms sadīgšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-2.0		Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga sadīgšanas 48 stundu laikā pēc sējas. Kultūrauga sēklām jābūt nosegtām ar vismaz 15 mm biezu augsnes kārtu	-	1
Kartupeļi pirms sadīgšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-2.0		Apsmidzināt stādījumus pēc stādīšanas pirms kultūrauga sadīgšanas	-	1

1	2	3	4	5	6	7
Tīrumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-4.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas	-	1
Ābeles, bumbieres, vīnogulāji	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.4-3.5		Apsmidzināt stādījumus nezāļu aktīvas augšanas periodā, pavasarī pirms kultūrauga zaļā konusa stadijas vai pēc ražas novākšanas. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz stumbra augstāk par 30 cm no zemes vai augļu koku un vīnogulāju zariem. Augļu kokiem un vīnogulājiem jābūt vecākiem par 2 gadiem	-	1
Ķirši, plūmes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.4-3.5		Apsmidzināt stādījumus nezāļu aktīvas augšanas periodā, pavasarī pirms kultūrauga ziedpumpuru atvēršanās vai pēc ražas novākšanas. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz stumbra augstāk par 30 cm no zemes vai koku zariem. Kokiem jābūt vecākiem par 2 gadiem	-	1
Zālāji	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-4.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās atraugušas pēc noganīšanas vai nopļaušanas	-	1
Papuves	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-4.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas	-	1
Pirms koku jaunaudžu ierīkošanas mežā	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā. Nogaidīt 7 dienas pirms jebkuriem zemes darbiem vai stādīšanas	-	1
Koku jaunaudzes pēc ierīkošanas mežā	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.4		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus	-	1
	Divdīgļalapju kokaugi-sārņaugi, ērgļpapaprdes	2.0		Apsmidzināt kokaugus-sārņaugus no jūnija līdz augustam pirms lapu novecošanas, bet pēc kultūrauga jauno dzinumu nobriešanas. Ērgļpapardes apsmidzināt pēc lapu atritināšanās, bet pirms novecošanās, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus		
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības / industriālās teritorijas (elektropārvades līnijas, naftas cauruļvadi, gāzes maģistrāles, ceļmalas, dzelzceļi)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0-4.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas	-	1

93. Kyleo

Reģ. Nr. 0423, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: 2,4-D, 160 g/l,
glifosāts, 240 g/l.
Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds.
Nufarm GmbH & Co KG

1	2	3	4	5	6	7
Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0-4.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus	30	1
Tīrumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā pēc ražas novākšanas	-	1
Papuves, atmata	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0-4.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā	-	1
Tīrumi pirms graudaugu un kukurūzas sējas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā	-	1
Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0-4.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā	-	1

94. Lancelot

Reģ. Nr. 0524, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: aminopiralīds, 300 g/kg,
florasulams, 150 g/kg.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Corteva Agriscience Denmark A/S

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, ziemas tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.015-0.025		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga trīs sāndzinumu stadiju līdz cerošanas beigām (AS 23-29). Darba šķidrumam jāpievieno virsmas aktīvā viela	-	1
		0.033		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32). Darba šķidrumam jāpievieno virsmas aktīvā viela		
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.010		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju līdz lapu attīstības fāzes beigām (AS 13-19)	-	1
		0.015-0.025		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas fāzes beigām (AS 20-29). Darba šķidrumam jāpievieno virsmas aktīvā viela		
		0.033		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32). Darba šķidrumam jāpievieno virsmas aktīvā viela		

1	2	3	4	5	6	7

95. Legacy 500 SC

Reģ. Nr. 0411, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: diflufenikans, 500 g/l.
Selektīvs pieskares iedarbības un augsnes herbicīds.
ADAMA Registrations B.V.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Stakato 500 SC

Reģ. Nr. 0739, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: diflufenikans, 500 g/l.
Selektīvs pieskares iedarbības un augsnes herbicīds.
ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.15-0.20		Apsmidzināt sējumus rudenī pirms graudaugu sadīgšanas līdz graudaugu 4 lapu stadijai (AS 00-14)	60	1
		0.20		Apsmidzināt sējumus pavasarī līdz graudaugu pirmā mezgla stadijai (AS 31)		
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.15		Apsmidzināt sējumus pirms graudaugu sadīgšanas līdz graudaugu pirmā mezgla stadijai (AS 00-31)	60	1

96. Legacy Pro

Reģ. Nr. 0415, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: pendimetalīns, 300 g/l,
hlortolurons, 250 g/l,
diflufenikans, 40 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
ADAMA Registrations B.V.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Trinity

Reģ. Nr. 0770, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: pendimetalīns, 300 g/l,
hlortolurons, 250 g/l,
diflufenikans, 40 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, rudzi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.8		Apsmidzināt sējumu pēc kultūrauga sadīgšanas līdz 3 lapu stadijai (AS 10-13)	-	1

97. Lentagran WP

Reģ. Nr. 0330, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: piridāts, 450 g/kg.
Pieskares iedarbība.
Certis Belchim B.V.

Galviņkāposti, Briseles kāposti, Savojas kāposti, lapu kāposti, lopbarības kāposti	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5-2.0		Apsmidzināt stādījumus pēc kultūraugu izstādīšanas, kad tie ir ieaugušies un ir četru līdz sešu lapu stadijā (AS 14-16). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā	42	2
Ziedkāposti, brokoļi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5-1.0		Apsmidzināt stādījumus pēc kultūraugu izstādīšanas, kad tie ir ieaugušies un ir četru līdz sešu lapu stadijā (AS 14-16). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā	42	2
Sīpoli (sētie, stādītie), šalotes sīpoli	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5-1.0		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus pēc kultūraugu sadīgšanas, tā vienas līdz četru lapu stadijā (AS 11-14). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā	56	3
Vasaras sīpoli (lokiem)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5-1.0		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad pilnībā attīstījušās trīs lapas (AS 13). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā	28	2
Puravi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5-2.0		Apsmidzināt pēc kultūrauga izstādīšanas un ieaugšanās, kad kultūraugam ir attīstījusies 3 lapa (AS 13). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā	28	2
Ķiploki*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5-2.0		Apsmidzināt stādījumus, kad kultūraugam attīstījusies 3 lapa (AS 13). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā	56	2
Kolrābji*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5-2.0		Apsmidzināt sējumus, kad kultūraugam attīstījušās četras līdz sešas lapas (AS 14-16). Ja augs pārstādīts, apstrādi veikt pēc 2-4 nedēļām. Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā	42	2
Kukurūza*, saldā	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0-2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 12-18). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā	42	2
Sparģeļi* (neražojoši stādījumi, 1-2 gadi veci)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5-1.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga attīstības stadiju, kad redzami 1-5 sānu dzinumi (AS 21). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā	-	2
Sparģeļi* (stādījumi vecāki par 2 gadiem)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5-2.0		Apsmidzināt stādījumus pirms kultūrauga sadīgšanas un/vai pēc ražas novākšanas. Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā	-	2
Zirņi (zaļie ar un bez pākstīm, graudiem)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.75-1.0		<u>1. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju līdz sešu lapu stadijai (AS 13-16)	-	1
		0.5		<u>2. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga pirmo īsto lapu līdz sešu lapu stadijai (AS 11-16). Atkārtoti smidzina pēc 7-10 dienām	-	2
Burkāni*, pastinaki*, sakņu pētersīļi*, mārrutķi*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5		Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumu, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz sešu lapu stadijai (AS 12-16). Intervāls starp apstrādēm 7 dienas	-	2
Ziemas rapsis, vasaras rapsis, cukurbietes, lopbarības bietes	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi	1.0-1.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz piecu lapu stadijai (AS 12-15)	100	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	2.0-2.5		Apsmidzināt sējumus, kad nezālēm ir 4-6 lapas (10-15 cm gara)		

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

98. Leopard

Reģ. Nr. 0424, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-kvizalofops-P, 50 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
ADAMA Registrations B.V.

1	2	3	4	5	6	7
Burkāni, kartupeļi	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi	1.0-1.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz piecu lapu stadijai (AS 12-15)	30	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	2.0-2.5		Apsmidzināt sējumus, kad nezālēm ir 4-6 lapas (10-15 cm gara)		
Zirņi, pupas	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi	1.0-1.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz piecu lapu stadijai (AS 12-15)	40	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	2.0-2.5		Apsmidzināt sējumus, kad nezālēm ir 4-6 lapas (10-15 cm gara)		

99. Lontrel 72 SG

Reģ. Nr. 0388, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: klopiralīds, 720 g/kg.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Corteva Agriscience Denmark A/S

Cukurbietes, lopbarības bietes	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.125-0.139		Apsmidzināt sējumos tikai daļu no rindstarpas platuma, kur apsmidzināmais joslas platums ir 16.5 cm un kopējais rindstarpas platums ir 50 cm, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai (AS 12-19)	-	1
Galda bietes	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.125-0.139		Apsmidzināt sējumos tikai daļu no rindstarpas platuma, kur apsmidzināmais joslas platums ir 16.5 cm un kopējais rindstarpas platums ir 50 cm, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai (AS 12-19)	42	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis, ziemas ripsis*, vasaras ripsis*	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.110-0.165		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stublāja pagarināšanās sākumu līdz ziedpumpuru veidošanās sākumam (AS 30-50)	-	1
Lini	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.110		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebra veidošanās fāzes beigām līdz pumpurošanās sākumam (AS 40-51)	-	1
Galviņkāposti, Savojas kāposti, ziedkāposti	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.110-0.165		Apsmidzināt stādījumā tikai daļu no rindstarpas platuma, kur apsmidzināmais joslas platums ir puse no kopējā rindstarpas platuma, 2-3 nedēļas pēc kultūrauga iesakņošanās, kad daudzgadīgās nezāles ir rozetes stadijā – laika posmā no aprīļa līdz jūnijam (ieskaitot)	42	1
Stiebrzāles (sēklai, ražas gadā)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.125-0.165		Apsmidzināt sējumus no stiebrzāļu cerošanas sākuma līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 21-37), arī maisījumā ar piemērotu preparātu	-	1
Ganības	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.125-0.165		Apsmidzināt ganības nezāļu aktīvas augšanas fāzē, kad ierobežojamās nezāles sasniegušas 15-20 cm (rozetes stadija)	7	1
Zemenes*	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.165		Apsmidzināt stādījumā tikai daļu no rindstarpas platuma, kur apsmidzināmais joslas platums ir puse no kopējā rindstarpas platuma, pēc kultūrauga ražas novākšanas, kad usnes ir 15-20 cm garas – laika posmā no jūnija līdz jūlijam (ieskaitot)	-	1

1	2	3	4	5	6	7
Egles*, baltegles* (kokaudzētavās)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.165		Apsmidzināt stādījumus, kad stādi iesakņojušies un apkarojamās nezāles ir 10-20 cm garas – laika posmā no aprīļa līdz jūnijam (ieskaitot)	-	1
Egles*, baltegles* (kokaudzētavās)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.083		Apsmidzināt stādījumus jūlijā, kad stādi iesakņojušies un apkarojamās nezāles ir 10-20 cm garas	-	1

*__Mazais lietojums.__ Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

100. Maister Power OD

Reģ. Nr. 0543, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: foramsulfurons, 30 g/l,
nātrija metil-jodosulfurons, 1 g/l,
metil-tiēnkarbazons, 10 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Bayer AG

Kukurūza	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz sešu lapu stadijai (AS 12-16)	-	1

101. Mateno Duo

Reģ. Nr. 0704, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: aklonifēns, 500 g/l,
diflufenikans, 100 g/l.
Selektīvs, pieskares iedarbība un augsnes herbicīds, augi uzņem caur dīgstiem un saknēm.
Bayer AG

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle, ziemas mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.35		Apsmidzināt sējumus rudenī, sākot ar kultūrauga vienas lapas stadiju līdz trīs lapu stadijai (AS 10-13)	-	1

102. MCPA 750

Reģ. Nr. 0135, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: MCPA, 750 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.5-2.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai līdz graudaugu stiebrošanas fāzes sākumam (AS 30)	-	1
	Tīruma usne	1.0		Apsmidzināt sējumus, kad usne ir rozetes stadijā, sākot ar kultūraugu pirmo mezglu, līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 31-39)		
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0-1.3		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 3-4 lapu stadiju līdz stiebrošanas fāzes sākumam (AS 13-30)	-	1
	Tīruma usne, tīruma mīkstpiene	2.5-3.0		Apsmidzināt sējumus, kad usnei un mīkstpienei izveidojusies lapu rozete, līdz graudaugu stiebrošanas fāzes sākumam (AS 30)		
	Tīruma usne	1.0		Apsmidzināt sējumus, kad usne ir rozetes stadijā, sākot ar kultūraugu pirmo mezglu, līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 31-39)		

Herbicīdi

1	2	3	4	5	6	7
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar āboliņa pasēju	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.8		Apsmidzināt sējumus, sakot ar graudaugu 3-4 lapu stadiju līdz stiebrošanas fāzes sākumam (AS 13-30), kad āboliņam ir 1-2 īstās lapas	-	1
Lini	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.8-1.3		Apsmidzināt sējumus pēc nezāļu sadīgšanas, kad lini ir 3-8 cm gari	-	1
Āboliņš	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.8		Apsmidzināt sējumus, kad āboliņam ir 1-2 īstās lapas	-	1
Ganības, pļavas	Divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt pēc nezāļu sadīgšanas, kad daudzgadīgajām nezālēm izveidojusies lapu rozete	20 (ganīt un pļaut zāli)	1
Daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.2-1.8		Apsmidzināt sējumus, kad stiebrzālēm attīstījušās 3-4 lapas	-	1

103. MCPA Super

Reģ. Nr. 0119, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: MCPA, 500 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, ziemas rudzi, ziemas mieži, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.0-1.5		Apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu 3-4 lapu stadijas līdz stiebrošanas fāzes sākumam	-	1
Vasarāju graudaugi ar āboliņa pasēju		0.8-1.2		Apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu 3-4 lapu stadijas līdz stiebrošanas fāzes sākumam. (āboliņam 1-2 īstās lapas)		1
Sarkanais un baltais āboliņš sējas gadā		0.8-1.2		Apsmidzināt sējumus, kad āboliņam 1-2 īstās lapas		1
Sarkanais āboliņš sēklu lauki		0.8-1.2		Apsmidzināt sējumus 2-3 nedēļu laikā pēc veģetācijas perioda atsākšanās, sēklu novākšanas gadā	45 lop-barībai	1
Daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki		1.0-1.5		Apsmidzināt sējumus sējas gadā no stiebrzāļu 1-2 lapu stadijas līdz stiebrošanas sākumam	-	1
Ganības un pļavas		1.0-1.5		Apsmidzināt nezāļu aktīvas augšanas laikā, daudzgadīgajām nezālēm izveidojusies lapu rozete	20 ganīt un pļaut zāli	1
Lini		1.0-1.2		Apsmidzināt sējumus, kad lini ir 3-8 cm gari	-	1

1	2	3	4	5	6	7

104. Metazamix™

Reģ. Nr. 0500, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: metazahlors, 500 g/l,
aminopiralīds, 5.3 g/l,
piklorams, 13.3 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
Corteva Agriscience Denmark A/S

Ziemas rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un atsevišķas īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.6-0.8		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas līdz četru lapu stadijai (AS 10-14)	-	1
Vasaras rapsis, vasaras ripsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas līdz dīgļsaknes parādīšanās stadijai (AS 00-05)	-	1
Vasaras rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.75		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas līdz četru lapu stadijai (AS 10-14). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu		

105. Mezzo WG

Reģ. Nr. 0322, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metil-metsulfurons, 200 g/kg.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm.
Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle, rudzi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.015		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 20-29). Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma	-	1
		0.030		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39). Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma		
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.01-0.02		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39). Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma	-	1

106. Milagro 4 OD

Reģ. Nr. 0223, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: nikosulfurons, 40 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
ISK Bioscience Europe N.V.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Fornet 4 OD

Reģ. Nr. 0436, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: nikosulfurons, 40 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
ISK Bioscience Europe N.V.

Samson 4 OD

Reģ. Nr. 0437, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: nikosulfurons, 40 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
ISK Bioscience Europe N.V.

Kukurūza	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.1		Apsmidzināt sējumus kukurūzas 2-8 lapu stadijā (AS 12-18)	40	1

1	2	3	4	5	6	7

107. Milagro Extra 6 OD

Reģ. Nr. 0361, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: nikosulfurons, 60 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
ISK Bioscience Europe N.V.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Fornet Max 6 OD

Reģ. Nr. 0433, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: nikosulfurons, 60 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
ISK Bioscience Europe N.V.

Samson Max 6 OD

Reģ. Nr. 0434, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: nikosulfurons, 60 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
ISK Bioscience Europe N.V.

Kukurūza	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.75		1. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus kukurūzas 2-8 lapu stadijā (AS 12-18)	40	1
		0.5 + 0.25		2. lietošanas variants Pirmo reizi apsmidzināt sējumus kukurūzas 2 -3 lapu stadijā (AS 12-13), otro reizi, pēc 10-14 dienām, kukurūzas 5- 8 lapu stadijā (AS 15-18)	40	2

108. Mizuki

Reģ. Nr. 0890, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-piraflufēns, 10.6 g/l.
Herbicīds. Pieskares iedarbība.
Nichino Europe Co. Ltd.

Kartupeļi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5-1.0		Apsmidzināt kultūraugu stādījumus pēc nezāļu sadīgšanas un pirms kultūraugu sadīgšanas (AS 00-09)	-	1
Zemenes*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5-1.4		Apsmidzināt zemeņu stādījumu starprindas pirms zemeņu ziedēšanas (AS 10-59) un/vai pēc ražas novākšanas (pēc AS 91)	-	2
Zemenes*	Zemeņu stīgas	1.4		Apsmidzināt zemeņu stādījumu starprindas pēc ražas novākšanas. Atkārtoti pēc 21 dienas	-	2

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

109. Monitor

Reģ. Nr. 0145, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: sulfosulfurons, 75 %.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

Ziemas kvieši, tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, parastā rudzusmilga	0.01		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20-32). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1
Vasaras kvieši	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, parastā rudzusmilga	0.01		Apsmidzināt sējumus, sākot ar cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20-32). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1

1	2	3	4	5	6	7

110. Mustangs Forte s.e.

Reģ. Nr. 0334, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: florasulams, 5 g/l,
aminopiralīds, 10 g/l,
2,4-D, 180 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Corteva Agriscience Denmark A/S

Ziemas kvieši, rudzi, tritikāle	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, veģetācijai atsākoties, līdz kultūrauga divu mezglu stadijai (AS 32)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.6-0.8		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 21-32)	-	1

111. Mustangs s.e.

Reģ. Nr. 0184, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: florasulams, 6.25 g/l,
2,4-D, 300 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība.
Corteva Agriscience Denmark A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas rudzi, tritikāle	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.4-0.6		Apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot no cerošanas stadijas līdz otrā mezgla stadijai (AS 25-32), iespējami maisījumi, ievērojot pievienotā komponenta lietošanas reglamentu	-	1
Vasaras mieži, vasaras kvieši, auzas		0.4-0.6		Apsmidzināt, sākot no vasarāju graudaugu 2-3 lapu stadijas līdz otrā mezgla stadijai (AS 13-32), iespējami maisījumi, ievērojot pievienotā komponenta lietošanas reglamentu	-	1

112. Nervure

Reģ. Nr. 0752, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-kvizalofops-P, 50 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Nissan Chemical Europe S.A.S.

Kartupeļi	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi	1.0-1.5		Apsmidzināt stādījumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12-29)	45	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt stādījumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad vārpatai ir 4-6 lapas un tā ir 10-15 cm gara		
Cukurbietes	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi	1.0-1.5		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12-29)	60	2
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad vārpatai ir 4-6 lapas un tā ir 10-15 cm gara		
Galda bietes	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi	1.0-1.5		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12-29)	60	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	2.5-3.0		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad vārpatai ir 4-6 lapas un tā ir 10-15 cm gara		

1	2	3	4	5	6	7
Zemenes	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.0-1.5		Apsmidzināt stādījumus pēc ražas novākšanas, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12-29)	-	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	2.5-3.0		Apsmidzināt stādījumus pēc ražas novākšanas, kad vārpatai ir 4-6 lapas un tā ir 10-15 cm gara		
Ķimenes (ražas gadā)	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.0-1.5		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12-29)	56	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	2.5-3.0		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad vārpatai ir 4-6 lapas un tā ir 10-15 cm gara		
Burkāni, kāļi*, sakņu selerijas*, pastinaki*, sakņu pētersīļi*	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi	1.0-1.5		Apsmidzināt sējumus un stādījumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12-29)	40	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	2.5-3.0		Apsmidzināt sējumus un stādījumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad vārpatai ir 4-6 lapas un tā ir 10-15 cm gara		
Zirņi, lauka pupas (graudiem)	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi	1.0-1.5		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12-29)	45	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	2.5-3.0		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad vārpatai ir 4-6 lapas un tā ir 10-15 cm gara		
Ziemas rapsis, vasaras rapsis, ziemas ripsis, vasaras ripsis, lini	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi	1.0-1.5		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12-29)	90	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	2.5-3.0		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad vārpatai ir 4-6 lapas un tā ir 10-15 cm gara		
Zirņi (zaļie, bez pākstīm)	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi	1.0-1.5		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12-29)	35	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	2.5-3.0		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad vārpatai ir 4-6 lapas un tā ir 10-15 cm gara		
Āboliņš (sēklai), sarkanā auzene (sēklai)	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.0-1.5		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12-29)	-	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	2.5-3.0		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad vārpatai ir 4-6 lapas un tā ir 10-15 cm gara		
Pupas (zaļas, ar pākstīm)	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi	1.0-1.5		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12-29)	42	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	2.5-3.0		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad vārpatai ir 4-6 lapas un tā ir 10-15 cm gara		

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

113. Nicogan

Reģ. Nr. 0413, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: nikosulfurons, 40 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
ADAMA Registrations B.V.

Kukurūza	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus, kukurūzas 2-8 lapu stadijā (AS 12-18)	40	1
		1.0+0.5		<u>2. lietošanas variants</u> Pirmo reizi apsmidzināt sējumus kukurūzas 2-3 lapu stadijā (AS 13-14), otro reizi, pēc 10-14 dienām, kukurūzas 5-8 lapu stadijā (AS 15-18)	40	2

114. Nimbus SE

Reģ. Nr. 0328, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: metazahlors, 250 g/l,
klomazons, 33.3 g/l.
Selektīvs, sistēmas un augsnes iedarbība, augi uzņem caur dīgstiem un saknēm.
SIA BASF

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-3.0		Apsmidzināt sējumus pēc sējas līdz kultūrauga sadīgšanai (AS 00-09)	-	1

115. Novitron DAMTec

Reģ. Nr. 0730, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: aklonifēns, 500 g/kg,
klomazons, 30 g/kg.
Selektīvs, augsnes iedarbība, augi uzņem caur saknēm un dīgstiem.
FMC Agricultural Solutions A/S

<u>Analogie augu aizsardzības līdzekļi:</u>

Toutatis DAMTec

Reģ. Nr. 0731, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: aklonifēns, 500 g/kg,
klomazons, 30 g/kg.
Selektīvs, augsnes iedarbība, augi uzņem caur saknēm un dīgstiem.
FMC Agricultural Solutions A/S

Kartupeļi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.4		Apsmidzināt stādījumu pēc vagu veidošanas pirms kultūrauga sadīgšanas	-	1
Zirņi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.4		Apsmidzināt sējumus 2 dienu laikā pēc kultūrauga sējas	-	1
Pupas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.4		Apsmidzināt sējumus 2 dienu laikā pēc kultūrauga sējas	-	1
Burkāni*	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.4		Apsmidzināt sējumus 2 dienu laikā pēc kultūrauga sējas	-	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

116. Nuance 75 WG

Reģ. Nr. 0403, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metil-tribenurons, 750 g/kg.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm.
Nufarm GmbH & Co KG

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Viking

Reģ. Nr. 0903, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metil-tribenurons, 750 g/kg.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm.
Nufarm GmbH & Co KG

Tribenocare 75 WG

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 65, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metil-tribenurons, 750 g/kg.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm.
Agrocare Chemicals Kft

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, rudzi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.0075		Apsmidzināt sējumus rudenī, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz kultūrauga cerošanas sākumam (AS 13-21)	-	1
		0.0075-0.0100		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 21-29)		
		0.0100-0.015		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)		
Vasaras kvieši, vasaras mieži, vasaras tritikāle, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.0075-0.010		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga četru lapu stadiju līdz cerošanas beigām (AS 14-29)	-	1
		0.010-0.015		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)		
Ceļa malas*, mežmalas*, lauksaimniecībā neizmantojamās zemes*, zemes zem elektrolīniju pārvadiem*	Latvāņi	0.015		Apsmidzina: 1. lietošanas veids Agri pavasarī, atsākoties veģetācijai, latvāņiem dīgstot, dīgļlapu stadijā; 2. lietošanas veids Agri pavasarī, atsākoties veģetācijai, kad lielāko pārziemojušo latvāņu rozešu diametrs- 20 cm; 3. lietošanas veids Vasarā pēc nopļaušanas, kad latvāņi ataug un to rozetes ir diametrā ap 20-25 cm; 4. lietošanas veids Atsevišķi augošu latvāņu rozetes. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu	-	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

117. Nufarm MCPA 750

Reģ. Nr. 0045, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: MCPA, 750 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Nufarm GmbH & Co KG

Ziemāju graudaugi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.3-2.0		Apsmidzināt sējumus, ziemājus atjaunojoties veģetācijai, līdz stiebrošanas sākumam (AS 30)	-	1
	Tīruma usne	1.0		Apsmidzināt sējumus, kad usne ir rozetes stadijā, sākot ar kultūraugu pirmo mezglu, līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 31-39)		
Vasarāju graudaugi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.3-2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 3-4 lapu stadiju līdz stiebrošanas fāzes sākumam (AS 13-30)	-	1
	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, tīruma usne, tīruma mīkstpiene	2.0-2.5		Apsmidzināt sējumus, kad usnei un mīkstpienei izveidojusies lapu rozete, līdz graudaugu stiebrošanas fāzes sākumam (AS 30)		
	Tīruma usne	1.0		Apsmidzināt sējumus, kad usne ir rozetes stadijā, sākot ar kultūraugu pirmo mezglu, līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 31-39)		
Vasarāju graudaugi ar āboliņa pasēju	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.8		Apsmidzināt sējumus, sakot ar graudaugu 3-4 lapu stadiju līdz stiebrošanas fāzes sākumam (AS 13-30), kad āboliņam ir 1-2 īstās lapas	-	1
Lini	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.8-1.3		Apsmidzināt sējumus pēc nezāļu sadīgšanas, kad lini ir 3-8 cm gari	-	1
Āboliņš	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.8		Apsmidzināt sējumus, kad āboliņam ir 1-2 īstās lapas	-	1
Ganības, pļavas	Divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt pēc nezāļu sadīgšanas, kad daudzgadīgajām nezālēm izveidojusies lapu rozete	20 (ganīt un pļaut zāli)	1
Daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.2-1.8		Apsmidzināt sējumus, kad stiebrzālēm attīstījušās 3-4 lapas	-	1
Zāliens	Divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt zālienu pēc nezāļu dīgšanas (daudzgadīgajām nezālēm izveidojusies lapu rozete)	-	1

118. Onyx

Reģ. Nr. 0657, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: piridāts, 600 g/l.
Pieskares iedarbība.
Certis Belchim B.V.

Kukurūza	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.75		1. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz sešu lapu stadijai (AS 12-16)	-	1
	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5+0.5		2. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz sešu lapu stadijai (AS 12-16), atkārtoti pēc 7 dienām	-	2

1	2	3	4	5	6	7

119. Optica Trio

Reģ. Nr. 0248, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: dihlorprops-P, 310 g/l,
mekoprops-P, 130 g/l,
MCPA, 160 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Nufarm HmbH & Co KG

Ziemas kvieši	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	2.0-2.5		Apsmidzināt pavasarī līdz graudaugu cerošanas stadijas beigām (AS 30)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.5-2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 5 lapu stadiju līdz cerošanas beigām (AS 15-30)	-	1

120.1. Ouragan System 4

Reģ. Nr. 0209, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Griķi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi	2.0-3.0		Apsmidzināt sējumus pēc tiešās sējas, pirms kultūrauga sadīgšanas	-	1
Kartupeļi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi	3.0-4.0		Apsmidzināt stādījumus pirms kultūrauga sadīgšanas	-	1
Tīrumi pirms kultūraugu sējas vai stādīšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi	3.0-4.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas	-	1
Tīrumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi	2.0-6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas	-	1
Papuves	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0-5.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 8 l/ha	-	1-2
Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0-5.0		1. lietošanas veids Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 4-5 lapas un tās ir 10-20 cm garas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbru un sakņu dzinumus. Nesmidzināt ražas nogatavošanās laikā	-	1
Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0		2. lietošanaas veids Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 4-5 lapas un tās ir 10-20 cm garas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbru un sakņu dzinumus. Atkārtoti pēc 60 dienām. Nesmidzināt ražas nogatavošanās laikā	-	2
Smiltsērkšķu* jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-5.0		1. lietošanas veids Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 4-5 lapas un tās ir 10-20 cm garas. Apsmidzināt 70 cm diametrā ap stumbru, aizsargājot kociņu lapotni un stumbru	-	1

1	2	3	4	5	6	7
Smiltsērkšķu* jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0		2. lietošanas veids Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 4-5 lapas un tās ir 10-20 cm garas. Apsmidzināt 70 cm diametrā ap stumbru, aizsargājot kociņu lapotni un stumbru	-	2
Skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt stādījumu veģetācijas periodā (maijs-septembris), kad nezāles ir aktīvi augošas, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus	-	1-2
Lauksaimniecībā neizmantojamās platībās/ industriālās teritorijas (elektropārvades līnijas, naftas cauruļvadi, gāzes maģistrāles, ceļmalas, dzelzceļi)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0-6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 8 l/ha	-	1-2

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

120.2. Ouragan System 4

Reģ. Nr. 0209, reģ. klase 3, iepakojumi mazāki par 1 litru.
Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Apstrādājamais objekts	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, ml/100m²	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Aizaugušu platību sagatavošana dārzeņu, augļu koku un krūmu, dekoratīvo koku un krūmu, krāšņumaugu stādīšanai, zāliena ierīkošanai, nezāļu ierobežošana sakņu dārzā pēc ražas novākšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	30		Apsmidzināt aktīvi augošas nezāles. Vārpatai ir vismaz 3-6 lapas	-	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	50				
Zāliena atjaunošana	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	30-50		Apsmidzināt atjaunošanai paredzēto zālienu, kad nezāles ir aktīvi augošas. Vārpatai ir vismaz 3-6 lapas	-	1

1	2	3	4	5	6	7

121. Panexion OD

Reģ. Nr. 0905, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: pinoksadēns, 120 g/l,
metil-mezosulfurons, 28.8 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, ziemas tritikāle, ziemas rudzi	Īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.30-0.375-0.5		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sakot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras tritikāle	Īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.30-0.375-0.5		Apsmidzināt sējumus, sakot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)	-	1

122. Pantera 4 EC

Reģ. Nr. 0171, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: tefuril-kvizalofops-P, 40 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
UPL Holdings Coöperatief U.A.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Bagira

Reģ. Nr. 0848, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: tefuril-kvizalofops-P, 40 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
UPL Holdings Coöperatief U.A.

Panarex

Reģ. Nr. 0849, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: tefuril-kvizalofops-P, 40 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
UPL Holdings Coöperatief U.A.

Ziemas rapsis	Labības - sārņaugi	0.6		Apsmidzināt kultūrauga sējumus, sākot no labību – sārņaugu 2 lapu stadijas līdz to cerošanas sākumam (AS 12-20)	60	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis, kartupeļi, cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes, burkāni, lini, zirņi (graudiem), pupas (graudiem)	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi	1.0		Apsmidzināt kultūraugu sējumus vai stādījumus, sākot ar īsmūža nezāļu 2 lapu stadiju līdz cerošanas beigām (AS 12-29), un labības-sārņaugus, sākot ar cerošanas sākumu, līdz cerošanas beigām (AS 21-29)		
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.5		Apsmidzināt kultūraugu sējumus vai stādījumus nezāļu 4-6 lapu stadijā, kad nezāles 10-15 cm garas		

123. Pico 750 WG

Reģ. Nr. 0671, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: pikolinafēns, 750 g/kg.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
SIA BASF

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle, ziemas mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.133		Apsmidzināt sējumus rudenī kultūrauga vienas līdz divu lapu stadijā (AS 11-12)	-	1

1	2	3	4	5	6	7

124. Pixxaro EC

Reģ. Nr. 0545, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: metil-halauksifēns, 12.5 g/l,
fluroksipirs, 280 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Coretav Agriscience Denmark A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle, rudzi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.25		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar trīs sāndzinumiem līdz cerošanas beigām (AS 23-29)	-	1
		0.4		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)		
		0.5		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar karoglapas maksts paplašināšanos līdz karoglapas maksts uzbriešanai (AS 40-45)		
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.125		Apsmidzināt sējumus, sākot ar trīs lapu stadiju līdz lapu attīstības fāzes beigām (AS 13-19)	-	1
		0.25		Apsmidzināt sējumus, sākot ar cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 20-29)		
		0.35		Apsmidzināt sējumus, sākot ar cerošanas sākumu līdz karoglapas maksts uzbriešanai (AS 30-45)		

125. Pontos

Reģ. Nr. 0782, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: pikolinafēns, 100 g/l,
flufenacets, 240 g/l.
Selektīvs, sistēmas un augsnes iedarbība, augi uzņem caur lapām un dīgstiem.
SIA BASF

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas rudzi, ziemas tritikāle	Īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.20-0.22		Apsmidzināt sējumus rudenī, pēc kultūrauga sējas līdz cerošanas vidum (AS 00-25)	-	1

126. Pony 306 SE

Reģ. Nr. 0864, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: florasulams, 6.25 g/l,
2,4-D, 300 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Pestila Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, rudzi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.4-0.6		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 21-32)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.4-0.6		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu attīstības stadiju līdz divu mezglu stadijai (AS 12-32)	-	1
Kukurūza	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.6		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu attīstības stadiju līdz sešu lapu stadijai (AS 12-16)	-	1

1	2	3	4	5	6	7

127. Pret nezālēm Hobby

Reģ. Nr. 0784, reģ. klase 3.
Darbīgā viela: pelargonskābe, 43.1 g/l.
Neselektīvs, pieskares iedarbība.
Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.

Ceļi, takas, laukumi, kuriem ir caurlaidīga virsma, dekoratīvo koku un krūmu stādījumi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, maura skarene *(Poa annua)*	30 ml/ m^2		Apsmidzināt nezāles pēc to sadīgšanas, nezāles ne augstākas par 10 cm. Atkārtota apstrāde pēc 7 līdz 21 dienai, sadīgstot jaunām nezālēm. Smidzinot zem, kokiem un krūmiem aizsargāt lapotni un auga daļas, kuras nav pārkoksnējušās.	-	4
Dekoratīvo koku un krūmu stādījumi	Sūnas *(Bryophyta)*	30 ml/ m^2		Apsmidzināt zem kokiem un krūmiem, aizsargājot koku un krūmu lapotni un auga daļas, kuras nav pārkoksnējušās. Atkārtota apstrāde pēc 7 līdz 21 dienai, sadīgstot jaunām sūnām	-	4

128. Pret nezālēm Ultra

Reģ. Nr. 0783, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: pelargonskābe, 565.5 g/l.
Neselektīvs, pieskares iedarbība.
Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.

Ceļi, takas, laukumi, kuriem ir caurlaidīga virsma, dekoratīvo koku un krūmu stādījumi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, maura skarene *(Poa annua)*	23 ml/ 10 m^2		Apsmidzināt nezāles pēc to sadīgšanas, nezāles ne augstākas par 10 cm. Atkārtota apstrāde pēc 7 līdz 21 dienai, sadīgstot jaunām nezālēm. Smidzinot zem kokiem un krūmiem, aizsargāt lapotni un auga daļas, kuras nav pārkoksnējušās.	-	4
Dekoratīvo koku un krūmu stādījumi	Sūnas *(Bryophyta)*	23 ml/ 10 m^2		Apsmidzināt zem kokiem un krūmiem, aizsargājot koku un krūmu lapotni un auga daļas, kuras nav pārkoksnējušās, kad sūnas sadīgušas. Atkārtota apstrāde pēc 7 līdz 21 dienai, sadīgstot jaunām sūnām	-	4

1	2	3	4	5	6	7

129. Primus

Reģ. Nr. 0172, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: florasulams, 50 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm.
Corteva Agriscience Denmark A/S

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Primme

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 53, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: florasulams, 50 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm.
Becesane s.r.o.

Pro

Reģ. Nr. 0585, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: florasulams, 50 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm.
Corteva Agriscience Denmark A/S

SuPrim

Reģ. Nr. 0528, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: florasulams, 50 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm.
Corteva Agriscience Denmark A/S

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, tritikāle ar/ bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.06-0.075		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai līdz kultūrauga cerošanas beigām (AS 29)	-	1
Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, tritikāle ar/ bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.075-0.1		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)		
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.05-0.075		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām stadijai (AS 20-29)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.075-0.1		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)		
Ganības (ierīkošanas gadā), stiebrzāles (sēklai, sējas gadā)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.075		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām stadijai (AS 20-29)	-	1
	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.075-0.15		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)		
Ganības (2. gada un vecākas)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.075-0.15		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39)	7	1
Stiebrzāles (sēklai)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.075-0.15		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39)	-	1

1	2	3	4	5	6	7

130. Primus 250 WG

Reģ. Nr. 0590, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: florasulams, 250 g/kg.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm.
Corteva Agriscience Denmark A/S

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, tritikāle ar/ bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.015		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 20-29). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1
Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, tritikāle ar/ bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.015-0.020		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39) Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu		
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.015		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām stadijai (AS 20-29) Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.015-0.020		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu		
Ganības (ierīkošanas gadā)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.015		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	7	1
Stiebrzāles (sēklai, sējas gadā)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.015		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1
Ganības (2. gada un vecākas)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.015-0.030		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	7	1
Stiebrzāles (sēklai, 2. gada un vecākas)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.015-0.030		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1

1	2	3	4	5	6	7

131. Primus XL

Reģ. Nr. 0387, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: florasulams, 5 g/l,
fluroksipirs, 100 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm.
Corteva Agriscience Denmark A/S

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, tritikāle ar/ bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.75-1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 39)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.75-1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu, līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39)	-	1
Ganības (ierīkošanas gadā)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.75		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu, līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39)	-	1
Ganības (2. gada un vecākas)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.75-1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu, līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39)	7	1
Stiebrzāles (sēklai, sējas gadā)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.75		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu, līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39)	-	1
Stiebrzāles (sēklai)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.75-1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu, līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39)	-	1

132. Professional

Reģ. Nr. 0713, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: prosulfokarbs, 800 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur saknēm un dzinumu.
Sharda Cropchem España S.L.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-2.5		Apsmidzināt sējumus rudenī pirms nezāļu sadīgšanas, tūlīt pēc kultūrauga sējas līdz kultūrauga sadīgšanai (AS 00-10)	-	1
		3.0-4.0		Apsmidzināt sējumus rudenī pēc sadīgšanas līdz cerošanas sākumam (AS 11-21)		
Kartupeļi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt stādījumus pirms nezāļu sadīgšanas, pirms kartupeļu sadīgšanas (AS 00-10)	42	1
Ķimenes	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas	-	1
Zirņi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas	75	1

1	2	3	4	5	6	7

133. Proman

Reģ. Nr. 0656, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metobromurons, 500 g/l.
Selektīvs, augsnes iedarbība, augi uzņem caur saknēm.
Certis Belchim B.V.

Kartupeļi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt stādījumus pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas (AS 00-09)	-	1

134. Puma Universal

Reģ. Nr. 0131, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-fenoksaprops-P, 69 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Bayer AG

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.0-1.2		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu divu mezglu stadijai (AS 32), nezāļu 2 lapu stadijā līdz to cerošanas fāzes beigām	-	1
Ziemas mieži	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu stiebrošanas sākumam (AS 30), nezāļu 2 lapu stadijā līdz to cerošanas fāzes beigām	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu 3 lapu stadijas līdz graudaugu divu mezglu stadijai (AS 13-32), nezāļu 2 lapu stadijā līdz to cerošanas fāzes beigām	-	1

135. Quelex

Reģ. Nr. 0641, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: florasulams, 100 g/kg,
metil-halauksifēns, 104.2 g/kg.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Corteva Agriscience Denmark A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle, rudzi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.025-0.050		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga trīs sāndzinumiem līdz karoglapas maksts uzbriešanai (AS 23-45). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.0250-0.0375		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz cerošanas beigām (AS 13-29). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1
		0.025-0.050		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz karoglapas maksts uzbriešanai (AS 30-45). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu		
Auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.025		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20-32). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1

1	2	3	4	5	6	7

136. Quick 50 EC

Reģ. Nr. 0429, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-kvizalofops-P, 50 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Sharda Europe b.v.b.a.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Gepard 50 EC

Reģ. Nr. 0607, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-kvizalofops-P, 50 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Sharda Europe b.v.b.a.

Graminis

Reģ. Nr. 0592, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-kvizalofops-P, 50 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Sharda Europe b.v.b.a.

Supero

Reģ. Nr. 0587, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-kvizalofops-P, 50 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Sharda Europe b.v.b.a.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Labības -sārņaugi	0.75-1.25		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar kultūrauga pirmā lapu pāra attīstību līdz sāndzinumu veidošanās sākumam (AS 11-21), labību - sārņaugu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12-29)	-	1
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.0-1.5		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar kultūrauga pirmā lapu pāra attīstību līdz sāndzinumu veidošanās sākumam (AS 11-21), sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12-29)		
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles, ložņu vārpata *(Elytrigia repens)*	2.0-3.0		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar kultūrauga pirmā lapu pāra attīstību līdz sāndzinumu veidošanās sākumam (AS 11-21), sākot ar nezāļu 4-6 lapu stadiju.		
Cukurbietes*, lopbarības bietes*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.0-3.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga vienu lapu pāri līdz trīs lapu pāriem (AS 11-13)	-	1
Galda bietes*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.0-2.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga vienu lapu, līdz lapas sedz 30 % no augsnes virskārtas (AS 11-33)	-	1
Topinambūrs*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.0-2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju, līdz izveidojušies deviņi stublāja posmi (AS 10-39)	-	1
Saulespuķes*	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.0-1.25		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz sešu lapu stadijai (AS 10-16)	-	1
Soja*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.0-2.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu pāri līdz sāndzinumu attīstības sākumam (AS 12-21)	-	1
Burkāni*, selerijas* (sakņu), mārrutki*, pastinaki*, pētersīļi* (sakņu), redīsi*, kāļi*, rāceņi*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.0-2.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu līdz saknes veidošanās sākumam (AS 11-41)	40	1

1	2	3	4	5	6	7
Sīpoli*, šalotes sīpoli*, ķiploki*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.0-2.0		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu, līdz izveidojušas deviņas lapas (AS 11-19)	42	1
Salāti*, endīvija*, rukola*, brūnās sinepes*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.0-3.0		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz izveidojies 30 % no šķirnei raksturīgā lapu rozetes lieluma (AS 12-33)	28	
Dārza pupiņas*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.0-2.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu pāri līdz sāndzinumu veidošanās sākumam (AS 12-21)	45	1
Zirņi* (graudiem)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.0-2.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz izveidojušies deviņi stublāja posmi (AS 12-39)	42	1
Lauka pupas* (graudiem), lēcas*, aunazirņi* (graudiem)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.0-2.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz izveidojušies deviņi stublāja posmi (AS 12-39)	49	1
Lupīna* (graudiem)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.0-2.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu pāri, līdz izveidojušies deviņi un vairāk sāndzinumu (AS 12-29)	49	1
Vīnogas*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.0-3.0		Apsmidzināt stādījumu, sākot ar kultūrauga ogu attīstības fāzes beigām līdz ogu nogatavošanās fāzes vidum (AS 79-85)	35	1
Ābeles*, bumbieres*, cidonijas*, parastais mespils*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.0-3.0		Apsmidzināt stādījumu, sākot ar kultūrauga augļa briešanas stadiju līdz augļu nogatavošanās sākuma stadijai (AS 75-81)	35	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

137. Rango Max

Reģ. Nr. 0706, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-kvizalofops-P, 50 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Arysta LifeScience S.A.S.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi	1.0-1.5		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad nezāles un labības - sārņaugi ir 2-5 lapu stadijā (AS 12-15)	90	1
	Ložņu vārpata *(Elymus repens)*	2.0-2.5		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad vārpata 15-20 cm augsta		
Cukurbietes, lopbarības bietes	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi	1.0-1.5		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad nezāles un labības - sārņaugi ir 2-5 lapu stadijā (AS 12-15)	60	1
	Ložņu vārpata *(Elymus rerpns)*	2.0-2.5		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad vārpata 15-20 cm augsta		

1	2	3	4	5	6	7
Kartupeļi	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi	1.0-1.5		Apsmidzināt stādījumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad nezāles un labības - sārņaugi ir 2-5 lapu stadijā (AS 12-15)	30	1
	Ložņu vārpata *(Elymus repens)*	2.0-2.5		Apsmidzināt stādījumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad vārpata 15-20 cm augsta		
Burkāni	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi	1.0-1.5		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad nezāles un labības - sārņaugi ir 2-5 lapu stadijā (AS 12-15)	30	1
	Ložņu vārpata *(Elymus repens)*	2.0-2.5		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad vārpata 15-20 cm augsta		
Pupas	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi	1.0-1.5		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad nezāles un labības - sārņaugi ir 2-5 lapu stadijā (AS 12-15)	40	1
	Ložņu vārpata *(Elymus repens)*	2.0-2.5		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad vārpata 15-20 cm augsta		
Zirņi	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi	1.0-1.5		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad nezāles un labības - sārņaugi ir 2-5 lapu stadijā (AS 12-15)	35	1
	Ložņu vārpata *(Elymus repens)*	2.0-2.5		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad vārpata 15-20 cm augsta		

138. Rapsan 500 SC

Reģ. Nr. 0546, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metazahlors, 500 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
Globachem n.v.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.5		Apsmidzināt sējumus pēc sējas (AS 00-09) vai pēc rapša sadīgšanas, līdz 8 lapu stadijai (AS 11-18) nezāļu dīgšanas laikā vai vēlākais nezāļu dīgļlapu stadija, līdz nezāles sasniedz pirmo īsto lapu	-	1

139. Rapsan Plus

Reģ. Nr. 0636, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: metazahlors, 333 g/l,
kvinmeraks, 83 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
Globachem n.v.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un atsevišķas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.0-2.25		Apsmidzināt sējumus pēc sējas (AS 00-09) vai pēc rapša sadīgšanas līdz 4 lapu stadijai (AS 10-14) nezāļu dīgšanas laikā vai vēlākais, nezāļu dīgļlapu stadijā, līdz nezāles sasniedz pirmo īsto lapu stadiju	-	1

1	2	3	4	5	6	7

140. Rassel 100 SC

Reģ. Nr. 0724, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: florasulams, 100 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Innvigo Sp. z o.o.

Ziemas kvieši	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.05		Apsmidzināt sējumus, pavasarī atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz pirmā mezgla stadijai (AS 21-31)	-	1
Ziemas tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.05		Apsmidzināt sējumus, pavasarī atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga četriem sāndzinumiem līdz pirmā mezgla stadijai (AS 24-31)	-	1

141. Rexade 440

Reģ. Nr. 0723, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: metil-halauksifēns, 104.2 g/kg,
piroksulams, 240 g/kg,
florasulams, 100 g/kg.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Corteva Agriscience Denmark A/S

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle	Īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.0375-0.0500		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga trīs sāndzinumiem līdz divu mezglu stadijai (AS 23-32)	-	1
Vasaras kvieši	Īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.040		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 21-32)	-	1

142. RIM 25 WG

Reģ. Nr. 0747, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: rimsulfurons, 250 g/kg.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
Sharda Cropchem España S.L.

Kartupeļi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.06		Apsmidzināt stādījumu, sākot ar kultūrauga pirmo lapu uz galvenā stublāja līdz atvērušās septiņas lapas uz galvenā stublāja (AS 11-17), ložņu vārpata 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 100 ml/100 l darba šķidruma	-	1
Kukurūza	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.06		Apsmidzināt sējumu, sākot ar kultūrauga pirmās lapas parādīšanos līdz septiņu lapu stadijai (AS 11-17), ložņu vārpata 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 100 ml/100 l darba šķidruma	-	1

143. Rodeo Plus

Reģ. Nr. 0879, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Bayer AG

Tīrumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.5-6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir 3-6 lapas un tās ir 10-15 cm garas	-	1
Tīrumi pirms kultūraugu sējas vai stādīšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.5-4.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas.	-	1
Cukurbietes, lopbarības bietes pirms sadīgšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.5-4.0		Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga sadīgšanas 48 stundu laikā pēc sējas	-	1
Kartupeļi, kukurūza pirms sadīgšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.5-4.0		Apsmidzināt kartupeļu stādījumus vai kukurūzas sējumus pirms sadīgšanas	-	1
Papuves	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5-6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 8.0 l/ha	-	1-2
Ganību, zālāju atjaunošana	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0-6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ataugušas pēc noganīšanas vai nopļaušanas	-	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-4.0		Apsmidzināt sējumus kultūrauga pilngatavības stadijā. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis, sinepes, lini pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-3.0		Apsmidzināt rapša sējumus, kad sēklu mitrums ir zem 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus.	10	1
Lauka pupas, zirņi, lupīna pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-4.0		Apsmidzināt sējumus, kad 75% kultūrauga pākstis ir nobrūnējušas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus.	10	1
Ābeles, bumbieres	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-5.3		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15-20 cm garas, aizsargājot koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus. Neapstrādāt augļu nogatavošanās un novākšanas laikā. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 8.0 l/ha	30	1-3
Ķirši, plūmes, persiki, aprikozes, lazdas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-5.3		Apsmidzināt pēc ražas novākšanas, kad nezāles ir aktīvi augošas, aizsargājot koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 8.0 l/ha	-	1-3
Jāņogas*, upenes*, ērkšķogas*, krūmmellenes*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-5.3		Apsmidzināt starprindas stādījumā, kad nezāles ir aktīvi augošas līdz kultūrauga ziedēšanai vai pēc ražas novākšanas Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz ogu krūmiem. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 8.0 l/ha	-	1-2

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

144. Roundup Biactive SL

Reģ. Nr. 0880, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Bayer AG

Tīrumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir 3-6 lapas un tās ir 10-15 cm garas	-	1
Tīrumi pirms kultūraugu sējas vai stādīšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.0-4.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas.	-	1
Cukurbietes, lopbarības bietes pirms sadīgšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.5-4.0		Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga sadīgšanas 48 stundu laikā pēc sējas	-	1
Kartupeļi, kukurūza pirms sadīgšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.5-4.0		Apsmidzināt kartupeļu stādījumus vai kukurūzas sējumus pirms sadīgšanas	-	1
Papuves	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0-6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 8.0 l/ha	-	1-2
Ganību, zālāju atjaunošana	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0-6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ataugušas pēc noganīšanas vai nopļaušanas	-	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-4.0		Apsmidzināt sējumus kultūrauga pilngatavības stadijā. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis, sinepes, lini pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-3.0		Apsmidzināt rapša sējumus, kad sēklu mitrums ir zem 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus.	10	1
Lauka pupas, zirņi, lupīna pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-4.0		Apsmidzināt sējumus, kad 75% kultūrauga pākstis ir nobrūnējušas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus.	10	1
Ābeles, bumbieres	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0-5.3		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15-20 cm garas, aizsargājot koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus. Neapstrādāt augļu nogatavošanās un novākšanas laikā. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 8.0 l/ha	30	1-3
Ķirši, plūmes, persiki, aprikozes, lazdas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0-5.3		Apsmidzināt pēc ražas novākšanas, kad nezāles ir aktīvi augošas, aizsargājot koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 8.0 l/ha	-	1-3
Jāņogas*, upenes*, ērkšķogas*, krūmmellenes*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0-5.3		Apsmidzināt starprindas stādījumā, kad nezāles ir aktīvi augošas līdz kultūrauga ziedēšanai vai pēc ražas novākšanas Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz ogu krūmiem. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 8.0 l/ha	-	1-2
Skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-3.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15-20 cm garas, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 5.76 l/ha	-	1-3
Kokaudzētavas, mežā pirms stādījumu ierīkošanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-3.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15-20 cm garas. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 5.76 l/ha	-	1-3
Ziemassvētku eglīšu stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-3.0		Apsmidzināt vienlaidus smidzinājumā rudenī, kad eglīšu pavasara dzinumi ir pilnībā nobrieduši un kociņiem ir iestājies miera periods	-	1-2
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības/ industriālās teritorijas (elektropārvades līnijas, naftas cauruļvadi, gāzes maģistrāles, ceļmalas, dzelzceļi)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0-6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 8.0 l/ha	-	1-3

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

145. Roundup Dynamic

Reģ. Nr. 0878, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 500 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Bayer AG

Tīrumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	0.72-4.32		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir 3-6 lapas un tās ir 10-15 cm garas	-	1
Tīrumi pirms kultūraugu sējas vai stādīšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	0.72-2.88		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas.	-	1
Cukurbietes, lopbarības bietes pirms sadīgšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	0.72-2.88		Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga sadīgšanas 48 stundu laikā pēc sējas	-	1
Kartupeļi, kukurūza pirms sadīgšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	0.72-2.88		Apsmidzināt kartupeļu stādījumus vai kukurūzas sējumus pirms sadīgšanas	-	1
Papuves	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.08-4.32		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 5.76 l/ha	-	1-2

1	2	3	4	5	6	7
Ganību, zālāju atjaunošana	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.72-4.32		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ataugušas pēc noganīšanas vai nopļaušanas	-	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.44-2.88		Apsmidzināt sējumus kultūrauga pilngatavības stadijā. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis, sinepes, lini pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.44-2.16		Apsmidzināt rapša sējumus, kad sēklu mitrums ir zem 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus.	10	1
Lauka pupas, zirņi, lupīna pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.44-2.88		Apsmidzināt sējumus, kad 75% kultūrauga pākstis ir nobrūnējušas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus.	10	1
Ābeles, bumbieres	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.08-3.8		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15-20 cm garas, aizsargājot koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus. Neapstrādāt augļu nogatavošanās un novākšanas laikā. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 5.76 l/ha	30	1-3
Ķirši, plūmes, persiki, aprikozes, lazdas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.08-3.8		Apsmidzināt pēc ražas novākšanas, kad nezāles ir aktīvi augošas, aizsargājot koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 5.76 l/ha	-	1-3
Jāņogas*, upenes*, ērkšķogas*, krūmmellenes*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.08-3.8		Apsmidzināt starprindas stādījumā, kad nezāles ir aktīvi augošas līdz kultūrauga ziedēšanai vai pēc ražas novākšanas Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz ogu krūmiem. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 5.76 l/ha	-	1-2
Skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.08-2.18		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15-20 cm garas, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 5.76 l/ha	-	1-3
Kokaudzētavas, mežā pirms stādījumu ierīkošanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.08-2.18		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15-20 cm garas. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 5.76 l/ha	-	1-3
Ziemassvētku eglīšu stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.08-2.18		Apsmidzināt vienlaidus smidzinājumā rudenī, kad eglīšu pavasara dzinumi ir pilnībā nobrieduši un kociņiem ir iestājies miera periods.	-	1-2
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības/ industriālās teritorijas (elektropārvades līnijas, naftas cauruļvadi, gāzes maģistrāles, ceļmalas, dzelzceļi)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.08-4.32		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 5.76 l/ha	-	1-3
Celmu apstrāde	Lietošanas mērķis- atvašu augšanas novēršana pēc nociršanas	-	14	Apstrādāt celmus uzreiz pēc krūmu vai koku nociršanas. Apstrādi neveikt pavasarī sulu cirkulācijas laikā	-	1

***Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

146. Roundup Gold ST

Reģ. Nr. 0873, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 450 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Bayer AG

1	2	3	4	5	6	7
Tīrumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	0.8-4.8		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir 3-6 lapas un tās ir 10-15 cm garas	-	1
Tīrumi pirms kultūraugu sējas vai stādīšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	0.8-3.2		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas.	-	1
Cukurbietes, lopbarības bietes, pirms sadīgšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.2-3.2		Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga sadīgšanas 48 stundu laikā pēc sējas	-	1
Kartupeļi, kukurūza pirms sadīgšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	1.2-3.2		Apsmidzināt kartupeļu stādījumus vai kukurūzas sējumus pirms sadīgšanas	-	1
Papuves	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.8-4.8		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 6.4 l/ha	-	1-2
Ganību, zālāju atjaunošana	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.8-4.8		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ataugušas pēc noganīšanas vai nopļaušanas	-	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.6-3.2		Apsmidzināt sējumus kultūrauga pilngatavības stadijā. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis, sinepes, lini pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.6-2.4		Apsmidzināt rapša sējumus, kad sēklu mitrums ir zem 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus.	10	1
Lauka pupas, zirņi, lupīna pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.6-3.2		Apsmidzināt sējumus, kad 75 % kultūrauga pākstis ir nobrūnējušas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus.	10	1
Ābeles, bumbieres	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.8-4.2		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15-20 cm garas, aizsargājot koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus. Neapstrādāt augļu nogatavošanās un novākšanas laikā. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 6.4 l/ha	30	1-3

1	2	3	4	5	6	7
Ķirši, plūmes, persiki, aprikozes, lazdas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.8-4.2		Apsmidzināt pēc ražas novākšanas, kad nezāles ir aktīvi augošas, aizsargājot koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 6.4 l/ha	-	1-3
Jāņogas*, upenes*, ērkšķogas*, krūmmellenes*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.8-4.2		Apsmidzināt starprindas stādījumā, kad nezāles ir aktīvi augošas līdz kultūrauga ziedēšanai vai pēc ražas novākšanas Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz ogu krūmiem. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 6.4 l/ha	-	1-2
Gurķi, ķirbji, galviņkāposti, burkāni, sīpoli, sparģeļi, puravi, cukurbietes, galda bietes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.2-3.2		Apsmidzināt nezāles kultūraugu starprindās, nepieļaujot preparāta nonākšanu uz kultūrauga	30	1
Skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.8-2.4		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15-20 cm garas, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 6.4 l/ha	-	1-3
Kokaudzētavas, mežā pirms stādījumu ierīkošanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.8-2.4		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15-20 cm garas. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 6.4 l/ha	-	1-3
Ziemassvētku eglīšu stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.8-2.4		Apsmidzināt vienlaidus smidzinājumā rudenī, kad eglīšu pavasara dzinumi ir pilnībā nobrieduši un kociņiem ir iestājies miera periods.	-	1-2
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības/ industriālās teritorijas (elektropārvades līnijas, naftas cauruļvadi, gāzes maģistrāles, ceļmalas, dzelzceļi)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.8-4.8		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 6.4 l/ha	-	1-3
Celmu apstrāde	Lietošanas mērķis- atvašu augšanas novēršana pēc nociršanas	-	15	Apstrādāt celmus uzreiz pēc krūmu vai koku nociršanas. Apstrādi neveikt pavasarī sulu cirkulācijas laikā	-	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

147. Roundup PowerMax

Reģ. Nr. 0519, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 720 g/kg.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Bayer AG

1	2	3	4	5	6	7
Tīrumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	0.5-3.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir 3-6 lapas un tās ir 10-15 cm garas	-	1
Tīrumi pirms kultūraugu sējas vai stādīšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	0.5-2.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas.	-	1
Cukurbietes, lopbarības bietes, pirms sadīgšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	0.5-2.0		Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga sadīgšanas 48 stundu laikā pēc sējas	-	1
Kartupeļi pirms sadīgšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības -sārņaugi	0.5-2.0		Apsmidzināt kartupeļu stādījumus pirms sadīgšanas	-	1
Papuves	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.5-3.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 4.0 kg/ha	-	1-2
Ganību, zālāju atjaunošana	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.5-3.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ataugušas pēc noganīšanas vai nopļaušanas	-	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0-2.0		Apsmidzināt sējumus kultūrauga pilngatavības stadijā. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis, sinepes, lini pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0-1.5		Apsmidzināt rapša sējumus, kad sēklu mitrums ir zem 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus.	10	1
Lauka pupas, zirņi, lupīna pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0-2.0		Apsmidzināt sējumus, kad 75% kultūrauga pākstis ir nobrūnējušas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus.	10	1
Ābeles, bumbieres	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.5-2.58		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15-20 cm garas, aizsargājot koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus. Neapstrādāt augļu nogatavošanās un novākšanas laikā. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 4.0 kg/ha	-	1-3
Ķirši, plūmes, persiki, aprikozes, lazdas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.5-2.58		Apsmidzināt pēc ražas novākšanas, kad nezāles ir aktīvi augošas, aizsargājot koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 4.0 kg/ha	-	1-3

1	2	3	4	5	6	7
Jāņogas*, upenes*, ērkšķogas*, krūmmellenes*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.5-2.58		Apsmidzināt starprindas stādījumā, kad nezāles ir aktīvi augošas līdz kultūrauga ziedēšanai vai pēc ražas novākšanas Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz ogu krūmiem. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 4.0 kg/ha	-	1-2
Skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.5-1.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15-20 cm garas., aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 4.0 kg/ha	-	1-3
Kokaudzētavas, mežs pirms stādījumu ierīkošanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.5-1.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15-20 cm garas. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 4.0 kg/ha	-	1-3
Ziemassvētku eglīšu stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.5-1.5		Apsmidzināt vienlaidus smidzinājumā rudenī, kad eglīšu pavasara dzinumi ir pilnībā nobrieduši un kociņiem ir iestājies miera periods. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 4.0 kg/ha	-	1-3
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības/ industriālās teritorijas (elektropārvades līnijas, naftas cauruļvadi, gāzes maģistrāles, ceļmalas, dzelzceļi)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.5-3.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4-6 lapas. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 4.0 kg/ha	-	1-3
Celmu apstrāde	Lietošanas mērķis- atvašu augšanas novēršana pēc nociršanas	-	10	Apstrādāt celmus uzreiz pēc krūmu vai koku nociršanas. Apstrādi neveikt pavasarī sulu cirkulācijas laikā	-	1

*__Mazais lietojums.__ Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība.__ Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

148. Roxy 800 EC

Reģ. Nr. 0518, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: prosulfokarbs, 800 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur saknēm un dzinumiem.
Globachem n.v.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Boiler

Reģ. Nr. 0824, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: prosulfokarbs, 800 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur saknēm un dzinumiem.
Globachem n.v.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, ziemas tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un atsevišķas īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.5-4.0		Apsmidzināt sējumus rudenī pirms nezāļu sadīgšanas, tūlīt pēc kultūrauga sējas līdz 3 lapu stadijai (AS 00-13)	-	1
Kartupeļi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un atsevišķas īsmūža viendīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt stādījumu pirms nezāļu sadīgšanas, pirms kartupeļu sadīgšanas (AS 00-08)	42	1

1	2	3	4	5	6	7

149. Saracen

Reģ. Nr. 0471, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: florasulams, 50 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
Nufarm GmbH & Co KG

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Fragma

Reģ. Nr. 0749, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: florasulams, 50 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, tritikāle, rudzi, ziemas mieži,	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.075-0.100		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.075-0.100		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12-39)	-	1
Daudzgadīgās stiebrzāles sēklai	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.075-0.150		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz kultūrauga attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39)	-	1
Ganības	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.075-0.150		Apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz kultūrauga attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39)	7	1

150. Saracen Delta

Reģ. Nr. 0493, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: florasulams, 50 g/l, diflufenikans, 500 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
Nufarm GmbH & Co KG

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Fragma Delta

Reģ. Nr. 0780, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: florasulams, 50 g/l, diflufenikans, 500 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, ziemas tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.075		Apsmidzināt sējumus rudenī, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz divu sāndzinumu stadijai (AS 12-22)	-	1
		0.075		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 20-29)		
		0.100		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai AS (30-32)		
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.075		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz cerošanas beigām (AS 12-29)	-	1
		0.100		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)		
Daudzgadīgās stiebrzāles sēklai	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.075-0.100		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 20-32)	-	1

1	2	3	4	5	6	7

151. Sekator OD

Reģ. Nr. 0260, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: amidosulfurons, 100 g/l,
nātrija metil-jodosulfurons, 25 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Bayer AG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, ziemas tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.10-0.15		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas parādīšanas stadijai (AS 21-37)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, vasaras tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.10-0.15		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz karoglapas parādīšanas stadijai (AS 13-37)	-	1

152. Sentrallas LQM

Reģ. Nr. 0875, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: fluroksipirs, 150 g/l,
metil-tifensulfurons, 30 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
FMC Agricultural Solutions A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, ziemas tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.4-0.75		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.4-0.75		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)	-	1

153. Shyfo

Reģ. Nr. 0802, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Sharda Cropchem España S.L.

Tīrumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5-3.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai vismaz 4-5 lapas	-	1
	Ložņu vārpata *(Agropyron repens)*	2.0-3.0				
Platības pirms kultūrauga sējas / stādīšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5-3.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai vismaz 4-5 lapas	-	1
	Ložņu vārpata *(Agropyron repens)*	2.0-3.0				
Skuju koku, lapu koku jaunie stādījumi (kokaudzētavās, mežā)	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.5-2.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, aizsargājot jauno kociņu lapotni un stumbrus	-	1
	Kokaugi - sārņaugi	3.0				
Pirms dekoratīvo augu sējas / stādīšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas	-	1

1	2	3	4	5	6	7

154. Spectrum

Reģ. Nr. 0850, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: dimetēnamīds-P, 720 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur koleoptili un ar saknēm.
SIA BASF

Zirņi (svaigam patēriņam ar/ bez pākstīm, graudiem), lauka pupas (svaigam patēriņam ar/ bez pākstīm, graudiem), dārza pupiņas* (svaigam patēriņam ar/ bez pākstīm, graudiem)	Īsmūža divdīgļlapju un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.8		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas līdz dīgšanas sākumam (AS 00-09)	-	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

155. Spotlight Plus

Reģ. Nr. 0718, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-karfentrazons, 60 g/l.
Pieskares iedarbība.
FMC Agricultural Solutions A/S

Zemenes*	Divdīgļlapju nezāles	0.4		Apsmidzināt stādījumu pavasarī, pirms kultūraugs atsāk veģetāciju, ja nepieciešams atkārtoti pēc ražas novākšanas	-	2
Jāņogas*, upenes*, ērkšķogas*, krūmmellenes*	Divdīgļlapju nezāles	0.8		Apsmidzināt ogulāju apdobes pirms kultūrauga ziedēšanas, ja nepieciešams atkārtoti pēc ražas novākšanas	-	2
Sparģeļi*	Divdīgļlapju nezāles	0.3		Apsmidzināt stādījumu pirms kultūrauga sadīgšanas un pēc ražas novākšanas	-	2
Avenes*, kazenes*	Kultūrauga atvases	0.8		Apsmidzināt kultūrauga atvases. Smidzinājumam jābūt vērstam uz kultūrauga pamatni (ne augstāk par 20 cm). Darba šķidruma patēriņš 1000 l/ha	21	2

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

Herbicīdi

1	2	3	4	5	6	7

156. Starane 333 HL

Reģ. Nr. 0605, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: fluroksipirs, 333 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Corteva Agriscience Denmark A/S

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Spitfire 333 HL
Reģ. Nr. 0606, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: fluroksipirs, 333 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Corteva Agriscience Denmark A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, rudzi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.25-0.4		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar trīs sandzinumu stadiju, līdz līdz kultūrauga karoglapas maksts piebriedusi (AS 45)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.1-0.3		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS 13-45)	-	1
Kukurūza	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.15		Apsmidzināt sējumus sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz sešu lapu stadijai (AS 13-16)	-	1

157. Starane XL

Reģ. Nr. 0277, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: florasulams, 2.5 g/l,
fluroksipirs, 100 g/l,
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm.
Corteva Agriscience Denmark A/S

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Sitara[1]
Reģ. Nr. 0830, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: fluroksipirs, 100 g/l,
florasulams, 2.5 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm.
Sharda Cropchem España S.L.

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, tritikāle ar/ bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.8-1.2		Apsmidzināt sējumus, pavasarī atsākoties veģetācijai, līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS 45)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu, līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS 20-45)	-	1
Auzas ar/ bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu, līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39)	-	1
Ganības (ierīkošanas gadā)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu, līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS 20-45)	-	1
Ganības (2. gada un vecākas)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.5-1.8		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu, līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS 20-45)	7	1
Stiebrzāles* (sēklai, sējas gadā)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu, līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS 20-45)	-	1

1	2	3	4	5	6	7
Stiebrzāles* (sēklai)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.5-1.8		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu, līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS 20-45)	-	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

[1]Analogs augu aizsardzības līdzeklim Starane XL, jo beidzies datu aizsardzības periods.

158. Starship

Reģ. Nr. 0520, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: mezotrions, 100 g/l.
Sistēmas iedarbība.
Nufarm GmbH & Co KG

Kukurūza	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.75-1.0		1. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, sākot ar divu lapu stadiju līdz sešu lapu stadijai (AS 12-16)	-	1
	Parastā gaiļsāre *(Echinochloa crus-galli)*	1.0-1.5				
	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, parastā gaiļsāre *(Echinochloa crus-galli)*	0.75+ 0.75		2. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē: 1.reizi - kukurūzas 2-4 lapu stadijā (AS 12-14); 2.reizi - kukurūzas 4-8 lapu stadijā (AS 14-18). Intervāls starp apstrādēm 7-14 dienas	-	2

159. Stomp CS

Reģ. Nr. 0431, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: pendimetalīns, 455 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur saknē un lapām.
SIA BASF

Vasaras kvieši, vasaras mieži ar āboliņa vai lucernas pasēju	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.73-0.88		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas līdz kultūrauga 1-2 lapu stadijai, kad āboliņš vai lucerna ir 1-2 lapu stadijā, maisījumā ar piemērotu preparātu	-	1
Zirņi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.18-4.35		Apsmidzināt sējumus pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži maisījumā ar zirņiem	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.18-4.35		Apsmidzināt sējumus pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai	-	1
Sīpoli, ķiploki	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.18-4.35		Apsmidzināt pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) vai izstādīšanas pirms kultūrauga dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā preparāta deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4.35 l/ha	-	2
Burkāni, sakņu pētersīļi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.18-4.35		Apsmidzināt sējumus pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) pirms kultūrauga dīgšanas	-	1

1	2	3	4	5	6	7
Kukurūza	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.18-4.35		Apsmidzināt sējumus pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 5 cm) pirms kultūrauga dīgšanas	-	1
Lauka pupas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.18-4.35		Apsmidzināt sējumus pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) pirms kultūrauga dīgšanas	-	1
Tulpes, narcises	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.63		Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas	-	1

160. Sultan 500 SC

Reģ. Nr. 0245, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metazahlors, 500 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
ADAMA Registrations B.V.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Fuego 500 SC

Reģ. Nr. 0859, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metazahlors, 500 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
ADAMA Registrations B.V.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0-1.5		Apsmidzināt sējumus pēc sējas līdz rapša četru lapu stadijai (AS 00-14), nezāļu dīgļlapu stadijā, līdz nezāles sasniedz pirmo īsto lapu stadiju	-	1

161. Sultan Super

Reģ. Nr. 0457, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: metazahlors, 375 g/l, kvinmeraks, 125 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un augsni.
ADAMA Registrations B.V.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Fuego Top

Reģ. Nr. 0483, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: metazahlors, 375 g/l, kvinmeraks, 125 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un augsni.
ADAMA Registrations B.V.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.75-2.0		Apsmidzināt sējumus pēc sējas līdz rapša 3 lapu stadijai (AS 00-13)	-	1

162. Sunda

Reģ. Nr. 0822, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-fenoksaprops-P, 69 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbības, augi uzņem caur lapām.
Sharda Cropchem España S.L.

Ziemas kvieši, ziemas tritikāle, rudzi	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.2		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 21-32)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga vienas lapas stadiju līdz divu mezglu stadijai (AS 11-32)	-	1
Ziemas mieži	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 21-32)	-	1

1	2	3	4	5	6	7

163.1. Taifun B

Reģ. Nr. 0027, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
ADAMA Registrations B.V.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Rodeo TF

Reģ. Nr. 0889, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Bayer AG

Kultūraugu sējumi rugainē pirms sadīgšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi	2.0-3.5		Apsmidzināt sējumus pēc sējas, pirms kultūrauga sadīgšanas (AS 00-09). Kultūrauga sēklām jābūt pilnībā nosegtām ar augsni	-	1
Kartupeļi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-3.5		Apsmidzināt stādījumus pēc stādīšanas, pirms kultūrauga sadīgšanas (AS 00-09). Nelietot stādījumos sēklas materiāla ieguvei un stādījumos, kur izmantots diedzēts stādāmais materiāls.	-	1
Cukurbietes, sīpoli, burkāni	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-3.5		Apsmidzināt sējumus pēc sējas, pirms kultūrauga sadīgšanas (AS 00-09). Kultūrauga sēklām jābūt pilnībā nosegtām ar augsni	-	1
Zirņi, lauka pupas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0-4.0		Apsmidzināt, kad notiek dabiskā svētku nogatavošanās un mitruma saturs sēklās ir zemāks par 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Tīrumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā. Deva atkarībā no nezāļu bioloģiskā sastāva	-	1
Tīrumu apstrāde pirms kultūraugu sējas vai stādīšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-5.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā. Deva atkarībā no nezāļu bioloģiskā sastāva	-	1
Papuves	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā. Deva atkarībā no nezāļu bioloģiskā sastāva	-	1
Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5-5.0		1. lietošanas veids Apsmidzināt stādījumu pavasarī atjaunojoties veģetācijai, līdz sāk veidoties augļaizmetņi (AS 71) vai pēc ražas novākšanas. Neapstrādāt sakņu atvases, koku zarus, lapas un aizsargāt jauno kociņu (1-2 gadi) stumbrus	-	1
Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0		2. lietošanas veids Apsmidzināt stādījumu pavasarī atjaunojoties veģetācijai, līdz sāk veidoties augļaizmetņi (AS 71) vai pēc ražas novākšanas Neapstrādāt sakņu atvases, koku zarus, lapas un aizsargāt jauno kociņu (1-2 gadi) stumbrus	-	2
Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1 daļa preparāta 2 daļās ūdens jeb 33 %	33	Apstrādāt stādījumos atsevišķas nezāles ar aplikatoru pavasarī atjaunojoties veģetācijai, līdz sāk veidoties augļaizmetņi (AS 71) vai pēc ražas novākšanas Neapstrādāt sakņu atvases, koku zarus, lapas.	-	1
Smiltsērkšķu* jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-5.0		1. lietošanas veids Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 4-5 lapas un tās ir 10-20 cm garas. Apsmidzināt 70 cm diametrā ap stumbru, aizsargājot kociņu lapotni un stumbru	-	1

1	2	3	4	5	6	7
Smiltsērkšķu* jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0		2. lietošanas veids Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 4-5 lapas un tās ir 10-20 cm garas. Apsmidzināt 70 cm diametrā ap stumbru, aizsargājot kociņu lapotni un stumbru	-	2
Jāņogas*, upenes*, ērkšķogas*, krūmmellenes*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-5.0		1. lietošanas veids Apsmidzināt starprindas stādījumā, kad nezāles ir aktīvi augošas līdz kultūrauga ziedēšanai vai pēc ražas novākšanas Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz ogu krūmiem	-	1
Jāņogas*, upenes*, ērkšķogas*, krūmmellenes*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0		2. lietošanas veids Apsmidzināt starprindas stādījumā, kad nezāles ir aktīvi augošas līdz kultūrauga ziedēšanai vai pēc ražas novākšanas Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz ogu krūmiem	-	2
Jāņogas*, upenes*, ērkšķogas*, krūmmellenes* (neražojoši stādījumi)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-5.0		1. lietošanas veids Apsmidzināt starprindas stādījumā, kad nezāles ir aktīvi augošas. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz ogu krūmiem	-	1
Jāņogas*, upenes*, ērkšķogas*, krūmmellenes* (neražojoši stādījumi)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0		2. lietošanas veids Apsmidzināt starprindas stādījumā, kad nezāles ir aktīvi augošas. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz ogu krūmiem	-	2
Zālāji	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0-4.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 4-5 lapas un tās ir līdz 10 cm garas. Nepieļaut ganīšanu uz apstrādātās platības	-	1
Skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0-3.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām labi izveidota lapu virsma, ir 4-5 lapas un nezāles ir 10-20 cm garas, aizsargājot jauno kociņu stumbrus	-	1
Skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1 daļa preparāta 2 daļās ūdens jeb 33%	33	Apstrādāt stādījumos atsevišķas nezāles ar aplikatoru	-	1
Lauksaimniecībā neizmantojamās platībās/ industriālās teritorijās (elektropārvades līnijas, naftas cauruļvadi, gāzes maģistrāles, ceļmalas, dzelzceļi)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0-4.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 4-5 lapas un tās ir līdz 10 cm garas	-	1
Celmu apstrāde	Lietošanas mērķis - atvašu augšanas novēršana pēc nociršanas	-	20	Apstrādāt celmus uzreiz pēc krūmu vai koku nociršanas. Neveikt apstrādi pavasarī aktīvas sulu cirkulācijas laikā	-	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

163.2. Taifun B

Reģ. Nr. 0027, reģ. klase 3.
Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
ADAMA Registrations B.V.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Emin dārzam Taifun B

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 30, reģ. klase 3.
Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
SIA "Emin dārzam"

Apstrādājamais objekts	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, ml/100m²	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Aizaugušu platību sagatavošana dārzeņu, augļu koku un krūmu, dekoratīvo koku, krūmu un krāšņumaugu stādīšanai, zāliena ierīkošanai, nezāļu ierobežošana sakņu dārzā pēc ražas novākšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	30		Apsmidzināt aktīvi augošas nezāles. Vārpatai ir vismaz 3-6 lapas	-	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	50				
Zāliena atjaunošana	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	30-50		Apsmidzināt atjaunošanai paredzēto zālienu, kad nezāles ir aktīvi augošas. Vārpatai ir vismaz 3-6 lapas	-	1

164. Tanaris

Reģ. Nr. 0579, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: dimetēnamīds-P, 333 g/l, kvinmeraks, 167 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
SIA BASF

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Butisan Pro

Reģ. Nr. 0629, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: dimetēnamīds-P, 333 g/l, kvinmeraks, 167 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
SIA BASF

Ziemas rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.5		1. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga sadīgšanas (AS 00-09)	-	1
		1.4		2. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18)		
Vasaras rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.5		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18)	-	1
Cukurbietes, lopbarības bietes	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.3+ 0.6+ 0.6		Apsmidzināt sējumus, pirmo reizi, sākot ar kultūrauga pirmo lapu līdz divu lapu stadijai (AS 10-12), otro reizi kultūrauga trīs līdz četru lapu stadijā (AS 13-14) un trešo reizi kultūrauga piecu līdz sešu lapu stadijā (AS 15-16)	-	3

1	2	3	4	5	6	7

165. Targa Super

Reģ. Nr. 0383, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-kvizalofops-P, 50 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Bayer AG

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Jenot Plus 050 EC[1]

Reģ. Nr. 0823, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-kvizalofops-P, 50 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Innvigo Sp. z o.o.

Pilot

Reģ. Nr. 0765, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-kvizalofops-P, 50 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Nissan Chemical Europe S.A.S.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības sārņaugi	0.75-1.25		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12-29)	75	1
	Ložņu vārpata *(Agropyron repens)*	1.5-2.0		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad vārpata 15-20 cm augsta		
Cukurbietes, lopbarības bietes	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības sārņaugi	0.75-1.25		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12-29)	-	1
	Ložņu vārpata *(Agropyron repens)*	1.5-2.0		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad vārpata 15-20 cm augsta		
Kartupeļi	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības sārņaugi	0.75-1.25		Apsmidzināt stādījumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12-29)	49	1
	Ložņu vārpata *(Agropyron repens)*	1.5-2.0		Apsmidzināt stādījumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad vārpata 15-20 cm augsta		
Burkāni	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības sārņaugi	0.75-1.25		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12-29)	42	1
	Ložņu vārpata *(Agropyron repens)*	1.5-2.0		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad vārpata 15-20 cm augsta		
Pupas*, zirņi*	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības sārņaugi	0.75-1.25		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12-29)	45	1
	Ložņu vārpata *(Agropyron repens)*	1.5-2.0		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad vārpata 15-20 cm augsta		

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

[1]Analogs augu aizsardzības līdzeklim Targa Super, jo beidzies datu aizsardzības periods.

1	2	3	4	5	6	7

166. TBM 75 WG

Reģ. Nr. 0581, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metil-tribenurons, 750 g/kg.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
Sharda Europe b.v.b.a.

Ziemas kvieši, rudzi, tritikāle, ziemas mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.02		Apsmidzināt kultūraugu sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz trīs mezglu stadijai (AS 20-33)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.02		Apsmidzināt kultūraugu sējumus, sakot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz trīs mezglu stadijai (AS 12-33)	-	1

167. Temsa SC

Reģ. Nr. 0563, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: mezotrions, 100 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm.
Globachem n.v.

Kukurūza	Parastā gaiļsāre, īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 12-18)	-	1

168. Teridox 500 EC

Reģ. Nr. 0051, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: dimetahlors, 500 g/l.
Selektīvs, sistēmas un augsnes iedarbība, augi uzņem caur dīgstiem un saknēm.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas - pirms nezāļu un kultūrauga sadīgšanas (AS 00-09). Pieļaujamais maksimālais darbīgās vielas dimetahlors daudzums ir 1 kg/ha reizi trijos gados tajā pašā laukā, neatkarīgi no lietotā preparāta, kura sastāvā ir dimetahlors	-	1

169. Timeline FX

Reģ. Nr. 0767, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: fluroksipirs, 52.5 g/l,
florasulams, 1.75 g/l,
pinoksadēns, 30 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, ziemas tritikāle, rudzi, ziemas mieži	Īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.5-2.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga sāndzinumu veidošanās sākumu līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 20-37)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.5-2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga sāndzinumu veidošanās sākumu līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 20-37)	-	1

1	2	3	4	5	6	7

170. Titus 25 d.g.

Reģ. Nr. 0059, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: rimsulfurons, 250 g/kg.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
Corteva Agriscience Denmark A/S

Kartupeļi	Divdīgļlapju nezāles un ložņu vārpata	0.05		Apsmidzināt stādījumus divdīgļlapju nezāļu dīgļlapu – 2 īsto lapu stadijā, vārpatas 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 100 ml/100 l darba šķidruma	-	1
		0.03+ 0.02		Apsmidzināt stādījumus divdīgļlapju nezāļu dīgļlapu – 2 īsto lapu stadijā, vārpatas 2-4 lapu stadijā, atkārtoti pēc 7-10 dienām. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 100 ml/100 l darba šķidruma	-	2
Kukurūza	Divdīgļlapju nezāles un ložņu vārpata	0.03- 0.05		Apsmidzināt sējumus kukurūzas 2-6 lapu stadijā, divdīgļlapju nezāļu dīgļlapu – 2 īsto lapu stadijā, vārpatas 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 100 ml/100 l darba šķidruma	-	1
		0.03+ 0.02		Apsmidzināt sējumus kukurūzas 2-6 lapu stadijā, divdīgļlapju nezāļu dīgļlapu – 2 īsto lapu stadijā, vārpatas 2-4 lapu stadijā, atkārtoti pēc 7-10 dienām. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 100 ml/100 l darba šķidruma	-	2

171. Tomahawk 200 EC

Reģ. Nr. 0536, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: fluroksipirs, 200 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle, rudzi (arī ar stiebrzāļu pasēju)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.5-0.7		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz kultūrauga karoglapas maksts piebriedusi (AS 45)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas (arī ar stiebrzāļu pasēju)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.45- 0.60		Apsmidzināt sējumu, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju, līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS 12-45)	-	1
Daudzgadīgās stiebrzāles (sēklai un lopbarībai), ganības (zelmenī stiebrzāles), zāliens, zāliens golfa laukumā	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.8		Apsmidzināt sējumus pēc nezāļu sadīgšanas, sākot ar stiebrzāļu 3 lapu stadiju, līdz karoglapas maksts uzbriešanas stadijai (AS 13-45)	7	1
Stiebrzāles sēklai (sējas gadā)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.45-0.6		Apsmidzināt sējumus pēc nezāļu sadīgšanas, sākot ar stiebrzāļu 2 lapu stadiju, līdz 5 lapu stadijai (AS 12-15)	-	1

1	2	3	4	5	6	7

172. Tombo WG

Reģ. Nr. 0335, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: piroksulams, 50 g/kg,
florasulams, 25 g/kg,
aminopiralīds, 50 g/kg.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Corteva Agriscience Denmark A/S

Ziemas kvieši, tritikāle, rudzi	Īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.15		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 21-29). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1
		0.20		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu		
Vasaras kvieši	Īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.10- 0.15		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 21-32). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1

173. Trimmer 500 WG

Reģ. Nr. 0469, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metil-tribenurons, 500 g/kg.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
ADAMA Registartions B.V.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, rudzi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.015		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 21-29). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1
		0.015- 0.0225		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu		
Vasaras kvieši, vasaras mieži, vasaras tritikāle, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.015		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 21-29). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	-	1
		0.015- 0.0225		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu		

Herbicīdi

1	2	3	4	5	6	7

174. Tripali

Reģ. Nr. 0551, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: metil-metsulfurons, 83 g/kg,
metil-tribenurons, 83 g/kg,
florasulams, 105 g/kg.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.
FMC Agricultural Solutions A/S

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.025-0.035		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma	-	1
Ziemas mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.025-0.035		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, kultūrauga stiebrošanas sākumā (AS 30). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.025-0.035		Apsmidzināt, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma	-	1
Auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.025		Apsmidzināt sējumus kultūrauga stiebrošanas sākumā (AS 30). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma	-	1

175. Tristar 50 SG

Reģ. Nr. 0814, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metil-tribenurons, 500 g/kg.
Selektīvs, sistēmas iedarbības, augi uzņem caur lapām un saknēm.
Innvigo Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, ziemas tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un atsevišķas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.015-0.0225		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma	-	1
Vasaras mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un atsevišķas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.015		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga sāndzinumu veidošanās sākumu līdz cerošanas beigām (AS 20-29).). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma	-	1
		0.015-0.0225		Apsmidzināt, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz pirmā mezgla stadijai (AS 30-31). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma		

176. Trolten

Reģ. Nr. 0816, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metil-halauksifēns, 7.81 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Corteva Agriscience Denmark A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.4		Apsmidzināt sējumus rudenī, sākot ar kultūrauga vienas lapas stadiju līdz divu sāndzinumu stadijai (AS 11-22)	-	1
		0.4		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga trīs sāndzinumu stadiju līdz cerošanas beigām (AS 23-29)	-	1
		0.8		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu karoglapas maksts piebriešanas stadijai (AS 30-45). Kopā veģetācijas period preparāta daudzums nedrīkst pārsniegt 1.2 l/ha (rudens+pavasaris)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.4		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz cerošanas beigām (AS 13-29)	-	1
		0.8		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu karoglapas maksts piebriešanas stadijai (AS 30-45)		

177. VextaDim 240 EC

Reģ. Nr. 0908, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: kletodims, 240 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Vextachem s.r.l.

Cukurbietes, lopbarības bietes	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi	0.75		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu līdz lapas nosedz 10% no augsnes virskārtas starprindās (AS 10-31)	-	1
Ziemas rapsis	Labības -sārņaugi	0.5		Apsmidzināt sējumu, sākot ar kultūrauga dīgļlapu atvēršanos līdz stublāja pagarināšanās sākumam (AS 10-31)	-	1
Selerijas* (sakņu), rāceņi*, mārrutki*, kāļi*	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi	0.75		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu līdz lapas nosedz 10% no augsnes virskārtas starprindās (AS 10-31)	-	1
Saulespuķes*, sinepes*	Labības - sārņaugi	0.5		Apsmidzināt sējumu, sākot ar kultūrauga dīgļlapu atvēršanos līdz stublāja pagarināšanās sākumam (AS 10-31)	-	1
Kaņepes* (šķiedrai), lini* (šķiedrai)	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi	0.75		Apsmidzināt sējumu, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz sešu lapu stadijia (AS 12-16)	-	1
Kārkli*	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi	0.75		Apsmidzināt stādījumus veģetācijas perioda sākumā	-	1
Krāšņumaugi*	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības - sārņaugi	0.75		Apsmidzināt sējumus un stādījumus veģetācijas perioda sākumā	-	1

*__Mazais lietojums.__ Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība.__ Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

178. Xerton

Reģ. Nr. 0794, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etofumezāts, 417 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur dīgstiem.
UPL Holdings Coöperatief U.A.

Ziemas kvieši	Parastā rudzusmilga (*Apera spica-venti)*, maura skarene *(Poa annua)*	0.45-0.48		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga vienas lapas stadiju līdz trīs sāndzinumu stadijai (AS 11-23), nezāļu attīstības stadijā, sākot ar pirmo lapu līdz cerošanas sākumam (AS 10-21)	-	1

179. Yodo 100 OD

Reģ. Nr. 0727, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: nātrija metil-jodosulfurons, 100 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Innvigo Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.1		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atjaunojoties veģetācijai, sākot ar cerošanas sākumu līdz stiebrošanas sākumam (AS 20-30). Darba šķidrumam obligāti jāpievieno palīgviela, kas satur dietilmefenfiru 0.1 l/ha	-	1

180. Zorro 300 SL

Reģ. Nr. 0726, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: piklorams, 300 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Innvigo Sp. z o.o.

Ziemas rapsis	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.078		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atjaunojoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stublāja pagarināšanās sākumu līdz ziedpumpuru veidošanās sākumam (AS 30-50)	-	1

181. Zypar

Reģ. Nr. 0555, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: metil-halauksifēns, 6.254 g/l,
florasulams, 5 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.
Corteva Agriscience Denmark A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle, rudzi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5-0.75		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar trīs sāndzinumiem līdz cerošanas beigām (AS 23-29)	-	1
		0.5-1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz karoglapas maksts uzbriešanai (AS 30-45)		
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar trīs lapu stadiju līdz cerošanas fāzes beigām (AS 13-29)	-	1
		0.5-1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz karoglapas maksts uzbriešanai (AS 30-45)		

1	2	3	4	5	6	7
Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes*, zemes zem elektrolīniju pārvadiem *	Latvāņi	1.0-2.0		Apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, kad latvāņi ataug un ir 20-30 cm augstumā (parasti aprīlis - maijs)	-	1
Ceļa malas*, lauksaimniecībā neizmantojamās zemes*, mežmalas*, zemes zem elektrolīniju pārvadiem*	Latvāņi	2.0		Apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, atsevišķi augošu latvāņu rozetes. Rozetes diametrs ir ap 20-25 cm	-	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

INSEKTICĪDI UN AKARICĪDI

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, l, kg/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7

1. Actellic 50 EC

Reģ. Nr. 0170, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metilpirimifoss, 50 %.
Pieskares, elpošanas un zarnu indes iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Tukšas noliktavu telpas, graudu pārstrādes uzņēmumu telpas un iekārtas	Smecernieki *(Sitophilus spp,)*, miltu sviļņi *(Ephestia kuehniella, Pyralis furinalis)*, mazais miltu melnulis *(Tribolium confusum)*, zobkakla plakanis *(Oryzaephilus surinamensis)*, miltu ērce *(Tyroglyphus farinae)*	0.4 ml/m^2		Apsmidzināt, vienmērīgi noklājot apstrādājamo virsmu. Ieteicamais darba šķidruma patēriņš līdz 50 ml/m^2	3	1
Kviešu, miežu, tritikāles, auzu graudi lopbarībai un sēklai	Smecernieki *(Sitophilus spp,)*, miltu sviļņi *(Ephestia kuehniella, Pyralis furinalis)*, mazais miltu melnulis *(Tribolium confusum)*, zobkakla plakanis *(Oryzaephilus surinamensis)*, ērces *(Acari)*	8 ml/t		Vienmērīgi apstrādāt graudu vai sēklu masu ar darba šķidrumu. Ieteicamais darba šķidruma patēriņš līdz 5 l/t	-	1
Rudzu graudi sēklai, zālāju sēklas materiāls						

2. Benevia 100 OD

Reģ. Nr. 0856, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: ciāntraniliprols, 100 g/l.
Pieskares un zarnu iedarbības insekticīds.
FMC Agricultural Solutions A/S

Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis *(Leptinotarsa decemlineata)*	0.125		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga divām lapām uz galvenā stublāja līdz bumbuļi sasnieguši 40 %-50 % no paredzamās masas (12-45)	14	2
Galviņkāposti, Savojas kāposti, Briseles kāposti	Kāpostu agrā muša *(Delia radicum)*	0.75		Apsmidzināt stādījumus 3-5 dienas pēc izstādīšanas, atkārtoti pēc 7-10 dienām	7	2
	Tripši *(Thysanoptera)*, kāpostu baltblusiņa *(Aleyrodes proletella)*, spradži *(Phylotretta spp.)*	0.75		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar divu lapu stadiju līdz galviņa sasniegusi raksturīgo lielumu (AS 12-49)		
	Kāpostu cekulkode *(Plutella xylostella)*, kāpostu pūcīte *(Mamestra brassicae)*, rāceņu baltenis *(Pieris rapae)*, kāpostu baltenis *(Pieris brassicae)*, krustziežu zāģlapsene *(Athalia rosae)*	0.4-0.5		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar divu lapu stadiju līdz galviņa sasniegusi raksturīgo lielumu (AS 12-49)		

1	2	3	4	5	6	7
Ziedkāposti, brokoļi	Kāpostu agrā muša *(Delia radicum)*	0.75		Apsmidzināt stādījumus 3-5 dienas pēc izstādīšanas, atkārtoti pēc 7-10 dienām	7	2
	Tripši *(Thysanoptera)*, kāpostu baltblusiņa *(Aleyrodes proletella)*, spradži *(Phylotretta spp.)*	0.75		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar divu lapu stadiju līdz galviņa sasniegusi raksturīgo lielumu (AS 12-49)		
	Kāpostu cekulkode *(Plutella xylostella)*, kāpostu pūcīte *(Mamestra brassicae)*, rāceņu baltenis *(Pieris rapae)*, kāpostu baltenis *(Pieris brassicae)*, krustziežu zāģlapsene *(Athalia rosae)*	0.4-0.5		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar divu lapu stadiju līdz galviņa sasniegusi raksturīgo lielumu (AS 12-49)		
Kolrābji*	Kāpostu agrā muša *(Delia radicum)*	0.75		Apsmidzināt stādījumus 3-5 dienas pēc izstādīšanas, atkārtoti pēc 7-10 dienām	7	2
	Tripši *(Thysanoptera)*, kāpostu baltblusiņa *(Aleyrodes proletella)*, spradži *(Phylotretta spp.)*	0.75		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar divu lapu stadiju līdz stublāja pārveidne izveidojusi raksturīgo formu un diametru (AS 12-49)		
	Kāpostu cekulkode *(Plutella xylostella)*, kāpostu pūcīte *(Mamestra brassicae)*, rāceņu baltenis *(Pieris rapae)*, kāpostu baltenis *(Pieris brassicae)*, krustziežu zāģlapsene *(Athalia rosae)*	0.4-0.5		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar divu lapu stadiju līdz stublāja pārveidne izveidojusi raksturīgo formu un diametru (AS 12-49)		
Burkāni	Burkānu muša *(Psila rosae)*	0.75		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar divu lapu stadiju līdz sakne izveidojusi raksturīgo formu un diametru (AS 12-49)	14	2
Sīpoli, Šalotes sīpoli, ķiploki, loku sīpoli	Sīpolu muša *(Delia antigua)*, tripši *(Thysanoptera)*	0.75		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar divu lapu stadiju līdz sīpols vai stublājs sasniedzis 70 % no raksturīgā diametra (AS 12-47)	14	2
Pastinaki, pētersīļi (sakņu), selerijas (sakņu), bietes, mārrutki, topinambūri, redīsi, kāļi, rāceņi	Tripši *(Thysanoptera)*, pūcītes *(Noctuidae)*, spradži *(Phylotretta spp.)*, burkānu muša *(Psila rosae)*	0.75		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar divu lapu stadiju līdz sakne izveidojusi raksturīgo formu un diametru (AS 12-49)	14	2
Zemenes	Aveņu ziedu smecernieks *(Anthonomus rubi)*, tripši *(Thysanoptera)*, punktspārnu augļmuša *(Drosophila suzuki)*, pūcītes *(Noctuidae)*	0.75		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar divu lapu stadiju līdz lielākā daļa ogu nogatavojušās (AS 12-87)	1	2

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7
3. Carnadine Extra Reģ. Nr. 0812, reģ. klase 2. Darbīgā viela: acetamiprīds, 200 g/l. Sistēmas iedarbība. ***Nufarm GmbH & Co KG***				**<u>Analogie augu aizsardzības līdzekļi:</u>** **Acetazol Extra** Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 63, reģ. klase 2. Darbīgā viela: acetamiprīds, 200 g/l. Sistēmas iedarbība. ***Agrozol Chemicals Srl***		
Ziemas rapsis	Krustziežu spīdulis *(Meligethes aeneus)*	0.18-0.25		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga ziedpumpuru veidošanās sākumu līdz ziedēšanas sākumam (AS 50-60)	28	1
	Rapša stublāju smecernieks *(Cetorhynchus napi)*	0.15-0.25		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga pirmo starpmezgla posmu līdz stublāju pagarināšanās beigām (AS 31-39)		
	Krustziežu stublāju smecernieks *(Ceutorhynchus pallidactylus)*	0.15-0.25		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga pirmo starpmezgla posmu līdz dzelteno pumpuru stadijai (AS 31-59)		
	Krustziežu pākšteņu pangodiņš *(Dasyneura brassicae),* krustziežu sēklu smecernieks *(Ceutorhynchus assimilis)*	0.20-0.25		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, kad atvērušies 10 % ziedu galvenajā ziedkopā līdz pākšteņu veidošanās sākumam (AS 61-71)		
Vasaras rapsis	Krustziežu spīdulis *(Meligethes aeneus)*	0.18-0.25		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga ziedpumpuru veidošanās sākumu līdz ziedēšanas sākumam (AS 50-60)	28	1
	Krustziežu stublāju smecernieks *(Ceutorhynchus pallidactylus)*	0.15-0.25		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga pirmo starpmezgla posmu līdz dzelteno pumpuru stadijai (AS 31-59)		
	Krustziežu pākšteņu pangodiņš *(Dasyneura brassicae)*, krustziežu sēklu smecernieks *(Ceutorhynchus assimilis)*	0.20-0.25		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, kad atvērušies 10 % ziedu galvenajā ziedkopā līdz pākšteņu veidošanās sākumam (AS 61-71)		
Kartupeļi	Laputis *(Aphididae),* kartupeļu lapgrauzis *(Leptinotarsa decemlineata),* cikādes *(Eupteryx aurata)*	0.12-0.18		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar sāndzinumu veidošanās sākumu, līdz bumbuļi sasnieguši 60-70 % no paredzamās masas (AS 21-47)	7	1
Ābeles	Ābolu tinējs *(Cydia pomonella)*	0.250		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga augļ-aizmetņu diametru 10 mm līdz augļu pilngatavībai (AS 71-89)	14	1
	Laputis *(Aphididea)*	0.125		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga augļ-aizmetņu diametru 10 mm līdz augļu pilngatavībai (AS 71-89)		

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas rudzi, ziemas tritikāle	Laputis *(Sitobion avennae, Rhopalosiphums padi)*	0.13		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz sāndzinumu veidošanās sākumam (AS 12-20)	28	1
		0.15		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 21-69)		
	Tripši *(Limothrips denticomis, Haplotriphs aculeatus)*	0.20		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)		
Vasaras kvieši, vasaras mieži, vasaras tritikāle, auzas	Laputis *(Sitobion avennae, Rhopalosiphums padi)*	0.15		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 21-29)	28	1
	Tripši *(Limothrips denticomis, Haplotriphs aculeatus)*	0.20		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)		
Lauka pupas*, zirņi* (svaigam patēriņam ar/ bez pākstīm, graudiem)	Laputis *(Aphididae),* svītrainais zirņu smecernieks *(Sitona lineatus)*	0.25		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga pirmās lapas atvēršanās stadiju līdz pirmo ziedpumpuru parādīšanās stadijai (AS 11-51)	35	1
Skuju koki* jaunaudzēs	Priežu lielais smecernieks *(Hylobius abietis)*	0.3-0.5		Apsmidzināt, kaitēkļiem parādoties, katra kociņa pamatni. Darba šķidruma patēriņš -8 ml 2.5 % uz kociņu	-	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

4. Ciperkils 500 e.k.
Reģ. Nr. 0385, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: cipermetrīns, 500 g/l.
Pieskares un zarnu inde
Arysta LifeScience Benelux Sprl

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle, vasaras kvieši, vasaras tritikāle, auzas	Labību lapgrauži *(Oulema spp.)*, laputis *(Sitobion avenae, Rhopalosiphon padi),* tripši (*Thysanoptera)*, melnās stiebrmušas *(Oscinella spp.),* kviešu dzeltenā zāģlapsene *(Pachynematus citellatus)*	0.05		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	28	2
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Svītrainais spradzis *(Phyllotreta nemorum),* rapša stublāju spradzis *(Psylliodes chrysocephala),* smecernieki *(Ceutorhynchus napi, Ceutorhynchus quadridens),* krustziežu sēklu smecernieks (*Ceutorhynchus assimilis*), krustziežu spīdulis *(Meligethes aeneus),* krustziežu pākšteņu pangodiņš *(Dasineura brassicae*), krustziežu zāģlapsene *(Athalia rosae)*	0.05		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	49	2

1	2	3	4	5	6	7
Zirņi, pupas	Svītrainais zirņu smecernieks *(Sitona lineatus)*, laputis *(Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae)*, zirņu tinējs *(Cydia nigricana)*	0.05		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	14	2
Galviņkāposti, ziedkāposti	Krustziežu spradži *(Phyllotreta spp.*), kāpostu baltenis *(Pieris brassicae)*, rāceņu baltenis *(Pieris rapae),* kāpostu pūcīte *(Mamestra brassicae)*, kāpostu cekulkode *(Plutella maculipennis)*, laputis *(Brevicoryne brassicae),* krustziežu zāģlapsene *(Athalia rosae)*	0.05		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādoties	7	2
Sīpoli, puravi, ķiploki	Sīpolu lakstu puskode *(Acrolepiopsis assetcella),* tripši *(Thysanoptera)*	0.05		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kaitēklim parādoties	7	2
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis *(Leptinotarsa decemlineata)*, laputis *(Aphis frangulae, Aulacorthum solani, Myzus persicae)*	0.05		Apsmidzināt stādījumus, kaitēklim parādoties	7	2
Krāšņumaugi (līdz 50 cm augsti)	Laputis *(Aphididae),* tripši *(Thysanoptera)*	0.1		Apmidzināt sējumus vai stādījumus, kaitēklim parādoties	-	2

5. Coragen 20 SC

Reģ. Nr. 0755, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: hlorantraniliprols, 200 g/l.
Pieskares un zarnu iedarbības insekticīds.
FMC Agricultural Solutions A/S

Ābeles, bumbieres	Lapu tinēji *(Adoxophyes sp., Archips sp.),* ābolu tinējs *(Cydia pomonella),* pīlādžu tīklkode *(Argyresthia conjugella)*, lapkodes* *(Lyonetiidae)*	0.60-0.175		Apsmidzināt stādījumu, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga augļaizmetņu diametru 10 mm līdz novākšanas gatavībai (AS 71-87)	14	1
Plūmes	Plūmu tinējs *(Cydia funebrana)*, lapu tinēji *(Adoxophyes sp., Archips sp.)*	0.150-0.175		Apsmidzināt stādījumu, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga augļaizmetņu attīstības sākumu līdz novākšanas gatavībai (AS 71-87)	14	1
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis *(Leptinotarsa decemlineata)*	0.06		Apsmidzināt stādījumu, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kartupeļu lakstu saskaršanos vagā sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 31-69)	14	2
Galviņkāposti, Savojas kāposti, brokoļi, ziedkāposti	Kāpostu agrā muša *(Delia radicum),* tripši *(Thysanoptera),* kāpostu cekulkode *(Plutella xylostella),* kāpostu pūcīte *(Mamestra brassicae),* rāceņu baltenis *(Pieris rapae),* kāpostu baltenis *(Pieris brassicae),* krustziežu zāģlapsene *(Athalia rosae)*	0.125		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz galviņa sasniegusi raksturīgo lielumu (AS 12-49)	3	1
Burkāni	Burkānu muša *(Psila rosae)*	0.175		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga piecu lapu stadiju, līdz sakne izveidojusi raksturīgo formu un diametru (AS 15-49)	21	1
Pastinaki*, sakņu pētersīļi*, sakņu selerijas*, galda bietes*, mārrutki*, redīsi*, kāļi*, rāceņi*, topinambūrs*	Burkānu muša *(Psila rosae)* biešu muša* *(Pegomya betae),* alotājmušas* *(Liriomyza spp.),* kāpostu baltenis *(Pieris brassicae),* kāpostu pūcīte *(Mamestra brassicae)*	0.175		Apsmidzināt stādījumus un sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga piecu lapu stadiju, līdz sakne izveidojusi raksturīgo formu un diametru (AS 15-49)	21	2
Cigoriņi	Rāceņu baltenis *(Pieris rapae),* linu pūcīte *(Autographa gamma)*	0.125		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga lapu attīstības fāzes beigām, līdz sakne izveidojusi raksturīgo formu un diametru (AS 19-49)	21	1
Kukurūza	Apiņu svilnis *(Ostrinia nubilalis)*	0.125		Apsmidzināt sējumu, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga četru lapu stadiju līdz fizioloģiskajai gatavībai (AS 14-87)	-	1
Kukurūza, saldā	Apiņu svilnis *(Ostrinia nubilalis)*	0.125		Apsmidzināt sējumu, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga četru lapu stadiju līdz fizioloģiskajai gatavībai (AS 14-87)	14	1
Krāšņumaugi*, dekoratīvie koki un krūmi*	Lapu tinēji *(Tortricidae)*	0.125		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kaitēkļiem parādoties	-	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

6. Decis Forte

Reģ. Nr. 0703, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: deltametrīns, 100 g/l.
Pieskares un zarnu inde.
Bayer AG

Ziemas kvieši, ziemas mieži	Laputis *(Aphididae),* tripši *(Thysanoptera),* labību lapgrauži *(Oulema spp.),* kviešu dzeltenā zāģlapsene *(Pachynematus clitellatus)*	0.0625		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	30	3
Ziemas tritikāle, rudzi, ziemas cietie kvieši	Laputis *(Aphididae),* tripši *(Thysanoptera),* labību lapgrauži *(Oulema spp.),* kviešu dzeltenā zāģlapsene *(Pachynematus clitellatus)*	0.060		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	30	2
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Laputis *(Aphididae),* tripši *(Thysanoptera),* labību lapgrauži *(Oulema spp.),* kviešu dzeltenā zāģlapsene *(Pachynematus clitellatus)*	0.0625		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	30	2

1	2	3	4	5	6	7
Vasaras rapsis, vasaras sinepes	Spradži *(Phyllotreta spp.),* krustziežu spīdulis *(Meligethes aeneus),* krustziežu stublāju smecernieks *(Ceuthorhynchus quadridens),* krustziežu sēklu smecernieks *(Ceuthorhynchus assimilis),* krustziežu pāksteņu pangodiņš *(Dasineura brassicae)*	0.075		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	45	3
Ziemas rapsis, ziemas sinepes	Spradži *(Phyllotreta spp.),* krustziežu spīdulis *(Meligethes aeneus),* krustziežu stublāju smecernieks *(Ceuthorhynchus quadridens),* krustziežu sēklu smecernieks *(Ceuthorhynchus assimilis),* krustziežu pāksteņu pangodiņš *(Dasineura brassicae)*	0.075		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	45	4*
Zirņi, lauka pupas, kāršu pupas	Pupu laputs *(Aphis fabae),* svītrainais zirņu smecernieks *(Sitona lineatus),* zirņu tinējs *(Cydia nigricana.),* zirņu laputs *(Acyrthosiphon pisum),* zirņu pangodiņš *(Contarinia pisi)*	0.075		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	7	2
Cukurbietes	Spradži *(Phyllotreta spp.),* laputis *(Aphididae)*	0.075		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	30	1
Ziedkāposti	Krustziežu spradži *(Phyllotreta spp.),* laputis *(Aphididae),* kāpostu baltenis *(Pieris brassicae),* rāceņu baltenis *(Pieris rapae),* kāpostu pūcīte *(Mamestra brassicae)*	0.075		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	7	3
Galviņkāposti, Briseles kāposti	Krustziežu spradži *(Phyllotreta spp.),* laputis *(Aphididae),* kāpostu baltenis *(Pieris brassicae),* rāceņu baltenis *(Pieris rapae),* kāpostu pūcīte *(Mamestra brassicae)*	0.075		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	7	2
Burkāni, pastinaki, mārrutki	Burkānu muša *(Psila rosae),* pūcītes *(Noctuidae)*	0.075		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	21	3
Sīpoli lokiem	Alotājmušas *(Agromyzidae)*	0.06		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	3	3
Puravi	Alotājmušas *(Agromyzidae),* pūcītes *(Noctuidae)*	0.06		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	3	3
Kāļi, rāceņi	Krustziežu spradži *(Phyllotreta spp.),* laputis *(Aphididae),* kāpostu baltenis *(Pieris brassicae),* rāceņu baltenis *(Pieris rapae),* kāpostu pūcīte *(Mamestra brassicae)*	0.075		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	30	1
Salāti (atklātā laukā)	Ipsilona pūcīte *(Agrotis ipsilon)*	0.0625		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	7	3
Tomāti, gurķi (segtās platības)	Laputis *(Aphididae),* vaboles *(Coleoptera),* lapu blusiņas *(Psyllidae),* siltumnīcu baltblusiņa *(Trialeurodes vaporariorum)*	17.5 ml/100 l ūdens		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	7	3

1	2	3	4	5	6	7
Paprika (segtās platības)	Laputis *(Aphididae),* vaboles *(Coleoptera),* lapu blusiņas *(Psyllidae),* siltumnīcu baltblusiņa (*Trialeurodes vaporariorum)*	12.5 ml/100 l ūdens		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	7	3
Ābeles, bumbieres	Laputis *(Aphididae),* lapu tinēji *(Archips rosana, Tmetocera ocellana, Argyroploce variegana),* ābeļu ziedu smecernieks *(Anthonomus pomorum),* ābolu tinējs *(Cydia pomonella)*, ābolu zāģlapsene *(Hoplocampa testudinea)*	0.0875 vai augstajiem kokiem 5 ml/ 100 l ūdens		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	7	1
Avenes	Avenāju vabole *(Byturus tomentosus)*	0.125		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	7	3
Krāšņumaugi, dekoratīvie augi (atklātā laukā un segtās platībās)	Laputis *(Aphididae),* vaboles *(Coleoptera),* lapu blusiņas *(Psyllidae),* siltumnīcu baltblusiņa (*Trialeurodes vaporariorum)*	17.5 ml/100 l ūdens		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	-	3

*viena reize rudenī un 3 reizes pavasarī /vasarā

7. Decis Mega

Reģ. Nr. 0310, reģ. Klase 2.
Darbīgā viela: deltametrīns, 50 g/l.
Pieskares un zarnu inde.
Bayer AG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Tripši *(Thysanoptera),* labību lapgrauži *(Oulema spp.),* kviešu stiebru pangodiņš *(Haplodiplosis equestris),* kviešu dzeltenā zāģlapsene *(Pachynematus clitellatus)*	0.125-0.150		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	20	2
	Laputis *(Aphididae)*	0.15		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties		
Zirņi, pupas	Svītrainais zirņu smecernieks *(Sitona lineatus),* zirņu tinēji *(Laspeyresia spp.),* zirņu laputs *(Acyrthosiphon pisum),* pupu laputs *(Aphis fabae)*	0.15		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	20	2
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Spradži *(Phyllotreta spp.),* krustziežu spīdulis *(Meligethes aeneus),* smecernieki *(Ceuthorhynchus spp).,* krustziežu pāksteņu pangodiņš *(Dasineura brassicae)*	0.125-0.150		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	20	2
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis *(Leptinotarsa decemlineata)*	0.10-0.15		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	20	2
Galviņkāposti, ziedkāposti, brokoļi, kāļi	Kāpostu baltenis *(Pieris brassicae),* rāceņu baltenis *(Pieris rapae),* kāpostu pūcīte *(Mamestra brassicae),* krustziežu spradži *(Phyllotreta spp.),* laputis *(Aphididea)*	0.125-0.150		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	14	2
Burkāni	Burkānu muša *(Psila rosae)*	0.15		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	30	2

1	2	3	4	5	6	7
Krāšņumaugi (atklātā laukā)	Cikādes *(Eupteryx collina)*	0.15		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	-	2
	Laputis *(Ahididae)*	0.25		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	-	
Ābeles, bumbieres	Laputis *(Aphis pomi, Dysaphis devecta, Anuraphis subterranea),* lapu tinēji *(Archips rosana, Tmetocera ocellana, Argyroploce variegana),* ābeļu ziedu smecernieks *(Anthonomus pomorum),* ābolu tinējs *(Cydia pomonella)*, ābolu zāģlapsene *(Hoplocampa testudinea)*	0.15-0.25		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	30	2

8. Delmetros 100 SC

Reģ. Nr. 0675, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: deltametrīns, 100 g/l.
Pieskares un zarnu inde.
Innvigo Sp. z o.o.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Koron 100 SC

Reģ. Nr. 0815, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: deltametrīns, 100 g/l.
Pieskares un zarnu inde.
Innvigo Sp. z o.o.

Ziemas kvieši	Labību lapgrauži *(Oulema spp.)*	0.05		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	30	1
Vasaras mieži	Labību lapgrauži *(Oulema spp.)*	0.05		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	30	1
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis *(Leptinotarsa decemlineata)*	0.05		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	7	1
Ziemas rapsis	Rapša stublāju spradzis *(Psylliodes chrysocephala),* krustziežu spīdulis *(Meligethes aeneus),* krustziežu sēklu smecernieks *(Ceuthorhynchus assimilis),* krustziežu pāksteņu pangodiņš *(Dasineura brassicae)*	0.05		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	45	1
Galviņkāposti*	Kāpostu baltenis *(Pieris brassicae),* rāceņu baltenis *(Pieris rapae),* kāpostu pūcīte *(Mamestra brassicae)*, kāpostu laputs *(Brevicoryne brassicae)*	0.05		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	14	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

9. Fibro

Reģ. Nr. 0460, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: parafīneļļa, 797 g/l.
Fizikāla iedarbība.
Certis Belchim B.V.

Kartupeļi	Kartupeļu vīruss (PVY) (vīrusu pārnesā laputis *(Aphidodea))*	10		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, sākot no to sadīgšanas līdz vienu nedēļu pirms lakstu desikācijas. Atkārtoti pēc 7 dienām	-	8
Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes	Sarkanā augļu koku tīklērce *(Panonychus ulmi)*	20-30	2	Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, ja atrastas ziemojošas kaitēkļa olas, sākot no zaļā konusa stadijas līdz sarkano pumpuru stadijai (AS 09-57) sēkleņiem un no pumpuru plaukšanas līdz kauslapu atvēršanās stadijai kauleņaugiem (AS 53-57)	-	1
Bumbieres	Bumbieru lapu blusiņa *(Cacopsylla pyri)*	20-30	2	1. lietošanas variants Apsmidzināt stādījumus, kad konstatētas kaitēkļa olas, sākot no pumpuru plaukšanas līdz sarkano pumpuru stadijai (AS 53-57)	-	1
		20	2	2. lietošanas variants Apsmidzināt stādījumus, kad konstatētas kaitēkļa olas, sākot no pumpuru plaukšanas līdz sarkano pumpuru stadijai (AS 53-57). Ja nepieciešams, veikt otru smidzinājumu ar 2 dienu atstarpi	-	2

10. Granprotec

Reģ. Nr. 0664, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: deltametrīns, 25 g/l.
Pieskares un zarnu iedarbība.
Sharda Cropchem España S.L.

Mieži, rudzi, auzas, sorgo, prosa, kukurūza	Graudu smecernieks *(Sitohilus granarius),* miltu vabole *(Tribolium castaneum),* Austrālijas kviešu smecernieks *(Rhyzopertha dominica),* pelēkais miltu svilnis *(Ephestia kuehniella)*	10-20 ml/t		Apstrādāt graudu masu vienmērīgi ar darba šķidrumu profilaktiski, ievietojot noliktavā vai parādoties kaitēkļiem. Darba šķidruma patēriņš 1 l/t	-	1
Kvieši	Graudu smecernieks *(Sitohilus granarius),* miltu vabole *(Tribolium castaneum),* Austrālijas kviešu smecernieks *(Rhyzopertha dominica),* zobkakla plakanis *(Oryzaephilus surinamensis),* sīkais miltu melnulis *(Cryptolestes herrugineus),* sviļņi *(Pyrilidae)*	10-20 ml/t		Apstrādāt graudu masu vienmērīgi ar darba šķidrumu profilaktiski, ievietojot noliktavā vai parādoties kaitēkļiem. Darba šķidruma patēriņš 1 l/t	-	1
	Gartaustu kode *(Sitotroga cerealella)*	20 ml/t		Apstrādāt graudu masu vienmērīgi ar darba šķidrumu profilaktiski, ievietojot noliktavā vai parādoties kaitēkļiem. Darba šķidruma patēriņš 1 l/t	-	1

1	2	3	4	5	6	7

11. Imprid Skog

Reģ. Nr. 0855, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: acetamiprīds, 200 g/kg.
Sistēmas iedarbība.
Nisso Chemical Europe GmbH

Egles, priedes (jaunaudzēs)	Lielais priežu smecernieks *(Hylobius abietis)*	0.5	5	Apsmidzināt atsevišķi katru kociņu, kaitēkļiem parādoties. Stādījumā 2500 augi/ha. Darba šķidruma patēriņš 5 ml/augu	-	1
Egļes, priedes (dēsti kokaudzētavā)	Lielais priežu smecernieks *(Hylobius abietis)*	0.5	5	Apstrādāt kokaugu dēstus profilaktiski pirms stādīšanas mežā. Plānotais augu skaits stādījumā 2500 augi/ha. Darba šķidruma patēriņš 5 ml/augu	-	1

12. Kaiso 50 EG

Reģ. Nr. 0381, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: lambda-cihalotrīns, 50 g/kg.
Pieskares un zarnu inde.
Nufarm GmbH & Co KG

Kartupeļi	Laputis *(Myzus persicae, Aphis nasturtii, Aphis frangulae),* kartupeļu lapgrauzis *(Leptinotarsa decemlineata)*	0.15		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	14	1
Ziemas kvieši, vasaras kvieši, rudzi, tritikāle	Laputis *(Aphididae),* labību lapgrauži (*Oulema melanopus, Oulema lichenis),* tripši *(Thysanoptera)*	0.15		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	35	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Smecernieki *(Ceutorhynchus assimilis, C.napi,C. quadridens),* krustziežu pākšteņu pangodiņš *(Dasyneurea brassicae),* krustziežu spīdulis *(Meligethes aeneus),* rapša stublāju spradzis (*Psylliodes chrysocephala)*	0.15		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	49	1

13. Karate Zeon 5 CS

Reģ. Nr. 0207, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: lamda-cihalotrīns, 50 g/l.
Pieskares un zarnu inde.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis *(Leptinotarsa decemlineata),* laputis *(Aphididae)*	0.2		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	28	1
Ziemas kvieši, vasaras kvieši, rudzi, ziemas mieži, vasaras mieži, auzas	Laputis *(Aphididae),* labību lapgrauži *(Oulema spp.),* spradži *(Phyllotreta spp.),* melnās stiebrmušas *(Oscinella spp.)*	0.15-0.20		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	35	1
Cukurbietes	Biešu muša *(Pegomya betae),* biešu spradzis (*Chaetocnema concinna)* biešu kapracis *(Aclypea opaca),* pupu laputs *(Aphis fabae)*	0.15		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	28	1
Zirņi	Tumšais zirņu tinējs *(Laspeyresia nigricana),* laputis *(Aphididae),* smecernieki *(Sitona spp.)*	0.15		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	28	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu spīdulis *(Meligethes aeneus),* spradži *(Phyllotreta spp.)*, laputis *(Aphididae)*, smecernieki *(Ceutorhynchus spp.)*	0.10-0.15		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	28	2
	Krustziežu pākšteņu pangodiņš *(Dasineura brassicae)*	0.15				
Galviņkāposti, ziedkāposti, brokoļi, Briseles kāposti	Krustziežu spradži *(Phyllotreta spp.),* kāpostu baltenis (*Pieris brassicae),* rāceņu baltenis *(Pieris rapae),* kāpostu pūcīte *(Mamestra brassicae),* kāpostu cekulkode *(Plutella maculipennis),* laputis *(Aphididae),* tripši *(Thysanoptera)*	0.15		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādoties	14	1
Ābeles, bumbieres	Smecernieki *(Anthonomus pomorum, Phyllobius spp.),* tinēji (*Tortricidae),* zāģlapsenes *(Hoplocampa spp.),* laputis *(Aphididae),* ābeļu lapu blusiņa *(Psylla mali),* mazais salnas sprīžmetis *(Operophthera brumata)*	0.4-0.5		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	28	2
Plūmes, ķirši	Smecernieki *(Phyllobius spp.),* plūmju augļu tinējs *(Cydia funebrana),* zāģlapsenes *(Hoplocampa spp.),* laputis *(Aphididae),* mazais salnas sprīžmetis *(Operophthera brumata)*	0.4		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	28	1
Lucernas un āboliņa sēklu lauki	Laputis *(Aphididae)*, smecernieki (*Apion spp., Sitona spp., Phytonomus spp.)*	0.15		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	28	1
Rozes, krizantēmas, gerberas, prīmulas, lilijas, petūnijas, atraitnītes	Laputis *(Aphididae),* tripši *(Thripidae)*		0.05	Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	-	2
Skuju koki kokaudzētavās un jaunaudzēs (ne vecākās, kā 1-3 gadi)	Sprīžmeši *(Geometridae*), tinēji *(Tortricidae*), priežu pūcīte (*Panolis flammea*), priežu sprīžotājs (*Bupalus piniarius*), egļu mūķene (*Lymantria monacha),* lielais priežu smecernieks *(Hylobius abietis*)	0.1		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	-	1
Lapu koki kokaudzētavās un jaunaudzēs (ne vecākās, kā 1-3 gadi)	Sprīžmeši (*Geometridae),* tinēji *(Tortricidae)*	0.1		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	-	1

1	2	3	4	5	6	7
Koksne	Egļu astoņzobu mizgrauzis (*Ips typographus)*	2.5-5.0 ml/m^2		Apsmidzināt koksni krautuvēs. Ieteicamais darba šķidruma patēriņš 250 ml/m^2 koksnes	-	1
Noliktavas	Maizes ķirmis *(Stegobium panicea),* miltu melnulis *(Tenebrio molitor),* graudu smecernieks (*Sitophilus granarius),* miltu raibais svilnis *(Pyralis farinalis)*	0.4 ml/ m^2		Apstrādāt tukšas noliktavu telpas. Ieteicamais darba šķidruma patēriņš 200 ml/m2	2	1
Noliktavu teritorija	Maizes ķirmis *(Stegobium panicea),* miltu melnulis *(Tenebrio molitor),* graudu smecernieks *(Sitophilus granarius),* miltu raibais svilnis *(Pyralis farinalis)*	0.8 ml/ m^2		Apstrādāt teritoriju ap noliktavām līdz 5 m platumā tūlīt pēc noliktavu apstrādes. Ieteicamais darba šķidruma patēriņš 400 ml/m2	2	1

14. K-Obiol

Reģ. Nr. 0394, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: deltametrīns, 25 g/l.
Pieskares un zarnu iedarbība.
2022 Environmental Science FR S.A.S.

Graudi	Graudu smecernieks *(Sitohilus granarius),* rīsu graudu smecernieks *(Sitophilus oryzae),* miltu vabole *(Tribolium castaneum),* Austrālijas kviešu smecernieks *(Rhyzopertha dominica),* zāģzobu graudu vabole *(Oryzaephylus surinamensis),* pupu smecernieks (*Acanthoscelides obtectus)*	10-20 ml/t		Apstrādāt graudu masu vienmērīgi ar darba šķidrumu profilaktiski, ievietojot noliktavā vai parādoties kaitēkļiem. Darba šķidruma patēriņš 0.5-1.5 l/t	42	1
Tukšas noliktavu telpas	Graudu smecernieks *(Sitohilus granarius),* rīsu graudu smecernieks *(Sitophilus oryzae),* miltu vabole *(Tribolium castaneum),* Austrālijas kviešu smecernieks *(Rhyzopertha dominica),* zāģzobu graudu vabole *(Oryzaephylus surinamensis),* pupu smecernieks (*Acanthoscelides obtectus),* svilnis *(Ephestia cautella)*	60 ml/100 m^2		Apsmidzināt, vienmērīgi noklājot apstrādājamo virsmu. Darba šķidruma patēriņš gludas virsmas apstrādei – 5 l/100m^2, nelīdzenas virsmas apstrādei- 10 l/100m^2	-	1

15. MAGTOXIN TABLET

Reģ. Nr. 0111, reģ. klase 1.
Darbīgā viela: magnija fosfīds, 66 %.
Insekticīds, akaricīds.
Elpošanas inde.
Detia Freyberg GmbH

Lietošanas veids: gāzēšana pie atmosfēras spiediena, t.sk. zem gāzes necaurlaidīgiem segumiem.

Produkcija, krava, kravas raksturojums	Kaitīgais organisms	Preparāta deva	Minimālais ekspozīcijas ilgums, dienas	Vēdināšana	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
Kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, auzas, pupas*, zirņi*, lupīna*, soja*, linsēklas*, kukurūza*, saulespuķu sēklas*, rapsis*, (pārtikai, lopbarībai)	Noliktavu kaitēkļi: graudu smecernieks *(Sitophilus granaries*), rīsu graudu smecernieks *(Sitophilus oryzae),* zirņu sēklgrauzis *(Brunchus pisorum),* zāģzobu graudu vabole *(Oryzeaphilus surinamensis),* sīkais miltu plakanis *(Cryptolestes ferrugineus),* žāvēto augļu svilnis *(Plodia interpunctella),* pelēkais miltu svilnis *(Anagasta kuehniella),* sīkais miltu melnulis *(Tribolium confusum) ,* graudu vabole *(Tribolium castaneum)*	5 g/PH_3/m^3 (5 tabletes/ m^3)	Iedarbības laiks atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas, temperatūras, mitruma. Zem 5°C- neveikt fumigāciju 5°-12°C -10 d; 13°-15°C -5 d; 16°-20°C -4 d; 21°-25°C -3 d; virs 25°- 2 d	Telpas atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas. Vēdināšanas laiks atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas	Novietojiet tabletes uz nedegošiem paliktņiem sabēruma virsotnē. Nepieļaut tablešu un to pēc lietošanas atlieku nonākšanu tiešā kontaktā ar produkciju, kas tiks lietota pārtikā vai lopbarībā. Pārtikā un lopbarībā izmantojamajai produkcijai – nogaidīšanas laiks 7 dienas
Dārza pupiņas*, rīsi*, sorgo*, prosa*, griķi*, rieksti*, kakao pupiņas*, kafijas pupiņas*, kaltēti augi*, kaltētas sēnes žāvēti dārzeņi*, žāvēti augļi*		5 g/PH_3/m^3 (5 tabletes/ m^3)		Telpas atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas. Vēdināšanas laiks atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas	Novietojiet tabletes uz nedegošiem paliktņiem sabēruma virsotnē. Telpas blīvi noslēgt. Nepieļaut tablešu un to pēc lietošanas atlieku nonākšanu tiešā kontaktā ar produkciju, kas tiks lietota pārtikā. Pārtikā izmantojamajai produkcijai – nogaidīšanas laiks 7 dienas

1	2	3	4	5	6
Kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, auzas, pupas*, dārza pupiņas*, zirņi*, lupīna*, soja*, linsēklas*, griķi*, kukurūza*, saulespuķu sēklas*, rapsis*, zālaugu sēklas (sēklai)	Noliktavu kaitēkļi: graudu smecernieks *(Sitophilus granaries)*, rīsu graudu smecernieks *(Sitophilus oryzae)*, zirņu sēklgrauzis *(Brunchus pisorum)*, zāģzobu graudu vabole *(Oryzeaphilus surinamensis,* sīkais miltu plakanis *(Cryptolestes ferrugineus)*, žāvēto augļu svilnis *(Plodia interpunctella)*, pelēkais miltu svilnis *(Anagasta kuehniella)*, sīkais miltu melnulis *(Tribolium confusum)*, graudu vabole *(Tribolium castaneum)*	5 g/PH_3/m^3 (5 tabletes/ m^3)		Telpas atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas. Vēdināšanas laiks atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas	Tabletes ievadīt produkcijas masā ar speciālām zondēm. Telpas blīvi noslēgt
Tukšas noliktavu telpas		5 g/PH_3/m^3 (5 tabletes/ m^3)		Telpas atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas. Vēdināšanas laiks atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas	Tabletes vienmērīgi izvietot telpās. Telpas blīvi noslēgt
Iesaiņoti pārtikas produkti*		2-3 g/PH_3/m^3 (2-3 tabletes/ m^3)		Telpas atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas. Vēdināšanas laiks 48 h atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas	Tabletes vienmērīgi izvietot telpā. Telpas blīvi noslēgt. Nogaidīšanas laiks 7 dienas
Kokvilna* kīpās un saiņos, tabaka iesaiņota	Noliktavu kaitēkļi un citi kaitēkļi	5 g/PH_3/m^3 (5 tabletes/ m^3		Telpas atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas. Vēdināšanas laiks atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas	Tabletes vienmērīgi izvietot telpā. Telpas blīvi noslēgt
Apaļie kokmateriāli* (zāģbaļķi, finierkluči, papīrmalka, stabi, mieti, malka), zāģmateriāli*, koksnes un kokmateriālu izstrādājumi*, iesaiņojamie materiāli*, starplikas*, šķelda*, mulča* (sasmalcināta koku miza, koksne), kūdra*	Koksnes kaitēkļi*	2-3 g/PH_3/m^3 (2-3 tabletes/ m^3)		Telpas atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas. Vēdināšanas laiks atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas	Tabletes vienmērīgi izvietot telpā. Telpas blīvi noslēgt

***Mazais lietojums**. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

16.1. Mavrik

Reģ. Nr. 0526, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: tau-fluvalināts, 240 g/l.
Pieskares un zarnu inde.
ADAMA Registrations B.V.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Evure
Reģ. Nr. 0577, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: tau-fluvalināts, 240 g/l.
Pieskares un zarnu inde.
ADAMA Registrations B.V.

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, rudzi	Labību laputs *(Sitobion avenae)*, ievu-labību laputs *(Rhopalosiphum padi)*	0.15-0.2		Apsmidzināt, kaitēkļiem parādoties (rudenī)	-	3; maksimāli 1 reize rudenī un maksimāli 2 reizes pavasarī
	Labību lapgrauzis *(Oulema melanopus)*, labību laputs (*Sitobion avenae*), kviešu stiebru pangodiņš (*Haplodiplosis marginata*), kviešu vārpu pangodiņš (*Contarinia tritici*), kviešu ziedu oranžais pangodiņš (*Sitodiplosis mosellana*), ievu-labību laputs (*Rhopalosiphum padi*), rudzu tripsis (*Limothrips denticornis*), kāpostu tripsis (*Thrips angusticeps*)	0.15-0.2		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties (pavasarī-vasarā)	30	
Vasaras kvieši, vasaras mieži, vasaras tritikāle, auzas	Labību lapgrauzis *(Oulema melanopus)*, labību laputs (*Sitobion avenae*), kviešu stiebru pangodiņš (*Haplodiplosis marginata*), kviešu vārpu pangodiņš (*Contarinia tritici*), kviešu ziedu oranžais pangodiņš (*Sitodiplosis mosellana*), ievu-labību laputs (*Rhopalosiphum padi*), rudzu tripsis (*Limothrips denticornis*), kāpostu tripsis (*Thrips angusticeps*)	0.15-0.2		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	30	2
Ziemas rapsis, vasaras rapsis, ziemas ripsis, vasaras ripsis	Spradži *(Phyllotreta spp.)*, krustziežu spīdulis (*Meligethes aeneus*), kāpostu tripsis (*Thrips angusticeps*), krustziežu sēklu smecernieks (*Ceutorhynchus assimilis*), rapšu stublāju smecernieks (*Ceutorhynchus napi*), krustziežu pāksteņu pangodiņš (*Dasineura brassicae*)	0.2		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	60	2
Zirņi (zaļiem zirņiem)	Zirņu laputs *(Acyrthosiphon pisum)*, tumšais zirņu tinējs *(Cydia nigricana)*, svītrainais zirņu smecernieks *(Sitona lineatus)*, pupu laputs *(Aphis fabae)*	0.15-0.2		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	7	2
Zirņi (graudiem)	Zirņu laputs *(Acyrthosiphon pisum)*, tumšais zirņu tinējs *(Cydia nigricana)*, svītrainais zirņu smecernieks *(Sitona lineatus)*, pupu laputs *(Aphis fabae)*	0.15-0.2		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	14	2

1	2	3	4	5	6	7
Pupas (graudiem)	Svītrainais zirņu smecernieks (*Sitona lineatus*), pupu laputs (*Aphis fabae)*	0.15-0.2		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	14	2
Kartupeļi	Persiku laputs (*Myzus persicae*), pabērzu laputs (*Aphis nasturtii*), kartupeļu laputs (*Macrosiphum euphorbiae*), kartupeļu lapgrauzis *(Leptinotarsa decemlineata)*	0.15-0.2		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	7	2
Ziedkāposti, brokoļi, Briseles kāposti, galviņkāposti	Spradži *(Phyllotreta spp.)*, persiku laputs (*Myzus persicae*), kāpostu laputs (*Brevicoryne brassicae*)	0.2-0.3		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	7	1
Krāšņumaugi* (atklātā laukā)	Laputis *(Aphididae),* lapu blusiņas *(Psyllidae),* vaboles *(Coleoptera)*	0.15-2.0		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	-	2
Ābeles, bumbieres	Ābeļu ziedu smecernieks *(Anthonomus pomorum),* ābolu tinējs *(Cydia pomonella),* ābeļu zalā laputs *(Aphis pomi),* rožu-ābeļu laputs *(Dysaphis plantaginea)*	0.3		Apsmidzināt, kaitēkļiem parādoties	30	2
Burkāni	Burkānu lapu blusiņa *(Trioza apicalis)*	0.3		Apsmidzināt, kaitēkļiem parādoties	14	2
Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes	Pupu laputs *(Aphis fabae),* persiku laputs *(Myzus persicae),* biešu muša *(Pegomya hyoscyami)*	0.2		Apsmidzināt, kaitēkļiem parādoties	14	2

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

16.2. Mavrik

Reģ. Nr. 0526, reģ. klase 3.
Darbīgā viela: tau-fluvalināts, 240 g/l.
Pieskares un zarnu inde.
ADAMA Registrations B.V.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Emin dārzam Mavrik Vita

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 31, reģ. klase 3.
Darbīgā viela: tau-fluvalināts, 240 g/l.
Pieskares un zarnu inde.
SIA "Emin dārzam"

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva ml/10 l ūdens	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6
Zirņi (zaļiem zirņiem)	Zirņu laputs *(Acyrthosiphon pisum)*, tumšais zirņu tinējs *(Cydia nigricana),* svītrainais zirņu smecernieks *(Sitona lineatus),* pupu laputs *(Aphis fabae)*	6	Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	7	2
Zirņi (graudiem)	Zirņu laputs *(Acyrthosiphon pisum),* tumšais zirņu tinējs *(Cydia nigricana),* svītrainais zirņu smecernieks *(Sitona lineatus),* pupu laputs *(Aphis fabae)*	6	Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	14	2
Pupas (graudiem)	Svītrainais zirņu smecernieks (*Sitona lineatus*), pupu laputs (*Aphis fabae)*	6	Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	14	2

1	2	3	4	5	6
Kartupeļi	Persiku laputs (*Myzus persicae*), pabērzu laputs (*Aphis nasturtii*), kartupeļu laputs (*Macrosiphum euphorbiae*), kartupeļu lapgrauzis *(Leptinotarsa decemlinetaa)*	6	Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	7	2
Ziedkāposti, brokoļi, Briseles kāposti, galviņkāposti	Spradži *(Phyllotreta spp.)*, persiku laputs (*Myzus persicae*), kāpostu laputs (*Brevicoryne brassicae*)	8	Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	7	1
Krāšņumaugi* (atklātā laukā)	Laputis *(Aphididae),* lapu blusiņas *(Psyllidae),* vaboles *(Coleoptera)*	6	Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	-	2

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

17. Mospilan 20 SG

Reģ. Nr. 0811, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: acetamiprīds, 200 g/kg.
Sistēmas iedarbība.
Nisso Chemical Europe GmbH

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Acetami 20 SG

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 55, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: acetamiprīds, 200 g/kg.
Sistēmas iedarbība.
Agrimotion S.A.

Acetazol 20 SG

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 60, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: acetamiprīds, 200 g/kg.
Sistēmas iedarbība.
Agrozol Chemicals Srl

Gazelle 20 SG

Reģ. Nr. 0871, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: acetamiprīds, 200 g/kg.
Sistēmas iedarbība.
Berner Ltd

Ziemas rapsis, vasaras rapsis, ziemas ripsis*, vasaras ripsis*	Krustziežu spīdulis *(Meligethes aeneus)*	0.2		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga ziedpumpuru veidošanās sākumu līdz galvenajā ziedkopā atvērušies 40 % ziedu (AS 50-64)	28	1
	Krustziežu sēklu smecernieks *(Ceutorhynchus assimillis),* krustziežu sēklu pangodiņš *(Dasyneura brassicae)*	0.2		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz nogatavošanās sākumam (AS 60-80)		
Kartupeļi	Laputis *(Aphididae),* kartupeļu lapgrauzis *(Leptinotarsa decemlineata),* cikādes *(Eupteryx aurata)*	0.15-0.25		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar lapu attīstības fāzes vidu līdz bumbuļi sasnieguši 60-70% no paredzamās masas (AS 15-47)	3	1
Lauka pupas*	Laputis *(Aphididae),* pupu sēklgrauzis *(Bruchus rufimanus)*	0.20-0.25		Apsmidzināt sējumus, kaitākļiem parādoties, sākot ar kultūrauga stublāja pagarināšanās sākumu līdz pākstī kļūst saredzamas atsevišķas pupas (AS 30-79)	28	1

1	2	3	4	5	6	7
Ābeles, bumbieres	Ābolu tinējs *(Cydia pomonella),* tinēji *(Tortricidae),* bruņutis *(Parthenolecanium cornis)*	0.375		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga augļaizmetņu diametru 10 mm līdz augļu pilngatavībai (AS 71-89)	14	1
	Laputis *(Aphididea),* ābeļu lapu pangodiņš *(Dasineura mali),* bumbieru lapu pangodiņš *(Dasineura pyri),* bumbieru ziedu smecernieks *(Anthonomus piri)*	0.250		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga ģeneratīvo pumpuru briešanas sākumu līdz augļu pilngatavībai (AS 50-89)		
Ķirši	Ķiršu muša* *(Rhagoletis cerasi)*	0.375		Apsmidzināt stādījumu, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga augļaizmetņu attīstības sākumu līdz augļu lietošanas gatavībai (AS 71-89)	7	1
	Laputis *(Aphididae)*	0.25		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga ģeneratīvo pumpuru briešanas sākumu līdz augļu pilngatavībai (AS 50-89)		
Plūmes	Laputis *(Aphididae),* zāģlapsenes *(Hoplocampa spp.)*	0.25		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga ģeneratīvo pumpuru briešanas sākumu līdz augļu pilngatavībai (AS 50-89)	14	1
Galviņkāposti	Laputis *(Aphididae),* siltumnīcu baltblusiņa *(Trialeurodes vaporariorum),* tripši *(Thysanoptera)*	0.200-0.325		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga galviņas veidošanās sākumu līdz galviņa sasniegusi šķirnei raksturīgo lielumu (AS 41-49)	14	1
Ziedkāposti, brokoļi	Laputis *(Aphididae),* siltumnīcu baltblusiņa *(Trialeurodes vaporariorum),* tripši *(Thysanoptera)*	0.200-0.325		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga galviņas veidošanās sākumu līdz galviņa sasniegusi 60% šķirnei raksturīgā lieluma (AS 41-46)	7	1
Briseles kāposti	Laputis *(Aphididae),* siltumnīcu baltblusiņa *(Trialeurodes vaporariorum),* tripši *(Thysanoptera)*	0.200-0.325		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga galviņas veidošanās sākumu līdz galviņa sasniegusi 70% šķirnei raksturīgo lielumu (AS 41-47)	14	1
Salāti, spināti, garšaugi	Laputis *(Aphididae)*	0.25		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kaitēkļiem parādoties	7	1
Krāšņumaugi (atklātā laukā)	Laputis *(Aphididae),* siltumnīcu baltblusiņa *(Trialeurodes vaporariorum)*	0.25		Apsmidzināt sējumus un stādījumus kaitēkļiem parādoties	-	1
Stādi, dēsti (kokaudzētavas), Ziemassvētku eglītes (atklātā laukā)	Laputis (Aphididae), tinēji* *(Tortricidae),* lapgrauži* *(Chrysomeliade)*	0.25		Apsmidzināt sējumus un stādījumus kaitēkļiem parādoties	-	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

18.1. NeemAzal-T/S

Reģ. Nr. 0241, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: azadiraktīns-A, 10 g/l.
Insekticīds, akaricīds.
Sistēmas un zarnu inde.
Trifolio-M GmbH

1	2	3	4	5	6	7
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis *(Leptinotarsa decemlineata)*	2.5		Apsmidzināt stādījumus, parādoties 1.-2. vecuma kāpuriem	4	2
Gurķi, ķirbji, cukīni, kabači, tomāti, baklažāni (atklātā laukā)	Laputis *(Aphididae),* alotājmušas *(Liriomyza spp., Tuta absoluta),* tīklērce *(Tetranychus urticae)*,* tripši *(Thysanoptera),* siltumnīcu baltblusiņa *(Trialeurodes vaporariorum)*	2.0-3.0		Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i., apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	3	2
Gurķi, ķirbji, cukīni, kabači, tomāti, baklažāni (segtās platībās)	Laputis *(Aphididae),* alotājmušas (*Liriomyza spp., Tuta absoluta),* tīklērce *(Tetranychus urticae)*,* tripši *(Thysanoptera),* siltumnīcu baltblusiņa *(Trialeurodes vaporariorum)*	2.0-3.0		Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i., apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	3	3
Pipari (segtās platībās)	Laputis *(Aphididae),* tīklērce *(Tetranychus urticae)*,* tripši *(Thysanoptera),* siltumnīcu baltblusiņa *(Trialeurodes vaporariorum)*	2.0-3.0		Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i., apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	3	3
Galviņkāposti*, Briseles kāposti*, Savojas kāposti*	Kāpostu laputs *(Brevicoryne braassicae),* kāpostu cekulkode *(Plutella maculipennis),* kāpostu pūcīte *(Barathra brassicae),* balteņi *(Pieris spp.)*	2.0-3.0		Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i., apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	3	2
Garšaugi*, izņemot maurlokus (atklātā laukā)	Laputis *(Aphididae),* tīklērce *(Tetranychus urticae)*,* tripši *(Thysanoptera),* siltumnīcu baltblusiņa *(Trialeurodes vaporariorum)*	2.0-3.0		Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i., apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	14	2
Garšaugi*, izņemot maurlokus (segtās platībās)	Laputis *(Aphididae),* tīklērce *(Tetranychus urticae)*,* tripši *(Thysanoptera),* siltumnīcu baltblusiņa *(Trialeurodes vaporariorum)*	2.0-3.0		Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i., apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	14	3
Spināti*, skābenes, portulaki, lapu bietes* (atklātā laukā)	Laputis *(Aphididae),* tripši *(Thysanoptera),* siltumnīcu baltblusiņa *(Trialeurodes vaporariorum)*	2.0-3.0		Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i., apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	7	2
Ābeles, cidonijas*	Laputis *(Aphididae),* sprīžmeši *(Geometridae),* augļu koku sarkanā tīklērce *(Panonychus ulmi)**	2.0-3.0		Apsmidzināt stādījumus, pirms un pēc ziedēšanas, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i., apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	14	2
Vīnogulāji* (neražojoši stādījumi, dēstu un mātes augu stādījumi)	Laputis *(Aphididae),* maivaboles *(Melolontha spp.)*	2.0-3.0		Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i., apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	3	3

1	2	3	4	5	6	7
Krāšņumaugi, dekoratīvie augi, izņemot skujkokus (atklātā laukā un segtās platībās)	Alotājmušas *(Agromyzidae),* šaurspārnu kodes *(Gracilaridae),* laputis *(Aphididae),* tīklērces *(Tetranychidae)*,* tripši *(Thysanoptera),* siltumnīcu baltblusiņa *(Trialeurodes vaporariorum)*	3.0		Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i., apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	-	2
Ozoli*	Maijvaboles *(Melolontha spp.)*	3.0		Apsmidzināt vaboļu papildbarošanās laikā	-	1
Ķirši*, plūmes*	Laputis *(Aphididae),* ķiršu zāģlapsene *(Caliroa cerasi),* ķiršu pumpuru tīklkode *(Aegyreshia pruniella),* zāģlapsene *(Hoplocampa spp.)*	2.0-3.0		Apsmidzināt stādījumus pirms un pēc ziedēšanas, parādoties kaitēkļu bojājumu pazīmēm, t.i., apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	14	2
Avenes*, kazenes*	Laputis (Aphididae)	2.0-3.0		Apsmidzināt stādījumus pirms un pēc ziedēšanas, parādoties kaitēkļu bojājumu pazīmēm, t.i., apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	7	2
Upenes*, jāņogas*, ērkšķogas*	Laputis *(Aphididea),* jāņogulāju zāģlapsene *(Nematus ribesii)*, gaiškāju ērkšķogu zāģlapsene *(Pristiphora rufipes)*, upeņu dzinumu pangodiņš *(Raseliella ribis)*	2.0-3.0		Apsmidzināt stādījumus pirms un pēc ziedēšanas, parādoties kaitēkļu bojājumu pazīmēm, t.i., apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	7	2

***Mazais lietojums**. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

18.2. NeemAzal-T/S

Reģ. Nr. 0241, reģ. klase 3.
Darbīgā viela: azadiraktīns-A, 10 g/l.
Insekticīds, akaricīds.
Sistēmas un zarnu inde.
Trifolio-M GmbH

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

NeemAzal
Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 43, reģ. klase 3.
Darbīgās vielas: azadiraktīns-A, 10 g/l.
Insekticīds, akaricīds.
Sistēmas un zarnu inde.
SIA Agrimatco Latvia

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Darba šķidruma deva: l/100 m²	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis *(Leptinotarsa decemlineata)*	0.5	5	Apsmidzināt stādījumus, parādoties 1.-2. vecuma kāpuriem	4	2
Gurķi, ķirbji, cukīni, kabači, tomāti, baklažāni (atklātā laukā)	Laputis *(Aphididae),* alotājmušas *(Liriomyza spp., Tuta absoluta),* tīklērce *(Tetranychus urticae)*,* tripši *(Thysanoptera),* siltumnīcu baltblusiņa *(Trialeurodes vaporariorum)*	0.5	4-6	Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i., apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	3	2

1	2	3	4	5	6	7
Gurķi, ķirbji, cukīni, kabači, tomāti, baklažāni (segtās platībās)	Laputis *(Aphididae),* alotājmušas (*Liriomyza spp., Tuta absoluta),* tīklērce *(Tetranychus urticae)*,* tripši *(Thysanoptera),* siltumnīcu baltblusiņa *(Trialeurodes vaporariorum)*	0.5	4-6	Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i., apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	3	3
Pipari (segtās platībās)	Laputis *(Aphididae),* tīklērce *(Tetranychus urticae)*,* tripši *(Thysanoptera),* siltumnīcu baltblusiņa *(Trialeurodes vaporariorum)*	0.5	4-6	Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i., apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	3	3
Galviņkāposti*, Briseles kāposti*, Savojas kāposti*	Kāpostu laputs *(Brevicoryne braassicae),* kāpostu cekulkode *(Plutella maculipennis),* kāpostu pūcīte *(Barathra brassicae),* balteņi *(Pieris spp.)*	0.5	4-6	Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i., apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	3	2
Garšaugi*, izņemot maurlokus (atklātā laukā)	Laputis *(Aphididae),* tīklērce *(Tetranychus urticae)*,* tripši *(Thysanoptera),* siltumnīcu baltblusiņa *(Trialeurodes vaporariorum)*	0.5	4-6	Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i., apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	14	2
Garšaugi*, izņemot maurlokus (segtās platībās)	Laputis *(Aphididae),* tīklērce *(Tetranychus urticae)*,* tripši *(Thysanoptera),* siltumnīcu baltblusiņa *(Trialeurodes vaporariorum)*	0.5	4-6	Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i., apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	14	3
Spināti*, skābenes, portulaki, lapu bietes* (atklātā laukā)	Laputis *(Aphididae),* tripši *(Thysanoptera),* siltumnīcu baltblusiņa *(Trialeurodes vaporariorum)*	0.5	4-6	Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i., apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	7	2
Ābeles, cidonijas*	Laputis *(Aphididae),* sprīžmeši *(Geometridae),* augļu koku sarkanā tīklērce *(Panonychus ulmi)**	0.3	10	Apsmidzināt stādījumus, pirms un pēc ziedēšanas, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i., apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	14	2
Vīnogulāji* (neražojoši stādījumi, dēstu un mātes augu stādījumi)	Laputis *(Aphididae),* maivaboles *(Melolontha spp.)*	0.5	4-6	Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i., apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	3	3
Krāšņumaugi, dekoratīvie augi, izņemot skujkokus (atklātā laukā un segtās platībās)	Alotājmušas *(Agromyzidae),* šaurspārnu kodes *(Gracilaridae),* laputis *(Aphididae),* tīklērces *(Tetranychidae)*,* tripši *(Thysanoptera),* siltumnīcu baltblusiņa *(Trialeurodes vaporariorum)*	0.3-0.5	0.3 % - 9; 0.5 % - 6	Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i., apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	-	2
Ozoli*	Maijvaboles *(Melolontha spp.)*	0.3	10	Apsmidzināt vaboļu papildbarošanās laikā	-	1
Ķirši*, plūmes*	Laputis *(Aphididae),* ķiršu zāģlapsene *(Caliroa cerasi),* ķiršu pumpuru tīklkode *(Aegyreshia pruniella),* zāģlapsene *(Hoplocampa spp.)*	0.3	10	Apsmidzināt stādījumus pirms un pēc ziedēšanas, parādoties kaitēkļu bojājumu pazīmēm, t.i., apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	14	2
Avenes*, kazenes*	Laputis (Aphididae)	0.3	10	Apsmidzināt stādījumus pirms un pēc ziedēšanas, parādoties kaitēkļu bojājumu pazīmēm, t.i., apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	7	2

1	2	3	4	5	6	7
Upenes*, jāņogas*, ērkšķogas*	Laputis *(Aphididea),* jāņogulāju zāglapsene *(Nematus ribesii)*, gaiškāju ērkšķogu zāglapsene *(Pristiphora rufipes),* upeņu dzinumu pangodiņš *(Raseliella ribis)*	0.3	10	Apsmidzināt stādījumus pirms un pēc ziedēšanas, parādoties kaitēkļu bojājumu pazīmēm, t.i., apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	7	2

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

19. Nexide CS

Reģ. Nr. 0715, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: gamma-cihalotrīns, 60 g/l.
Pieskares un zarnu iedarbība.
FMC Agricultural Solutions A/S

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Vantex CS

Reģ. Nr. 0716, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: gamma-cihalotrīns, 60 g/l.
Pieskares un zarnu iedarbība.
FMC Agricultural Solutions A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, speltas kvieši, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Laputis *(Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum, Rahopolosiphum padi)*	0.05		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz piengatavības vidum (AS 12-75)	21	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu spīdulis *(Meligethes aeneus),* krustziežu sēklu smecernieks *(Ceutorhynchus assimilis),* krustziežu pākšteņu pangodiņš *(Dasineura brassicae),* rapša stublāju spradzis *(Psylliodes chrysocephala),* krustziežu spradži (*Phyllotreta spp.)*	0.05-0.06		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz ziedēšanas beigām (AS 10-69)	28	1
Zirņi (svaigam patēriņam ar/bez pākstīm, graudiem)	Zirņu laputs *(Acyrthosiphon pisum),* zirņu tinējs (*Cydia nigricana),* svītrainais zirņu smecernieks *(Sitona lineatus)*	0.05-0.06		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz ziedēšanas beigām (AS 10-69)	14	1
Pupas (graudiem)	Svītrainais zirņu smecernieks *(Sitona lineatus)*	0.05-0.06		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz ziedēšanas beigām (AS 10-69)	14	1
Galviņkāposti*	Rāceņu baltenis *(Pieris rapae),* kāpostu baltenis *(Pieris brassicae),* kāpostu laputs *(Brevicoryne brassiacae),* kāpostu cekulkode* *(Plutella maculipennis)*	0.08		Apsmidzināt stādījumu, kaitēkļiem parādoties, sākot ar galviņas veidošanās sākumu līdz galviņa sasniegusi šķirnei raksturīgo lielumu (AS 41-49)	7	1
Cukurbietes*	Laputis *(Aphididae),* biešu muša *(Pegomya betae)*	0.06		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai (AS 12-19)	-	1
Galda bietes*, lopbarības bietes*	Laputis *(Aphididae),* biešu muša *(Pegomya betae)*	0.06		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz sakne sasniegusi 30% no raksturīgā lieluma (AS 12-43)	10	1
Āboliņš* (sēklai), lucerna* (sēklai)	Laputis *(Aphididae),* smecernieki *(Apion spp., Sitona spp., Hypera spp.)*	0.05		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz ziedēšanas beigām (AS 12-69)	-	1

1	2	3	4	5	6	7
Eļļas rutks* (sēklai)	Krustziežu spradži *(Phyllotreta spp.),* smecernieki *(Ceutorhynchus spp.)*	0.06		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga dīgļlapu atvēršanas stadiju līdz ziedēšanas beigām (AS 10-69)	-	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

20. Nissorun 250 SC

Reģ. Nr. 0861, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: heksitiazoks, 250 g/l.
Pieskares un zarnu iedarbība.
Nisso Chemical Europe GmbH

Ābeles, bumbieres	Sarkanā augļu koku tīklērce *(Panonychus ulmi),* parastā tīklērce *Tetranychus urticae)*	0.4		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga ziedpumpuru parādīšanos līdz augļiem izveidojies šķirnei raksturīgais augļa krāsojums (AS 55-85)	28	1
Vīnogas (pārstrādei)	Sarkanā augļu koku tīklērce *(Panonychus ulmi),* parastā tīklērce *(Tetranychus urticae)*	0.32		Apsmidzināt stādījumu, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga lapu attīstības fāzes vidu līdz ogas iegūst šķirnei raksturīgo krāsojumu (AS 15-83)	21	2
Zemenes (atklātā laukā, tuneļos)	Parastā tīklērce *(Tetranychus urticae)*	0.4		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga lapu attīstības sākumu līdz atmirušas vecās lapas (AS 13-97)	3	1
Zemenes (segtās platībās)	Parastā tīklērce *(Tetranychus urticae)*	0.24		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga lapu attīstības sākumu līdz atmirušas vecās lapas (AS 13-97)	3	1
Gurķi, kabači, melones, arbūzi (segtās platībās)	Parastā tīklērce *(Tetranychus urticae)*	0.32		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga piecu lapu stadiju līdz augļi nogatavojušie (AS 15-89)	3	1
Tomāti, baklažāni, paprika (segtās platībās)	Parastā tīklērce *(Tetranychus urticae)*	0.30		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga piecu lapu stadiju līdz augļi nogatavojušie (AS 15-89)	3	1
Krūmmellenes*, avenes*, kazenes* (atklātā laukā, tuneļos)	Parastā tīklērce *(Tetranychus urticae)*	0.4		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, pēc ražas novākšanas	-	1
Upenes*, jāņogas*, ērkšķogas*	Parastā tīklērce *(Tetranychus urticae)*	0.4		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, pēc ražas novākšanas	-	1
Krāšņumaugi* (atklātā laukā, tuneļos, segtās platībās)	Parastā tīklērce *(Tetranychus urticae)*	0.30		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēkļiem parādoties	-	1

*__Mazais lietojums.__ Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

21. PHOSTOXIN TABLET

Reģ. Nr. 0112, reģ. klase 1.
Darbīgā viela: alumīnija fosfīds, 56 %.
Insekticīds, akaricīds.
Elpošanas inde.
Detia Freyberg GmbH

Lietošanas veids: gāzēšana pie atmosfēras spiediena t.sk. zem gāzes necaurlaidīgiem segumiem.

Produkcija, krava, kravas raksturojums	Kaitīgais organisms	Preparāta deva	Minimālais ekspozīcijas ilgums, dienas	Vēdināšana	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
Kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, auzas, pupas, zirņi, rapsis, lupīna*, soja*, linsēklas*, kukurūza*, saulespuķu sēklas* (pārtikai, lopbarībai)	Noliktavu kaitēkļi: graudu smecernieks *(Sitophilus granaries)*, rīsu graudu smecernieks *(Sitophilus oryzae),* zirņu sēklgrauzis *(Brunchus pisorum),* zāģzobu graudu vabole *(Oryzeaphilus surinamensis),* sīkais miltu plakanis *(Cryptolestes ferrugineus),* žāvēto augļu svilnis *(Plodia interpunctella),* pelēkais miltu svilnis *(Anagasta kuehniella),* sīkais miltu melnulis *(Tribolium confusum)* , graudu vabole *(Tribolium castaneum)*	5 g-10 g/PH_3 /m^3 (5 tabletes/ m^3)	Iedarbības laiks atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas, temperatūras, mitruma. Zem 5°C - neveikt fumigāciju 5°-12°C -10 d; 13°-15°C -5 d; 16°-20°C -4 d; 21°-25°C -3 d; virs 25°- 2 d;	Telpas atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas. Vēdināšanas laiks atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas	Novietojiet tabletes uz nedegošiem paliktņiem sabēruma virsotnē. Nepieļaut tablešu un to pēc lietošanas atlieku nonākšanu tiešā kontaktā ar produkciju, kas tiks lietota pārtikā vai lopbarībā. Pārtikā un lopbarībā izmantojamajai produkcijai – nogaidīšanas laiks 7 dienas
Žāvēti dārzeņi, žāvēti augļi, dārza pupiņas*, rīsi*, sorgo*, prosa*, griķi*, rieksti*, kakao pupiņas*, kafijas pupiņas*, kaltēti augi*, kaltētas sēnes*		5 g-10 g/PH_3 /m^3 (5 -10 tabletes/m^3)		Telpas atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas. Vēdināšanas laiks atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas	Novietojiet tabletes uz nedegošiem paliktņiem sabēruma virsotnē. Telpas blīvi noslēgt. Nepieļaut tablešu un to pēc lietošanas atlieku nonākšanu tiešā kontaktā ar produkciju, kas tiks lietota pārtikā. Pārtikā izmantojamajai produkcijai – nogaidīšanas laiks 7 dienas

1	2	3	4	5	6
Kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, auzas, pupas, rapsis, zirņi, dārza pupiņas*, lupīna*, soja*, linsēklas*, griķi*, kukurūza*, saulespuķu sēklas*, zālaugu sēklas (sēklai)	Noliktavu kaitēkļi: graudu smecernieks *(Sitophilus granaries)*, rīsu graudu smecernieks *(Sitophilus oryzae),* zirņu sēklgrauzis *(Brunchus pisorum),* zāģzobu graudu vabole *(Oryzeaphilus surinamensis),* sīkais miltu plakanis *(Cryptolestes ferrugineus),* žāvēto augļu svilnis *(Plodia interpunctella),* pelēkais miltu svilnis *(Anagasta kuehniella),* sīkais miltu melnulis *(Tribolium confusum),* graudu vabole *(Tribolium castaneum)*	5 g-10 g/PH_3 /m^3 (5 tabletes/ m^3)		Telpas atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas. Vēdināšanas laiks atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas	Tabletes ievadīt produkcijas masā ar speciālām zondēm. Telpas blīvi noslēgt
Tukšas noliktavu telpas		5 g-10 g/PH_3 /m^3 (5 tabletes/ m^3)		Telpas atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas. Vēdināšanas laiks atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas	Tabletes vienmērīgi izvietot telpās. Telpas blīvi noslēgt
Iesaiņoti pārtikas produkti*		2 g-3 g/PH_3 /m^3 (2-3 tabletes/ m^3)		Telpas atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas. Vēdināšanas laiks 48 h atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas	Tabletes vienmērīgi izvietot telpā. Telpas blīvi noslēgt. Nogaidīšanas laiks 7 dienas
Kokvilna* ķīpās un saiņos, tabaka iesaiņota	Noliktavu kaitēkļi un citi kaitēkļi	5 g-10 g/PH_3 /m^3 (5 tabletes/ m^3		Telpas atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas. Vēdināšanas laiks atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas	Tabletes vienmērīgi izvietot telpā. Telpas blīvi noslēgt
Apaļie kokmateriāli* (zāģbaļķi, finierkluči, papīrmalka, stabi, mieti, malka), zāģmateriāli*, koksnes un kokmateriālu izstrādājumi*, iesaiņojamie materiāli*, starplikas*, šķelda*, mulča* (sasmalcināta koku miza, koksne), kūdra*	Koksnes kaitēkļi*	2 g -3 g/PH_3 /m^3 (2-3 tabletes/ m^3)		Telpas atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas. Vēdināšanas laiks atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas	Tabletes vienmērīgi izvietot telpā. Telpas blīvi noslēgt
Graudi kuģu tilpnēs (kvieši, mieži, rudzi, auzas, tritikāle, kukurūza)	Noliktavu kaitēkļi	3 g -5 g/PH_3 /m^3 (3-5 tabletes/ m^3)	21 diena	Tilpnes atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas	Tabletes vienmērīgi izvietot kravas virspusē. Tilpnes blīvi noslēgt. Pārtikā un lopbarībā izmantojamajai produkcijai – nogaidīšanas laiks 7 dienas

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

22. Poleci

Reģ. Nr. 0764, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: deltametrīns, 25 g/l.
Pieskares un zarnu iedarbības insekticīds.
Sharda Cropchem España S.L.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu spīdulis *(Meligethes aeneus)*	0.2		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga zaļo pumpuru stadiju līdz dzelteno pumpuru stadijai (AS 51-59)	56	1
Burkāni*	Burkānu muša *(Psilla rosae)*, laputis *(Aphididae)*	0.3		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga vienas lapas stadiju līdz izveidojusies saknei raksturīgā forma un diametrs (AS 11-49)	7	2

***Mazais lietojums**. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

23. Quickphos pellets 56 GE

Reģ. Nr. 0504, reģ. klase 1.
Darbīgā viela: alumīnija fosfīds, 56 %.
Insekticīds.
Elpošanas inde.
UPL Holdings Coöperatief U.A.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

AGROPHOS PELLETS 56 GE

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 48, reģ. klase 1.
Darbīgā viela: alumīnija fosfīds, 56 %.
Insekticīds.
Elpošanas inde.
SIA "Sekargas Hamilton Pest Control"

Balticphos pellets GE

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 64, reģ. klase 1.
Darbīgā viela: alumīnija fosfīds, 56 %.
Insekticīds.
Elpošanas inde.
SIA "KG Latvija"

Lietošanas veids: gāzēšana pie atmosfēras spiediena t.sk. zem gāzes necaurlaidīgiem segumiem.

Apstrādājamais objekts	Kaitīgais organisms	Deva	Ekspozīcijas laiks	Vēdināšana	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
Kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, auzas, prosa, sorgo, zirņi (sabērumā, torņos) (pārtikai, lopbarībai)	Noliktavu kaitēkļi: graudu smecernieks *(Sitophilus granaries)*, rīsu graudu smecernieks *(Sitophilus oryzae)*, zirņu sēklgrauzis *(Brunchus pisorum)*, zāģzobu graudu vabole *(Oryzeaphilus surinamensis)*, sīkais miltu plakanis *(Cryptolestes ferrugineus)*, žāvēto augļu svilnis *(Plodia interpunctella)*, pelēkais miltu svilnis *(Anagasta kuehniella)*, sīkais miltu melnulis *(Tribolium confusum)*, graudu vabole *(Tribolium castaneum)*	20-25 granulas/t	Iedarbības laiks atkarīgs no ēkas konstrukcijas, temperatūras, mitruma: vismaz 3-8 dienas	Ventilēšanas laiks atkarīgs no ēkas konstrukcijas	Novietojiet granulas uz nedegošiem paliktņiem sabēruma virsotnē. Nepieļaut granulu un to pēclietošanas atlieku nonākšanu tiešā kontaktā ar graudiem, kas tiks lietoti pārtikā vai lopbarībā. Pārtikā un lopbarībā izmantojamiem graudiem – nogaidīšanas laiks 7 dienas

1	2	3	4	5	6
Kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, auzas, prosa, sorgo, zirņi (sabērumā, torņos) (sēklai)	Noliktavu kaitēkļi: graudu smecernieks *(Sitophilus granaries)*, rīsu graudu smecernieks *(Sitophilus oryzae)*, zirņu sēklgrauzis *(Brunchus pisorum)*, zāģzobu graudu vabole *(Oryzeaphilus surinamensis)*, sīkais miltu plakanis *(Cryptolestes ferrugineus)*, žāvēto augļu svilnis *(Plodia interpunctella)*, pelēkais miltu svilnis *(Anagasta kuehniella)*, sīkais miltu melnulis *(Tribolium confusum)*, graudu vabole *(Tribolium castaneum)*	20-25 granulas/t	Iedarbības laiks atkarīgs no ēkas konstrukcijas, temperatūras, mitruma: vismaz 3-8 dienas	Ventilēšanas laiks atkarīgs no ēkas konstrukcijas	Granulas ievadīt graudu masā ar speciālām zondēm vai ievērojot noteiktu intervālu ievadīt graudu plūsmā graudu iebēršanas laikā
Kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, auzas, prosa, sorgo, zirņi (iesaiņoti) (pārtikai, lopbarībai, sēklai)	Noliktavu kaitēkļi: graudu smecernieks *(Sitophilus granaries)*, rīsu graudu smecernieks *(Sitophilus oryzae)*, zirņu sēklgrauzis *(Brunchus pisorum)*, zāģzobu graudu vabole *(Oryzeaphilus surinamensis)*, sīkais miltu plakanis *(Cryptolestes ferrugineus)*, žāvēto augļu svilnis *(Plodia interpunctella)*, pelēkais miltu svilnis *(Anagasta kuehniella)*, sīkais miltu melnulis *(Tribolium confusum)*, graudu vabole *(Tribolium castaneum)*	20-25 granulas/m^3	Iedarbības laiks atkarīgs no ēkas konstrukcijas, temperatūras, mitruma: vismaz 3-8 dienas	Ventilēšanas laiks atkarīgs no ēkas konstrukcijas	Granulas izvieto vienmērīgi un brīvi starp vai gar produkta iepakojumiem, lai nesaskaras ar apstrādājamo produktu. Pārtikā un lopbarībā izmantojamiem graudiem – nogaidīšanas laiks 7 dienas

24. Quickphos tablets 56 GE

Reģ. Nr. 0505, reģ. klase 1.
Darbīgā viela: alumīnija fosfīds, 56%.
Insekticīds.
Elpošanas inde.
UPL Holdings Coöperatief U.A.

Lietošanas veids: gāzēšana pie atmosfēras spiediena t.sk. zem gāzes necaurlaidīgiem segumiem.

Apstrādājamais objekts	Kaitīgais organisms	Deva	Ekspozīcijas laiks	Vēdināšana	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
Kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, auzas, prosa, sorgo, zirņi (sabērumā, torņos) (pārtikai, lopbarībai)	Noliktavu kaitēkļi: graudu smecernieks *(Sitophilus granaries)*, rīsu graudu smecernieks *(Sitophilus oryzae)*, zirņu sēklgrauzis *(Brunchus pisorum)*, zāģzobu graudu vabole *(Oryzeaphilus surinamensis)*, sīkais miltu plakanis *(Cryptolestes ferrugineus)*, žāvēto augļu svilnis *(Plodia interpunctella)*, pelēkais miltu svilnis *(Anagasta kuehniella)*, sīkais miltu melnulis *(Tribolium confusum)*, graudu vabole *(Tribolium castaneum)*	4-5 tb/t	Iedarbības laiks atkarīgs no ēkas konstrukcijas, temperatūras, mitruma: vismaz 3-8 dienas	Ventilēšanas laiks atkarīgs no ēkas konstrukcijas	Novietojiet tabletes uz nedegošiem paliktņiem sabēruma virsotnē. Nepieļaut tablešu un to pēclietošanas atlieku nonākšanu tiešā kontaktā ar graudiem, kas tiks lietoti pārtikā vai lopbarībā. Pārtikā un lopbarībā izmantojamiem graudiem – nogaidīšanas laiks 7 dienas

1	2	3	4	5	6
Kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, auzas, prosa, sorgo, zirņi (sabērumā, torņos) (sēklai)	Noliktavu kaitēkļi: graudu smecernieks *(Sitophilus granaries)*, rīsu graudu smecernieks *(Sitophilus oryzae),* zirņu sēklgrauzis *(Brunchus pisorum),* zāģzobu graudu vabole *(Oryzeaphilus surinamensis),* sīkais miltu plakanis *(Cryptolestes ferrugineus),* žāvēto augļu svilnis *(Plodia interpunctella),* pelēkais miltu svilnis *(Anagasta kuehniella),* sīkais miltu melnulis *(Tribolium confusum),* graudu vabole *(Tribolium castaneum)*	4-5 tb/t	Iedarbības laiks atkarīgs no ēkas konstrukcijas, temperatūras, mitruma: vismaz 3-8 dienas	Ventilēšanas laiks atkarīgs no ēkas konstrukcijas	Tabletes ievadīt graudu masā ar speciālām zondēm vai ievērojot noteiktu intervālu ievadīt graudu plūsmā graudu iebēršanas laikā
Kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, auzas, prosa, sorgo, zirņi (iesaiņoti) (pārtikai, lopbarībai, sēklai)	Noliktavu kaitēkļi: graudu smecernieks *(Sitophilus granaries)*, rīsu graudu smecernieks *(Sitophilus oryzae),* zirņu sēklgrauzis *(Brunchus pisorum),* zāģzobu graudu vabole *(Oryzeaphilus surinamensis),* sīkais miltu plakanis *(Cryptolestes ferrugineus),* žāvēto augļu svilnis *(Plodia interpunctella),* pelēkais miltu svilnis *(Anagasta kuehniella),* sīkais miltu melnulis *(Tribolium confusum),* graudu vabole *(Tribolium castaneum)*	4-5 tb/m^3	Iedarbības laiks atkarīgs no ēkas konstrukcijas, temperatūras, mitruma: vismaz 3-8 dienas	Ventilēšanas laiks atkarīgs no ēkas konstrukcijas	Tabletes izvieto vienmērīgi un brīvi starp vai gar produkta iepakojumiem, lai nesaskaras ar apstrādājamo produktu. Pārtikā un lopbarībā izmantojamiem graudiem – nogaidīšanas laiks 7 dienas

25. SilicoSec

Reģ. Nr. 0910, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: diatomīta zeme, 1000 g/kg.
Insekticīds/akaricīds.
Andermatt Group AG

Apstrādājamais objekts	Kaitīgais organisms	Preparāta deva	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, auzas, prosa, sorgo, kukurūza, rīsi, griķi	Rīsu graudu smecernieks *(Sitophilus oryzae),* Austrālijas kviešu smecernieks *(Rhyzopertha dominica),* miltu vabole *(Tribolium castaneum),* sīkais miltu melnulis *(Tribolium confusum),* zāģzobu graudu vabole *(Oryzaephylus surnamensis),* graudu smecernieks *(Sitophilus granaries),* ērces *(Acarus siro, Lepidoglyphus destructor),* svilņi *(Ephestia cautella, Ephestia keuhniella, Ephestia elutella)*	1 kg/t	Apstrādāt graudu masu vienmērīgi ar pulveri profilaktiski, ieliekot noliktavā	-	1
		2 kg/t	Apstrādāt graudu masu vienmērīgi ar pulveri, parādoties kaitēkļiem	-	1
Tukšas noliktavu telpas		10 g/m^2	Apstrādāt, vienmērīgi noklājot apstrādājamo virsmu ar pulveri, pastāvot kaitēkļu apdraudējuma riskam vai to augstas invāzijas gadījumā	-	10
Noliktavu, dzirnavu telpas ar graudu produkciju		10 g/m^2		-	12

1	2	3	4	5	6	7

26. SoilGuard 0.5 GR

Reģ. Nr. 0761, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: teflutrīns, 5 g/kg.
Pieskares un zarnu iedarbība.
Sharda Cropchem España S.L.

Kukurūza	Kukurūzas vabole *(Diabrotica virgifera),* sprakšķu kāpuri *(Agriotes spp.)*	15.0		Iestrādāt preparātu augsnē, kultūrauga sēšanas laikā	-	1
Kartupeļi*	Sprakšķu kāpuri *(Agriotes spp.)*	15.0-20.0		Iestrādāt preparātu augsnē, kultūrauga stādīšanas laikā	-	1

***Mazais lietojums**. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

27. Teppeki

Reģ. Nr. 0699, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: flonikamīds, 500 g/kg.
Sistēmas iedarbība.
ISK Biosciences Europe N.V.

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle, vasaras kvieši	Labību laputs *(Sitobion avenae),* rožu-graudzāļu laputs *(Metopolophium dihodum),* ievu-auzu laputs *(Rhopalosiphum padi)*	0.10-0.14		Apsmidzināt sējumus pavasarī/vasarā, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz vēlajai piengatavībai (AS 21-77)	28	2
Ziemas mieži, vasaras mieži, auzas	Labību laputs *(Sitobion avenae),* rožu-graudzāļu laputs *(Metopolophium dihodum),* ievu-auzu laputs *(Rhopalosiphum padi)*	0.10-0.14		Apsmidzināt sējumus pavasarī/vasarā, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz vēlajai piengatavībai (AS 21-77)	28	1
Zirņi (zaļie bez pākstīm)	Zirņu laputs *(Acyrthosiphon pisum),* pupu laputs *(Aphis fabae),* persiku laputs *(Myzus persicae)*	0.14		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga 6 lapu stadiju līdz pākstis sasniegušas 10 % no izmēra (AS 16-71)	14	1
Ābeles, bumbieres	Ābeļu zaļā laputs *(Aphis pomi),* rožu-ābeļu laputs *(Dysaphis plantaginea),* bumbieru madaru laputs *(Dysaphis pyri)*	0.14		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar ģeneratīvo pumpuru briešanas sākumu līdz augļi sasnieguši apmēram pusi no šķirnei raksturīgā lieluma (AS 51-75)	21	3
Ķirši*	Persiku laputs *(Myzus persicae),* ķiršu-madaru laputs (*Myzus cerasi*)	0.14		Apsmidzināt stādījumus, kaitēklim parādoties, sākot ar ģeneratīvo pumpuru plaukšanu līdz augļaizmetņu attīstības sākumam (AS 51-71)	14	2
Plūmes*	Laputis *(Aphididae),* plūmju-niedru laputs *(Hyalopterus pruni),* plūmju-apiņu laputs *(Phorodon humuli)*	0.14		Apsmidzināt stādījumus, kaitēklim parādoties, sākot ar ģeneratīvo pumpuru plaukšanu līdz augļaizmetņu attīstības sākumam (AS 51-71)	21	2
Galviņkāposti*, Briseles kāposti*	Kāpostu laputs *(Brevicoryne brassicae),* kāpostu baltblusiņa *(Aleyrodes proletella)*	0.14		Apsmidzināt stādījumu, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz galviņa sasniegusi 50 % no šķirnei raksturīgā lieluma (AS 13-45)	14	2
Krāšņumaugi*	Laputis *(Aphididae)*	0.14		Apsmidzināt, kaitēkļiem parādoties	-	3

1	2	3	4	5	6	7
Cukurbietes, galda bietes*, lopbarības bietes*	Pupu laputs *(Aphis fabae),* persiku laputs *(Myzus persicae)*	0.14		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga 6 lapu stadiju līdz izveidojusies sakne (AS 16-49)	60	1
Zirņi, pupas, lupīna*, lēcas* (graudiem)	Zirņu laputs *(Acyrthosiphon pisum),* pupu laputs *(Aphis fabae),* persiku laputs *(Myzus persicae)*	0.14		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga 6 lapu stadiju līdz pākstis sasniegušas 10% no izmēra (AS 16-71)	-	1
Kartupeļi	Persiku laputs *(Myzus persicae),* pabērzu laputs *(Aphis nasturtii),* kartupeļu laputs *(Macrosiphum euphorbiae)*, krūkļu laputs *(Aphis frangulae)*	0.16		Apsmidzināt stādījumu, kaitēkļiem parādoties, sākot ar pirmo lapu veidošanos līdz piecām lapām uz galvenā stublāja (AS 10-15). Sēklai paredzētajiem kartupeļiem drīkst lietot kopā ar eļļu saturošu virsmas aktīvo vielu	-	1
Tomāti*, gurķi*, kabači* (segtās platībās)	Laputis *(Aphididae)*	0.16		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties	3	3

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

28. Tracer

Reģ. Nr. 0740, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: spinosads, 480 g/l.
Pieskares un zarnu inde.
Corteva Agriscience Denmark A/S

1	2	3	4	5	6	7
Ābeles, bumbieres, krūmcidonijas*	Lapu tinēji *(Archips rosana, Spilonota ocellana),* lapkodes *(Lyonetiidae)**	0.15		Apsmidzināt stādījumu pirms ziedēšanas, kad no olām sāk šķilties kāpuri, sākot ar zaļā konusa stadiju līdz ziedpumpuru attīstības beigām (AS 07-59)	7	1
Ābeles, bumbieres, krūmcidonijas*	Ābolu tinējs *(Cydia pomonella)*, lapu tinēji *(Archips rosana, Spilonota ocellana),* lapkodes *(Lyonetiidae)**	0.20		Apsmidzināt stādījumu pēc noziedēšanas, kad no olām sāk šķilties kāpuri, sākot ar augļaizmetņu veidošanās sākumu līdz izveidojies raksturīgais augļa krāsojums (AS 71-85)	7	3
Galviņkāposti, Briseles kāposti, brokoļi, Ķīnas kāposti, ziedkāposti	Agrā kapostu muša *(Delia brassicae)*	12 ml/1000 augiem		Apstrādāt dēstus pirms izstādīšanas atklātā laukā 3 līdz 6 lapu stadijā (AS 13-16)	-	1
Galviņkāposti, Briseles kāposti, brokoļi, Ķīnas kāposti, ziedkāposti (atklātā laukā)	Kāpostu baltenis *(Pieris brassiace)*, rāceņu baltenis *(Pieris rapae),* kāpostu cekelkode *(Plutella xylostella)*	0.2		Apsmidzināt stādījumu, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz galviņa sasniegusi 50% no škirnei raksturīgā lieluma (AS 13-45)	3	1
Sīpoli, ķiploki, šalotes sīpoli, puravi (atklātā laukā)	Tripši *(Thysanoptera),* sīpolu lakstu puskode *(Acrolepia assectrella),* sīpolu ziedmuša *(Eumerus strigatus)*	0.2		Apsmidzināt, kaitēkļiem parādoties	7	1
Zemenes (atklātā laukā)	Tripši *(Thysanoptera),* drozofila *(Drosophila suzukii)*	0.15		Apsmidzināt, kaitēkļiem parādoties	3	1
Zemenes (segtās platībās)	Tripši *(Thysanoptera),* drozofila *(Drosophila suzukii)*	0.15		Apsmidzināt, kaitēkļiem parādoties	1	3
Tomāti, paprika, baklažāni, gurķi (segtās platībās)	Kalifornijas tripsis *(Frankliniella occidentalis),* tabakas tripsis *(Thrips tabaci)*	0.2	0.02	Apsmidzināt, kaitēkļiem parādoties	3	3
Krāšņumaugi (segtās platībās)	Kalifornijas tripsis *(Frankliniella occidentalis),* tabakas tripsis *(Thrips tabaci)*	0.2	0.02	Apsmidzināt, kaitēkļiem parādoties	-	2
Smiltsērkšķi*	Raibspārnu muša *(Rhagoletis batava)*	0.2		Apsmidzināt, kaitēkļiem parādoties	7	2
Avenes*, kazenes*, upenes*, jāņogas*, ērkšķogas* (atklātā laukā)	Tripši *(Thysanoptera),* drozofila *(Drosophila suzukii),* zāģlapsenes *(Tenhredinidae),* tinēji *(Tortricidae)*	0.2		Apsmidzināt, kaitēkļiem parādoties	7	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

LIMACĪDI

1. Ferramol

Reģ. Nr. 0395, reģ. klase 3.
Darbīgā viela: dzelzs (III) fosfāts, 9.9 g/kg.
Limacīds.
W.Neudorff GmbH KG

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Ferramol Limacide

Reģ. Nr. 0745, reģ. klase 3.
Darbīgā viela: dzelzs (III) fosfāts, 9.9 g/kg.
Limacīds.
W.Neudorff GmbH KG

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, g/m²	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Lauksaimniecības un dekoratīvās kultūras, zāliens	Milzu kailgliemezis (*Limax maximus*), raibais mīkstgliemezis (*Deroceras reticulatum*), tīruma mīkstgliemezis *(Deroceras agreste),* Spānijas kailgliemezis (*Arion vulgaris)*	5	Ēsmas granulas izkaisa, kad kļūst redzamas pirmās gliemežu invāzijas un augu bojājuma pazīmes	-	4

2. Gusto

Reģ. Nr. 0489, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metaldehīds, 30 g/kg.
Limacīds.
ADAMA Registrations B.V.

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, kg/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Mīkstgliemeži *(Deroceras spp.),* kailgliemeži *(Arion spp.)*	6.0	Apstrādi veic, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc graudaugu sējas līdz kultūrauga cerošanas beigām (AS 00-29). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-14 dienām	-	2
Ziemas rapsis, vasaras rapsis, kukurūza, cukurbietes, lopbarības bietes, zirņi (graudiem), pupas (graudiem), sīpoli, šalotes sīpoli, tomāti (atklātā laukā un segtās platībās), baklažāni (atklātā laukā un segtās platībās)	Mīkstgliemeži *(Deroceras spp.),* kailgliemeži *(Arion spp.)*	6.0	Apstrādi veic, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kultūrauga sējas līdz tā 9 lapu stadijai (AS 00-19). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-14 dienām	-	2
Kartupeļi	Mīkstgliemeži *(Deroceras spp.),* kailgliemeži *(Arion spp.)*	6.0	Apstrādi veic, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājumu pazīmēm, pēc kartupeļu stādīšanas līdz kultūrauga stublāju atmiršanas beigām (AS 00-97). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-14 dienām	3	2

1	2	3	4	5	6
Zirņi, pupas (svaigam patēriņam)	Mīkstgliemeži *(Deroceras spp.),* kailgliemeži *(Arion spp.)*	6.0	Apstrādi veic, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājumu pazīmēm, pēc zirņu sējas līdz kultūrauga ziedkopas veidošanās fāzes sākumam (AS 00-50). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-14 dienām	28	2
Ziedkāposti, brokoļi, Briseles kāposti, galviņkāposti	Mīkstgliemeži *(Deroceras spp.),* kailgliemeži *(Arion spp.)*		Apstrādi veic, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājumu pazīmēm, pēc kultūrauga sējas vai stādīšanas līdz galviņas vai ziedkopas veidošanās sākumam (AS 00-41). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-14 dienām	3	2
Zemenes (atklātā laukā un segtās platībās)	Mīkstgliemeži *(Deroceras spp.),* kailgliemeži *(Arion spp.)*	6.0	Apstrādi veic parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājumu pazīmēm, no kultūrauga ataugšanas sākuma līdz cera centrā redzams ziedkopas pumpurs (AS 00-55). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-14 dienām	-	2
Dekoratīvo augu un krāšņumaugu sējumi un stādījumi, krāšņumaugu stādi, meža kultūru stādi, augļu koku un ogulāju stādi stādaudzētavās	Mīkstgliemeži *(Deroceras spp.),* kailgliemeži *(Arion spp.)*	6.0	Apstrādi veic, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājumu pazīmēm visu veģetācijas periodu. Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-14 dienām	-	2

3. Ironmax Pro

Reģ. Nr. 0630, reģ. klase 3.
Darbīgā viela: dzelzs fosfāts, 24.2 g/kg.
Limacīds.
De Sangosse S.A.S.

Kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, auzas, zirņi pupas, pupiņas, rapsis, ripsis, lini, saulespuķes, soja, sinepes, kaņepes, ķirbji	Kailgliemeži *(Arion spp.*), mīkstgliemeži *(Deroceras spp.)*	7.0	Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kultūrauga sējas līdz ražas novākšanai (AS 00-89). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 5 dienām	-	4
Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes, kāļi, rāceņi, burkāni, selerijas (sakņu), redīsi	Kailgliemeži *(Arion spp.*), mīkstgliemeži *(Deroceras spp.)*	7.0	Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kultūrauga sējas līdz kultūrauga četru lapu stadijai (AS 00-14). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 5 dienām	-	4
Sīpoli, ķiploki, ziedkāposti, brokoļi, galviņkāposti, Briseles kāposti	Kailgliemeži *(Arion spp.),* mīkstgliemeži *(Deroceras spp.)*	7.0	Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kultūrauga sējas līdz ražas novākšanai (AS 00-49). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 5 dienām	-	4

1	2	3	4	5	6
Selerijas (lapu, kātu), puravi, vasaras sīpoli	Kailgliemeži *(Arion spp.)*, mīkstgliemeži *(Deroceras spp.)*	7.0	Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kultūrauga sējas līdz ražas novākšanai (AS 00-49). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 5 dienām	-	4
Zirņi, pupas, pupiņas (svaigam patēriņam ar/bez pākstīm)	Kailgliemeži *(Arion spp.)*, mīkstgliemeži *(Deroceras spp.)*	7.0	Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kultūrauga sējas līdz ražas novākšanai (AS 00-79). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 5 dienām	-	4
Kukurūza (lopbarībai), saldā kukurūza	Kailgliemeži *(Arion spp.)*, mīkstgliemeži *(Deroceras spp.)*	7.0	Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kultūrauga sējas līdz ražas novākšanai (AS 00-85). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 5 dienām	-	4
Salāti, spināti, garšaugi (atklātā laukā un segtās platībās)	Kailgliemeži *(Arion spp.)*, mīkstgliemeži *(Deroceras spp.)*	7.0	Apstrādāt kultūraugu platības vai arī atsevišķas vietās sējumā vai stādījumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kultūrauga sējas līdz ražas novākšanai (AS 00-49). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 5 dienām	-	4
Ganības (sējas gadā)	Kailgliemeži *(Arion spp.)*, mīkstgliemeži *(Deroceras spp.)*	7.0	Apstrādāt ganības sējas gadā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kultūrauga sējas līdz ganīšanas sākumam	-	4
Gurķi, kabači,cukini, melones, arbūzi	Kailgliemeži *(Arion spp.)*, mīkstgliemeži *(Deroceras spp.)*	7.0	Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kultūrauga sējas līdz ražas novākšanai (AS 00-89). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 5 dienām	-	4
Tomāti, paprika, baklažāni (segtās platībās)	Kailgliemeži *(Arion spp.)*, mīkstgliemeži *(Deroceras spp.)*	7.0	Apstrādāt kultūraugu platības vai arī atsevišķas vietās sējumā vai stādījumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kultūrauga sējas līdz ražas novākšanai (AS 00-89). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 5 dienām	-	4
Zāliens	Kailgliemeži *(Arion spp.)*, mīkstgliemeži *(Deroceras spp.)*	7.0	Apstrādāt zālienu, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm jebkurā laikā sezonā. Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 5 dienām	-	4

1	2	3	4	5	6
4. Lima Oro Reģ. Nr. 0568, reģ. klase 2. Darbīgā viela: metaldehīds, 50 g/kg. Limacīds. ***Sharda Cropchem España S.L.***			**<u>Analogie augu aizsardzības līdzekļi:</u>** **Limgol** Reģ. Nr. 0586, reģ. klase 2. Darbīgā viela: metaldehīds, 50 g/kg. Limacīds. ***Sharda Cropchem España S.L.*** **Meridian** Reģ. Nr. 0569, reģ. klase 2. Darbīgā viela: metladehīds, 50 g/kg. Limacīds. ***Sharda Cropchem España S.L.***		
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Kailgliemeži *(Arion spp.)*, mīkstgliemeži *(Deroceras spp.)*	7.0	Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc graudaugu sējas līdz kultūrauga cerošanas beigām (AS 00-29). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām	-	2
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Kailgliemeži *(Arion spp.)*, mīkstgliemeži *(Deroceras spp.)*	7.0	Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kultūrauga sējas līdz kultūrauga sāndzinumu veidošanas fāzes beigām (AS 00-29). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām	-	2
Kukurūza	Kailgliemeži *(Arion spp.)*, mīkstgliemeži *(Deroceras spp.)*	7.0	Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kukurūzas sējas līdz kultūrauga piecu lapu stadijai (AS 00-15). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām	-	2
Salāti	*Kailgliemeži (Arion spp.)*, mīkstgliemeži *(Deroceras spp.)*	7.0	Apstrādāt kultūraugu platības vai arī atsevišķas vietās sējumā vai stādījumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc salātu sējas līdz kultūrauga deviņu lapu stadijai (AS 00-19). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām	-	2
Ābeles, bumbieres	*Kailgliemeži (Arion spp.)*, mīkstgliemeži *(Deroceras spp.)*	7.0	Apstrādāt kultūraugu stādījumu vai arī atsevišķas vietas stādījumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, veģetācijai atsākoties līdz kultūrauga ziedēšanas beigām (AS 01-69). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām	-	2
Jāņogas, upenes, ērkšķogas, avenes, kazenes	*Kailgliemeži (Arion spp.)*, mīkstgliemeži *(Deroceras spp.)*	7.0	Apstrādāt kultūraugu stādījumu vai arī atsevišķas vietas stādījumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, veģetācijai atsākoties līdz kultūrauga ziedēšanas beigām (AS 01-69). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām	-	2
Dekoratīvās kultūras, zāliens	*Kailgliemeži (Arion spp.)*, mīkstgliemeži *(Deroceras spp.)*	7.0	Apstrādāt kultūraugu platības vai arī atsevišķas vietas stādījumā vai sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, kultūrauga veģetācijas periodā (AS 00-99). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām	-	2

1	2	3	4	5	6
Ganības (ierīkošanas gadā), zālājs (ierīkošanas gadā)	*Kailgliemeži (Arion spp.*), mīkstgliemeži *(Deroceras spp.)*	7.0	Apstrādāt sējumu vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc sējas līdz kultūrauga piecu lapu stadijai (AS 00-15). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām	-	2

5. SLUXX^{HP}

Reģ. Nr. 0396, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: dzelzs (III) fosfāts, 29.7 g/kg.
Limacīds.
W.Neudorff GmbH KG

Lauksaimniecības un dekoratīvās kultūras (atklātā laukā un segtās platībās)	Kailgliemeži *(Arion spp.*), mīkstgliemeži *(Deroceras spp.)*	7	Apstrādāt kultūraugu platības, kā arī atsevišķas sējumu vai stādījumu vietas, gliemežu invāzijas sākumā	-	4

6.1. Vitrol GB

Reģ. Nr. 0857, reģ. klase 3.
Darbīgā viela: dzelzs pirofosfāts, 24 g/kg.
Limacīds.
Bros Sp. z o.o.

Profesionāliem lietotājiem:

Graudaugi, eļļas augi	Kailgliemeži *(Arion spp.),* mīkstgliemeži *(Deroceras spp.)*	7.0	Apstrādāt kultūraugu platības, kā arī atsevišķas sējumu vietas, gliemežu invāzijas sākumā	-	6
Kartupeļi	Kailgliemeži *(Arion spp., Limax spp.)*, mīkstgliemeži *(Deroceras spp.)*, vīngliemeži *(Cepaea spp.)*	7.0	Apstrādāt kultūraugu platības, kā arī atsevišķas stādījumu vietas, gliemežu invāzijas sākumā	-	6
Galviņkāposti, Briseles kāposti, ziedkāposti, brokoļi, salāti, lapu dārzeņi (atklātā laukā, tuneļos, segtās platībās)	Kailgliemeži *(Arion spp.),* mīkstgliemeži *(Deroceras spp.)*, gliemeži *(Helix spp.)*, vīngliemeži *(Cepaea spp.)*	7.0	Apstrādāt kultūraugu platības, kā arī atsevišķas stādījumu vietas, gliemežu invāzijas sākumā	-	6
Zemenes, ogulāji (atklātā laukā, tuneļos, segtās platībās)	Kailgliemeži *(Arion spp.),* mīkstgliemeži *(Deroceras spp.)*, gliemeži *(Helix spp.)*	7.0	Apstrādāt kultūraugu platības, kā arī atsevišķas stādījumu vietas, gliemežu invāzijas sākumā	-	6
Dekoratīvās kultūras (atklātā laukā, tuneļos un segtās platībās)	Kailgliemeži *(Arion spp.)*, mīkstgliemeži *(Deroceras spp.)*, gliemeži *(Helix spp.),* vīngliemeži *(Cepaea spp.)*	7.0	Apstrādāt kultūraugu platības, kā arī atsevišķas sējumu vai stādījumu vietas, gliemežu invāzijas sākumā	-	6

1	2	3	4	5	6

6.2. Vitrol GB

Reģ. Nr. 0857, reģ. klase 3.
Darbīgā viela: dzelzs pirofosfāts, 24 g/kg.
Limacīds
Bros Sp. z o.o.

Neprofesionāliem lietotājiem:

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, g/m^2	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Zemenes, ogulāji (atklātā laukā, tuneļos un segtās platībās)	Kailgliemeži *(Arion spp.)*, mīkstgliemeži *(Deroceras spp.)*, gliemeži *(Helix spp.)*	0.7	Ēsmas granulas izkaisa, kad kļūst redzamas pirmās gliemežu invāzijas un augu bojājumu pazīmes	-	6
Galviņkāposti, Briseles kāposti, ziedkāposti, brokoļi, salāti, lapu dārzeņi (atklātā laukā, tuneļos, segtās platībās)	Kailgliemeži *(Arion spp.)*, mīkstgliemeži *(Deroceras spp.)*, gliemeži *(Helix spp.)*, vīngliemeži *(Cepaea spp.)*	0.7	Ēsmas granulas izkaisa, kad kļūst redzamas pirmās gliemežu invāzijas un augu bojājumu pazīmes	-	6
Dekoratīvās kultūras (atklātā laukā, tuneļos un segtās platībās)	Kailgliemeži *(Arion spp.)*, mīkstgliemeži *(Deroceras spp.)*, gliemeži *(Helix spp.)*, vīngliemeži *(Cepaea spp.)*	0.7	Ēsmas granulas izkaisa, kad kļūst redzamas pirmās gliemežu invāzijas un augu bojājumu pazīmes	-	6

REPELENTI

1. Cervacol extra

Reģ. Nr. 0337, reģ. klase 3.
Darbīgā viela: kvarca smiltis, 251 g/kg.
Repelents.
FMC Agricultural Solutions A/S

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Skuju koki, lapu koki	Aļņi *(Alces spp.)*, staltbrieži *(Cervus spp.)*, stirnas *(Capreolus spp.)*	2.0-4.0 kg/1000 kociņiem	Apstrādāt jauno kociņu gala dzinumus jaunaudzēs	-	1

2.1. Detia Wühlmausgas

Reģ. Nr. 0584, reg. klase 2.
Darbīgā viela: kalcija karbīds, 800 g/kg.
Repelents.
Detia Freyberg GmbH

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Lauksaimniecības kultūras, dekoratīvās kultūras, pļavas, ganības	Ūdenszurka *(Arvicola terestris)*	5 g uz alu/eju	Ievieto nepieciešamo preparāta daudzumu katrā alas vai ejas atverē, kuru pēc tam nekavējoties noslēdz	-	Pēc nepieciešamības
	Kurmis *(Talpa europaea)*	20 g uz alu/eju			

2.2. Detia Wühlmausgas

Reģ. Nr. 0584, reg. klase 3.
Darbīgā viela: kalcija karbīds, 800 g/kg.
Repelents.
Detia Freyberg GmbH

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Lauksaimniecības kultūras, dekoratīvās kultūras, pļavas, ganības	Ūdenszurka *(Arvicola terestris)*	5 g (1 maisiņš) uz alu/eju	Ievieto nepieciešamo preparāta daudzumu katrā alas vai ejas atverē, kuru pēc tam nekavējoties noslēdz	-	Pēc nepieciešamības
	Kurmis *(Talpa europaea)*	20 g (4 maisiņi) uz alu/eju			

3. Plantskydd

Reģ. Nr. 0274, reg. klase 3.
Darbīgā viela: žāvēti asiņu milti, 998 g/kg.
Repelents.
Plantskydd AB

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Skuju koki, jaunaudzēs un dekoratīvo koku stādījumos	Aļņi, staltbrieži, stirnas, zaķi	0.8-1.6 kg/1000 kociņiem	Apsmidzināt jauno skuju kociņu galotnes ar darba šķidrumu. Darba šķidruma patēriņš 5.0-10.0 litri uz 1000 kociņiem	-	2
Lapu koki jaunaudzēs un dekoratīvo koku stādījumos	Aļņi, staltbrieži, stirnas, zaķi	0.8-1.6 kg/1000 kociņiem	Apsmidzināt visu jauno kociņu ar darba šķidrumu. Darba šķidruma patēriņš 5.0-10.0 litri uz 1000 kociņiem	-	2

4. Trico

Reģ. Nr. 0435, reģ. klase 3.
Darbīgā viela: aitu tauki, 65 g/l.
Repelents.
Kwizda Agro GmbH

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, l/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas rapsis, vasaras rapsis, kukurūza, saulespuķes	Staltbrieži, stirnas	15	Apsmidzināt sējumus, sākot no divu lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 12-61)	-	4
Lapu koku, skuju koku audzes	Staltbrieži, stirnas, aļņi	10-20	Apsmidzināt stādījumus rudenī, lai aizsargātu koku audzes ziemā	-	1
			Apsmidzināt stādījumus pavasarī, lai aizsargātu koku audzes vasarā		1
Vīnogas (ražojoši stādījumi)	Staltbrieži, stirnas	10-15	Apsmidzināt stādījumus, sākot no vīnogu trīs lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 13-61)	75	2
Vīnogas (jauni, neražojoši stādījumi)			Apsmidzināt stādījumus, sākot no vīnogu trīslapu stadijas (AS 13)	-	2
Apiņi	Staltbrieži, stirnas	10-15	Apsmidzināt stādījumus, sākot no apiņu trešā lapu pāra stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 13-61)	-	3
Melnais plūškoks	Staltbrieži, stirnas	10-15	Apsmidzināt stādījumus, sākot no jauno dzinumu veidošanās sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 31-61)	-	3

5. WAM extra

Reģ. Nr. 0482, reģ. klase 3.
Darbīgā viela: kvarca smiltis, 298.5 g/kg.
Repelents.
Witasek PflazenSchutz GmbH

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Skuju koki, lapu koki	Staltbrieži *(Cervus spp.)*, stirnas *(Capreolus spp.)*	3.0-4.0 kg/1000 kociņiem	Apstrādāt jauno kociņu dzinumus jaunaudzēs, izmantojot aizsargcimdus	-	1
		2.5-3.5 kg/1000 kociņiem	Apstrādāt jauno kociņu dzinumus jaunaudzēs, izmantojot birsti	-	1

6. Wöbra

Reģ. Nr. 0575, reģ. klase 3.
Darbīgās vielas: kvarca smiltis, 475.2 g/kg.
Repelents.
Flügel GmbH

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Skuju koki, lapu koki	Staltbrieži *(Cervus spp.)*, dambrieži *(Dama spp.)*	180-400 g/koku	Apstrādāt visu koka stumbru noteiktā augstumā ar otu, kā arī citas augu daļas, kuras var būt pakļautas bojājumiem	-	1
	Bebrs *(Castor fiber)*	180-250 g/koku			
Augļu koki	Staltbrieži *(Cervus spp.)*, dambrieži *(Dama spp.)*	18-400 g/koku	Apstrādāt visu koka stumbru noteiktā augstumā ar otu, kā arī citas augu daļas, kuras var būt pakļautas bojājumiem	-	1
	Zaķi *(Lepus spp.)*, trusis *(Oryctolagus cuniculus)*, bebrs *(Castor fiber)*	18-250 g/koku			
Dekoratīvie koki, dekoratīvie krūmi	Bebrs *(Castor fiber)*, zaķi *(Lepus spp.)*, trusis *(Oryctolagus cuniculus)*	18-250 g/koku, krūmu	Apstrādāt visu koka stumbru vai krūmu zarus noteiktā augstumā ar otu, kā arī citas augu daļas, kuras var būt pakļautas bojājumiem	-	1

MIKROBIOLOĢISKIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

1. DiPel DF

Reģ. Nr. 0760, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: *Bacillus thuringiensis var. kurstaki,* celms ABTS 351, 540 g/kg.
Insekticīds. Zarnu iedarbība.
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, kg/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7
Galviņkāposti, Briseles kāposti, brokoļi, ziedkāposti, lapu kāposti, Ķīnas kāposti, kāļi, rāceņi, topinambūri*	Kāpostu pūcīte *(Mamestra brassicae)*, kāpostu baltenis *(Pieris brassiace)*, rāceņu baltenis *(Pieris rapae)*, kāpostu cekulkode *(Plutella xylostella)*	0.5-1.0		Apsmidzināt, kad šķiļas kāpuri. Vienas paaudzes kāpuriem veikt 1-3 apstrādes ar 7 dienu intervālu	-	8
Zirņi	Zirņu tinēji *(Laspeyresia spp.)*, linu pūcīte *(Autographa gamma)*	0.5-1.0		Apsmidzināt, kad šķiļas kāpuri. Vienas paaudzes kāpuriem veikt 1-3 apstrādes ar 7 dienu intervālu	-	8
Puravi, sīpoli*, ķiploki*	Sīpolu lakstu puskode *(Acrolepiopsis assectella)*	0.5-1.0		Apsmidzināt, kad šķiļas kāpuri. Vienas paaudzes kāpuriem veikt 1-3 apstrādes ar 7 dienu intervālu	-	8
Ābeles, bumbieres	Tinēji *(Tortricidae)*, ābolu tinējs *(Cydia pomonella)*	0.5-1.5		Apsmidzināt, kad šķiļas kāpuri. Vienas paaudzes kāpuriem veikt 1-3 apstrādes ar 7 dienu intervālu	-	8
Plūmes*, ķirši*	Plūmju augļu tinējs *(Cydia funebrana)*, augļu koku tīklkode *(Yponomeuta padella)*	0.75-1.5		Apsmidzināt, kad šķiļas kāpuri. Vienas paaudzes kāpuriem veikt 2-5 apstrādes ar 3-16 dienu intervālu	-	5
Upenes*, jāņogas*, ērkšķogas*, smiltsērkšķi*, kazenes*, aronijas*, mežrozītes*	Rožu lapu tinējs *(Archips rosana)*, tinēji *(Tortricidae)*	0.6		Apsmidzināt, kad šķiļas kāpuri. Vienas paaudzes kāpuriem veikt 1-2 apstrādes ar 7 dienu intervālu	-	3
Zemenes*, avenes*, krūmmellenes* (atklātā laukā un segtās platībās)	Rožu lapu tinējs *(Archips rosana)*, tinēji *(Tortricidae)*	0.6		Apsmidzināt, kad šķiļas kāpuri. Vienas paaudzes kāpuriem veikt 1-2 apstrādes ar 7 dienu intervālu	-	3
Tomāti, gurķi, paprika, baklažāni (segtās platībās)	Pūcītes *(Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites, Mamestra oleracea)*	0.5-1.0		Apsmidzināt, kad šķiļas kāpuri. Vienas paaudzes kāpuriem veikt 1-3 apstrādes ar 7 dienu intervālu	-	8
Salāti, spināti, garšaugi* (atklātā laukā un segtās platībās)	Pūcītes *(Noctuidae)*	0.5-1.0		Apsmidzināt, kad šķiļas kāpuri. Vienas paaudzes kāpuriem veikt 1-3 apstrādes ar 7 dienu intervālu	-	3

1	2	3	4	5	6	7
Krāšņumaugi, dekoratīvie augi* (atklātā laukā un segtās platībās)	Pūcītes *(Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites),* tinēji *(Tortricidae)*	0.75-1.0		Apsmidzināt, kad šķiļas kāpuri. Vienas paaudzes kāpuriem veikt 1-3 apstrādes ar 7 dienu intervālu	-	8
Lapu koki* (kokaudzētavās)	Pūcītes *(Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites),* tinēji *(Tortricidae)*	0.75-1.0		Apsmidzināt, kad šķiļas kāpuri. Vienas paaudzes kāpuriem veikt 1-3 apstrādes ar 7 dienu intervālu	-	8

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

2. Lalstop G46 WG

Reģ. Nr. 0813, reģ. klase *3*.
Darbīgā viela: *Clonostachys rosea,* celms J1446, 900 g/kg.
Fungicīds. Pieskares iedarbība.
Danstar Ferment AG

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7
Ķirbjaugi (gurķi, kabači, cukīni, melones, ķirbji, arbūzi) (segtās platībās)	Stublāju iedegas *(Didymella spp.)*	0.25-0.5 kg/ha	0.05	Apsmidzināt tūlīt pēc iestādīšanas, pirms pirmās atlapošanas. Apstrādi atkārto ik pēc 3 līdz 4 nedēļām	-	4
Gurķi, kabači, cukīni, melones, ķirbji, arbūzi, tomāti, baklažāni, (segtās platībās)	Sakņu puves (*Pythium spp.)*	0.8-1.0 kg/ha vai 20-25 g/1000 augiem		Apliet pēc pārstādīšanas vai izmantot pilienlaistīšanu	-	4
Tomāti, paprika (segtās platībās)	Pelēkā puve *(Botrytis spp.)*	0.25-0.5 kg/ha	0.05	Apsmidzināt tūlīt pēc iestādīšanas. Apstrādi atkārto ik pēc 3 līdz 4 nedēļām	-	4
Dēsti (dārzeņi, lapu dārzeņi un salāti, garšaugi, ziedkāposti) (segtās platībās)	Sakņu puves (*Rhizoctonia spp., Pythium spp.)*	20-50 g/m^3	0.05	Pirms kultūrauga sējas iestrādāt substrātā	-	1
		50-100 g /100 m^2	0.05	Apsmidzināt/ap-liet/ izmantot pilienlaistīšanu pēc kultūrauga sadīgšanas	-	3
Salāti	Sakņu puves (*Rhizoctonia spp., Pythium spp.)*	0.8-1.0 kg/ha vai 20-25 g/1000 augiem		Apliet pēc pārstādīšanas vai izmantot pilienlaistīšanu	-	3
			0.05	Iemērkt dēstus pirms pārstādīšanas	-	1
Zemenes (segtās platībās)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	0.3 kg/ha	0.05	Apsmidzināt stādījumus, sākot ar ziedēšanas sākumu līdz redzamas sēkliņas uz ogu aizmetņa (AS 60-73)	-	2
Zemenes (tuneļos, atklātā laukā)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	0.125-0.300 kg/ha	0.05	Apsmidzināt stādījumus, sākot ar ziedēšanas sākumu līdz redzamas sēkliņas uz ogu aizmetņa (AS 60-73)	-	4
Paprika (segtās platībās)	Sakņu puves (*Pythium spp., Rhyzoctonia spp., Phytopthora spp.)*	20-50 g/m^3		Pirms kultūrauga sējas iestrādāt substrātā	-	1
	Sakņu puves (*Pythium spp., Phytopthora spp.)*	0.8-1.0 kg/ha vai 20-25 g/1000 augiem		Apliet pēc pārstādīšanas vai izmantot pilienlaistīšanu	-	4
Dekoratīvie augi (podos, augiem ziedu griešanai, augiem no spraudeņiem, sīpolpuķēm) (segtās platībās)	Sakņu puves *(Pythium spp., Phytopthora spp.)*	20-50 g/m^3		Pirms kultūrauga sējas iestrādāt substrātā	-	1
		0.5 l podam 10-25 g/1000 augiem	0.05	Apliet pēc pārstādīšanas vai izmantot pilienlaistīšanu (AS 13-65)	-	4
			0.05	Iemērkt apsakņotus spraudeņus, sīpolus pirms stādīšanas/ pārstādīšanas	-	1
	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	0.1-1.0 kg/ha	0.05	Apsmidzināt augus pēc pārstādīšanas (AS 15-89)	-	4
Dēsti* (dārzeņi*, lapu dārzeņi* un salāti*, garšaugi*, ziedkāposti*, dekoratīvie augi*) (segtās platībās)	Sakņu puves *(Fusarium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp.*)* *tikai kātu un sīpolu dārzeņiem, kāpostaugiem, garšaugiem un dekoratīvajiem augiem	20-50 g/m^3	0.05	Pirms kultūrauga sējas iestrādāt substrātā	-	1
		50-100 g/100 m^2	0.05	Apsmidzināt/apliet/ izmantot pilienlaistīšanu pēc kultūrauga sadīgšanas	-	3
	Pelēkā puve *(Botrytis spp.)*		0.05	Apsmidzināt pēc sadīgšanas. Atkārtot apstrādi ik pēc 3-4 nedēļām	-	4
Gurķi*, tomāti*, paprika*, baklažāni* (segtās platībās)	Sakņu puves *Fusarium spp., Phytophthora spp.*, Rhizoctonia spp.)* izņemot papriku	20-25 g/1000 augiem	0.05	Apsmidzināt/apliet/ izmantot pilienlaistīšanu pēc kultūrauga sadīgšanas. Atkārtot apstrādi pēc 3-6 nedēļām	-	4
Gurķi*, melones*, ķirbji*, kabači*, cukīni*, baklažāni* (segtās platībās)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	0.25-0.5 kg/ha		Pēc pārstādīšanas apsmidzināt. Atkārtot ik pēc 3-4 nedēļām	-	4
Paprika*, tomāti*, baklažāni* (segtās platībās)	Stublāju iedegas *(Didymella spp.)*	0.25-0.5 kg/ha		Pēc pārstādīšanas apsmidzināt. Atkārtot ik pēc 3-4 nedēļām	-	4
Gurķi*, ķirbji*, kabači*, cukīni*, melones*, arbūzi* (atklātā laukā, tuneļos)	Stublāju iedegas *(Didymella spp.),* pelēkā puve *(Botrytis cineea)*	100 g/ 30000-40000 dēstu	0.05	Apsmidzināt dīgsta stadijā, tikai gurķiem	-	1
		0.2-0.3 kg/ha	0.05	Apsmidzināt stādīšanas laikā. Atkārtot apstrādi pēc 3-4 nedēļām pēc stādīšanas	-	2
Salāti*, lapu dārzeņi* (segtās platībās)	Sakņu puves *(Fusarium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia spp.*, Pythium spp.*)* *izņemot salātus		0.05	Iemērkt apsakņotus spraudeņus, dēstus	-	1
		0.8-1.0 kg/ha	0.05	Apsmidzināt/apliet/ izmantot pilienlaistīšanu pēc kultūrauga sadīgšanas	-	3

1	2	3	4	5	6	7
Salāti*, lapu dārzeņi* (atklātā laukā)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*		0.05	Apsmidzināt dēstu stadijā. Atkārtot apstrādi pēc 3-4 nedēļām	-	2
Garšaugi*, kāpostaugi* (segtās platības)	Sakņu puves *(Fusarium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp.)*	0.5 l podam, 10-25 g/1000 augiem		Pēc pārstādīšanas pievieno laistāmajam ūdenim	-	3
Dekoratīvie augi* (podos, augiem ziedu griešanai, augiem no spraudeņiem, sīpolpuķēm) (segtās platībās)	Saknu puves *(Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)*	20-50 g/m^3		Iemaisa substrātā	-	1
			0.05	Iemērc apsakņotus spraudeņus, dēstus, sīpolus, gumus	-	1
		0.5 l podiem 10-25 g/1000 augiem	0.05	Apsmidzināt/apliet/ izmantot pilienlaistīšanu pēc podošanas vai izstādīšanas. Atkārtot apstrādi pēc 3-6 nedēļām	-	4
Zemenes*, avenes* (atklātā laukā, tuneļos)	Saknu puves *(Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp., Pythium spp.)*		0.05	Sakņu iemērkšana pirms izstādīšanas	-	1
		12.5 g/1000 augiem		Apsmidzināt vai pievienot laistāmajam ūdenim pirms stādīšanas	-	1
		Zemenes: 20-25 g/1000 augiem; Avenes: 25-30 g/1000 augiem		Apsmidzināt/apliet/ izmantot pilienlaistīšanu pēc izstādīšanas. Atkārtot apstrādi pēc 4 nedēļām	-	2
Zemenes*, avenes* (segtās platībās)	Sakņu puves *(Rhizoctonia spp.)*	20-50 g/m^3		Iemaisa substrātā	-	1
		50-100 g/100 m^2		Apsmidzināt vai pievienot laistāmajam ūdenim stādu stadijā	-	3
		20-25 g/1000 augiem;	0.05	Apsmidzināt/apliet/ izmantot pilienlaistīšanu pēc izstādīšanas. Atkārtot apstrādi pēc 4 nedēļām	-	3
Zemenes*, avenes* (segtās platībās)	Saknu puves *(Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp.)*	12.5 g/1000 augiem	0.05	Apsmidzināt vai pievienot laistāmajam ūdenim pirms izstādīšanas	-	1
			0.05	Iemērkt stādus stādīšanas laikā	-	1
		Zemenes: 20-25 g/1000 augiem; Avenes: 25-30 g/1000 augiem	0.05	Apsmidzināt/apliet/ izmantot pilienlaistīšanu pēc izstādīšanas. Atkārtot apstrādi pēc 4 nedēļām	-	2
Avenes* (atklātā laukā, tuneļos)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	Atklātā laukā: 0.3-0.4 kg/ha; Tuneļos: 0.2-0.3300 kg/ha	0.05	Apsmidzināt kultūraugu ziedēšanas laikā	-	3
Avenes* (segtās platībās)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	0.2-0.3 kg/ha	0.05	Apsmidzināt kultūraugu ziedēšanas laikā	-	4
Kazenes* (atklātā laukā, tuneļos)	Sakņu puves *(Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhyzoctonia spp.)*		0.05	Iemērkšana stādīšanas laikā	-	1
		25-30 g/1000 augiem	0.05	Apsmidzināt/apliet/ izmantot pilienlaistīšanu pēc izstādīšanas. Atkārtot apstrādi pēc 4 nedēļām	-	2
	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	Atklātā laukā: 0.3-0.4 kg/ha; Tuneļos: 0.2-0.3 kg/ha	0.05	Apsmidzināt kultūraugu ziedēšanas laikā	-	3
Krūmmellenes* (atklātā laukā, tuneļos)	Sakņu puves *(Phytium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia spp.)*		0.05	Iemērkšana stādīšanas laikā	-	1
		25-40 g/1000 augiem	0.05	Apsmidzināt/apliet/ izmantot pilienlaistīšanu pēc izstādīšanas. Atkārtot apstrādi pēc 4 nedēļām	-	2
	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	0.3-0.4 kg/ha	0.05	Apsmidzināt kultūraugu ziedēšanas laikā	-	3
Jāņogas* (atklātā laukā)	Pelēkā puve (*Botrytis cinerea*)	0.3-0.4 kg/ha	0.05	Apsmidzināt kultūraugu ziedēšanas laikā	-	3
Dzērvenes* (atklātā laukā)	Sakņu puves *(Phytium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia spp.)*		0.05	Stādu iemērkšana stādīšanas laikā	-	1
		0.3-0.4 kg/ha		Apsmidzināt kultūraugu vai pievienot laistāmajam ūdenim		
Kāpostaugi* (atklātā laukā)	Krustziežu sakņu augoņi *(Plasmodiaphora brassicae)*	50-100 g/100 m^2	0.05	Apsmidzina vai pievieno laistāmajam ūdenim pirms stādīšanas	-	1
		0.3-0.4 kg/ha	0.05	Apsmidzina kultūraugu vagās 3-4 nedēļas pēc stādīšanas	-	2
Sīpoli*, Šalotes sīpoli*, maurloki*, ķiploki*, puravi* (segtās platībās, atklātā laukā, tuneļos)	Sakņu puves *(Fusarium spp.)*		0.05	Stādu iemērkšana stādīšanas laikā	-	1
	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	Segtās platībās, tuneļos: 0.2-0.3 kg/ha; Atklātā laukā: 0.3-0.4 kg/ha		Apsmidzina kultūraugu vai pievieno laistāmajam ūdenim 3-4 nedēļas pēc stādīšanas	-	1
Bumbuļu*, sīpolu* un stublāju* dārzeņi (izņemt sīpolus, Šalotes sīpolus, maurlokus, ķiplokus, puravus) (segtās platībās)	Sakņu puves *(Fusarium spp.),* pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*		0.05	Iemērkt stādāmo materiālu stādīšanas laikā	-	1
Lapu cigoriņi*, endīvijas* (segtās platībās)	Melnā sakņu puve *(Thielaviopsis basicola)*	0.4 g/l		Pēc ražas novākšanas, pirms sakņu glabāšanas pievieno laistāmajam ūdenim vai iemērc saknes	-	1
		0.2-0.4 g/l		Sakņu apsmidzināšana steidzinot	-	1
Burkāni*, citi sakņu* dārzeņi (atklātā laukā)	Sakņu puves *(Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)*	0.3-0.4 kg/ha	0.05	Apsmidzināt kultūrauga stādījuma vagas augšanas sākumā	-	2

1	2	3	4	5	6	7
Pupiņas* (atklātā laukā, tuneļos)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	0.3-0.4 kg/ha	0.05	Apsmidzināt sējumu pēc sadīgšanas. Apstrādi atkārtot ik pēc 3-4 nedēļām	-	3
Lapu koki*, skuju koki* kokaudzētavās (segtās platībās, atklātā laukā, tuneļos)	Sakņu puves *(Phytium spp., Phytopthora spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.)*	20-50 g/m^3		Iemaisa substrātā pirms sēšanas	-	1
		50-100 g/100 m^2	0.05	Apsmidzināt vai pievienot laistāmajam ūdenim pēc sēšanas. Atkārtot ik pēc 3-4 nedēļām	-	5
	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	0.3-0.5 kg/ha	0.05	Apsmidzināt augus pēc sadīgšanas. Atkārtot apstrādi ik pēc 3-4 nedēļām	-	5
Zāliens golfa laukumā*, zāliens sporta laukumā* (atklātā laukā)	Sakņu puves *(Fusarium spp., Rhizoctonis spp., Pythium spp.)*	0.1-0.2 kg/ha		Apsmidzināt visā augšanas sezonā. Apstrādi atkārtot ik pēc 3-4 nedēļām	-	5
Ābeles* (atklātā laukā)	Augļu koku vēzis *(Neonectria dilissima)*	0.3-0.5 kg/ha	0.05	Apsmidzināt stādījumu pavasarī pirms lapu plaukšanas (AS 00-09) un rudenī lapu krišanas laikā (AS 95-99)	-	2

Dārzeņi[1]	Gurķi, melones, ķirbji, arbūzi, tomāti, paprika, čili, baklažāni
Lapu dārzeņi un salāti[2]	Salāti (lapu salāti, galviņsalāti un romiešu salāti, selerijas, lauka salāti, *Cichorium* sp. (endīvijas, radičio, cigoriņi, vitlufa cigoriņi), spināti, salātu baldriņi, sarkanās sinepes un kreses (ēdamas).
Garšaugi[3]	Dižzirdzene, baziliks, lauru lapas, pļavas ķimenes, selerijas, lapu kārveles, lociņi, koriandrs, dilles, fenhelis, ārstniecības lupstājs, majorāns, piparmētra, raudene, pētersīļi, rozmarīns, salvija, kalnumētra, estragons un timiāns.
Citi dārzeņi (bumbuļu, sīpolu, sakņu, kātu dārzeņi)	*Allium* sp. (sīpoli, puravi, ķiploki, puravi), sparģeļi, artišoki, fenhelis, lapu artišoki un *Apium* sp. (selerijas, sakņu selerijas)
Kāpostaugi	Brokoļi, Briseles kāposti, galviņkāposti, ziedkāposti, kolrābji, lapu kāposti

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

3.1. Madex Pro

Reģ. Nr. 0762, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: *Cydia pomonella Granulovirus (CpGV-V15)* 3x10^{13} virioni olbaltumvielu apvalkā/l.
Insekticīds. Zarnu iedarbība.
Andermatt Group AG

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva l/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ābeles, bumbieres, cidonijas, valrieksti	Ābolu tinējs *(Cydia pomonella)*	0.1	Apsmidzināt, kad šķiļas kāpuri. Vienas paaudzes kāpuriem veikt 1-3 apstrādes ar 8 saulainu dienu intervālu	-	10
		0.05	Apsmidzināt, kad šķiļas kāpuri. Vienas paaudzes kāpuriem veikt 1-3 apstrādes ar 6 saulainu dienu intervālu		

3.2. Madex Pro

Reģ. Nr. 0762, iepakojumiem 25 ml un mazākiem, reģ. klase 3.
Darbīgā viela: *Cydia pomonella Granulovirus (CpGV-V15)* 3x10^{13} virioni olbaltumvielu apvalkā/l.
Insekticīds. Zarnu iedarbība.
Andermatt Group AG

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, ml/10 l	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ābeles, bumbieres, cidonijas, valrieksti	Ābolu tinējs *(Cydia pomonella)*	1	Apsmidzināt, kad šķiļas kāpuri. Vienas paaudzes kāpuriem veikt 1-3 apstrādes ar 8 saulainu dienu intervālu. Darba šķidruma patēriņš 1-5 l/koku	-	10
		0.5	Apsmidzināt, kad šķiļas kāpuri. Vienas paaudzes kāpuriem veikt 1-3 apstrādes ar 6 saulainu dienu intervālu. Darba šķidruma patēriņš 1-5 l/koku		

4. Mycostop

Reģ. Nr. 0480, reģ. klase 3.
Aktīvā sastāvdaļa: mikroorganisms *Streptomyces*, strain K61.
Fungicīds.
Danstar Ferment AG

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva	Lietošanas laiks, iedarbības veids	Preparāta forma, uzglabāšana
1	2	3	4	5
Kāposti, sīpoli, puravi, garšaugi	Sakņu puves (*Fusarium spp., Phytophthora spp.),* dēstu melnkāja *(Pythium spp.)*	8 g/kg	Sēklu apstrāde, slēgtā traukā rūpīgi sakratīt vai sajaukt ar preparātu. Apstrādātās sēklas izsēt apstrādes dienā vai vēlākais 1 nedēļu pēc apstrādes	1 g preparāta satur 5x10^8 mikroorganisma veidojošo vienību. Uzglabāšana vienu gadu sausā vietā un temperatūrā, kas ir zemāka par +8 °C un istabas temperatūrā viens mēnesis
Salāti, gerberas		2 g/kg		
Lapu dārzeņi, sakņu dārzeņi, tomāti, pipari, gurķi, pākšaugi, krāšņumaugi		5 g/kg		
Augļu dārzeņi	Sakņu puves (*Fusarium spp., Phytophthora spp.),* dēstu melnkāja *(Pythium spp.)*	2-10 g/100 m^2	<u>1. lietošanas paņēmiens</u> Piesūcināt substrātu pēc pārstādīšanas. Apliet kultūraugus pēc pārstādīšanas. Apsmidzināt substrāta virsmu pēc dēstu izstādīšanas. Atkārtoti pēc 3-6 nedēļām, līdz 4 reizēm veģetācijas periodā	
		5-20 g/1000 augiem	<u>2. lietošanas paņēmiens</u> Pēc pārstādīšanas veikt apstrādi, izmantojot pilienlaistīšanu. Atkārtoti pēc 3-6 nedēļām, līdz 4 reizēm veģetācijas periodā	
Lapu dārzeņi, garšaugi	Sakņu puves (*Fusarium spp., Phytophthora spp.),* dēstu melnkāja *(Pythium spp.)*	1-10 g/1 m^3	Iestrādāt substrātā pirms kultūrauga sējas	1 g preparāta satur 5x10^8 mikroorganisma veidojošo vienību. Uzglabāšana vienu gadu sausā vietā un temperatūrā, kas ir zemāka par +8 °C un istabas temperatūrā viens mēnesis
		2-10 g/100 m^2	<u>1. lietošanas paņēmiens</u> Pēc kultūrauga sadīgšanas/ pārstādīšanas veikt substrāta apstrādi. Atkārtoti pēc 3-6 nedēļām, līdz 3 reizēm veģetācijas periodā	
		1 g/1000 augiem	<u>2. lietošanas paņēmiens</u> Audzēšana hidroponikā. Apstrādi veic, pievienojot barības vielu šķīdumam pēc pārstādīšanas	

1	2	3	4	5
Krāšņumaugi (podos, grieztajiem ziediem)	Sakņu puves (*Fusarium spp., Phytophthora spp.),* dēstu melnkāja *(Pythium spp.)*	1-10 g/m^3	Iestrādāt substrātā pirms kultūrauga sējas	1 g preparāta satur 5x10^8 mikroorganisma veidojošo vienību. Uzglabāšana vienu gadu sausā vietā un temperatūrā, kas ir zemāka par +8 °C un istabas temperatūrā viens mēnesis
		1-10 g/100 m^2	1. lietošanas paņēmiens Pēc kultūrauga sadīgšanas / pārstādīšanas veikt substrāta apstrādi. Atkārtoti pēc 3-6 nedēļām, līdz 4 reizēm veģetācijas periodā	
		2-10 g/1000 augiem	2. lietošanas paņēmiens Pēc pārstādīšanas veikt apstrādi, izmatojot pilienlaistīšanu. Atkārtoti pēc 3-6 nedēļām, līdz 4 reizēm veģetācijas periodā	
Krāšņumaugu spraudeņi	Sakņu puves (*Fusarium spp., Phytophthora spp.),* dēstu melnkāja *(Pythium spp.)*	0.01%	Apsakņotu stādu iemērkšana preparāta suspensijā veicot pārstādīšanu/ podošanu. 0.01 % - 1 g /10 l ūdens	
Sīpoli	Sakņu puves (*Fusarium spp., Phytophthora spp.),* dēstu melnkāja *(Pythium spp.)*	0.01%	Pirms izstādīšanas iemērkt uz 15 minūtēm preparāta suspensijā. 0.01 %- 1g/10 l ūdens	
Dārzeņu, krāšņumaugu dēsti	Sakņu puves (*Fusarium spp., Phytophthora spp.),* dēstu melnkāja *(Pythium spp.)*	1-10 g/m^3	Substrāta apstrāde- iestrādāt substrātā pirms kultūrauga sējas	
		2-10 g/100 m^2	Apsmidzināt substrāta virsmu pēc kultūraugu sadīgšanas. Atkārtoti ar 21 dienas intervālu, līdz 2 reizēm veģetācijas periodā	

5. Naturalis

Reģ. Nr. 0858, reģ. klase 3.
Darbīgā viela: *Beauveria bassiana*, celms ATCC 74040, 0.179 g/l (2.3x10^{10} k.v.v./l)
Insekticīds. Pieskares iedarbība.
CBC (Europe) S.r.l.

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva l/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6
Tomāti, paprika, baklažāni (segtās platībās)	Baltblusiņas *(Bremisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*	0.75-1.0	Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga sadīgšanu līdz ražas novākšanai (AS 10-89). Intervāls starp apstrādēm 5-7 dienas	-	5
	Kalifornijas tripsis (*Frankliniella occidentalis*)	1.0-1.5			
	Parastā tīklērce *(Tetranychus urticae),* tomātu maurērce *(Aculops lycopersici)*	1.0-2.0			
Gurķi, kabači, melones, ķirbji, arbūzi (segtās platībās, tuneļos*, atklātā laukā*)	Baltblusiņas *(Bremisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum),* parastā tīklērce *(Tetranychus urticae)*	0.75-1.0	Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga sadīgšanu līdz ražas novākšanai (AS 10-89). Intervāls starp apstrādēm 5-7 dienas	-	5
	Kalifornijas tripsis *(Frankliniella occidentalis)*	1.0-1.5			

1	2	3	4	5	6
Salāti*, endīvijas* (segtās platībās, tuneļos*, atklātā laukā*)	Laputis *(Aphididae)*	0.75-1.0	Apsmidzināt stādījumus vai sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga sadīgšanu līdz ražas novākšanai (AS 12-49). Intervāls starp apstrādēm 5-7 dienas	-	5
	Kalifornijas tripsis* *(Frankliniella occidentalis)*	1.0-1.5			
Pupiņas (segtās platības)	Baltblusiņas *(Bremisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*	1.0-1.5	Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga pirmo lapu pāri līdz ražas novākšanai (AS 10-89). Intervāls starp apstrādēm 5-7 dienas	-	5
Kartupeļi*	Spraksķu kāpuri *(Agriotes spp.)*	3.0	Apsmidzināt augsni un bumbuļus kartupeļu stādīšanas laikā	-	1
Zemenes* (segtās platības, tuneļos*, atklātā laukā*)	Baltblusiņas *(Bremisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*, parastā tīklērce *(Tetranychus urticae)*	0.75-1.0	Apsmidzināt stādījumu, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga pirmo atvērušos alpu cerā līdz ražas jaunu lapu veidošanās sākumam (AS 10-92). Intervāls starp apstrādēm 5-7 dienas	-	5
	Kalifornijas tripsis *(Frankliniella occidentalis)*	1.0-1.5			
Krāšņumaugi, dekoratīvie augi (segtās platībās, tuneļos*, atklātā laukā*)	Baltblusiņas *(Bremisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*, parastā tīklērce *(Tetranychus urticae)*	0.75-1.0	Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kaitēkļiem parādoties, visā kultūraugu veģetācijas laikā. Intervāls starp apstrādēm 5-7 dienas	-	5
Krūmmellenes* (tuneļos, atklātā laukā)	Parastā tīklērce *(Tetranychus urticae)*	0.75-1.0	Intervāls starp apstrādēm 5-7 dienas	-	5
Ķirši*	Ķiršu muša *(Rhagoletis cerasi)*	1.0-2.0	Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga augļaizmetņu attīstības sākumu līdz augļu ražas novākšanai (AS 71– 89). Intervāls starp apstrādēm 5-7 dienas	-	5
Smiltsērkšķi*	Raibspārnu muša* *(Rhagoletis batava)*	1.0-2.0	Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga augļaizmetņu attīstības sākumu līdz augļu ražas novākšanai (AS 71– 89). Intervāls starp apstrādēm 5-7 dienas	-	5
Bumbieres*	Bumbieru lapu blusiņa *(Cacopsylla pyri)*	1.0-2.0	Apsmidzināt stādījumu, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga ģeneratīvo pumpuru briešanu līdz ražas novākšanai (AS 51-89). Intervāls starp apstrādēm 5-7 dienas	-	5
	Augļu koku sarkanā tīklērce *(Panonychus ulmi)*	1.0-1.5			
Ābeles*	Augļu koku sarkanā tīklērce *(Panonychus ulmi)*	1.0-1.5	Apsmidzināt stādījumu, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga ģeneratīvo pumpuru briešanu līdz ražas novākšanai (AS 51-89). Intervāls starp apstrādēm 5-7 dienas	-	5

1	2	3	4	5	6
Vīnogas*	Parastā tīklērce *(Tetranychus urticae),* tipši *(Thysanoptera)*	1.0-1.5	Apsmidzināt stādījumu, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga lapu plaukšanu līdz ražas novākšanai (AS 11-89). Intervāls starp apstrādēm 5-7 dienas	-	5

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

6. PMV-01

Reģ. Nr. 0701, reģ. klase 2.
Aktīvā sastāvdaļa: *Pepino mozaīkas vīruss*, celms CH2, izolāts 1906 (>5*10^5 vīrusa daļiņas/μL)
Viricīds.
De Ceuster Meststoffen n.v.

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva l/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Tomāti (segtās platībās)	*Pepino mozaīkas vīruss* (PMV)	4.0-8.0	Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, tūlīt pēc izstādīšanas kultūrauga agrā attīstības stadijā, sākot ar 5 lapu stadiju, līdz pirmais ziedu ķekars sāk ziedēt (AS 15-61)	-	1

7. Polyversum

Reģ. Nr. 0719, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: *Pythium oligandrum* M1, 1000000 oosporas/g.
Fungicīds. Pieskares iedarbība.
BIOPREPARÁTY, spol. s r.o.

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, kg/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas rapsis	Krustziežu sausā puve *(Leptosphaeria maculans)*	0.1	Apsmidzināt sējumus profilaktiski: 1. lietošanas veids: 1.reizi - rudenī kultūrauga 2-9 lapu stadijā (AS 12-19), 2.reizi - stublāja pagarināšanās attīstības fāzē (AS 30-39), 2. lietošanas veids: 1.reizi - stublāja pagarināšanās attīstības fāzē (AS 30-39), 2.reizi - sākot ar stublāja pagarināšanās fāzes beigām līdz ziedēšanas vidum (AS 39-65)	-	2
Ziemas rapsis	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	0.1	Apsmidzināt sējumus profilaktiski: 1. lietošanas veids: 1.reizi - rudenī kultūrauga 2-9 lapu stadijā (AS 12-19), 2.reizi - stublāja pagarināšanās attīstības fāzē (AS 30-39), 3.reizi - sākot ar stublāja pagarināšanās fāzes beigām līdz ziedēšanas vidum (AS 39-65); 2. lietošanas veids: 1.reizi - stublāja pagarināšanās attīstības fāzē (AS 30-39), 2.reizi - sākot ar stublāja pagarināšanās fāzes beigām līdz ziedēšanas vidum (AS 39-65)	-	3

1	2	3	4	5	6
Ziemas kvieši	Fuzarioze *(Fusarium spp.)*	0.1	Apsmidzināt sējumus profilaktiski: 1.reizi - kultūrauga 3-5 lapu stadijā (AS 13-15), 2.reizi - sākot ar cerošanas vidu līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 25-37), 3. reizi - sākot ar vārpošanas vidu līdz ziedēšanas vidum (AS 55-65)	-	3
Vasaras mieži, vasaras kvieši	Fuzarioze *(Fusarium spp.)*	0.1	Apsmidzināt sējumus profilaktiski: 1. reizi - kultūrauga cerošanas sākumā (AS 21-23), 2. reizi - sākot ar vārpošanas vidu līdz ziedēšanas vidum (AS 55-65)	-	2

8. Rotstop SC

Reģ. Nr. 0401, reģ. klase 3.
Aktīvā sastāvdaļa: mikroorganisms *Phlebiopsis gigantea*, strain 1835.
Fungicīds.
Danstar Ferment AG

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Deva	Lietošanas laiks, iedarbības veids	Preparatīvā forma, uzglabāšana
Priedes, egles (celmi)	Sakņu trupe *(Heterobasidion annosum, Heterobasidion parviporum)*	2 g/m^2	Celmu apstrāde kailcirtēs vai skrajcirtēs automātiski zāģēšanas laikā, izmantojot mehanizēto celmu apstrādi. Darba šķidruma patēriņš 2 l/m^2	Suspensijas koncentrāts, 1 g preparāta satur 2 x 10^6- 2 x 10^7 kolonijas veidojošo vienību
Priedes, egles (celmi)	Sakņu trupe *(Heterobasidion annosum, Heterobasidion parviporum)*	1 g/m^2	Celmu apstrāde kailcirtēs vai skrajcirtēs, apstrādājot tos ar muguras smidzinātāju pēc nozāģēšanas. Darba šķidruma patēriņš 1 l/m^2	

9. Serenade Aso

Reģ. Nr. 0556, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: *Bacillus subtilis*, celms QST 713, 13.96 g/l (min. 1.042x10^{12} k.v.v./l)
Fungicīds. Pieskares iedarbība.
Bayer AG

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva l/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7
Zemenes (atklātā laukā un segtā platībās)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	8.0		Apsmidzināt stādījumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedkopas pumpuru parādīšanos, līdz otrajai ražai (AS 55-85)	-	6
Burkāni	Burkānu lapu sauplankumainība *(Alternaria dauci),* čemurziežu īstā miltrasa *(Erysiphe heraclei)*	8.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no saknes veidošanās sākuma, līdz tai izveidojusies raksturīgā forma un diametrs (AS 41-49)	-	8
Tomāti, paprika, baklažāni (segtās platībās)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea),* tomātu lapu sausplankumainība *(Altermaria spp.)*	8.0		Apsmidzināt stādījumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar pirmajiem sānu dzinumiem, līdz augļu pilnai nobriešanai (AS 21-89)	-	6

1	2	3	4	5	6	7
Salāti (atklātā laukā un segtās platībās)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerera)*, baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	8.0		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju, līdz sasniegta tipiskā lapu masa/ salātu galviņu izmērs (AS 13-49)	-	5
Vīnogas	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	8.0		Apsmidzināt stādījumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas beigām, līdz pilnīgai ogu gatavībai (AS 68-89)	-	9
Burkāni*	Dīgstu melnkāja *(Pythium violae)*	10.0		Apsmidzināt augsni pēc sējas. Nepieciešams nodrošināt preparāta nokļūšanu augu sakņu zonā	-	1
Puravi*	Lapu plankumainība *(Alternaria porri)*	8.0		Apsmidzināt kultūraugu, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sakot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz vākšanas gatavībai (AS 12-49)	-	9
Tomāti*, paprika* (segtās platībās)	Tomātu īstā miltrasa *(Oidium lycopersici),* tomātu bakteriālā plankumainība *(Pseudomonas syringae pv. tomato)*	4.0-8.0		Apsmidzināt kultūraugu, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar pirmo sānu dzinumu izveidošanos, līdz vākšanas gatavībai, kad augļiem ir šķirnei tipiska krāsa (AS 21-89)	-	6
Gurķi* (atklātā laukā un segtās platībās)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea),* īstā miltrasa *(Erysiphe cichoracearum),* gurķu bakteriālā plankumainība *(Pseudomonas syringae pv. lachrymans)*	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar pirmo sānu dzinumu izveidošanos, līdz gatavībai, kad augļi sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu, formu un nogatavinājuši sēklas (AS 21-89)	-	6
Pipargurķīši* (atklātā laukā un segtās platībās)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*, ķirbjaugu īstā miltrasa *(Podosphaera xanthii)*	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar pirmo sānu dzinumu izveidošanos, līdz gatavībai, kad augļi sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu, formu un nogatavinājuši sēklas (AS 21- 89)	-	6
Ķirbji*, arbūzi*, melones* (atklātā laukā)	Sakņu un stublāju puves *(Phytophthora spp., Pythium spp.)*	-	1	Aplaistīt stādus pirms pārstādīšanas, līdz substrāts paliek mitrs	-	1
		10.0		Apstrādāt sakņu zonu sēšanas/ stādīšanas/ pārstādīšanas laikā, izmantojot hidraulisko smidzinātāju vai pilienveida laistīšanas sistēmu		
	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea),* ķirbjaugu īstā miltrasa *(Podosphaera xanthii)*	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar pirmo sānu dzinumu izveidošanos, līdz vākšanas gatavībai, kad augļiem ir šķirnei tipiska krāsa (AS 21-89)	-	9
Kabači* (atklātā laukā un segtās platībās)	Sakņu un stublāju puves *(Phytophthora spp., Pythium spp.)*		1	Aplaistīt stādus pirms pārstādīšanas, līdz substrāts paliek mitrs	-	1
		10.0		Apstrādāt sakņu zonu sēšanas/ stādīšanas/ pārstādīšanas laikā, izmantojot hidraulisko smidzinātāju vai pilienveida laistīšanas sistēmu		
	Ķirbjaugu īstā miltrasa *(Podosphaera xanthii)*	8.0		Apsmidzināt kultūraugu, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar pirmo sānu dzinumu izveidošanos, līdz vākšanas gatavībai, kad augļiem ir šķirnei tipiska krāsa (AS 21-89)	-	6
Cukīni* (atklātā lauka un segtās platībās)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea),* īstā miltrasa *(Sphaerotheca fuliginea)*	3.2		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar pirmo sānu dzinumu izveidošanos, līdz vākšanas gatavībai, kad augļiem ir šķirnei tipiska krāsa (AS 21-89)	-	9
Galda bietes*	Sausplankumai-nība *(Alternaria spp.),* baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no divu lapu stadijas, līdz sakņu vākšanas gatavībai (AS 12-49)	-	6
Brokoļi*, Briseles kāposti*, ziedkāposti* (atklātā laukā un segtās platībās)	Sakņu un stublāju puves *(Pythium spp.)*		1	Aplaistīt stādus pirms pārstādīšanas, līdz substrāts paliek mitrs	-	1
		10.0		Apstrādāt sakņu zonu sēšanas/ stādīšanas/ pārstādīšanas laikā, izmantojot hidraulisko smidzinātāju vai pilienveida laistīšanas sistēmu		
Brokoļi*, Briseles kāposti*, ziedkāposti*, galviņkāposti*, Ķīnas kāposti* (atklātā laukā un segtās platībās)	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea),* sausplankumai-nība *(Alternaria spp.),* krustziežu īstā miltrasa *(Erysiphe cruciferarum),* krustziežu vadaudu bakterioze *(Xanthomonas campestris)*	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, līdz kultūrauga galviņa sasniegusi šķirnei raksturīgo lielumu un nobriedusi (AS 49)	-	6
Selerijas* (sakņu, kātu, lapu), pētersīļi* (sakņu, lapu), pastinaki* (atklātā laukā un segtās platībās)	Sakņu un stublāju puves *(Pythium spp.),* dīgstu melnkāja *(Rhizoctonia solani)*		1	Aplaistīt stādus pirms pārstādīšanas, līdz substrāts paliek mitrs	-	1
		10.0		Apstrādāt sakņu zonu sēšanas/ stādīšanas/ pārstādīšanas laikā, izmantojot hidraulisko smidzinātāju vai pilienveida laistīšanas sistēmu		
Selerijas* (lapu, kātu, sakņu), pētersīļi* (sakņu, lapu), pastinaki*, kolrābji*, rāceņi*, batātes*, mārrutki*, sparģeļi*	Sausplankumai-nība *(Alternaria spp.),* pelēkā puve *(Botrytis cinerea),* baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum),* miltrasas *(Erysiphe spp.)*	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no divu lapu stadijas, līdz kultūrauga vākšanas gatavībai (AS 12-49)	-	6

1	2	3	4	5	6	7
Redīsi* (atklātā laukā un segtās platībās)	Sausplankumainība *(Alternaria spp.),* baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no divu lapu stadijas līdz sakņu vākšanas gatavībai (AS 12-49)	-	6
Fenhelis* (segtās platībās)	Sausplankumainība *(Alternaria spp.),* baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum),* pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no divu lapu stadijas, līdz vākšanas gatavībai (AS 12-49)	-	9
Cigoriņi* (sakņu)	Sausplankumainība *(Alternaria spp.),* baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum),* pelēkā puve *(Botrytis cinerea),* miltrasas *(Erysiphe spp.)*	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no divu lapu stadijas, līdz sakņu vākšanas gatavībai (AS 12-49)	-	9
Salāti*, endīvijas*, rukola*, spināti* (atklātā laukā un segtās platībās)	Dīgstu melnkāja *(Rhizoctonia solani)*		1	Aplaistīt stādus pirms pārstādīšanas, līdz substrāts paliek mitrs	-	1
		10.0		Apstrādāt sakņu zonu sēšanas/ stādīšanas/ pārstādīšanas laikā, izmantojot hidraulisko smidzinātāju vai pilienveida laistīšanas sistēmu		
Spināti*, endīvijas*, rukola* (atklātā laukā un segtās platībās)	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum),* pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no trīs lapu stadijas, līdz sasniegta tipiskā lapu masa (AS 13-49)	-	6
Kāršu pupas*, pupiņas*, zirņi* (atklātā laukā un segtās platībās)	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum),* pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar pirmo īsto lapu pāri, līdz stadijai, kad pākstī kļūst redzamas atsevišķas pupas (AS 12-79)	-	6
Šalotes sīpoli*, sīpoli* (lokiem), sīpoli*, ķiploki*	Sīpolu kakla puve *(Botryotinia squamosa)*	8.0		Apsmidzināt kultūraugu, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar divu lapu stadiju, līdz vākšanas gatavībai (AS 12-49)	-	9
Soja*, ķimenes*, lini*, magones*, kaņepes*	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea),* baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum)*	8.0		Apsmidzināt kultūraugu, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar divu lapu stadiju, līdz pilnai sēklu gatavībai (AS 12-89)	-	6
Garšaugi (baziliks*, gurķu mētra*, pupu mētra*, koriandrs*, kressalāti*, dilles*, majorāns*, piparmētra*, raudene*, rozmarīns*, timiāns*) (atklātā laukā un segtās platībās)	Dīgstu melnkāja *(Rhizoctonia solani)*		1	Aplaistīt stādus pirms pārstādīšanas, līdz substrāts paliek mitrs	-	1
		10.0		Apstrādāt sakņu zonu sēšanas/ stādīšanas/ pārstādīšanas laikā, izmantojot hidraulisko smidzinātāju vai pilienveida laistīšanas sistēmu		
	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar divu lapu stadiju, līdz sasniegta tipiskā lapu masa (AS 12-49)	-	9

1	2	3	4	5	6	7
Avenes*, upenes*, ērkšķogas*, jāņogas*, kazenes*	Sakņu un stublāju puves *(Phytophthora spp.)*		1	Aplaistīt stādus pirms pārstādīšanas, līdz substrāts paliek mitrs	-	1
		10.0		Apstrādāt sakņu zonu stādīšanas/ pārstādīšanas laikā, izmantojot hidraulisko smidzinātāju vai pilienveida laistīšanas sistēmu		
	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedpumpuru parādīšanos, līdz ogu krāsošanās sākumam (AS 51-85)	-	9
Krūmmellenes*, dzērvenes*	Sakņu un stublāju puves *(Phytophthora spp.)*		1	Aplaistīt stādus pirms pārstādīšanas, līdz substrāts paliek mitrs	-	1
		10.0		Apstrādāt sakņu zonu stādīšanas/ pārstādīšanas laikā, izmantojot hidraulisko smidzinātāju vai pilienveida laistīšanas sistēmu		
	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedpumpuru parādīšanos, līdz ogu krāsošanās sākumam (AS 51-85)	-	9
Zemenes* (atklātā laukā un segtās platībās)	Īstā miltrasa *(Podosphaera macularis)*	8.0		Apsmidzināt kultūraugu, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar ziedpumpuru briešanu līdz otrajai ogu ražai (AS 51-89)	-	6
Ķirši*, plūmes*, aprikozes*, persiki*	Pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*, augļu parastā puve *(Monilia fructigena),* kauleņkoku pelēkā puve *(Monilia laxa),* mizas bakteriālais vēzis *(Pseudomonas syringae pv. syringae)*	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ģeneratīvo pumpuru briešanas sākumu, līdz izveidojies šķirnei raksturīgais augļa krāsojums (AS 51-85)	-	6
Bumbieri*	Mizas bakteriālais vēzis *(Pseudomonas syringae pv. syringae)*	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedēšanas sākumu, līdz augļi sasnieguši 90 % no šķirnei raksturīgā lieluma (AS 60-79)	-	4
Krāšņumaugi* (atklātā laukā un segtās platībās)	Sausplankumai-nība *(Alternaria spp.),* pelēkā puve *(Botrytis cinerea)*, baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum),* miltrasas *(Erysiphe spp.)*	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar divu lapu stadiju, līdz pilnai sēklu gatavībai (AS 12-89)	-	9
Kokaugi*, krūmi* (kokaudzētavās, atklātā laukā un segtās platībās)	Sakņu un stublāju puves *(Phytophthora spp.)*		1	Aplaistīt stādus pirms pārstādīšanas, līdz substrāts paliek mitrs	-	1
		10.0		Apstrādāt sakņu zonu stādīšanas/ pārstādīšanas laikā, izmantojot hidraulisko smidzinātāju vai pilienveida laistīšanas sistēmu		

1	2	3	4	5	6	7
Kokaugi*, krūmi* (kokaudzētavās, atklātā laukā un segtās platībās)	Sausplankumainība *(Alternaria spp.),* pelēkā puve *(Botrytis cinerea),* baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum),* miltrasas *(Erysiphe spp.),* lapu plankumainības (*Xanhomonas spp.),* bakteriālais vēzis *(Pseudomonas spp.),* rožu īstā miltrasa *(Podosphaera pannosa)*	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos	-	9
Kvinoja*	Baltā puve *(Sclerotinia sclerotiorum),* sausplankumainība *(Alternaria spp.),* miltrasas *(Erysiphe spp.)*	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar divu lapu stadiju, līdz pilnai sēklu gatavībai (AS 12-89)	-	6

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

10. T34 Biocontrol

Reģ. Nr. 0809, reģ. klase 2., iepakojumi 500 g un mazāki 3.klasē
Darbīgā viela: *Trichoderma asperellum,* celms T34, 120 g/kg
Fungicīds. Pieskares iedarbība.
Biocontrol Technologies, S.L.

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6
Neļķes (segtās platībās)	Sakņu puves *(Fusarium spp.)*	10 g/m^3	Pirms kultūrauga sējas iestrādāt substrātā	-	1
		0.5 g/m^2	vai apliet/ apsmidzināt kasetes pirms/pēc sējas vai stādus pēc iestādīšanas	-	1
		0.01 g/l	un/vai iemērkt spraudeņus darba šķidrumā pirms iestādīšanas		1
		0.005 g/l substrāta	un/vai apliet konteinerā augošus augus, izmantojot pilienlaistīšanu	-	6
Tomāti, paprika, baklažāni (segtās platībās)	Sakņu puves (*Pythium spp.)*	10 g/m^3	Pirms kultūrauga sējas, stādīšanas vai pārstādīšanas iestrādāt substrātā	-	1
		0.5 g/m^2	vai apliet/ apsmidzināt kasetes pirms/pēc sējas vai stādus pēc iestādīšanas	-	1
		0.01 g/l substrāta vai dalītā apstrādē 0.005 g + 0.005 g/l substrāta	un/vai apliet konteinerā augošus augus, izmantojot pilienlaistīšanu. Dalītā apstrāde ar vienas nedēļas intervālu	-	3
Dekoratīvie augi* podos un konteineros, stādi* kokaudzētavās, baziliks*, mētras*, dižzirdzene*, estragons*, izops*, ķimenes*, koriandrs*, mazā brūnvālīte*, smaržīgais mirris*, melisa*, lapu kārvele*, kressalāti*, sinepes*, lupstājs*, majorāns*, piparmētra*, oregano*, rozmarīns*, salvija*, lapu selerijas*, timiāns*, lauris*, cigoriņi*, fenhelis*, endīvijas*, Sareptas sinepes*, pētersīļi*, dārza portulakas*, salātu baldriņi*, rukolas*, salāti*, maurloki*, spināti*, cukīni* ēdamajiem ziediem, kabači* ēdamajiem ziediem, patisoni* ēdamajiem ziediem, brokoļi*, Briseles kāposti*, galviņkāposti*, Pekinas kāposti*, Āzijas kāposti*, Ķīnas kāposti*, ziedkāposti*, lapu kāposti*, kolrābji*, cukīni*, kabači*, gurķi*, melones*, ķirbji* (segtās platībās)	Sakņu puves *(Pythium spp., Fusarium spp.)*	10 g/m^3	Pirms kultūrauga sējas, stādīšanas vai pārstādīšanas iestrādāt substrātā	-	1
		0.5 g/m^2	vai apliet/ apsmidzināt kasetes pirms/pēc sējas vai stādus pēc iestādīšanas	-	1
		0.01 g/l substrāta vai dalītā apstrādē 0.005 g + 0.005 g/l substrāta	un/vai apliet konteinerā augošus augus, izmantojot pilienlaistīšanu. Dalītā apstrāde ar vienas nedēļas intervālu	-	1-2
Krūmmellenes*, upenes*, jāņogas*, ērkšķogas*, kazenes*, avenes*, melnais plūškoks*, dzērvenes*, zīdkoks*, zemenes* (segtās platībās)	Sakņu puves *(Fusarium spp.)*	10 g/m^3	Pirms kultūrauga sējas, stādīšanas vai pārstādīšanas iestrādāt substrātā	-	1
		0.5 g/m^2	vai apliet/ apsmidzināt kasetes pirms/pēc sējas vai stādus pēc iestādīšanas	-	1
		0.01 g/l substrāta vai dalītā apstrādē 0.005 g + 0.005 g/l substrāta	un/vai apliet konteinerā augošus augus, izmantojot pilienlaistīšanu. Dalītā apstrāde ar vienas nedēļas intervālu	-	1-2
Kāposti*, brokoļi*, ziedkāposti*, kolrābji*, galvas salāti*, lapu salāti*, salātu baldriņš*, rukola*, sīpoli*, ķiploki*, puravi*, Šalotes sīpoli*, cukīni*, ķirbji*, gurķi*, pupiņas*, zirņi*, galda bietes*, burkāni*, pētersīļi*, selerijas*, mārrutki*, redīsi*, tomāti*, pipari*, baklažāni*, lapu selerijas*, sparģeļi*, krūmmellenes*, avenes*, augļu koku stādi* kokaudzētavās, kaņepes*, garšaugi*, dekoratīvie augi*, koku sējeņi un stādi* kokaudzētavās, dekoratīvie augi* stādu audzētavās (atklātā laukā)	Sakņu puves *(Pythium spp., Fusarium spp.)*	10 g/m^3	Pirms kultūrauga sējas, stādīšanas vai pārstādīšanas iestrādāt substrātā	-	1
		0.5 g/m^2	vai apliet/ apsmidzināt kasetes pirms/pēc sējas vai stādus pēc iestādīšanas	-	1
		0.25 kg/ha vai dalīti 0.125 + 0.125 kg/ha	un/vai lietot caur laistīšanas sistēmu pēc sējas/stādīšanas līdz augļu attīstības fāzes beigām (AS 00-79)	-	1-2
		0.25 kg/ha	vai izsmidzināt uz augsnes pirms sēšanas, pirms/pēc stādīšanas līdz kultūrauga 6 lapu stadijai (AS 00-16)	-	1

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība**. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

11. Trianum-P

Reģ. Nr. 0676, reģ. klase 3.
Aktīvā sastāvdaļa: *Trichoderma harzianum,* celms T-22, 10 g/kg, ($1.0x10^9$ k.v.v./g).
Fungicīds. Pieskares iedarbība.
Koppert B.V.

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva kg/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6
<u>Stādi un dēsti segtās platībās:</u> ogulāji, salāti un citi lapu dārzeņi, pākšaugi, augļu dārzeņi (tomāti, gurķi, paprika, ķirbji, kabači u.c.), garšaugi, visu veidu kāposti, stublāju dārzeņi, krāšņumaugi (grieztie ziedi, podu puķes), daudzgadīgie augi (stādi, dēsti, segtās platībās)	Sakņu puves (*Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp., Sclerotinia spp.)*	15+7.5	Apstrādāt audzēšanas substrātu divas reizes stādu audzēšanas laikā ar 14 dienu intervālu. Darba šķidruma patēriņš 25000-50000 l/ha	-	2
Dažādu kultūru dēsti un stādi (kokaudzētavās, segtās platībās, atklātā laukā)	Sakņu puves (*Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp., Sclerotinia spp.)*	15+7.5+ 7.5+7.5	Apstrādāt audzēšanas substrātu līdz četrām reizēm stādu audzēšanas laikā ar 14 dienu intervālu. Darba šķidruma patēriņš 25000-50000 l/ha	-	4
Zemenes, avenes, krūmmellenes, kazenes (segtās platībās)	Sakņu puves (*Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp., Sclerotinia spp.)*	2.5-5.0	Apliet, audzējot dobēs, uzreiz pēc pārstādīšanas, atkārtoti ar intervālu starp apstrādēm 10 nedēļas. Darba šķidruma patēriņš 1000-1200 l/ha	-	5
Zemenes, avenes, krūmmellenes, kazenes (segtās platībās)	Sakņu puves *(Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp., Sclerotinia spp.)*	1.0-2.5	Apliet, audzējot rindās, uzreiz pēc pārstādīšanas, atkārtoti ar intervālu starp apstrādēm 10 nedēļas. Darba šķidruma patēriņš 1000-1200 l/ha	-	5
Zemenes, avenes, krūmmellenes, kazenes (segtās platībās)	Sakņu puves *(Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp., Sclerotinia spp.)*	0.015-0.03 kg/1000 augiem	Apstrādi veikt, izmantojot pilienlaistīšanu, uzreiz pēc pārstādīšanas, atkārtoti ar intervālu starp apstrādēm 10 nedēļas. 30000 augi/ha	-	5
Salāti un citi lapu dārzeņi, stublāju dārzeņi, sakņu un bumbuļu dārzeņi (segtās platībās)	Sakņu puves *(Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp., Sclerotinia spp.)*	2.5-5.0	Apliet, audzējot dobēs, uzreiz pēc pārstādīšanas. Darba šķidruma patēriņš 200-1000 l/ha	-	1
Salāti un citi lapu dārzeņi, stublāju dārzeņi, sakņu un bumbuļu dārzeņi (segtās platībās)	Sakņu puves *(Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp., Sclerotinia spp.)*	1.0-2.5	Apliet, audzējot rindās, uzreiz pēc pārstādīšanas. Darba šķidruma patēriņš 200-500 l/ha	-	1
Augļu dārzeņi (tomāti, gurķi, paprika, ķirbji, kabači u.c.), (segtās platībās)	Sakņu puves *(Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp., Sclerotinia spp.)*	0.015-0.03 kg/1000 augiem	Apstrādi veikt, izmantojot pilienlaistīšanu, uzreiz pēc pārstādīšanas, atkārtoti ar intervālu starp apstrādēm 4 nedēļas. Augu daudzums ha 15000-30000	-	12
Garšaugi (segtās platībās)	Sakņu puves *(Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp., Sclerotinia spp.)*	15+7.5	Apliet audzēšanas sezonā divas reizes ar minimālo intervālu 14 dienas. Darba šķidruma patēriņš 10000-13000 l/ha	-	2
Sīpolpuķes (segtās platībās)	Sakņu puves *(Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp., Sclerotinia spp.)*	1.0-2.5	Apliet stādījumu, audzējot rindās, tūlīt pēc iestādīšanas. Darba šķidruma patēriņš 10000-25000 l/ha	-	1
Sīpolpuķes (segtās platībās)	Sakņu puves (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp., Sclerotinia spp.)	2.5-5.0	Apliet stādījumu, audzējot dobēs, tūlīt pēc iestādīšanas. Darba šķidruma patēriņš 25000-50000 l/ha	-	1
Krāšņumaugi (grieztie ziedi, podu puķes) (segtās platībās)	Sakņu puves *(Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp., Sclerotinia spp.)*	1.0-2.5	Apliet sējumu vai stādījumu, audzējot rindās, tūlīt pēc sējas vai stādīšanas, atkārtoti ar minimālo intervālu 2 nedēļas. Darba šķidruma patēriņš 5000-25000 l/ha	-	4
Krāšņumaugi (grieztie ziedi, podu puķes), (segtās platībās)	Sakņu puves *(Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp., Sclerotinia spp.)*	2.5-5.0	Apliet sējumu vai stādījumu, audzējot dobēs, tūlīt pēc sējas vai stādīšanas, atkārtoti ar minimālo intervālu 2 nedēļas. Darba šķidruma patēriņš 10000-50000 l/ha	-	4
Krāšņumaugi (grieztie ziedi, podu puķes), daudzgadīgie augi (segtās platībās)	Sakņu puves *(Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp., Sclerotinia spp.)*	0.015-0.03 kg/ 1000 augiem	Apstrādi veikt, izmantojot pilienlaistīšanu, uzreiz pēc pārstādīšanas, atkārtoti ar intervālu starp apstrādēm 4 nedēļas. Augu daudzums ha 20000-90000	-	12
Daudzgadīgie augi, augi kokaudzētavās (segtās platībās)	Sakņu puves *(Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp., Sclerotinia spp.)*	1.0-2.5	Apliet stādījumu, audzējot rindās, tūlīt pēc sējas vai stādīšanas, atkārtoti ar minimālo intervālu 10 nedēļas. Darba šķidruma patēriņš 5000-25000 l/ha	-	5
Daudzgadīgie augi, augi kokaudzētavās (segtās platībās)	Sakņu puves *(Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp., Sclerotinia spp.)*	2.5-5.0	Apliet stādījumu, audzējot dobēs, tūlīt pēc sējas vai stādīšanas, atkārtoti ar minimālo intervālu 10 nedēļas. Darba šķidruma patēriņš 10000-50000 l/ha	-	5
Augi kokaudzētavās (segtās platībās)	Sakņu puves *(Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp., Sclerotinia spp.)*	0.15 kg/ 1000 augiem	Apliet stādījumā katru atsevišķu augu tūlīt iestādīšanas, atkārtoti ar minimālo intervālu 10 nedēļas. Darba šķidruma patēriņš 25000-50000 l/ha	-	5

DZĪVOS ORGANISMUS SATUROŠIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva: Īpatņi/m²	Lietošanas laiks, iedarbības veids	Preparatīvā forma, uzglabāšanas ilgums
1	2	3	4	5

1. ABS sistēma

Reģ. Nr. 0447, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: plēsējērce (*Neoseiulus cucumeris*).
Biobest Group N.V.

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva: īpatņi/augu	Lietošanas laiks, iedarbības veids	Preparatīvā forma, uzglabāšanas ilgums
Gurķi, paprika, zemenes, puansetijas, gerberas, rozes, stādi kokaudzētavās un stādu audzētavās (segtajās platībās)	Tripši *(Frankliniella occidentalis, Trips tabaci)*	Profilaktiski: 1000/3-7 augi	Maisiņus nomaina ar intervālu 4-6 nedēļas	Plēsējērces dažādās attīstības stadijās. Uzglabāt tumsā, +15 °C temperatūrā, relatīvais gaisa mitrums virs 85 %

2. Adalia sistēma (Adalia-E sistēma)

Reģ. Nr. 0463, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: divpunktu mārīte (*Adalia bipunctata*).
Biobest Group N.V.

Dārzeņi, garšaugi, krāšņumaugi, zemenes, stādi kokaudzētavās un stādu audzētavās (atklātā laukā un segtās platībās)	Laputis *(Aphidadea)*	Vispārēja izlaišana: 10-50	Tikai invāzijas gadījumā. Ja nepieciešams, lieto atkārtoti	Kūniņas vai oliņas sajauktas ar sasmalcinātu papīru. Uzglabāt tumsā, +6-10 °C temperatūrā, 1-2 dienas
		Invāzijas perēkļos: 50-100	Tikai invāzijas gadījumā. Ja nepieciešams, lieto atkārtoti	

3. Afidius sistēma

Reģ. Nr. 0442, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: parazītlapsene (*Aphidius colemani*).
Biobest Group N.V.

Tomāti, gurķi, paprika, zemenes, salāti, puansetijas, krizantēmas, gerberas, rozes (segtajās platībās)	Laputis *(Aphis gossypii, Myzus persicae)*	Profilaktiski: 0.25	Izber pa lapām visā platībā, atkārto ar 1-2 nedēļu intervālu	Kūniņas pildvielā. Uzglabāt + 6-8 °C temperatūrā, relatīvais gaisa mitrums 85 %
		Zemas invāzijas gadījumā: 0.25-0.5	Invāzijas punktos un ap tiem, 3 reizes ar nedēļas intervālu	
		Augstas invāzijas gadījumā: 0.5-1	Invāzijas punktos un ap tiem, 4 reizes ar nedēļas intervālu	

4. Afidiuss

Reģ. Nr. 0064, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: laputu lapsenīte (*Aphidius colemani*).
IK „Ciklaneda BS”

Gurķi, tomāti, pipari, selerijas, salāti, pētersīļi augu mājās	Laputis *(Aphidadea)*	15 mūmijas/m²	Parazitē laputis. Izlikt mūmijas augu mājā, kaitēklim parādoties	Laputu mūmijas. Uzglabāt +5 °C temperatūrā, pie gaisa mitruma 70 %, ne ilgāk par 15 dienām

1	2	3	4	5

5. Afidoletes sistēma

Reģ. Nr. 0448, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: pangodiņš (*Aphidoletes aphidimyza*).
Biobest Group N.V.

Tomāti, gurķi, paprika, zemenes, salāti, puansetijas, krizantēmas, gerberas, rozes (segtajās platībās)	Laputis *(Myzus persicae, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Aulacorthum solani, Macrosiphum rosae, Macrosiphoniella sanborni)*	Profilaktiski: 0.1-0.2	Reizi nedēļā	Pildvielā iejauktas pangodiņa kūniņas. Uzglabāt +6-8 °C temperatūrā, relatīvais gaisa mitrums virs 85 %
		Invāzijas gadījumā: 0.5-4	Reizi nedēļā, invāzijas punktos un ap tiem, atkārto pēc vajadzības	

6. Ambliseijus sistēma

Reģ. Nr. 0464, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: plēsējērce (*Amblyseius cucumeris (Neoseiulus cucumeris)*).
Biobest Group N.V.

Gurķi, paprika, zemenes, puansetijas, gerberas, rozes, stādi kokaudzētavās un stādu audzētavās (segtajās platībās)	Tripši *(Frankliniella occidentalis, Trips tabaci)*	Profilaktiski: 50	Izber uz lapām visā platībā, atkārtot ar 2 nedēļu intervālu	Plēsējērces imago stadijā pildvielā. Uzglabāt tumsā, +15 °C temperatūrā, 1-2 dienas, relatīvais gaisa mitrums virs 85 %
		Zemas invāzijas gadījumā: 100	Izber invāzijas punktos un ap tiem, atkārtot ar 2 nedēļu intervālu	
		Augstas invāzijas gadījumā: 100-250	Izber invāzijas punktos un ap tiem, atkārtot ar 2 nedēļu intervālu, līdz invāzija tiek kontrolēta	
		Profilaktiski: 50	Izber uz lapām visā platībā ar gaisa strūklu, atkārtot ar 2 nedēļu intervālu	Plēsējērces imago stadijā vermikulītā (min. 80 %). Uzglabāt tumsā, +15 °C temperatūrā, 1-2 dienas, relatīvais gaisa mitrums virs 85 %

7. Ambliseiuss

Reģ. Nr. 0063, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: plēsējērce (*Amblyseius cucumeris*).
IK „Ciklaneda BS”

Gurķi, tomāti augu mājās	Parastā tīklērces *(Tetranychus urticae)*, tripši *(Frankliniella occidentalis), Thrips tabaci)*	500 ēces/m²	Iznīcina tīklērces, tripšu kāpurus, retāk olas. Izlaist, kaitēklim parādoties	Plēsējērces. Uzglabāt +10 °C temperatūrā, ne ilgāk par trim dienām
Pipari augu mājās	Tripši *(Frankliniella occidentalis), Thrips tabaci)*			

8. Aphidend

Reģ. Nr. 0124, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: pangodiņš (*Aphidoletes aphidimyza*).
Koppert B.V.

Dārzeņi, krāšņumaugi (segtajās platībās)	Laputis *(Myzus persicae, Myzus nicotianae, Macrosiphum euphorbiare, Aphis gossypii, Aulacorthum solani)*	Vispārējai izlaišanai: 1 kūniņa/m²	Izlikt kūniņas, laputīm parādoties, vismaz 3 reizes ar intervālu 7 dienas	Vermikulītā iejauktas pangodiņa kūniņas. Uzglabāt tumsā, temperatūrā no +10 °C līdz +15 °C, ne ilgāk par 1-2 dienām
		Invāzijas perēkļos: 10 kūniņas/m²	Izlikt kūniņas lokāli, laputīm parādoties, vismaz 3 reizes ar intervālu 7 dienas	

1	2	3	4	5

9. Aphipar

Reģ. Nr. 0616, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: parazītlapsene (*Aphidius colemani*).
Koppert B.V.

Dārzeņi, krāšņumaugi (segtajās platībās)	Laputis *(Aphis gossypii, Myzus persicae)*	Profilaktiski: 0.25	Izlaiž ik pēc 7 dienām	Laputu mūmijas iejauktas koka skaidās. Uzglabāt tumsā, +8 °C līdz +10 °C temperatūrā, 1-2 dienas
		Vispārēja izlaišana: 1	Vismaz 3 reizes ar 7 dienu intervālu	
		Invāzijas perēkļos: 2	Vismaz 6 reizes ar 7 dienu intervālu	

10. Aphiscout

Reģ. Nr. 0702, reģ. klase 3.
Dzīvie organismi: parazītlapsenes (*Aphidius colemani, Aphidius ervi* (Haliday), *Aphelinius abdominalis, Ephedrus cerasicola, Praon volucre*).
Koppert B.V.

Dārzeņi, garšaugi, krāšņumaugi (segtās platībās)	Laputis *(Aphis gossypii, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aulacorthum solani)*	Profilaktiski: 0.63 īpatņi/m^2	Vismaz trīs reizes, ar 14 dienu intervālu	Parazītlapseņu mūmijas zāģu skaidās. Uzglabāt tumsā, +8 °C līdz +10 °C temperatūrā, ne ilgāk kā 24 stundas
		Vispārējai lietošanai: 1.25 īpatņi/m^2	Vismaz trīs reizes, ar 7 dienu intervālu (lokāli)	

11. Calif PRO5

Reģ. Nr. 0734, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: plēsējērce (*Neoseiulus californicus*).
SIA SPTS

Krāšņumaugi, dārzeņi, garšaugi, zemenes, avenes, krūmmellenes, krāšņumaugu stādi, kokaugu stādi kokaudzētavās (segtās platībās)	Parastā tīklērce *(Tetranychus urtica),* sarkanā augļu koku tīklērce *(Panonychus ulmi),* zemeņu ērce *(Tarsonemus pallidus),* sarkanā citrusaugu ērce *(Panonychus citri),* ērce *(Polyphagotarsonemus latus)*	Profilaktiski: 25 plēsējērces/m^2	Vairākas reizes, intervāls 3 nedēļas	Plēsējērces iejauktas klijās. Uzglabāt tumsā, +8 °C līdz +10 °C temperatūrā, 1-2 dienas. Nodrošināt labu ventilāciju
		Vispārēja izlaišana: 100 plēsējērces/m^2	Izlaiž pēc vajadzības vienu reizi	
		Invāzijas perēkļos: 200 plēsējērces/m^2	Izlaiž pēc vajadzības vienu reizi invāzijas perēkļos	

12. Calif PRO5 LS

Reģ. Nr. 0735, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: plēsējērce (*Neoseiulus californicus*).
SIA SPTS

Krāšņumaugi, dārzeņi, garšaugi, zemenes, avenes, krūmmellenes, krāšņumaugu stādi, kokaugu stādi kokaudzētavās (segtās platībās)	Parastā tīklērce *(Tetranychus urtica),* sarkanā augļu koku tīklērce *(Panonychus ulmi),* zemeņu ērce *(Tarsonemus pallidus),* sarkanā citrusaugu ērce *(Panonychus citri),* ērce *(Polyphagotarsonemus latus)*	Vispārēja izlaišana: 40 plēsējērces/m^2	Izlaiž 1-2 reizes ar 4-6 nedēļu intervālu	Plēsējērces iejauktas klijās kopā ar barību. Uzglabāt tumsā, temperatūrā +18 °C, līdz 7 dienām. Nodrošināt labu ventilāciju
		Invāzijas perēkļos: 100 plēsējērces/m^2	Izlaiž pēc vajadzības ar 4 nedēļu intervālu	

1	2	3	4	5

13. Carpo sistēma

Reģ. Nr. 0865, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: entomopatogēnā nematode (*Steinernema carpocapsae*).
Biobest Group N.V.

Dārzeņi, garšaugi, krāšņumaugi (segtās platībās), sēnes (audzētavās segtās platībās), dekoratīvie koki, dekoratīvie krūmi kokaudzētavās (segtās platībās), zemenes (segtās platībās, tuneļos, atklātā laukā)	Augsnes/substrāta apstrāde			Nematodes (trešajā attīstības stadijā) papildvielā. Uzglabāšanas temperatūra no +2 °C līdz +6 °C
	Trūdodiņu kāpuri *(Scaiaridae),* pūcīšu kāpuri *(Noctuidae)*	Vispārējai izlaišanai: 500 000 īpatņi/m^2; 5 000 īpatņi/L substrāta	Apstrādāt augsni/ substrātu, parādoties kaitēkļiem. Atkārtoti pēc 6 nedēļām. Darba šķidruma patēriņš: 1 l/m^2. Darba šķidruma patēriņš: 1 L/100L substrāta	
		Invāzijas gadījumā: 1 000 000 īpatņi/m^2; 10 000 īpatņi/L substrāta	Apstrādāt augsni/ substrātu, parādoties kaitēkļiem. Atkārtoti pēc 6 nedēļām. Darba šķidruma patēriņš: 1 l/m^2. Darba šķidruma patēriņš: 1 L/100L substrāta	
	Smidzināšana pa lapām			
	Pūcīšu kāpuri *(Noctuidae,* kāpostu pūcītes kāpuri *(Mamestra barssicae)*	Vispārējai izlaišanai: 250 000	Apsmidzināt augus, kaitēkļiem parādoties. Darba šķidruma patēriņš: 1000 l/ha	

14. CBS sistēma

Reģ. Nr. 0610, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: plēsējērce (*Neoseiulus californicus*).
Biobest Group N.V.

Tomāti, paprika, gurķi, pupas, baklažāni, avenes, jāņogas, upenes, krūmmellenes, kazenes, rozes, krizantēmas, gerberas, puansetijas, dižkallas, frēzijas, fuksijas, balzamīnes, daturas, koku un krūmu stādi kokaudzētavās (segtās platībās un atklātā lauka)	Parastā tīklērce *(Tetranychus urtica),* sarkanā augļu koku tīklērce *(Panonychus ulmi),* zemeņu ērce *(Tarsonemus pallidus),* sarkanā citrusaugu ērce *(Panonychus citri),* ērce *(Polyphagotarsonemus latus)*	Vispārēja izlaišana: 40 plēsējērces/m^2	Vienu līdz divas reizes ar 4-6 nedēļu intervālu	Plēsējērces imago iejaukts klijās kopā ar barību papīra maisiņā. Uzglabāšana tumsā, temperatūrā +18 °C, līdz 7 dienām, nodrošinot labu ventilāciju

15. Chrysopa

Reģ. Nr. 0883, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: zeltactiņa (*Chrysoperla carnea*).
Koppert B.V.

Dārzeņi, krāšņumaugi (segtās platībās)	Laputis *(Aphididae)*	Vispārējai izlaišanai: 2	Intervāls 7 dienas, kamēr sasniegts rezultāts	Kāpuri pildvielā. Uzglabāt tumsā, +8 °C līdz +10 °C temperatūrā, 1-2 dienas
		Invāzijas perēkļos: 20-50	Intervāls 7 dienas, kamēr sasniegts rezultāts	

1	2	3	4	5

16. Chrysopa-E

Reģ. Nr. 0884, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: zeltactiņa (*Chrysoperla carnea*).
Koppert B.V.

Dārzeņi, krāšņumaugi (segtās platībās)	Laputis (*Aphididae*)	Vispārējai izlaišanai: 10	Intervāls 7 dienas, kamēr sasniegts rezultāts	Olas iepakojumā. Uzglabāt tumsā, +8 °C līdz +10 °C temperatūrā, 1-2 dienas

17. Cryptobug

Reģ. Nr. 0683, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: Montrouza mārīte (*Cryptolaemus montrouzieri* (Mulsant)).
Koppert B.V.

Dārzeņi, krāšņumaugi (segtās platībās)	Pūkainās bruņutis *(Pseudococcidae)*	Vispārēja izlaišana: 2 īpatņi/m²	Divas reizes, ar 14 dienu intervālu	Pieauguši īpatņi iejaukti griķu sēnalās. Uzglabāt tumsā, +10 °C līdz +15 °C temperatūrā, 1-2 dienas
		Invāzijas perēkļos: 10 īpatņi/m²	Vienu reizi	

18. Cryptobug-L

Reģ. Nr. 0684, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: Montrouza mārīte (*Cryptolaemus montrouzieri* (Mulsant)).
Koppert B.V.

Dārzeņi, krāšņumaugi (segtās platībās)	Pūkainās bruņutis *(Pseudococcidae)*	Profilaktiski: 5 īpatņi/m²	Divas reizes, ar 14 dienu intervālu	Mārīšu kāpuri iejaukti griķu sēnalās. Uzglabāt tumsā, +10 °C līdz +15 °C temperatūrā, 1 dienu
		Vispārēja izlaišana: 10 īpatņi/m²	Vismaz 3 reizes, ar 7-14 dienu intervālu	
		Invāzijas perēkļos: 20-40 īpatņi/m²	Vismaz 3 reizes, ar 7-14 dienu intervālu	

19. Cucum PRO5

Reģ. Nr. 0768, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: plēsējērce (*Neoseiulus cucumeris*).
SIA SPTS

Krāšņumaugi, dārzeņi, garšaugi, zemenes, krāšņumaugu stādi, kokaugu stādi kokaudzētavās (segtās platībās)	Kalifornijas tripsis *(Frankliniella occidentalis)*, tabakas tripsis *(Thrips tabaci)*	Profilaktiski: 50 plēsējērces/m²	Vairākas reizes, intervāls 2 nedēļas	Plēsējērces iejauktas klijās. Uzglabāt tumsā, +12 °C līdz +15 °C temperatūrā, 1-2 dienas. Nodrošināt labu ventilāciju
		Vispārēja izlaišana: 100 plēsējērces/m²	Vairākas reizes, intervāls 2 nedēļas	
		Invāzijas perēkļos: 200 plēsējērces/m²	Vairākas reizes, intervāls 2 nedēļas	

20. Cucum PRO5 LS

Reģ. Nr. 0769, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: plēsējērce (*Neoseiulus cucumeris*).
SIA SPTS

Krāšņumaugi, dārzeņi, garšaugi, zemenes, krāšņumaugu stādi, kokaugu stādi kokaudzētavās (segtās platībās)	Kalifornijas tripsis *(Frankliniella occidentalis)*, tabakas tripsis *(Thrips tabaci)*	Profilaktiski: 400 plēsējērces/m²	Vairākas reizes, intervāls 5-6 nedēļas	Plēsējērces iejauktas klijās kopā ar barību. Uzglabāt tumsā, temperatūrā +15-20 °C, līdz 2 dienām. Nodrošināt labu ventilāciju
		Vispārēja izlaišana: 400 plēsējērces/m²	Vairākas reizes, intervāls 4-5 nedēļas	
		Invāzijas perēkļos: 1000 plēsējērces/m²	Vairākas reizes, intervāls 4 nedēļas	

1	2	3	4	5

21. Daknusa sistēma

Reģ. Nr. 0659, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: parazītlapsene (*Dacnusa sibirica*).
Biobest Group N.V.

Tomāti, paprika, gurķi, kabači, baklažāni un citi dārzeņi; krizantēmas, gerberas un citi ziedaugi; koku un krūmu stādi kokaudzētavās (segtās platībās)	Lapu alotājmušas *(Liriomyza spp.)*	Vispārēja izlaišana: 0.25-0.5 parazītlapsenes/m²	3-4 reizes ar 7 dienu intervālu, ja <1 alojums/10 augi	Parazītlapsenes imago. Uzglabāšana tumsā, temperatūrā +10-15 °C, 18 stundas
		Invāzijas perēkļos: 0.5-1 parazītlapsenes/m²	Ja >1 alojums/10 augi, lietot kopā ar Diglifus sistēma	

22. Diglifus sistēma

Reģ. Nr. 0443, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: parazītlapsene (*Diglyphus isaea*).
Biobest Group N.V.

Tomāti, paprika, krizantēmas, gerberas (segtajās platībās)	Lapu alotājmušas *(Liriomyza bryoniae, Liriomiza trifolii, Liriomyza huidobrensis)*	Parādoties kaitēkļiem: 0.25	3 reizes ar nedēļas intervālu	Parazītlapsenes. Uzglabāt tumsā, +6-10 °C temperatūrā
		Invāzijas gadījumā: 1	3 reizes ar nedēļas intervālu, invadētās vietās	

23. Enermix

Reģ. Nr. 0649, reģ. klase 3.
Dzīvie organismi: parazītlapsene (*Eretmocerus eremicus*), spožlapsene (*Encarsia formosa*).
Koppert B.V.

Dārzeņi, krāšņumaugi (segtajās platībās)	Siltumnīcu baltblusiņa (*Trialeurodes vaporariorum),* tabakas baltblusiņa *(Bremisia tabaci)*	Profilaktiski: 3	Izlaist ar 7-14 dienu intervālu	Pie kartona plāksnītēm fiksēti baltblusiņas pupārīji. Uzglabāt tumsā, +8 °C līdz +10 °C temperatūrā, 1-2 dienas
		Vispārēja izlaišana: 6	Vismaz 3 reizes, kamēr kaitēkļi ir ierobežoti. Intervāls 7 dienas	
		Invāzijas perēkļos: 9	Vismaz 3 reizes, kamēr kaitēkļi ir ierobežoti. Intervāls 7 dienas	

24. Enkarsija

Reģ. Nr. 0061, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: spožlapsene (*Encarsia formosa*).
IK „Ciklaneda BS"

Gurķi augu mājās	Siltumnīcu baltblusiņa *(Trialeurodes vaporariorum)*	10 pupāriji/m²	Parazitē 3.-4. vecuma baltblusiņu kāpurus. Izlikt pupārijus augu mājā, kaitēklim parādoties	Pupāriji. Uzglabāt +10 °C temperatūrā, pie gaisa mitruma 70 %, ne ilgāk par 30 dienām
Tomāti augu mājās		5 pupāriji/m²		

1	2	3	4	5

25. Enkarsijas sistēma

Reģ. Nr. 0444, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: spožlapsene (*Encarsia formosa*).
Biobest Group N.V.

Tomāti, gurķi, paprika, zemenes, salāti, puansetijas, krizantēmas, gerberas, rozes (segtajās platībās)	Siltumnīcu baltblusiņa (*Trialeurodes vaporariorum),* tabakas baltblusiņa *(Bremisia tabaci)*	Profilaktiski: 0.5-1	Reizi nedēļā, visā platībā, atkārto vismaz 4 reizes	Pie kartona plāksnītēm fiksēti pupārīji vai brīvi birstoši parazitēti pupārīji. Uzglabāt +6-8 °C temperatūrā, relatīvais gaisa mitrums lielāks par 85 %
		Zemas invāzijas gadījumā: 1-2	Reizi nedēļā, invāzijas punktos un ap tiem, atkārto pēc vajadzības	
		Augstas invāzijas gadījumā: 5-15	Reizi nedēļā, invāzijas punktos un ap tiem, atkārto pēc vajadzības	

26. En-Strip

Reģ. Nr. 0125, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: spožlapsenīte (*Encarsia formosa*).
Koppert B.V.

Dārzeņi, krāšņumaugi (segtajās platībās)	Baltblusiņas *(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)*	Profilaktiskai izlaišanai: 1.5-3 pupārīji/m^2	Izlikt pupārijus atkārtoti ar 7-14 dienu intervālu	Pie kartona strēmelēm fiksēti pupārīji. Uzglabāt tumsā, temperatūrā no +8 °C-10 °C, ne ilgāk par 1-2 dienām
		Vispārējai izlaišanai: 3-6 pupārīji/m^2	Izlikt pupārijus, kaitēklim parādoties, vismaz 3 reizes ar intervālu 7 dienas	
		Invāzijas perēkļos: 9 pupārīji/m^2		

27. Entomite-M

Reģ. Nr. 0615, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: plēsējērce (*Stratiolaelaps scimitus*).
Koppert B.V.

Dārzeņi, krāšņumaugi (segtajās platībās)	Trūdodiņu kāpuri *(Sciaridae),* tripšu kūniņas *(Frankliniella occidentalis),* kolembolas *(Collembola),* sakņu ērces	Profilaktiski: 100	Izlaist vienu reizi	Vermikulītā un kūdrā iejauktas plesējērces visās attīstības stadijās. Uzglabāt tumsā, +10 °C līdz +15 °C temperatūrā, 1-2 dienas
		Vispārēja izlaišana: 200	Izlaist vienu reizi	
		Invāzijas perēkļos: 500	Izlaist vienu reizi	

28. Entonem

Reģ. Nr. 0619, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: entomopatogēnā nematode (*Steinernema feltiae*).
Koppert B.V.

Dārzeņi, krāšņumaugi, garšaugi, zemenes (segtajās platībās)	Smidzināšana uz augsnes			Nematodes (trešajā attīstības stadijā) speciālā gelā. Uzglabāšanas temperatūra no +2 °C līdz +6 °C, 1-2 dienas
	Trūdodiņi *(Sciaridae),* tripši *(Thysanoptera)*	Invāzijas perēkļos (neliela mēroga invāzijas gadījumā): 500 000	Viena reize	
		Invāzijas perēkļos (liela mēroga invāzijas gadījumā): 500 000	2-3 reizes ar 7 dienu intervālu	
	Smidzināšana pa lapām			
	Tripši *(Thysanoptera)*	Invāzijas perēkļos: 250 000	Atkārtot ar 7 dienu intervālu, kamēr nepieciešams	

1	2	3	4	5

29. Ercal

Reģ. Nr. 0614, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: parazītlapsene (*Eretmocerus eremicus*).
Koppert B.V.

Dārzeņi, krāšņumaugi (segtajās platībās)	Siltumnīcu baltblusiņa (*Trialeurodes vaporariorum),* tabakas baltblusiņa *(Bremisia tabaci)*	Profilaktiski: 1.5-3	Ar 7-14 dienas intervālu	Pie kartona plāksnītēm fiksēti baltblusiņas pupārīji. Uzglabāt tumsā, +8 °C līdz +10 °C temperatūrā, 1-2 dienas
		Vispārēja izlaišana: 3-6	Vismaz 3 reizes ar 7 dienu intervālu, kamēr kaitēkļi ir ierobežoti	
		Invāzijas perēkļos: 9	Vismaz 3 reizes ar 7 dienu intervālu, kamēr kaitēkļi ir ierobežoti	

30. Eretmiks sistēma

Reģ. Nr. 0465, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: spožlapsenes (*Encarsia formosa, Eretmocerus eremicus*).
Biobest Group N.V.

Tomāti, gurķi, paprika, zemenes, puansetijas, krizantēmas, gerberas, rozes (segtajās platībās)	Siltumnīcu baltblusiņa *(Trialeurodes vaporariorum),* tabakas baltblusiņa *(Bemisia tabaci)*	Profilaktiski: 0.5-1	Visā platībā, reizi nedēļā, atkārto vismaz 4 reizes	Pie kartona plāksnītēm fiksēti baltblusiņas pupārīji vai parazitēti pupārīji pudelītē. Uzglabāt tumsā, +6-8 °C temperatūrā, 1-2 dienas
		Zemas invāzijas gadījumā: 1-2	Invāzijas punktos un ap tiem, reizi nedēļā, atkārto pēc vajadzības	
		Augstas invāzijas gadījumā: 5-15	Invāzijas punktos un ap tiem, reizi nedēļā, atkārto pēc vajadzības	

31. Eretmocerus sistēma

Reģ. Nr. 0466, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: spožlapsene (*Eretmocerus eremicus*).
Biobest Group N.V.

Tomāti, gurķi, paprika, zemenes, puansetijas, krizantēmas, gerberas, rozes (segtajās platībās)	Siltumnīcu baltblusiņa *(Trialeurodes vaporariorum),* tabakas baltblusiņa *(Bemisia tabaci)*	Profilaktiski: 1.5-3	Visā platībā, ar divu nedēļu intervālu, atkārto 1-2 reizes	Pie kartona plāksnītēm fiksēti baltblusiņas pupārīji vai parazitēti pupārīji pudelītē. Uzglabāt tumsā, +6-8 °C temperatūrā, 1-2 dienas
		Zemas invāzijas gadījumā: 3-6	Invāzijas punktos un ap tiem, reizi nedēļā, atkārto vismaz 3 reizes	
		Augstas invāzijas gadījumā: 10-15	Invāzijas punktos un ap tiem, reizi nedēļā, atkārto vismaz 3 reizes	

32. Ervipar

Reģ. Nr. 0670, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: parazītlapsene (*Aphidius ervi* (Haliday)).
Koppert B.V.

Dārzeņi, krāšņumaugi (segtās platībās)	Laputis *(Macrosiphum euphorbiae, Aulacorthum solani, Myzus persicae var. nicotianae)*	Profilaktiski: 0.25	Izlaiž atkārtoti, ja nepieciešams pēc 7 dienām	Laputu mūmijas iejauktas griķu sēnalās. Uzglabāt tumsā, +8 °C līdz +10 °C temperatūrā, 1-2 dienas
		Mērena invāzija: 0.5	Nepārtraukti ar 7 dienu intervālu	
		Augsta invāzija: 2	Nepārtraukti ar 7 dienu intervālu	

1	2	3	4	5

33. Eupiods sistēma

Reģ. Nr. 0725, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: ziedmuša (*Eupeodes corollae*).
Biobest Group N.V.

Paprika, gurķi un citi dārzeņi; zemenes, ogulāji, augļu koki, dekoratīvie augi (atklātā laukā un segtās platībās)	Laputis *(Aphididae)*	Profilaktiski (laputis nav redzamas): 100 ziedmušas/ha	Vienu reizi nedēļā, 6 reizes, pudele vienā izlaišanas punktā. Augiem jāizdala nektārs un ziedputekšņi ziedmušu barībai	Ziedmušu kūniņas, olas, imago vai kāpuri pildvielā. Uzglabāšana tumsā, temperatūrā +8-10 °C, 24 stundas
		Vispārējai izlaišanai: 300-400 ziedmušas/ha	Vienu reizi nedēļā, 3 reizes, pudele vienā izlaišanas punktā, invāzijas perēkļos. Augiem jāizdala nektārs un ziedputekšņi ziedmušu barībai	

34. Feltiella sistēma

Reģ. Nr. 0529, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: pangodiņš (*Feltiella acarisuga* (Vallot 1827)).
Biobest Group N.V.

Tomāti, paprika	Tīklērces *(Tetranychus urticae, Tetranychus cinnabarinus)*	Mērena invāzija: 250 īpatņi/ perēklī/ nedēļā	Veģetācijas periodā minimums 2-3 reizes	Dzīvā organisma kūniņas koka skaidās. Uzglabāšana +10 °C temperatūrā, 1-2 dienas
		Augsta invāzija: 250 īpatņi/ perēklī/ nedēļā	Veģetācijas periodā minimums 8 reizes	
Gurķi		250 īpatņi/ perēklī/ nedēļā	Veģetācijas periodā minimums 2-3 reizes	
Rozes		Mērena invāzija: 250 īpatņi/ perēklī/ nedēļā	Veģetācijas periodā minimums 2-3 reizes	
Baklažāni, zemenes, krizantēmas, gerberas, antūrijas, stādi kokaudzētavās un stādu mājās		500-750 īpatņi/ ha/ nedēļā	Pavasarī, kad platībā parādās pārziemojušās tīklērces	
Tomāti, paprika, gurķi, rozes, baklažāni, zemenes, krizantēmas, gerberas, antūrijas, stādi kokaudzētavās un stādu mājās		Augsta invāzija: 2500 īpatņi/ ha/ nedēļā	Pavasarī, kad platībā parādās pārziemojušās tīklērces, minimums 6 reizes	
		250 īpatņi/ perēklī/ nedēļā	Veģetācijas periodā minimums 4-6 reizes	

1	2	3	4	5

35. Fitoseiulus sistēma

Reģ. Nr. 0449, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: plēsējērce (*Phytoseiulus persimilis*).
Biobest Group N.V.

Gurķi, tomāti, paprika, zemenes, antūrijas, krizantēmas, gerberas, rozes, stādi kokaudzētavās un stādu audzētavās (segtajās platībās)	Parastā tīklērce *(Tetranychus urticae)*	Profilaktiski: 2-4	Atkārto pēc 3-4 nedēļām	Plēsējērce pildvielā. Uzglabāt +6-8 °C temperatūrā, pie relatīvā gaisa mitruma virs 85 %
		Pie agra invāzijas novērojuma: 6-12	Atkārto 1-2 reizes ar nedēļas intervālu	
		Pie vēla invāzijas novērojuma: min. 20	Atkārtot vismaz 2 reizes visā platībā ar nedēļas intervālu	
		Pie vēla invāzijas novērojuma: min. 100	Atkārtot vismaz 2 reizes invāzijas punktos un ap tiem, ar nedēļas intervālu	

36. Fitosējuluss

Reģ. Nr. 0060, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: plēsējērce (*Phytoseiulus persimilis*).
IK „Ciklaneda BS"

Gurķi augu mājās	Parastā tīklērce *(Tetranychus urticae)*	1 plēsējērce uz 50 tīklērcēm	Iznīcina visu vecumu tīklērces, to olas. Izlaist augu mājā vienu reizi, kaitēklim parādoties	Plēsējērces uz auga lapām. Uzglabāt +3 °C temperatūrā, pie gaisa mitruma 80 %, ne ilgāk par divām nedēļām
Tomāti augu mājās		1 plēsējērce uz 25 tīklērcēm		
Rozes augu mājās		1 plēsējērce uz 10 tīklērcēm		

37. Heterorhabditis sistēma

Reģ. Nr. 0866, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: entomopatogēnā nematode (*Heterorhabditis bacteriophora*).
Biobest Group N.V.

Dekoratīvie koki, dekoratīvie krūmi (kokaudzētavās), zemenes (atklātā laukā, tuneļos), zāliens	Smecernieku kāpuri *(Otiorhynchus spp.),* dārza vaboļu kāpuri *(Phyllopertha spp.)*	Invāzijas gadījumā: 500 000	Apstrādāt augsni, parādoties kaitēkļiem. Atkārtoti 1-2 reizes ar 4 nedēļu intervālu. Darba šķidruma patēriņš: 0.1 l/m^2	Nematodes (trešajā attīstības stadijā) papildvielā. Uzglabāšanas temperatūra no +2 °C līdz +6 °C

38. Hipoaspis sistēma

Reģ. Nr. 0445, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: plēsējērce (*Stratiolaelaps scimitus*).
Biobest Group N.V.

Dārzeņi, puansētijas, krizantēmas, gerberas, rozes (segtajās platībās), stādi kokaudzētavās un stādu audzētavās	Trūdodiņa kapuri *(Sciaridae),* tripšu pupāriji *(Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis)*, sakņu ērces, daudzkāji	Profilaktiski: 100-200	Vienreiz, invāzijas punktos un ap tiem	Pildvielā iejauktas plēsējērces. Uzglabāt tumsā, +15-18 °C temperatūrā
		Invāzijas gadījumā: 200-500	Vienreiz, invāzijas punktos un ap tiem	

1	2	3	4	5

39. Kalifornikus sistēma

Reģ. Nr. 0609, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: plēsējērce (*Neoseiulus californicus*).
Biobest Group N.V.

Tomāti, paprika, gurķi, pupas, baklažāni, avenes, jāņogas, upenes, krūmmellenes, kazenes, rozes, krizantēmas, gerberas, puansetijas, dižkallas, frēzijas, fuksijas, balzamīnes, daturas, koku un krūmu stādi kokaudzētavās (segtās platībās un atklātā laukā)	Parastā tīklērce *(Tetranychus urtica)*, sarkanā augļu koku tīklērce *(Panonychus ulmi)*, zemeņu ērce *(Tarsonemus pallidus)*, sarkanā citrusaugu ērce *(Panonychus citri)*, ērce *(Polyphagotarsonemus latus)*	Profilaktiski: 25 plēsējērces/m²	Ik pēc 3 nedēļām	Plēsējērces imago vermikulītā. Uzglabāšana tumsā, temperatūrā +8 °C, 1-2 dienas, nodrošinot labu ventilāciju
		Vispārēja izlaišana: 100 plēsējērces/m²	Pēc vajadzības, ja ērces atrodamas	
		Invāzijas perēkļos: 200 plēsējērces/m²	Pēc vajadzības, tikai invāzijas perēkļos	

40. Kriptolēmus-(L-) sistēma

Reģ. Nr. 0754, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: Montrouza mārīte (*Cryptolaemus mintrouzieri* (Mulsant)).
Biobest Group N.V.

Dārzeņi, dekoratīvie augi (segtās platībās)	Bruņutis *(Pseudococcidae, Coccoidea)*	Profilaktiski: 0.25-1 īpatņi/m²	Ar 2 nedēļu intervālu, īpaši jutīgās kultūrās	Pieauguši īpatņi vai kāpuri iejaukti pildvielā. Uzglabāt +10-15 °C temperatūrā, 1-2 dienas, relatīvais gaisa mitrums virs 85 %
		Nelielas invāzijas gadījumā: 2-3 īpatņi/m²	Trīs reizes ar nedēļas intervālu, tiklīdz atklāj pirmās kolonijas	
		Nopietnas invāzijas gadījumā: 20-50 īpatņi/m²	Trīs reizes ar nedēļas intervālu	

41. Larvanem

Reģ. Nr. 0692, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: entomopatogēnā nematode (*Heterorhabditis bacteriophora*).
Koppert B.V.

Dārzeņi, garšaugi, krāšņumaugi, zemenes, ogulāji (segtās platībās un atklātā laukā)	Vīnogulāju smecernieks *(Otiorhynchus sulcatus)*, lauka maijvabole *(Melolontha melolontha)*	Invāzijas gadījumā: 500 000 īpatņi/m²	Divas reizes, ar 14 dienu intervālu	Nematodes trešā attīstības stadijā speciālā gelā. Uzglabāt tumsā, +2 °C līdz +6 °C temperatūrā
		Spēcīgas invāzijas gadījumā: 1 000 000 īpatņi/m²	Divas reizes, ar 14 dienu intervālu	
Zāliens (ieskaitot golfa laukumu)	Lauka maijvabole *(Melolontha melolontha)*, dārza vabole *(Phyllotretha horticola)*	Invāzijas gadījumā: 500 000 īpatņi/m²	Divas reizes, ar 14 dienu intervālu	
		Spēcīgas invāzijas gadījumā: 1 000 000 īpatņi/m²	Divas reizes, ar 14 dienu intervālu	

1	2	3	4	5

42. Limonikus sistēma

Reģ. Nr. 0693, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: plēsējērce (*Amblydromalus limonicus*).
Biobest Group N.V.

Dārzeņi (izņemot tomātus), garšaugi, dekoratīvie augi, zemenes (segtās platībās)	Tabakas tripsis *(Trips tabaci)*, Kalifornijas tripsis *(Frankliniella occidentalis)*, siltumnīcu baltblusiņa *(Trialeurodes vaporariorum)*, tabakas baltblusiņa *(Bemisia tabaci)*, parastā tīklērce *(Tetranychus urtica)*, zemeņu ērce *(Phytonemus pallidus)*, ērce *(Polyphagotarsonemus latus)*	Produkts maisiņos		Plēsējērces imago iejauktas pildvielās. Uzglabāšana, sargājot no tiešiem saules stariem, temperatūrā +10-15 °C, paciņas līdz 7 dienām, beramais produkts izlietojams ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc saņemšanas
		Profilaktiski: 250 plēsējērces/m²	Vienu līdz divas reizes ar 4 nedēļu intervālu	
		Vispārēja izlaišana: 250 plēsējērces/m²	Vienu līdz divas reizes ar 4 nedēļu intervālu	
		Beramais produkts		
		Vispārēja izlaišana: 50-100 plēsējērces/m²	Vienu līdz divas reizes ar nedēļas intervālu	
		Invāzijas perēkļos: 250 plēsējērces/m²	Vienu līdz divas reizes ar nedēļas intervālu	

43. Macro-Mite

Reģ. Nr. 0645, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: plēsējērce (*Macrocheles robustulus*).
Koppert B.V.

Dārzeņi, krāšņumaugi (segtajās platībās)	Tabakas tripsis *(Thrips tabaci)*, Kalifornijas tripsis *(Frankliniella occidentalis)*	Vispārēja izlaišana: 200	Vienmērīgi izkaisīt uz augsnes. Viena reize	Plēsējērces visās attīstības stadijās iejauktas vermikulītā. Uzglabāt tumsā, +10 °C līdz +15 °C temperatūrā, 1-2 dienas

44. Makrolofus sistēma (Makrolofus-N sistēma)

Reģ. Nr. 0446, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: plēsīgā mīkstblakts (*Macrolophus pygmaeus*).
Biobest Group N.V.

Tomāti (segtajās platībās)	Siltumnīcu baltblusiņa *(Trialeurodes vaporariorum)*, tabakas Baltblusiņa *(Bemisia tabaci)*	Profilaktiski: 0.5-1 (pieauguši īpatņi)	Ar 1-2 nedēļu intervālu, visā platībā, atkārto 2-4 reizes	Pildvielā iejauktas pieaugušas plēsīgās mīkstblaktis vai nimfas. Uzglabāt +8-10 °C temperatūrā
	Tomātu lapu alotājs *(Tuta absoluta)*	Profilaktiski: 1.5-2 (pieauguši īpatņi)	Ar 1-2 nedēļu intervālu, visā platībā, atkārto 2-4 reizes	
	Parastā tīklērce *(Tetranychus urticae)*	Invāzijas perēkļos: 100-500 (nimfas)	Lokāli, pēc vajadzības	

1	2	3	4	5

45. Miglyphus

Reģ. Nr. 0648, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: parazītlapsene (*Digliphus isaea* (Walker)).
Koppert B.V.

Dārzeņi, krāšņumaugi (segtajās platībās)	Lapu alotājmušas *(Agromyzidae)*	Mērena invāzija: 0.25	Pielietot, ja ir vairāk nekā 1 kāpurs/ 10 augiem, vismaz 3 reizes. Intervāls 7 dienas	Pieaugušas parazītlapsenes. Uzglabāt tumsā, +8 °C līdz + 10 °C temperatūrā, 1-2 dienas
		Augsta invāzija: 1	Pielietot, ja ir vairāk nekā 1 kāpurs/ 3 augiem, vismaz 3 reizes. Intervāls 7 dienas	

46. Mikromus sistēma

Reģ. Nr. 0820, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: stūru brūnactiņa (*Mikromus angulatus*).
Biobest Group N.V.

Paprika, gurķi un citi dārzeņi; zemenes, ogulāji, dekoratīvie augi (segtās platībās)	Laputis *(Aphididae)*	Profilaktiski: 0.2-0.4 īpatņi/m^2	Divas līdz trīs reizes ar nedēļas intervālu	Pieauguši īpatņi pildvielā. Uzglabāšana īslaicīgi, temperatūrā +8-10 °C
		Invāzijas gadījumā: 20-50 īpatņi/auga	Vienu reizi nedēļā, invāzijas perēkļos un ap tiem, atkārto pēc vajadzības	

47. Mirical

Reģ. Nr. 0127, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: plēsīgā mīkstblakts (*Macrolophus pygmaeus*).
Koppert B.V.

Dārzeņi, krāšņumaugi, izņemot gerberas (segtajās platībās)	Baltblusiņas *(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)*	Profilaktiskai izlaišanai: 0.25 mīkstblaktis/ m^2	Izlaist mīkstblaktis 2 reizes ar intervālu 14 dienas (kopā ar barību ENTOFOOD)	Plēsīgās mīkstblakts imago un nimfas koka skaidās. Uzglabāt tumsā, temperatūrā no +8 °C-10 °C, ne ilgāk par 1-2 dienām
		Vispārējai izlaišanai: 0.5 mīkstblaktis/m^2	Izlaist mīkstblaktis, kaitēklim parādoties, 2 reizes ar 14 dienu intervālu	
		Invāzijas perēkļos: 5 mīkstblaktis/m^2	Izlaist mīkstblaktis, kaitēklim parādoties, 2 reizes ar 14 dienu intervālu	

1	2	3	4	5

48. Montdorensis sistēma

Reģ. Nr. 0694, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: plēsējērce (*Transeius montdorensis*).
Biobest Group N.V.

Dārzeņi, garšaugi, dekoratīvie augi, zemenes (segtās platībās)	Tabakas tripsis *(Trips tabaci)*, Kalifornijas tripsis *(Frankliniella occidentalis)*, siltumnīcu baltblusiņa *(Trialeurodes vaporariorum)*, tabakas baltblusiņa *(Bemisia tabaci)*, parastā tīklērce *(Tetranychus urtica)*, zemeņu ērce *(Phytonemus pallidus)*, ērce *(Polyphagotarsonemus latus)*, tomātu maurērce *(Aculops lycopersici)*	Produkts maisiņos		Plēsējērces imago iejauktas pildvielās. Uzglabāšana, sargājot no tiešiem saules stariem, temperatūrā +10-15 °C, paciņas līdz 7 dienām, beramais produkts izlietojams ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc saņemšanas
		Profilaktiski: 250 plēsējērces/m^2	Vienu līdz divas reizes ar 4 nedēļu intervālu	
		Vispārēja izlaišana: 250 plēsējērces/m^2	Vienu līdz divas reizes ar 4 nedēļu intervālu	
		Beramais produkts		
		Vispārēja izlaišana: 20-50 plēsējērces/ m^2	Vienu līdz divas reizes ar nedēļas intervālu	
		Invāzijas perēkļos: 50-150 plēsējērces/ m^2	Vienu līdz divas reizes ar nedēļas intervālu	

49. NemaFence Phasma

Reģ. Nr. 0894, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: entomopatogēnā nematode (*Phasmarhabditis californica*).
SIA BASF

Dārzeņi, garšaugi, dekoratīvie koki, dekoratīvie krūmi (kokaudzētavās), zemenes (atklātā laukā, tuneļos), zāliens	Gliemeži *(Gastropoda)*	Profilaktiski: 50 000	Apstrādājiet augsni, kad gliemeži ir aktīvi. Ja nepieciešams atkārtot 3 reizes, ik pēc 2-4 nedēļām	Nematodes (trešajā attīstības stadijā) speciālā gēlā vai pulverveida masā. Uzglabāšanas temperatūra no +1 °C līdz +5 °C
		Zemas invāzijas gadījumā: 150 000	Apstrādājiet augsni, kad gliemeži ir aktīvi. Ja nepieciešams atkārtot 3 reizes, ik pēc 2-6 nedēļām	
		Augstas invāzijas gadījumā: 300 000	Apstrādājiet augsni, kad gliemeži ir aktīvi. Ja nepieciešams atkārtot 3 reizes	

50. Nemaslug

Reģ. Nr. 0687, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: entomopatogēnā nematode (*Phasmarhabditis hermaphrodita*).
SIA BASF

Dārzeņi, krāšņumaugi	Mīkstgliemeži *(Deroceras spp.)*, kailgliemeži *(Arion spp.)*	300 000	Apstrādājiet augsni, kad gliemeži ir aktīvi. Ja nepieciešams, atkārtot ik pēc 6 nedēļām	Nematodes (trešajā attīstības stadijā) speciālā gelā. Uzglabāšanas temperatūra no +1 °C līdz +5 °C

1	2	3	4	5

51. Nemasys

Reģ. Nr. 0688, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: entomopatogēnā nematode (*Steinernema feltiae*).
SIA BASF

Burkāni	Burkānu muša *(Psila rosae)*	166 666	Apliet augus rindās, sākot ar jūnija sākumu. Atkārtoti ik pēc 2 nedēļām, kamēr ir kaitēkļi	Nematodes (trešajā attīstības stadijā) speciālā gelā. Uzglabāšanas temperatūra no +1 °C līdz + 5 °C
Sīpoli	Sīpolu muša *(Delia antigua)*	166 666	Apliet augus rindās, sākot ar jūnija otro pusi. Atkārtoti ik pēc 2 nedēļām, kamēr ir kaitēkļi	
Kāposti	Kāpostu mušas *(Delia spp.)*	166 666	Apliet pēc augu iestādīšanas. Apliet rindas un ap augiem. Atkārtoti ik pēc 2 nedēļām, kamēr ir kaitēkļi	
Dārzeņi, krāšņumaugi, garšaugi	Garkājodu kāpuri *(Tipula spp.)*	166 666	Apliet pēc augu iestādīšanas. Apliet rindas un ap augiem. Atkārtoti ik pēc 2 nedēļām, kamēr ir kaitēkļi	
Dārzeņi, krāšņumaugi	Pūcīšu kāpuri *(Noctuidae)*	166 666	Apliet pēc augu iestādīšanas. Apliet rindas un ap augiem. Atkārtoti ik pēc 2 nedēļām, kamēr ir kaitēkļi	
Dārzeņi, krāšņumaugi, garšaugi	Trūdodiņu kāpuri *(Sciaridae)*	166 666	Apliet podus, audzēšanas maisus vai augsni. Atkārtoti ik pēc 2 nedēļām, kamēr ir kaitēkļi	
Dārzeņi, krāšņumaugi, garšaugi	Skudras *(Formicidae)*	166 666	Apliet augsni vai tieši skudru pūzni. Skudras meklēs jaunu vietu skudru pūžņa veidošanai. Ja nepieciešams, veikt atkārtotu apstrādi pēc 2 nedēļām	
Dārzeņi, krāšņumaugi, ogulāji	Tauriņu kāpuri *(Lepidoptera)*	166 666	Apsmidzināt augus, kad kāpuri ir redzami. Nepieciešama apstrāde katru nedēļu, līdz visi kaitēkļi ir izšķīlusies	
Ogulāji	Zāģlapsenes *(Tenthredinidae)*	166 666	Apsmidzināt augus, kad kāpuri ir redzami. Nepieciešama apstrāde katru nedēļu, līdz visi kaitēkļi ir izšķīlusies	
Dārzeņi, krāšņumaugi, garšaugi	Tripši *(Thysanoptera)*	166 666	Apsmidzināt augus, kad kāpuri ir redzami. Nepieciešama apstrāde katru nedēļu, līdz visi kaitēkļi ir izšķīlusies	
Ābeles, bumbieres	Ābolu tinējs *(Cydia pomonella)*	625 000 vai līdz 16 koki	Apsmidzināt stumbru, skeletzarus un augsni zem vainaga. Nepieciešams veikt apstrādes katru nedēļu, kopā 3 apstrādes	

1	2	3	4	5

52. Nemasys C

Reģ. Nr. 0690, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: entomopatogēnā nematode (*Steinernema carpocapsae*).
SIA BASF

Ābeles, bumbieres	Ābolu tinējs *(Cydia pomonella)*	150 000	Apsmidzināt stumbru, skeletzarus un augsni zem koka vainaga no jūlija beigām līdz septembrim, kamēr temperatūra ir virs 14 °C	Nematodes (trešajā attīstības stadijā) speciālā gelā. Uzglabāšanas temperatūra no +1 °C līdz + 5 °C
Dārzeņi, krāšņumaugi	Krastmalmušas *(Ephydridae)*	500 000	Apstrādāt augsni/ substrātu parādoties kaitēkļiem. Atkārtoti apstrādāt ik pēc nedēļas	
Dārzeņi	Pūcīšu kāpuri *(Noctuidae),* kāpostu pūcītes kāpuri *(Mamestra brassicae)*	500 000	Apsmidzināt augus, parādoties kāpuriem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-7 dienām vai 7-14 dienām	
Dārzeņi, krāšņumaugi	Pūcīšu kāpuri *(Noctuidae),* sviļņu kāpuri *(Pyralidae)*	500 000	Apliet augsni parādoties kāpuriem. Atkārtoti apliet pēc 5-7 dienām vai 7-14 dienām	

53. Nemasys H

Reģ. Nr. 0686, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: entomopatogēnā nematode (*Heterorhabditis bacteriophora*).
SIA BASF

Augsne	Vīnogulāju smecernieks *(Otiorhynchus sulcatus)*	1 000 000/m²	Apliet augsni, kad kaitēklis ir kāpura vai kūniņas stadijā. Ja nepieciešams, atkārtot pēc 4 nedēļām	Nematodes (trešajā attīstības stadijā) speciālā gelā. Uzglabāšanas temperatūra no +1 °C līdz +5 °C
Podi, konteineri	Vīnogulāju smecernieks *(Otiorhynchus sulcatus*	500 000/m²	Apliet augsni, kad kaitēklis ir kāpura vai kūniņas stadijā. Ja nepieciešams, atkārtot pēc 4 nedēļām	
Zemenes	Vīnogulāju smecernieks *(Otiorhynchus sulcatus)*	25 000/augu	Apliet katru augu atsevišķi, kad kaitēklis ir kāpura vai kūniņas stadijā. Ja nepieciešams, atkārtot pēc 4 nedēļām	

1	2	3	4	5

54. Nemasys L

Reģ. Nr. 0685, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: entomopatogēnā nematode (*Steinernema kraussei*).
SIA BASF

Augsne	Vīnogulāju smecernieks *(Otiorhynchus sulcatus)*	1 000 000/m^2	Apliet augsni, kad kaitēklis ir kāpura vai kūniņas stadijā. Ja nepieciešams, atkārtot pēc 4 nedēļām	Nematodes (trešajā attīstības stadijā) speciālā gelā. Uzglabāšanas temperatūra no +1 °C līdz +5 °C
Podi, konteineri	Vīnogulāju smecernieks *(Otiorhynchus sulcatus*	500 000/m^2	Apliet katru augu atsevišķi, kad kaitēklis ir kāpura vai kūniņas stadijā. Ja nepieciešams, atkārtot pēc 4 nedēļām	
Zemenes	Vīnogulāju smecernieks *(Otiorhynchus sulcatus*	25 000/augu	Apliet katru augu atsevišķi, kad kaitēklis ir kāpura vai kūniņas stadijā. Ja nepieciešams, atkārtot pēc 4 nedēļām	

55. Nemasys No Ants

Reģ. Nr. 0689, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: entomopatogēnā nematode (*Steinernema feltiae*).
SIA BASF

Dārzeņi, krāšņumaugi, garšaugi, zāliens	Skudras *(Formicidae)*	1 000 000	Apliet augsni vai tieši skudru pūzni. Skudras meklēs jaunu vietu skudru pūžņa veidošanai. Skudras netiek iznīcinātas, tikai atbaidītas	Nematodes (trešajā attīstības stadijā) speciālā gelā. Uzglabāšanas temperatūra no +1 °C līdz +5 °C

56. Orius sistēma

Reģ. Nr. 0467, reģ. klase 3
Dzīvais organisms: laupītājblakts (*Orius laevigatus*).
Biobest Group N.V.

Gurķi, paprika, zemenes, puansetijas, gerberas, rozes, stādi kokaudzētavās un stādu audzētavās (segtajās platībās)	Tripši *(Thysanoptera)*	Profilaktiski: 0.5-3	Izlaiž vietās, kur iepriekš novērota kaitēkļu parādīšanās, atkārto 2-4 reizes	Blaktis iejauktas griķos un vermikulītā. Uzglabāt tumsā, +10-15 °C temperatūrā, 1-2 dienas
		Zemas invāzijas gadījumā: 3-5	Invāzijas punktos un ap tiem, reizi nedēļā, atkārto pēc vajadzības 1-3 reizes	
		Augstas invāzijas gadījumā: 5-10	Invāzijas punktos un ap tiem, reizi nedēļā, atkārto pēc vajadzības 1-3 reizes	

57. Pangodiņš

Reģ. Nr. 0062, reģ. klase 3.
Aktīvā sastāvdaļa: plēsīgais pangodiņš (*Aphidoletes aphidimyza*).
IK „Ciklaneda BS"

Gurķi, tomāti, pipari, salāti, garšaugi, dekoratīvās kultūras augu mājās	Laputis *(Aphidadea)*	40 kūniņas/m^2	Izlikt kūniņas augu mājā, kaitēklim parādoties	Kūniņas. Uzglabāt +8 °C temperatūrā, pie gaisa mitruma 70 %, ne ilgāk par 10 dienām

1	2	3	4	5

58. Sferoforia sistēma

Reģ. Nr. 0660, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: ziedmuša (*Spaerophoria rueppellii*).
Biobest Group N.V.

Tomāti, paprika, gurķi, kabači, baklažāni un citi dārzeņi; dekoratīvie augi (atklātā laukā un segtās platībās)	Laputis *(Aphididae)*	Profilaktiski (laputis nav redzamas): 100 ziedmušas/ha	Vienu reizi nedēļā, 6 reizes, pudele vienā izlaišanas punktā. Augiem jāizdala nektārs un ziedputekšņi ziedmušu barībai	Ziedmušu kūniņas uz strēmelēm. Uzglabāšana tumsā, temperatūrā +8-10 °C, 24 stundas
		Vispārējai izlaišanai: 300-400 ziedmušas/ha	Vienu reizi nedēļā, 3 reizes, pudele vienā izlaišanas punktā, invāzijas perēkļos. Augiem jāizdala nektārs un ziedputekšņi ziedmušu barībai	

59. Spical

Reģ. Nr. 0633, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: plēsējērce (*Neoseiulus californicus*).
Koppert B.V.

Dārzeņi, krāšņumaugi, (segtajās platībās)	Parastā tīklērce *(Tetranychus urtica),* sarkanā augļu koku tīklērce *(Panonychus ulmi),* zemeņu ērce *(Tarsonemus pallidus),* sarkanā citrusaugu ērce *(Panonychus citri),* ērce *(Polyphagotarsonemus latus)*	Profilaktiski: 25 plēsējērces/m^2	Vairākas reizes, intervāls 21 diena	Plēsējērces visās mobilajās stadijās inertā materiālā. Uzglabāšana tumsā, temperatūrā +8 °C-10 °C, 1-2 dienas
		Vispārēja izlaišana: 100 plēsējērces/m^2	Vienu reizi. Lietot kopā ar Spidex	
		Invāzijas perēkļos: 200 plēsējērces/m^2	Vienu reizi. Lietot kopā ar Spidex	

60. Spical-Plus

Reģ. Nr. 0634, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: plēsējērce (*Neoseiulus californicus*).
Koppert B.V.

Dārzeņi, krāšņumaugi, (segtajās platībās)	Parastā tīklērce *(Tetranychus urtica),* sarkanā augļu koku tīklērce *(Panonychus ulmi),* zemeņu ērce *(Tarsonemus pallidus),* sarkanā citrusaugu ērce *(Panonychus citri),* ērce *(Polyphagotarsonemus latus)*	Profilaktiski: iepakojums uz 2.5 m^2	Vairākas reizes, intervāls 28-42 dienas	Plēsējērces kopā ar žāvēto augļu ērcītēm klijās. Uzglabāšana tumsā, temperatūrā +17 °C-20 °C, 1-2 dienas, nodrošinot labu ventilāciju
		Vispārēja izlaišana: iepakojums uz 2.5 m^2	Vairākas reizes, intervāls 28 dienas. Lietot kopā ar Spidex	
		Invāzijas perēkļos: iepakojums uz 1 m^2	Vairākas reizes, intervāls 28 dienas. Lietot kopā ar Spidex	

1	2	3	4	5

61. Spidend

Reģ. Nr. 0647, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: pangodiņš (*Feltiella acarisuga* (Vallot)).
Koppert B.V.

Dārzeņi, krāšņumaugi (segtajās platībās)	Tīklērces *(Tertranychus urticae, Tetranychus spp.)*	Mērena invāzija: 0.25	Pielietot tikai invāzijas perēkļos, vismaz 3 reizes. Intervāls 7 dienas	Lapas ar dzīvā organisma kūniņām. Uzglabāt tumsā, +8 °C līdz +10 °C temperatūrā, 1-2 dienas
		Augsta invāzija: 10	Pielietot visā platībā, vismaz 3 reizes. Intervāls 7 dienas	

62. Spidex Vital

Reģ. Nr. 0128, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: plēsējērce (*Phytoseiulus persimilis*).
Koppert B.V.

Dārzeņi, krāšņumaugi (segtajās platībās)	Tīklērces *(Tetranychus urticae, Tetranychus cinnabarinus)*	Profilaktiskai izlaišanai: 2 plēsējērces/m^2	Izlaist atkārtoti ar intervālu 14 dienas, nelielās siltumnīcu saimniecībās, gadījumos, kad var prognozēt tīklērces parādīšanos	Pieaugušas plēsējērces iejauktas koka skaidiņās. Uzglabāt tumsā, temperatūrā no +8 °C-10 °C, ne ilgāk par 1-2 dienām
		Vispārējai izlaišanai: 6 plēsējērces/m^2	Izlaist kaitēklim parādoties, vienu līdz divas reizes ar intervālu 7 dienas.	
		Invāzijas perēkļos: 20-50 plēsējērces/m^2	Izlaist kaitēkļu invāzijas perēkļos, divas reizes ar intervālu 7 dienas	

63. Steinernema sistēma

Reģ. Nr. 0661, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: entomopatogēnā nematode (*Steinernema feltiae*).
Biobest Group N.V.

Tomāti, paprika, gurķi, kabači, baklažāni un citi dārzeņi; garšaugi, krizantēmas, gerberas un citi ziedaugi; dekoratīvie koki un krūmi kokaudzētavās (segtās platībās), sēnes (sēņu audzētavās segtās platībās), zemenes (atklātā laukā un segtās platībās)	Smidzināšana pa lapām			Nematodes (trešajā attīstības stadijā) papildvielā. Uzglabāšanas temperatūra no +2 °C līdz +6 °C, tumsā
	Tripši *(Thysanoptera)*, lapu alotājmušas *(Liriomyza spp.)*	Vispārējai izlaišanai: 125 000 nematodes/m^2	Viena reize nedēļā	
		Invāzijas perēkļos: 250 000 nematodes/m^2	2-3 reizes ar 7 dienu intervālu	
	Augsnes/substrāta apstrāde			
	Trūdodiņi *(Sciaridae)*, smecernieki *(Otiorhynchus spp.)*	Vispārējai izlaišanai: 1 000 000 nematodes/m^2	Vienu reizi pēc sēšanas/ stādīšanas. Lēni augošām kultūrām atkārtot pēc 6 nedēļām	

1	2	3	4	5

64. Svirski sistēma

Reģ. Nr. 0441, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: plēsējērce (*Amblyseius swirski).*
Biobest Group N.V.

Gurķi, paprika, zemenes, salāti (segtajās platībās)	Siltumnīcu baltblusiņa *(Trialeurodes vaporariourum)*, tabakas baltblusiņa *(Bemisia tabaci)*, tripši *(Frankliniella occidentalis)*	Beramais produkts:		
		Profilaktiski: 20	Izber uz lapām visā platībā, atkārto pēc vajadzības	Plēsējērču imago beramā veidā tūlītējai izlaišanai. Uzglabāt tumša telpā, horizontāli, temperatūrā +15 °C, pie relatīvā mitruma 75 %
		Invāzijas gadījumā: 100	Invāzijas punktos, atkārto pēc vajadzības	
		Produkts maisiņos:		
		Profilaktiski: 250	Iekar augos visā platībā, atkārto pēc 4 nedēļām.	Plēsējērču imago maisiņos barības maisījumā. Uzglabāt tumša telpā, horizontāli, temperatūrā +15 °C, pie relatīvā mitruma 75 %

65. Swir PRO5

Reģ. Nr. 0736, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: plēsējērce (*Ambliseius swirskii*).
SIA SPTS

Krāšņumaugi, dārzeņi, garšaugi, zemenes, krāšņumaugu stādi, kokaugu stādi kokaudzētavās (segtajās platībās)	Tripši *(Thysanoptera), b*altblusiņas *(Trialeurodes vaporariorum, Bremisia tabaci),* parastā tīklērce *(Tetranychus urticae)*	Profilaktiski: 25 plēsējērces/m^2	Vairākas reizes, intervāls 3 nedēļas	Plēsējērces iejauktas klijās. Uzglabāt tumsā, +12 °C līdz +15 °C temperatūrā, 1-2 dienas. Nodrošināt ventilāciju, lai neuzkrājas CO_2
		Vispārēja izlaišana: 50 plēsējērces/m^2	Izlaiž vienu reizi, kad tripsis vai baltblusiņa parādās	
		Invāzijas perēkļos: 100 plēsējērces/m^2	Izlaiž vienu reizi invāzijas perēkļos, kad tripsis vai baltblusiņa parādās	

66. Swir PRO5 LS

Reģ. Nr. 0737, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: plēsējērce (*Ambliseius swirskii*).
SIA SPTS

Krāšņumaugi, dārzeņi, garšaugi, zemenes, krāšņumaugu stādi, kokaugu stādi kokaudzētavās (segtajās platībās)	Tripši *(Thysanoptera), b*altblusiņas *(Trialeurodes vaporariorum, Bremisia tabaci),* parastā tīklērce *(Tetranychus urticae)*	Profilaktiski: 125 plēsējērces/m^2	Izlaiž 1-2 reizes ar 4-6 nedēļu intervālu	Plēsējērces iejauktas klijās kopā ar barību. Uzglabāt tumsā, temperatūrā +15 °C, līdz 7 dienām. Nodrošināt ventilāciju, lai neuzkrājas CO_2
		Vispārēja izlaišana: 125 plēsējērces/m^2	Izlaiž 1-2 reizes ar 4 nedēļu intervālu	
		Invāzijas perēkļos: 250 plēsējērces/m^2	Izlaiž pēc vajadzības, ar 4 nedēļu intervālu	

1	2	3	4	5

67. Swirskii-Mite

Reģ. Nr. 0620, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: plēsējērce (*Ambliseius swirskii*).
Koppert B.V.

Krāšņumaugi, dārzeņi (izņemot tomātus) (segtajās platībās)	Baltblusiņas *(Trialeurodes vaporariorum, Bremisia tabaci),* tripši *(Thysanoptera)*	Profilaktiski: 25	Izlaiž vienu reizi	Plēsējērces un nimfas iejauktas klijās. Uzglabāt tumsā, +12 līdz +14 °C temperatūrā, 1-2 dienas. Nodrošināt ventilāciju, lai neuzkrājas CO_2
		Vispārēja izlaišana: 50	Izlaiž vienu reizi, kad tripsis vai baltblusiņa parādās	
		Invāzijas perēkļos: 100	Izlaiž vienu reizi invāzijas perēkļos, kad tripsis vai baltblusiņa parādās. Ieteicams kombinēt ar citiem dzīvos organismus saturošiem līdzekļiem	

68. Swirskii-Mite LD

Reģ. Nr. 0621, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: plēsējērce (*Ambliseius swirskii*).
Koppert B.V.

Gurķi, pipari, baklažāni, rozes, gerberas (segtajās platībās)	Baltblusiņas *(Trialeurodes vaporariorum, Bremisia tabaci),* tripši *(Thysanoptera)*	Profilaktiski: iepakojums uz 2.5 m^2	Izlaiž ar 28-42 dienu intervālu	Plēsējērces un žāvēto augļu ērces iejauktas klijās. Uzglabāt tumsā, +10 līdz +15 °C temperatūrā, 1-2 dienas. Nodrošināt ventilāciju, lai neuzkrājas CO_2
		Vispārēja izlaišana: iepakojums uz 2.5 m^2	Izlaiž ar 28 dienu intervālu	
		Invāzijas perēkļos: -	Lietot Swrskii-Mite Plus	

69. Swirskii-Mite Plus

Reģ. Nr. 0622, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: plēsējērce (*Ambliseius swirskii*).
Koppert B.V.

Krāšņumaugi, dārzeņi (izņemot tomātus) (segtajās platībās)	Baltblusiņas *(Trialeurodes vaporariorum, Bremisia tabaci),* tripši *(Thysanoptera)*	Profilaktiski: iepakojums uz 2.5 m^2	Izlaiž ar 28-42 dienu intervālu	Plēsējērces un žāvēto augļu ērces iejauktas klijās. Uzglabāt tumsā, +10 līdz +15 °C temperatūrā, 1-2 dienas. Nodrošināt ventilāciju, lai neuzkrājas CO_2
		Vispārēja izlaišana: iepakojums uz 2.5 m^2	Izlaiž ar 28 dienu intervālu, kad tripši vai baltblusiņa parādās	
		Invāzijas perēkļos: iepakojums uz 1 m^2	Izlaiž ar 28 dienu intervālu invāzijas perēkļos. Ieteicams kombinēt ar citiem dzīvos organismus saturošiem līdzekļiem	

1	2	3	4	5

70. Thripex (Thripex-Plus)

Reģ. Nr. 0129, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: plēssējērce (*Neoseiulus cucumeris*).
Koppert B.V.

Dārzeņi, krāšņumaugi (segtajās platībās) (Thripex)	Tripši *(Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis)*	Profilaktiskai izlaišanai: 50 plēsējērces/m^2	Izlaist plēsējērces atkārtoti ar 14 dienu intervālu	Plēsējērces kopā ar graudu ērci klijās. Uzglabāt tumsā, temperatūrā no +10 °C-15 °C, ne ilgāk par 1-2 dienām
		Vispārējai izlaišanai: 100 plēsējērces/m^2	Izlaist plēsējērces, kaitēklim parādoties, ar 14 dienu intervālu	
		Invāzijas perēkļos: 100 plēsējērces/m^2	Izlaist plēsējērces, kaitēklim parādoties, ar 7 dienu intervālu	
Dārzeņi, krāšņumaugi (segtajās platībās) (Thripex-Plus)	Tripši *(Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis)*	Profilaktiskai izlaišanai: 1 iepakojums (1000 plēsējērces/2.5 m^2	Izlaist plēsējērces ar 42 dienu intervālu. Ziedošiem augiem likt vienu reizi	Plēsējērces kopā ar graudu ērci klijās aploksnē. Uzglabāt tumsā, temperatūrā no +10 °C-15 °C, ne ilgāk par 1-2 dienām
		Vispārējai izlaišanai: 1 iepakojums (1000 plēsējērces/2.5 m^2	Izlaist plēsējērces ar 35 dienu intervālu	
		Invāzijas perēkļos: 1 iepakojums (1000 plēsējērces/0.75 m^2	Izlaist plēsējērces ar 28 dienu intervālu	

71. Thripor-L

Reģ. Nr. 0646, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: laupītājblakts *(Orius laevigatus)*
Koppert B.V.

Dārzeņi, krāšņumaugi (segtajās platībās)	Tabakas tripsis *(Thrips tabaci),* Kalifornijas tripsis *(Frankliniella occidentalis*	Profilaktiski: 0.5	Izlaist vismaz 2 reizes. Intervāls 14 dienas. Vienu reizi var izlaist kultūrās, kurās pieejami putekšņi	Pieauguši īpatņi un nimfas griķu sēnalās un vermikulītā. Uzglabāt tumsā, +8 °C līdz +10 °C temperatūrā, 1-2 dienas
		Vispārēja izlaišana: 1	Izlaist vismaz 2 reizes. Intervāls 14 dienas	
		Invāzijas perēkļos: 10	Izlaist vienu reizi invāzijas perēkļos	

72. Trihogramma

Reģ. Nr. 0143, reģ. klase 3.
Dzīvais organisms: spožlapsenīte (*Trichogramma embryophagum* (Hartig)).
SIA "Bioefekts"

Ābeles	Ābolu tinējs *(Cydia pomonella)*	0.5-1.0 g/ha	Izlaist uz ābelēm, kad kaitēklis izlidojis, 2 reizes ar intervālu 7-10 dienas	Ar trihogrammu parazitētu graudu kodes olas. Uzglabāt tumsā, +5 °C līdz +6 °C temperatūrā, ne ilgāk par 3 nedēļām
Zirņi	Zirņu tumšais tinējs *(Cydia nigricana)*	0.5-1.0 g/ha	Izlaist zirņiem vienu reizi ziedēšanas sākumā. Ja zirņi bagātīgi zied, ieteicams izlikt atkārtoti	
Kāposti, krustziežu dzimtas dārzeņi	Kāpostu baltenis *(Pieris brassicae),* rāceņu baltenis *(Pieris rapae),* kāpostu pūcīte *(Mamestra barssicae)*	0.5-1.0 g/ha	Izlaist kāpostos un krustziežu dārzeņos 1-2 reizes, kaitēkļu lidošanas sākumā	

FEROMONI

Isonet Z

Reģ. Nr. 0918, reģ. klase 3.
Darbīgās vielas: (E,Z)-2,13-oktadekadiēn-1-ilacetāts, min. 755 g/kg,
(E,Z)- 3,13-oktadekadiēn-1-ilacetāts, min. 30 g/kg.
Feromons.
CBC (Europe) S.r.l.

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Jāņogas, upenes, ērkšķogas	Jāņogu stiklspārnis *(Synanthedon tipuliformis)*	300 dispenseri/ha	Izvietot dispenserus pirms kaitēkļu ziemojošās paaudzes izlidošanas. Kaitēkļu izlidošanas sākumu nosaka, izvietojot feromonu slazdus	-	1
Ābeles, bumbieres, plūmes, dekoratīvie koki	Ābeļu urbējs *(Zeuzera pyrina)*	300 dispenseri/ha	Izvietot dispenserus pirms kaitēkļu ziemojošās paaudzes izlidošanas. Kaitēkļu izlidošanas sākumu nosaka, izvietojot feromonu slazdus	-	1

AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI, KURIEM PAPLAŠINĀTA DARBĪBAS JOMA, IEKĻAUJOT TAJĀ MAZOS LIETOJUMUS*

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums	Reģ./PT atļaujas Nr.	'Mazais lietojums'
2,4-D Nufarm	0095	Atļauts lietot nezāļu ierobežošanai **pļavas lapsastes***, **bezakotu lāčauzas***, **kamolzāles***, **augstās dižauzas***, **timotiņa***, **pļavu auzenes***, **pļavu skarenes*** sējumos
Accurate 200 WG	0342	Atļauts lietot latvāņa ierobežošanai **ceļa malās***, **mežmalās***, **lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs***, **zemēs zem elektrolīniju pārvadiem***, kā arī nezāļu ierobežošanai **linu*** sējumos
Acetami 20 SG	55	Atļauts lietot **ziemas ripša***, **vasaras ripša*** sējumos, **lauka pupas*** sējumos, kā arī **ķiršu mušu*** ierobežošanai ķiršu stādījumos, **tinēju*** un **lapgraužu*** ierobežošanai stādu, dēstu (kokaudzētavās), Ziemassvētku eglīšu (atklātā laukā) sējumos un stādījumos
Acetazol 20 SG	60	Atļauts lietot **ziemas ripša***, **vasaras ripša*** sējumos, **lauka pupas*** sējumos, kā arī **ķiršu mušu*** ierobežošanai ķiršu stādījumos, **tinēju*** un **lapgraužu*** ierobežošanai stādu, dēstu (kokaudzētavās), Ziemassvētku eglīšu (atklātā laukā) sējumos un stādījumos
Acetazol Extra	63	Atļauts lietot arī **lauka pupu***, **zirņu*** (svaigam patēriņam ar/bez pākstīm, graudiem) sējumos un **skuju koku*** jaunaudzēs
Afrodyta 250 SC	0674	Atļauts lietot arī **vasaras rudzu*** sējumos, **ziedkāpostu***, **brokoļu***, **lapu kāpostu***, **Briseles kāpostu***, **galviņkāpostu***, **Pekinas kāpostu***, **Ķīnas kāpostu***, **seleriju*** (sakņu), **sīpolu***, **puravu*** stādījumos un **zirņu*** (svaigam patēriņam bez pākstīm), **pupiņu*** (svaigam patēriņam bez pākstīm) sējumos
Agil 100 EC	0003	Atļauts lietot **ķimeņu*** sējumos
Aliette	0650	Atļauts lietot **aveņu*** (jaunie stādījumi, atklātā laukā) stādījumos
Amistar 250 SC	0187	Atļauts lietot **ķiploku***, **ķirbju***, **melones***, **arbūzu***, **paprikas***, **salātu*** (atklātā laukā un segtās platībās), **krizantēmu*** (atklātā laukā un segtās platībās) stādījumos
Amistar Gold	0632	Atļauts lietot **lopbarības biešu*** un **galda biešu*** sējumos
Arrva	0695	Atļauts lietot arī **zāliena*** sējumos
Azuba	0828	Atļauts lietot arī **ķiploku***, **ķirbju***, **meloņu***, **arbūzu***, **paprikas*** (segtās platībās) stādījumos, **salātu*** (atklātā laukā, segtās platībās) sējumos un stādījumos, **krizantēmu*** (atklātā laukā, segtās platībās) stādījumos
Barracuda	0892	Atļauts lietot arī saldās **kukurūzas*** sējumos
Basagran 480	0024	Atļauts lieto arī **dārza pupiņu***, **dārza pupu*** (svaigas ar/bez pākstīm, graudiem) sējumos; **zirņugraudaugu mistru*** (graudiem) sējumos, **lucernas*** (sēklu lauki) sējumos, **sojas*** sējumos, **sīpolu***, **šalotes sīpolu*** un **ķiploku*** sējumos un stādījumos
Benafar	0915	Atļauts lietot arī **ziemas ripša*** un **vasaras ripša*** sējumos
Benevia 100 OD	0856	Atļauts lietot arī **kolrābju*** stādījumos
Benz	0867	Atļauts lietot arī **ziņu*, pupu* (zaļi ar/bez pākstīm, graudiem)** sējumos
Beret 025 FS	0852	Atļauts lietot **zirņu***, **lauka pupu*** un **lupīnu*** sēklu kodināšanai, kā arī **fomozes** (*Phoma exigua*)*, **paugurainā kraupja** (*Polyscytalum pustulans*)* un **parastā kraupja** (*Steptomyces scabies*)* ierobežošanai kartupeļos
Boom efekt 360 SL	0881	Atļauts lietot arī **jāņogu***, **upeņu***, **ērkšķogu***, **krūmmelleņu*** stādījumos
Boxer 800 EC	0271	Atļauts lietot **lupīnu***, **lauka pupu***, **burkānu***, **sīpolu***, **ķiploku*** un **saulespuķu*** sējumos un **sakņu seleriju*** un **kātu seleriju*** stādījumos
Buteo Start	0710	Atļauts lietot arī **ziemas ripsim*** un **vasaras ripsim***
Butisan 400	0037	Atļauts lietot **Pekinas kāpostu*** un **Ķīnas kāpostu*** sējumos un stādījumos
Butoxone	0138	Atļauts lietot **pupu***, **baltā āboliņa***, **sarkanā āboliņa***, **galegas*** sējumos
Candit	0197	Atļauts lietot **tomātu*** (segtās platībās), **paprikas*** (segtās platībās), **krizantēmu (atklātā laukā*** un segtās platībās), **begoniju*** (atklātā laukā un segtās platībās), **neļķu*** (atklātā laukā un segtās platībās) un **gerberu*** (atklātā laukā un segtās platībās) stādījumos, kā arī miltrasas ierobežošanai **ozoliem***
Carnadine Extra	0812	Atļauts lietot arī **lauka pupu***, **zirņu*** (svaigam patēriņam ar/bez pākstīm, graudiem) sējumos un **skuju koku*** jaunaudzēs

Clematis	0753	Atļauts lietot **spinātu*** (sēklai) un **redīsu*** (sēklai) sējumos
Clentiga	0842	Atļauts lietot **ziemas ripša*** un **vasaras ripša*** sējumos
Cliophar 600 SL	0665	Atļauts lietot arī **zemeņu***, **egļu*** (kokaudzētavās) un **baltegļu*** (kokaudzētavās) stādījumos
Clomate	0732	Atļauts lietot **spinātu*** (sēklai) un **redīsu*** (sēklai) sējumos
Conaxis	0773	Atļauts lietot arī **sojas*** sējumos
Conclude AZT 250 SC	0717	Atļauts lietot ķiploku*, ķirbju*, **melones***, **arbūzu***, **paprikas***, **salātu*** (atklātā laukā un segtās platībās), **krizantēmu*** (atklātā laukā un segtās platībās) stādījumos
Coragen 20 SC	0755	Atļauts lietot **pastinaku***, **sakņu pētersīļu***, **sakņu seleriju***, **galda biešu***, **mārrutku***, **redīsu***, **kāļu***, **rāceņu***, **topinambūru*** sējumos un stādījumos, kā arī **biešu mušas*** (*Pegomya betae*) un **alotājmušas*** (*Liriomyza spp.*) ierobežošanai, **krāšņumaugu***, **dekoratīvo koku un krūmu*** sējumos un stādījumos, kā arī **lapkodes*** (*Lyonetiidae*) ierobežošanai ābeļu un bumbieru stādījumos
Corum	0729	Atļauts ierobežot nezāles arī **lēcu*** un **sojas*** sējumos
Crown MH	0900	Atļauts lietot arī **ķiploku*** un **šalotes sīpolu*** sējumos un stādījumos, **burkānu*** un **pastinaku*** sējumos
Cycocel 750	0096	Atļauts lietot **stiebrzāļu*** sējumos sēklai
Darby	0786	Atļauts lietot nezāļu ierobežošanai **pļavas lapsastes***, **bezakotu lāčauzas***, **kamolzāles***, **augstās dižauzas***, **timotiņa***, **pļavu auzenes***, **pļavu skarenes*** sējumos
Delmetros 100 SC	0675	Atļauts lietot arī **galviņkāpostu*** stādījumos
Devrinols s.k.	0252	Atļauts lietot arī **galviņkāpostu***, **ziedkāpostu***, **brokoļu***, **Briseles kāpostu***, **Ķīnas kāpostu***, **upeņu***, **jāņogu***, **ērkšķogu***, **aveņu***, **krūmmelleņu***, **ābeļu***, **bumbieru***, **plūmju***, **ķiršu***, **zemeņu***, **zirņu*** un **pupu*** stādījumos
Difcor 250 EC	0580	Atļauts lietot **galviņkāpostu***, **ziedkāpostu***, **brokoļu***, **Briseles kāpostu***, **seleriju*** (kātu), **burkānu***, **pētersīļu*** (sakņu), **pastinaku***, **mārrutku***, **seleriju*** (sakņu), **kāļu***, **rāceņu***, **melno rutku***, **galda biešu***, **cigoriņu*** (sakņu), **sparģeļu***, **puravu***, **mangoldu***, **rožu*** (atklātā laukā un segtās platībās), **krāšņumaugu*** (atklātā laukā un segtās platībās) sējumos un stādījumos
DiPel DF	0760	Atļauts lietot arī **topinambūru***, **sīpolu***, **ķiploku***, **plūmju***, **ķiršu***, **upeņu***, **jāņogu***, **ērkšķogu***, **smiltsērkšķu***, **kazeņu***, **aroniju***, **mežrozīšu***, **zemeņu***, **aveņu***, **krūmmelleņu***, **garšaugu***, **dekoratīvo augu*** un **lapu koku*** stādījumos
Dynamo	0827	Atļauts lietot **plūmju***, **upeņu***, **jāņogu***, **ērkšķogu*** un **aveņu*** stādījumos
Effector	0134	Atļauts lietot **plūmju***, **upeņu***, **jāņogu***, **ērkšķogu*** un **aveņu*** stādījumos
Elatus Era	0552	Atļauts lietot arī **lēcu*** (graudiem) sējumos
Emin dārzam **Mavrik Vita**	31	Atļauts lietot **krāšņumaugu*** stādījumos atklātā laukā
Emin dārzam **Revus 250 SC**	26	Atļauts lietot **gurķu***, **kabaču***, **cukīni***, **patisonu*** un **ķirbju*** (segtās platībās) sējumos un stādījumos
Emin dārzam **Score 250 EC**	33	Atļauts ierobežot **bumbieru-kadiķu rūsu*** (*Gymnosporangium fuscum*) bumbieru stādījumos. Atļauts lietot arī **burkānu***, **seleriju*** (sakņu), **sīpolu***, **ķiploku***, **šalotes***, **galda biešu*** un **krizantēmu*** (gan atklātā laukā, gan segtās platībās) sējumos un stādījumos
Evure	0577	Atļauts lietot **krāšņumaugu*** (atklātā laukā) stādījumos
Focus Ultra	0065	Atļauts lietot **vasaras ripša***, **mārrutku***, **pastinaku***, **selerijas*** (sakņu), **kāļu***, **rāceņu***, **turnepšu***, **ķiploku***, **krāšņumaugu***, **pētersīļu*** (lapu), **selerijas*** (kātu, lapu), **salātu*** sējumos un stādījumos, **upeņu***, **jāņogu***, **ērkšķogu***, **aveņu***, **krūmmelleņu*** stādījumos
Fortune	0776	Atļauts lietot **krūmcidoniju***, **smiltsērkšķu***, **krūmmelleņu***, **dzērveņu*** stādījumos, **cigoriņu*** (sakņu), **sojas***, **sarkanā āboliņa***, **baltā āboliņa***, **bastarda āboliņa***, **sarkanās auzenes***, **griķu***, **ķimeņu*** (sējas gadā) sējumos
Fraxion	0902	Atļauts lietot arī saldās **kukurūzas*** sējumos
Fusilade Forte 150 EC	0182	Atļauts lietot nezāļu ierobežošanai **krūmcidoniju***, **smiltsērkšķu***, **krūmmelleņu***, **dzērveņu***, **cigoriņu*** (sakņu), **sojas***, **sarkanā āboliņa***, **baltā āboliņa***, **bastarda āboliņa***, **sarkanās auzenes*** (sēklai), **griķu***, **ķimeņu*** (sējas gadā) sējumos un stādījumos
Gazelle 20 SG	0871	Atļauts lietot arī **ziemas ripša***, **vasaras ripša*** un **lauka pupu*** sējumos, **ķiršu mušas*** ierobežošanai ķiršu stādījumos, **tinēju*** un **lapgraužu*** ierobežošanai stādu, dēstu (kokaudzētavās), Ziemassvētku eglīšu (atklātā laukā) sējumos un stādījumos

Gepard 50 EC	0607	Atļauts lietot **cukurbiešu***, **lopbarības biešu***, **galda biešu***, **topinambūru***, **saulespuķu***, **sojas***, **burkānu***, **selerijas*** (sakņu), **mārrutku***, **pastinaku***, **pētersīļu*** (sakņu), **redīsu***, **kāļu***, **rāceņu*** sējumos, **sīpolu***, **šalotes sīpolu***, **ķiploku***, **salātu***, **endīviju***, **rukolas***, **brūno sinepju*** sējumos un stādījumos, **dārza pupiņu***, **zirņu*** (graudiem), **lauka pupu*** (graudiem), **lēcu***, **aunazirņu*** (graudiem), **lupīnu*** (graudiem) sējumos, **vīnogu***, **ābeļu***, **bumbieru***, **cidoniju*** un **parastā mespila*** stādījumos
Goltix Gold	0851	Atļauts lietot **parastās egles*** stādījumos, **ķimeņu*** (sējas gadā), **ķimeņu*** (ražas gadā) sējumos, **zemeņu*** (jaunie stādījumi), **zemeņu*** (ražojoši stādījumi) stādījumos un **spinātu*** (sēklai) sējumos
Graminis	0592	Atļauts lietot **cukurbiešu***, **lopbarības biešu***, **galda biešu***, **topinambūru***, **saulespuķu***, **sojas***, **burkānu***, **selerijas*** (sakņu), **mārrutku***, **pastinaku***, **pētersīļu*** (sakņu), **redīsu***, **kāļu***, **rāceņu*** sējumos, **sīpolu***, **šalotes sīpolu***, **ķiploku***, **salātu***, **endīviju***, **rukolas***, **brūno sinepju*** sējumos un stādījumos, **dārza pupiņu***, **zirņu*** (graudiem), **lauka pupu*** (graudiem), **lēcu***, **aunazirņu*** (graudiem), **lupīnu*** (graudiem) sējumos, **vīnogu***, **ābeļu***, **bumbieru***, **cidoniju*** un **parastā mespila*** stādījumos
Innox	0872	Atļauts lietot arī **ziemas ripša*** un **vasaras ripša*** sējumos
Jenot Plus 050 EC	0823	Atļauts lietot **pupu*** un **zirņu*** sējumos
Joust	0876	Atļauts lietot arī **ziemas ripša***, **vasaras ripša***, **sinepju*** (sēklai) un **linu*** (šķiedrai) sējumos
Kinvara	0672	Atļauts lietot arī **zāliena*** sējumos
Koron 100 SC	0815	Atļauts lietot arī **galviņkāpostu*** stādījumos
Lalstop G46 WG	0813	Atļauts lietot arī **dēstu*** (**dārzeņi***, **lapu dārzeņi*** un **salāti***, **garšaugi***, **ziedkāposti***, **dekoratīvie augi***) (segtās platībās), **gurķu***, **tomātu***, **paprikas***, **baklažānu*** (segtās platībās), **melones***, **ķirbju***, **kabaču***, **cukīni***, **baklažānu*** (segtās platībās), **gurķu***, **ķirbju***, **kabaču***, **cukīni***, **melones***, **arbūzu*** (atklātā laukā, tuneļos), **salātu***, **lapu dārzeņu*** (segtās platībās), **salātu***, **lapu dārzeņu*** (atklātā laukā), **garšaugu***, **kāpostaugu*** (segtās platības), **dekoratīvo augu*** (podos, augiem ziedu griešanai, augiem no spraudeņiem, sīpolpuķēm) (segtās platībās), **zemeņu***, **aveņu*** (atklātā laukā, tuneļos), **zemeņu***, **aveņu*** (segtās platībās), **krūmmelleņu*** (atklātā laukā, tuneļos), **jāņogu*** (atklātā laukā), **dzērveņu*** (atklātā laukā), **kāpostaugu*** (atklātā laukā), **sīpolu***, **Šalotes sīpolu***, **maurloku***, **ķiploku***, **puravu*** (segtās platībās, atklātā laukā, tuneļos), **bumbuļu***, **sīpolu*** un **stublāju*** dārzeņu (izņemt sīpolus, Šalotes sīpolus, maurlokus, ķiplokus, puravus) (segtās platībās), **lapu cigoriņu***, **endīviju*** (segtās platībās), **burkānu***, **citu sakņu*** dārzeņu (atklātā laukā), **pupiņu*** (atklātā laukā, tuneļos), **lapu koku***, **skuju koku*** kokaudzētavās (segtās platībās, atklātā laukā, tuneļos) sējumos un stādījumos, **zālienos golfa laukumā***, **zālienos sporta laukumā*** (atklātā laukā) un **ābeļu*** (atklātā laukā) stādījumos
Lentagran WP	0330	Atļauts lietot **ķiploku***, **kolrābju***, **saldās kukurūzas*** sējumos un **sparģeļu*** stādījumos, **burkānu***, **pastinaku***, **sakņu pētersīļu*** un **mārrutku*** sējumos un stādījumos
Linati 800 EC	0790	Atļauts lietot **lupīnu***, **lauka pupu***, **burkānu***, **sīpolu***, **ķiploku*** un **saulespuķu*** sējumos un **sakņu seleriju*** un **kātu seleriju*** stādījumos
Lontrel 72 SG	0388	Atļauts lietot arī **ziemas ripša***, **vasaras ripša*** sējumos, **zemeņu*** stādījumos, **egļu*** un **baltegļu*** stādījumos kokaudzētavās
MAGTOXIN TABLET	0111	Atļauts lietot šādu kultūraugu fumigēšanai: **pupas***, **zirņi***, **rapsis***, **lupīna***, **soja***, **linsēklas***, **kukurūza***, **saulespuķu sēklas*** (pārtikai, lopbarībai, sēklai); **dārza pupiņas***, **rīsi***, **sorgo***, **prosa***, **griķi***, **rieksti***, **kakao pupiņas***, **kafijas pupiņas***, **kaltēti augi***, **žāvēti dārzeņi***, **žāvēti augļi***; **dārza pupiņas***, **griķi***, **zālaugu sēklas*** (sēklai); **apaļie kokmateriāli*** (zāģbaļķi, finierkluči, papīrmalka, stabi, mieti, malka), **zāģmateriāli***, **koksnes un kokmateriālu izstrādājumi***, **iesaiņojamie materiāli***, **starplikas***, **šķelda***, **mulča*** (sasmalcināta koku miza, koksne), **kūdra***, **kokvilna*** ķīpās un saiņos, **iesaiņoti pārtikas produkti***
Maxentis	0860	Atļauts lietot arī **ziemas ripša*** un **vasaras ripša*** sējumos
Mavita 250 EC	0576	Atļauts lietot **burkānu***, **selerijas** (sakņu)*, **sīpolu***, **ķiploku***, **šalotes sīpolu***, **galda biešu*** un **krizantēmu*** (atklātā laukā un segtās platībās) stādījumos
Mavrik	0526	Atļauts lietot **krāšņumaugu*** (atklātā laukā) stādījumos
Maxim 025 FS	0089	Atļauts lietot **zirņu***, **lauka pupu*** un **lupīnu*** sēklu kodināšanai, kā arī **fomozes** (*Phoma exigua*)*, **paugurainā kraupja** (*Polyscytalum pustulans*)* un **parastā kraupja** (*Steptomyces scabies*)* ierobežošanai kartupeļos
Medax Top	0347	Atļauts lietot arī **ziemas ripša***, **vasaras ripša***, **sinepju*** (sēklai), **eļļas rutku***, **sējas idras***, **linu*** un **magoņu*** (sēklai) sējumos

Mirador 250 SC	0591	Atļauts lietot arī **ķiploku***, **ķirbju***, **melones***, **arbūzu***, **paprikas*** (segtās platībās), **salātu*** (atklātā laukā un segtās platībās) un **krizantēmu*** (atklātā laukā un segtās platībās) sējumos un stādījumos
Mirador Uni	0791	Atļauts lietot **lopbarības biešu*** un **galda biešu*** sējumos
Mizuki	0890	Atļauts lietot arī **zemeņu*** stādījumos
Mospilan 20 SG	0811	Atļauts lietot **ziemas ripša***, **vasaras ripša*** sējumos, **lauka pupas*** sējumos, kā arī **ķiršu mušu*** ierobežošanai ķiršu stādījumos, **tinēju*** un **lapgraužu*** ierobežošanai stādu, dēstu (kokaudzētavās), Ziemassvētku eglīšu (atklātā laukā) sējumos un stādījumos
Naturalis	0858	Atļauts lietot arī gurķu, kabaču, meloņu, ķirbju, arbūzu (**tuneļos***, **atklātā laukā***) stādījumos, **salātu***, **endīviju*** (**tuneļos***, **atklātā laukā***) stādījumos vai sējumos **Kalifornijas tripša*** (*Frankliniella occidentalis*) ierobežošanai, **kartupeļiem***, **zemeņu*** (segtās platībās, **tuneļos***, **atklātā laukā***) stādījumos, krāšņumaugu, dekoratīvo augu (**tuneļos***, **atklātā laukā***) sējumos un stādījumos, **krūmmelleņu*** stādījumos, **ķiršu*** stādījumos, **smiltsērkšķu*** stādījumos **raibspārnu mušas*** (*Rhagoletis batava*) ierobežošanai, **bumbieru*** stādījumos, **ābeļu*** stādījumos, **vīnogu*** stādījumos
NeemAzal	43	Atļauts lietot **galviņkāpostu***, **Briseles kāpostu***, **Savojas kāpostu***, **garšaugu*** (izņemot maurlokus), **spinātu***, **biešu*** (atklātā laukā), **cidoniju***, **vīnogulāju*** un **ozolu*** stādījumos. Atļauts ierobežot **tīklērces** (*Tetranychus urticae*)* vairākos dārzeņos un garšaugos, **augļkoku sarkano tīklērci** (*Panonychus ulmi*)* ābeļu un cidoniju stādījumos un **tīklērces** (*Tetranychidae*)* krāšņumaugu un dekoratīvo augu (izņemot skujkokus) stādījumos. Atļauts lietot arī **ķiršu***, **plūmju***, **aveņu***, **kazeņu***, **upeņu***, **jāņogu*** un **ērkšķogu*** stādījumos
NeemAzal-T/S	0241	Atļauts lietot **galviņkāpostu***, **Briseles kāpostu***, **Savojas kāpostu***, **garšaugu*** (izņemot maurlokus), **spinātu***, **biešu*** (atklātā laukā), **cidoniju***, **vīnogulāju*** un **ozolu*** stādījumos. Atļauts ierobežot **tīklērces** (*Tetranychus urticae*)* vairākos dārzeņos un garšaugos, **augļkoku sarkano tīklērci** (*Panonychus ulmi*)* ābeļu un cidoniju stādījumos un **tīklērces** (Tetranychidae)* krāšņumaugu un dekoratīvo augu (izņemot skujkokus) stādījumos. Atļauts lietot arī **ķiršu***, **plūmju***, **aveņu***, **kazeņu***, **upeņu***, **jāņogu*** un **ērkšķogu*** stādījumos
Nervure	0752	Atļauts lietot arī **kāļu***, **sakņu seleriju***, **pastinaku*** un **sakņu pētersīļu*** sējumos un stādījumos
Nexide CS	0715	Atļauts lietot arī **galviņkāpostu*** stādījumos, kā arī **kāpostu cekulkodes*** ierobežošanai. Atļauts lietot arī **cukurbiešu***, **galda biešu***, **lopbarības biešu***, **āboliņa*** (sēklai), **lucernas*** (sēklai), **eļļas rutku*** (sēklai) sējumos
Nissorun 250 SC	0861	Atļauts lietot arī **krūmmelleņu***, **aveņu***, **kazeņu*** (atklātā laukā, tuneļos) stādījumos, **upeņu***, **jāņogu***, **ērkšķogu*** stādījumos un **krāšņumaugiem*** (atklātā laukā, tuneļos, segtās platībās)
Novitron DAMTec	0730	Atļauts ierobežot nezāles arī **burkānu*** sējumos
Nuance 75 WG	0403	Atļauts lietot latvāņa ierobežošanai **ceļa malās***, **mežmalās***, **lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs***, **zemēs zem elektrolīniju pārvadiem***
Ouragan System 4	0209	Atļauts lietot nezāļu ierobežošanai **smiltsērkšķu*** jaunajos stādījumos
Patel 300 EC	0714	Atļauts lietot **ziemas ripša*** un **vasaras ripša*** sējumos
Pecari 300 EC	0748	Atļauts lietot **ziemas ripša*** un **vasaras ripša*** sējumos
PHOSTOXIN TABLET	0112	Atļauts lietot šādu kultūraugu fumigēšanai: **lupīna***, **soja***, **linsēklas***, **kukurūza***, **saulespuķu sēklas*** (pārtikai, lopbarībai, sēklai); **dārza pupiņas***, **rīsi***, **sorgo***, **prosa***, **griķi***, **rieksti***, **kakao pupiņas***, **kafijas pupiņas***, **kaltēti augi***; **dārza pupiņas***, **griķi***, **zālaugu sēklas***, (sēklai); **apaļie kokmateriāli*** (zāģbaļķi, finierkluči, papīrmalka, stabi, mieti, malka), **zāģmateriāli***, **koksnes un kokmateriālu izstrādājumi***, **iesaiņojamie materiāli***, **starplikas***, **šķelda***, **mulča*** (sasmalcināta koku miza, koksne), **kūdra***; **kokvilna*** ķīpās un saiņos, **iesaiņoti pārtikas produkti***
Pictor Active	0642	Atļauts lietot **ziemas ripša***, **vasaras ripša***, **sinepju***, **eļļas rutku***, **kaņepju*** un **linu*** sējumos. Atļauts lietot arī **lauka pupu*** (graudiem) un **zirņu*** (graudiem) sējumos
Pilot	0765	Atļauts lietot arī **pupu*** un **zirņu*** sējumos
Poleci	0764	Atļauts lietot **burkānu*** sējumos
Poleposition 300 EC	0714	Atļauts lietot **ziemas ripša*** un **vasaras ripša*** sējumos
Propulse	0416	Atļauts lietot arī lauka **pupu*** (graudiem) un **zirņu*** (graudiem) sējumos
Protendo 300 EC	0714	Atļauts lietot **ziemas ripša*** un **vasaras ripša*** sējumos
Protikon 250 EC	0886	Atļauts lietot arī **vasaras rudzu***, **sojas*** un **baltās sinepes*** sējumos

Prosaro	0276	Atļauts lietot **pupu*** un **zirņu*** sējumos. Pupas graudiem (lauka pupas, kāršu pupas, kanavālijas, sviesta pupas, lopbarības pupas). Zirņi graudiem
Quick 50 EC	0429	Atļauts lietot **cukurbiešu***, **lopbarības biešu***, **galda biešu***, **topinambūru***, **saulespuķu***, **sojas***, **burkānu***, **selerijas*** (sakņu), **mārrutku***, **pastinaku***, **pētersīļu*** (sakņu), **redīsu***, **kāļu***, **rāceņu*** sējumos, **sīpolu***, **šalotes sīpolu***, **ķiploku***, **salātu***, **endīviju***, **rukolas***, **brūno sinepju*** sējumos un stādījumos, **dārza pupiņu***, **zirņu*** (graudiem), **lauka pupu*** (graudiem), **lēcu***, **aunazirņu*** (graudiem), **lupīnu*** (graudiem) sējumos, **vīnogu***, **ābeļu***, **bumbieru***, **cidoniju*** un **parastā mespila*** stādījumos
Ranman Top	0355	Atļauts lietot arī **gurķu***, **cukīni***, **kabaču***, **patisonu***, **ķirbju***, **melones***, **arbūzu*** (atklātā laukā, segtās platībās), **krāšņumaugu*** (atklātā laukā, segtās platībās) un **dekoratīvo koku*** (atklātā laukā, segtās platībās) sējumos vai stādījumos
Rapsan 400 SC	0617	Atļauts lietot **Pekinas kāpostu*** un **Ķīnas kāpostu*** sējumos un stādījumos
Revus 250 SC	0312	Atļauts lietot **salātu*** (segtās platībās), **gurķu***, **kabaču***, **cukīni***, **patisonu*** un **ķirbju*** (segtās platībās) sējumos un stādījumos
Revydas	0835	Atļauts lietot **ziemas ripša***, **vasaras ripša***, **eļļas rutka*** (sēklai) sējumos
Rodeo Plus	0879	Atļauts lietot arī **jāņogu***, **upeņu***, **ērkšķogu***, **krūmmelleņu*** stādījumos
Rodeo TF	0889	Atļauts lietot arī **smiltsērkšķu*** (jaunie stādījumi), **jāņogu***, **upeņu***, **ērkšķogu***, **krūmmelleņu*** stādījumos
Rosate Clean 360 SL	0882	Atļauts lietot arī **jāņogu***, **upeņu***, **ērkšķogu***, **krūmmelleņu*** stādījumos
Roundup Biactive SL	0880	Atļauts lietot arī **jāņogu***, **upeņu***, **ērkšķogu***, **krūmmelleņu*** stādījumos
Roundup Dynamic	0878	Atļauts lietot arī **jāņogu***, **upeņu***, **ērkšķogu***, **krūmmelleņu*** stādījumos
Roundup Gold ST	0873	Atļauts lietot **jāņogu***, **upeņu***, **ērkšķogu***, **krūmmelleņu*** stādījumos
Roundup PowerMax	0519	Atļauts lietot **jāņogu***, **upeņu***, **ērkšķogu***, **krūmmelleņu*** stādījumos
Roxy EC	0914	Atļauts lietot **lupīnu***, **lauka pupu***, **burkānu***, **sīpolu***, **ķiploku*** un **saulespuķu*** sējumos un **sakņu seleriju*** un **kātu seleriju*** stādījumos
Scenic Gold	0705	Atļauts lietot **ziemas ripsim*** un **vasaras ripsim***
Score	61	Atļauts ierobežot **bumbieru-kadiķu rūsu*** (*Gymnosporangium fuscum*) bumbieru stādījumos. Atļauts lietot arī **burkānu***, **seleriju*** (sakņu), **sīpolu***, **ķiploku***, **šalotes***, **galda biešu*** un **krizantēmu*** (gan atklātā laukā, gan segtās platībās) sējumos un stādījumos
Score 250 EC	0001	Atļauts ierobežot **bumbieru-kadiķu rūsu*** (*Gymnosporangium fuscum*) bumbieru stādījumos. Atļauts lietot arī **burkānu***, **seleriju*** (sakņu), **sīpolu***, **ķiploku***, **šalotes***, **galda biešu*** un **krizantēmu*** (gan atklātā laukā, gan segtās platībās) sējumos un stādījumos
Serenade Aso	0556	Atļauts lietot **burkānu***, **puravu***, **tomātu***, **paprikas*** (segtās platībās), **gurķu*** (atklātā laukā un segtās platībās), **pipargurķīšu*** (atklātā laukā un segtās platībās), **ķirbju***, **arbūzu***, **meloņu*** (atklātā laukā), **kabaču*** (atklātā laukā un segtās platībās), **cukīni*** (atklātā laukā un segtās platībās), **galda biešu***, **brokoļu***, **Briseles kāpostu***, **ziedkāpostu*** (atklātā laukā un segtās platībās), **galviņkāpostu***, **Ķīnas kāpostu*** (atklātā laukā un segtās platībās), **seleriju*** (sakņu, kātu, lapu), **pētersīļu*** (sakņu, lapu), **pastinaku*** (atklātā laukā un segtās platībās), **kolrābju***, **rāceņu***, **batāšu***, **mārrutku***, **sparģeļu***, **redīsu*** (atklātā laukā un segtās platībās), **fenheļu*** (segtās platībās), **cigoriņu*** (sakņu), **salātu***, **endīviju***, **rukolas***, **spinātu*** (atklātā laukā un segtās platībās), **kāršu pupu***, **pupiņu***, **zirņu*** (atklātā laukā un segtās platībās), **šalotes sīpolu***, **sīpolu*** (lokiem), **sīpolu***, **ķiploku***, **sojas***, **ķimeņu***, **linu***, **magoņu***, **kaņepju***, garšaugu (**baziliks***, **gurķu mētra***, **pupu mētra***, **koriandrs***, **kressalāti***, **dilles***, **majorāns***, **piparmētra***, **raudene***, **rozmarīns***, **timiāns***) (atklātā laukā un segtās platībās), **aveņu***, **upeņu***, **ērkšķogu***, **jāņogu***, **kazeņu***, **krūmmelleņu***, **dzērveņu***, **zemeņu*** (atklātā laukā un segtās platībās), **ķiršu***, **plūmju***, **aprikožu***, **persiku***, **bumbieru***, **krāšņumaugu*** (atklātā laukā un segtās platībās), **kokaugu***, **krūmu*** (kokaudzētavās, atklātā laukā un segtās platībās), **kvinojas*** sējumos un stādījumos
Signum	0269	Atļauts lietot **pupu*** sējumos. Pupas graudiem (lauka pupas, kāršu pupas, kanavālijas, sviesta pupas, lopbarības pupas). Atļauts lietot arī **ķiploku*** stādījumos
Sitara	0830	Atļauts lietot **stiebrzāļu*** (sēklai, sējas gadā) un **stiebrzāļu*** (sēklai) sējumos
SoilGuard 0.5 GR	0761	Atļauts lietot **kartupeļu*** stādījumos
Soratel	0869	Atļauts lietot arī **ziemas ripša*** un **vasaras ripša*** sējumos
Spectrum	0850	Atļauts lietot **dārza pupiņu*** (svaigam patēriņam ar/bez pākstīm, graudiem)

Spotlight Plus	0718	Atļauts lietot nezāļu ierobežošanai **zemeņu***, **jāņogu***, **upeņu***, **ērkšķogu***, **krūmmelleņu*** **sparģeļu***, **aveņu*** un **kazeņu*** stādījumos
Stabilan 400 SL	0793	Atļauts lietot arī **speltas kviešu*** un **cieto kviešu*** sējumos
Stapler	0787	Atļauts lietot nezāļu ierobežošanai **pļavas lapsastes***, **bezakotu lāčauzas***, **kamolzāles***, **augstās dižauzas***, **timotiņa***, **pļavu auzenes***, **pļavu skarenes*** sējumos
Starane XL	0277	Atļauts lietot arī **stiebrzāļu*** sējumos
Supero	0587	Atļauts lietot **cukurbiešu***, **lopbarības biešu***, **galda biešu***, **topinambūru***, **saulespuķu***, **sojas***, **burkānu***, **selerijas*** (sakņu), **mārrutku***, **pastinaku***, **pētersīļu*** (sakņu), **redīsu***, **kāļu***, **rāceņu*** sējumos, **sīpolu***, **šalotes sīpolu***, **ķiploku***, **salātu***, **endīviju***, **rukolas***, **brūno sinepju*** sējumos un stādījumos, **dārza pupiņu***, **zirņu*** (graudiem), **lauka pupu*** (graudiem), **lēcu***, **aunazirņu*** (graudiem), **lupīnu*** (graudiem) sējumos, **vīnogu***, **ābeļu***, **bumbieru***, **cidoniju*** un **parastā mespila*** stādījumos
Switch 62.5 WG	0244	Atļauts lietot **skuju koku***, **lapu koku***, **dekoratīvo krūmu*** stādījumos kokaudzētavās, **paprikas*** un **baklažānu*** stādījumos segtās platībās, **kabaču*** un **cukīni*** sējumos un stādījumos atklātā laukā un segtās platībās, ķirbju* un **meloņu*** stādījumos atklātā laukā, **salātu*** un **endīviju*** sējumos un stādījumos atklātā laukā un segtās platībās, **burkānu***, **sakņu pētersiļu***, **melnsaknes***, **pastinaku***, **galda biešu***, **mārrutku***, **seleriju*** (sakņu), **sīpolu***, **šalotes***, **ķiploku*** sējumos un stādījumos atklātā laukā, **zirņu***, **pupu***, **pupiņu*** sējumos un stādījumos svaigam patēriņam un graudiem, **zālienā*** **golfa laukumā**
T34 Biocontrol	0809	Atļauts lietot arī **dekoratīviem augiem*** podos un konteineros, **stādiem*** kokaudzētavās, **bazilika***, **mētru***, **dižzirdzenes***, **estragona***, **izopa***, **ķimeņu***, **koriandra***, **mazās brūnvālītes***, **smaržīgā mirra***, **melisas***, **lapu kārveles***, **kressalātu***, **sinepes***, **lupstāja***, **majorāna***, **piparmētras***, **oregano***, **rozmarīna***, **salvijas***, **lapu selerijas***, **timiāna***, **laura***, **cigoriņu***, **fenheļa***, **endīvijas***, **Sareptas sinepes***, **pētersiļu***, **dārza portulaku***, **salātu baldriņa***, **rukolas***, **salātu***, **maurloku***, **spinātu***, **cukīni*** ēdamajiem ziediem, **kabaču*** ēdamajiem ziediem, **patisonu*** ēdamajiem ziediem, **brokoļu***, **Briseles kāpostu***, **galviņkāpostu***, **Pekinas kāpostu***, **Āzijas kāpostu***, **Ķīnas kāpostu***, **ziedkāpostu***, **lapu kāpostu***, **kolrābju***, **cukīni***, **kabaču***, **gurķu***, **melones***, **ķirbju*** (segtās platībās), **krūmmelleņu***, **upeņu***, **jāņogu***, **ērkšķogu***, **kazeņu***, **aveņu***, **melnā plūškoka***, **dzērveņu***, **zīdkoka***, **zemeņu*** (segtās platībās), **kāpostu***, **brokoļu***, **ziedkāpostu***, **kolrābju***, **galvas salātu***, **lapu salātu***, **salātu baldriņa***, **rukolas***, **sīpolu***, **ķiploku***, **puravu***, **šalotes sīpolu***, **cukīni***, **ķirbju***, **gurķu***, **pupiņu***, **zirņu***, **galda biešu***, **burkānu***, **pētersiļu***, **seleriju***, **mārrutku***, **redīsu***, **tomātu***, **piparu***, **baklažānu***, **lapu seleriju***, **sparģeļu***, **krūmmelleņu***, **aveņu*** sējumos un stādījumos, **augļu koku stādiem*** kokaudzētavās, **kaņepju***, **garšaugu*** sējumiem un stādījumiem, **dekoratīviem augiem***, koku sējeņiem un **stādiem*** kokaudzētavās, **dekoratīviem augiem*** stādu audzētavās (atklātā laukā)
Taifun B	0027	Atļauts lietot nezāļu ierobežošanai **smiltsērkšķu*** jaunajos stādījumos, **jāņogu***, **upeņu***, **ērkšķogu***, **krūmmelleņu*** stādījumos
Targa Super	0383	Atļauts lietot arī **pupu*** un **zirņu*** sējumos
Teppeki	0699	Atļauts lietot arī **ķiršu***, **plūmju***, **galviņkāpostu***, **Briseles kāpostu*** stādījumiem un **krāšņumaugiem***, **galda biešu*** un **lopbarības biešu*** sējumos, **lupīnu*** (graudiem), **lēcu*** (graudiem) sējumos un **tomātu*** (segtās platībās), **gurķu*** (segtās platībās) un **kabaču*** (segtās platībās) stādījumos
Tetatra	0916	Atļauts lietot arī **ziemas ripša*** un **vasaras ripša*** sējumos
Topas 100 EC	0009	Atļauts ierobežot **bumbieru-kadiķu rūsu*** (*Gymnosporangium fuscum*) bumbieru stādījumos, **ogulāju stabiņrūsu*** (*Cronartium ribicola*), **ogu krūmu kausiņrūsu*** (*Puccinia rebesii-caricis*) upeņu un ērkšķogu stādījumos. Atļauts lietot **jāņogu***, **ķiršu***, **dekoratīvo kokaugu***, **krizantēmu***, **ķirbju***, **cukīni***, **meloņu*** un **arbūzu*** stādījumos un **lapu koku** stādījumos kokaudzētavās*
Toutatis DAMTec	0731	Atļauts ierobežot nezāles arī **burkānu*** sējumos
Tracer	0740	Atļauts lietot **krūmcidoniju*** stādījumos, **smiltsērkšķu*** stādījumos, **aveņu***, **kazeņu***, **upeņu***, **jāņogu***, **ērkšķogu*** (atklātā laukā) stādījumos, kā arī **lapkodes (*Lyonetiidae*)*** ierobežošanai ābeļu, bumbieru un **krūmcidoniju*** stādījumos
Tribenocare 75 WG	65	Atļauts lietot latvāņa ierobežošanai **ceļa malās***, **mežmalās***, **lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs***, **zemēs zem elektrolīniju pārvadiem***
Vantex CS	0716	Atļauts lietot arī **galviņkāpostu*** stādījumos, kā arī **kāpostu cekulkodes*** ierobežošanai. Atļauts lietot arī **cukurbiešu***, **galda biešu***, **lopbarības biešu***, **āboliņa*** (sēklai), **lucernas*** (sēklai), **eļļas rutku*** (sēklai) sējumos

Verben	0825	Atļauts lieto arī **vasaras tritikāles*** un **vasaras rudzu*** sējumos
VextaDim 240 EC	0906	Atļauts lietot arī **selerijas*** (sakņu), **rāceņu***, **mārrutku***, **kāļu***, **saulespuķu***, **sinepju***, **kaņepju*** (šķiedrai), **linu*** (šķiedrai) sējumos, **kārklu*** stādījumos, **krāšņumaugu*** sējumos un stādījumos
Viking	0903	Atļauts lietot latvāņa ierobežošanai **ceļa malās***, **mežmalās***, **lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs***, **zemēs zem elektrolīniju pārvadiem***
VitiSan	0788	Atļauts lietot **cidoniju***, **ķiršu***, **plūmju***, **aprikožu***, **persiku***, **bārbeļu***, **korinšu***, **smiltsērkšķu***, **plūškoku***, **pīlādžu***, **vilkābeļu***, **aroniju***, **krūmmelleņu*** stādījumos, **meloņu***, **arbūzu***, **endīviju***, **garšaugu***, **zirņu*** (atklātā laukā un segtās platībās), **ķiploku*** (atklātā laukā), **dekoratīvo koku*** un **krūmu*** (atklātā laukā) sējumos vai stādījumos, kā arī **ābeļu miltrasas***, **īstās miltrasas***, **kauleņkoku sausplankumainības***, **pelēkās puves*** ierobežošanai
Vredmix	0711	Atļauts lietot **lopbarības biešu*** un **galda biešu*** sējumos
Zenby	0832	Atļauts lietot **ziemas ripša*** un **vasaras ripša*** sējumos, **ķiršu***, **plūmju***, **vīnogu***, **zemeņu*** (atklātā laukā un segtās platībās) stādījumos, **salātu***, **spinātu*** (atklātā laukā un segtās platībās) sējumos un stādījumos
Zetrola	0578	Atļauts lietot **ķimeņu*** sējumos (sējas gadā)
Zypar	0555	Atļauts lietot latvāņu ierobežošanai **ceļa malās***, **mežmalās***, **lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs***, **zemēs zem elektrolīniju pārvadiem***

“Mazais lietojums” ir augu aizsardzības līdzekļa lietošana attiecīgā dalībvalstī augiem vai augu produktiem, kurus: a) šajā dalībvalstī neaudzē lielās platībās; vai b) audzē lielās platībās, – lai apmierinātu ārkārtēju augu aizsardzības vajadzību.

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. __Atbildība__. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

FUNGICĪDI KARTUPEĻU LAKSTU PUVES *(Phytophthora infestans)* IEROBEŽOŠANAI

Augu aizsardzības līdzeklis	Deva l, kg/ha, %	Ieteicamais intervāls smidzinājumiem, dienās	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Sistēmas iedarbības fungicīdi				
Infinito	1.2-1.6	7-12	7	4
Sporax	1.4	5-7	14	6
Lokālas sistēmas iedarbības fungicīdi				
Emin dārzam Revus 250 SC	12 ml/10 l	7-10	3	3
Revus 250 SC	0.6	7-10	3	6
	12 ml/10 l			3
Revus Top	0.6	7-10	3	3
Zorvec Enicade	0.15	7-10	7	4
Lokālas sistēmas un pieskares iedarbības fungicīdi				
Evagio Plus	0.6	6	7	3
Pieskares iedarbības fungicīdi				
Altima 500 s.k.	0.4	7-14	7	8
Frowncide 500 s.k.	0.4	7-10	7	8
Gachinko	0.5	7-10	7	4
Leimay SC	0.5	7-10	7	4
Nando 500 SC	0.3-0.4	7-10	1	8
Ohayo 500 s.k.	0.4	7-10	7	8
Ranman Top	0.5	5-10	7	3
Širlans 500 s.k.	0.4	7-14	7	8
Winby 500 s.k.	0.4	7-10	7	8

FUNGICĪDI AUGĻU DĀRZIEM

		Candit	Chorus 50 WG	Delan Pro	Difcor 250 EC	Difenzone	Dynamo	Effector	Mavita 250 EC	Revyona	Scab 80 WG	Score 250 EC	Signum	Syllit 544 SC	Topas 100 EC
Kaitīgais organisms	Pelēkā puve *Botryotinia fuckeliana*														
	Plūmju rūsa *Transchelia pruni-spinosae*						•	•							
	Ķiršu kraupis *Venturia cerasi*						•	•							
	Ķiršu lapbire *Blumeriella jaapii*						•	•					•	•	•
	Kauleņkoku sausplankumainība *Stigmina carpophila*						•	•							
	Kauleņkoku pelēkā puve *Monilinia laxa*		•						•	•		•	•		
	Lapu plankumainības *Stemhylium spp.*									•					
	Bumbieru rūsa *Gymnosporangium sabinaea*						•	•	*•			•			•
	Bumbieru kraupis *Venturia pirina*	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	
	Augļu rūgtā puve *Pezicula alba, Colletotrichum gleosporioides*						•	•					•		
	Augļu parastā puve *Monilinia fructigena*		•				•	•	•	•		•	•		
	Augļu koku vēzis *Nectria galligena*														
	Ābeļu miltrasa *Podosphaera leucotricha*	•			•					•					•
	Ābeļu kraupis *Venturia inaequalis*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
Apstrādājamā kultūra / deva l, kg/ha	Plūmes	-	0.45	-	-	-	0.5*	0.5*	0.2	līdz 1.8 l/ha	-	0.2	0.75-1.0	-	-
	Ķirši	-	0.45	-	-	-	0.5	0.5	0.2	līdz 1.8 l/ha	-	0.2	0.75-1.0	1.25	0.5
	Bumbieres	0.15-0.25	0.45	2.5	0.2	-	0.5	0.5	0.2	līdz 2 l/ha	1.88	0.2	-	1.25	0.5
	Ābeles	0.15-0.25	0.30-0.45	2.5	0.2	0.2	0.5	0.5	0.2	līdz 2 l/ha	1.88	0.2	-	1.25	0.5
Augu aizsardzības līdzeklis															

*__Mazais lietojums__. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

KODNES ZIEMĀJU GRAUDAUGU SĒKLU KODINĀŠANAI, TO DEVAS UN IEROBEŽOJAMĀS AUGU SLIMĪBAS

Augu aizsardzības līdzeklis	Deva kg, l /t	Sniega pelējums	Sakņu puves	Kviešu plēkšņu plankumainība	Kviešu pundurmelnplauka	Kviešu cietā melnplauka	Tritikāle	Stiebrzāļu gredzenplankumainība	Sniega pelējums	Sakņu puves	Rudzu stiebru melnplauka	Rudzi	Stiebrzālu gredzenplankumainība	Sniega pelējums	Sakņu puves	Miežu lapu tīklplankumainība	Miežu lapu brūnsvītarinība	Miežu putošā melnplauka	Miežu cietā melnplauka	Graudzāļu miltrasa	Ziemas mieži	Rizoktonija	Sniega pelējums	Sakņu puves	Labību tumšbrūnā plankumainība	Kviešu plēkšņu plankumainība	Kviešu pundurmelnplauka	Kviešu putošā melnplauka	Kviešu lapu pelēkplankumainība	Kviešu cietā melnplauka	Graudzāļu miltrasa	Ziemas kvieši
Bariton Super	1.0	•	•		•		1.0		•	•		1.0		•	•	•	•	•			1.0		•	•								1.0
Beret 025 FS	2.0	•	•	•			2.0		•	•	•	2.0		•	•	•	•		•		2.0		•	•		•				•		2.0
Chambel 6 FS	0.5						-					-									-											0.5
Celest Trio 060 FS	2.0				•	•	2.0					2.0							•		2.0						•				•	2.0
	1.5-2.0						1.5-2.0					1.5-2.0									1.5-2.0											1.5-2.0
Difend	2.0					•	2.0					-									-											2.0
	2.5				•		2.5					-									-											2.5
Gamelan 100 FS	1.0		•			•	1.0		•	•		1.0		•	•						1.0		•	•								1.0
Latitude XL	2.0						-					-									-											2.0
Maxim 025 FS	2.0		•			•	2.0		•	•		2.0		•	•						2.0		•	•								2.0
Maxim Extra 050 FS	1.5-2.0		•			•	1.5-2.0		•	•		1.5-2.0		•	•						1.5-2.0		•	•								1.5-2.0
Prepper	2.0		•				2.0		•	•		2.0		•	•						2.0		•	•								2.0
Relenya	1.0						-					-									-											1.0
Seedron	1.0		•			•	1.0		•	•		1.0		•	•						1.0		•	•								1.0
Systiva	1.5						1.5	•	•	•		1.5		•	•						1.5		•	•								1.5
Vibrance Duo	1.5-2.0		•				1.5-2.0		•	•		-									-											1.5-2.0
	2.0					•	2.0					-									-											2.0
Vibrance Pro	1.5-2.0		•			•	1.5-2.0		•	•		1.5-2.0		•	•						1.5-2.0		•	•								1.5-2.0
Vibrance Star	1.5-2.0		•			•	1.5-2.0		•	•		1.5-2.0		•	•						1.5-2.0		•	•								1.5-2.0
Vibrance Trio	1.5-2.0		•			•	1.5-2.0		•	•		1.5-2.0		•	•						2.0		•	•								1.5-2.0

KODNES VASARĀJU GRAUDAUGU SĒKLU KODINĀŠANAI, TO DEVAS UN IEROBEŽOJAMĀS AUGU SLIMĪBAS

Augu aizsardzības līdzeklis	Deva kg, l /t	Sakņu puves	Kviešu cietā melnplauka	Kviešu plēkšņu plankumainība	Vasaras tritikāle	Sakņu puves	Auzu brūnplankumainība	Auzu putošā melnplauka	Auzas	Labību tumšbrūnā plankumainība	Stiebrzāļu gredzenplankumainība	Sakņu puves	Miežu lapu tīklplankumainība	Miežu lapu brūnsvītarinība	Miežu putošā melnplauka	Miežu cietā melnplauka	Graudzāļu miltrasa	Vasaras mieži	Rizoktonija	Sakņu puves	Labību tumšbrūnā plankumainība	Kviešu plēkšņu plankumainība	Kviešu pundurmelnplauka	Kviešu putošā melnplauka	Kviešu lapu pelēkplankumainība	Kviešu cietā melnplauka	Graudzāļu miltrasa	Vasaras kvieši
Bariton Super	1.0	•			1.0	•			1.0			•	•	•				1.0		•								1.0
Beret 025 FS	2.0	•	•		2.0	•			-			•	•	•				2.0		•		•						2.0
Chambel 6 FS	0.5				-				-									-										0.5
Celest Trio 060 FS	2.0				2.0	•			-			•	•	•				2.0		•			•					2.0
	1.5-2.0				1.5-2.0				-									1.5-2.0										1.5-2.0
Difend	2.0				-				-									-										2.0
Latitude XL	2.0	•			-	•			-									-										2.0
Maxim 025 FS	2.0	•	•		2.0	•			-			•	•	•				2.0		•		•						2.0
Maxim Extra 050 FS	1.5-2.0	•			1.5-2.0	•			1.5-2.0			•	•	•				1.5-2.0		•			•					1.5-2.0
Prepper	2.0	•			2.0	•			-			•	•	•				2.0		•								2.0
Redigo Pro	0.5-0.667	•			0.667	•	•		0.5-0.667	•		•						0.5-0.667		•								0.5-0.667
Relenya	1.0				-				-									-					•					1.0
Seedron	1.0	•			1.0	•			1.0			•						1.0		•								1.0
Systiva	1.5				-				1.5		•							0.75										1.5
Vibrance Duo	1.5-2.0	•			1.5-2.0	•			-			•						-					•					1.5-2.0
	2.0				2.0				-									-	•									2.0
Vibrance Pro	1.5-2.0	•			1.5-2.0	•			1.5-2.0			•	•	•				1.5-2.0		•			•					1.5-2.0
Vibrance Star	1.5-2.0	•			1.5-2.0	•			1.5-2.0			•	•	•				1.5-2.0		•			•					1.5-2.0
Vibrance Trio	1.5-2.0	•			1.5-2.0	•			1.5			•						2.0		•			•					1.5-2.0

FUNGICĪDI GRAUDAUGIEM

MIEŽI

Augu aizsardzības līdzeklis	Deva l, kg/ha	Kaitīgais organisms										
		Miežu lapu brūnplankumainība *Bipolaris sorokiniana*	Vārpu fuzarioze *Fusarium spp.*	Miežu lapu tīklplankumainība *Drechslera teres*	Graudzāļu miltrasa *Erysiphe graminis*	Sakņu puve *Fusarium spp.*	Pundurrūsa *Puccinia hordei*	Dzeltenā rūsa *Puccinia striiformis*	Stiebrzāļu gredzenplankumainība *Rhynchosporium secalis*	Ramulārija *Ramularia collo-cygni*	Stiebru lūšana *Pseudocercosporella herpotrichoides*	Kviešu plēkšņu plankumainība *Septoria nodorum*
Amistar 250 SC	0.8-1.0			●			●	●	●			
Artina	0.7			●			●	●	●			
Artina EC	0.7			●			●	●	●			
Ascra Xpro	0.6-1.2			●	●		●		●	●		
Avastel	1.0-1.25		●	●	●		●		●	●		●
Azaka	0.8-1.0			●	●		●		●			
Azuba	0.8-1.0			●			●	●	●			
Balaya	0.5-1.5; 0.5-1.0			●	●		●		●	●		
Bolid 250 SE	1.0			[v]●			[v]●		[v]●			
Capalo Revy	0.75-1.50			●	●		●		●	●		
Cayunis	1.0; 0.8			●	●		●		●			
Cezix	1.0		●	●	●		●		●			
Comet Pro	1.25			●			●	●				
Conclude AZT 250 SC	0.8-1.0			●			●	●	●			
Croton Flex	0.6-0.8		●	●	●		●		●		●	
Curbatur	0.6-0.8		●	●	●		●		●		●	
DARCOS	1.0		●	●	●		●		●			
Delaro Forte	1.3		●	●	●		●		●		●	
Dominic	1.0			●	●		●		●			
Elatus Era	0.75-1.0			●			●		●	●		
Elatus Plus	0.375-0.750			●			●		●	●		
Entargo	0.7			●								
Erasmus	1.0		●	●	●		●		●			
Euskatel	0.8		●	●			●		●			
Falcon Forte	0.6-0.8			●	●		●		●			
Flexity	0.5				●							
Folicur	1.0		●		●							
Glacis	0.6-0.8		●	●	●		●		●		●	
Globaztar 250 SC	1.0; 0.5+0.5			●	●		●		●			
Hutton Flex	0.6-0.8; 0.8*		●*	●	●		●		●	●		
Imtrex XE	1.0-2.0			●	●		●	●	●	●		
Innox	0.6-0.8			●			●		●	●		
Input	0.8-1.0		●	●	●	●	●		●		●	
Input Triple	0.75			●	●		●		●		●	
Joust	0.6		●	●	●		●		●	●		
Juventus 90	0.7			●			●	●	●			
Leander	0.5				●		●	●				
Lenvyor	0.75-1.5			●	●		●		●	●		
Librax	1.0-2.0		●	●	●		●		●	●		
Maxentis	0.4		●	●	●		●		●			
Mirador 250 SC	0.8-1.0			●			●	●	●			
Mirador Forte	1.5-2.0			●	●		●		●			
Orius 250 EW	1.0		●	●	●		●		●			
Patel 300 EC	0.33-0.65		●	●	●		●		●			
Pecari 300 EC	0.33-0.65		●	●	●		●		●			
Pioli	1.0-2.0			●	●		●	●	●	●		
Plexeo 90	0.7			●			●	●	●			
Plexeo 90 EC	0.7			●			●	●	●			
Poleposition 300 EC	0.33-0.65		●	●	●		●		●			
Polyversum	0.1		[v]●									
Priaxor	0.75-1.5			●	●		●	●	●	●		
Proline	0.6-0.8		●	●	●		●		●		●	
Property 180 SC	0.5				●							
Prosaro	0.75-1.0	●	●	●	●		●	●	●			
Protendo 300 EC	0.33-0.65		●	●	●		●		●			
Remocco 90	0.7			●			●	●	●			
Revystar XL	0.75-1.5			●	●		●		●	●		
Revytrex	0.75-1.5			●	●		●		●	●		
Riza 200 EC	1.25			●	●		●		●			
Siltra Xpro	0.75-1.0			●	●		●		●	●		
Silvron	0.75-1.25			●	●		●		●	●		
Soratel	0.6-0.8			●			●		●	●		
Syrius	1.0		●	●	●		●		●			
Talius	0.125-0.250				●							
Tebuplius	1.0			●	●		●		●			
Tebusha 25 EW	1.0			●	●		●		●			
Tetatra	0.6-0.8			●			●		●	●		
Torero	0.8-1.0			●	●		●		●			
Turret 90	0.7			●			●	●	●			
Variano Xpro	1.0-1.25		●	●	●		●		●			
Vazanti	1.0-1.25		●	●	●		●		●	●		●
Verben	0.6-1.0			●	●		●		●			
Winotoe	0.5				●		●	●				

KVIEŠI

Augu aizsardzības līdzeklis	Deva l, kg/ha	Kaitīgais organisms								
		Vārpu fuzarioze *Fusarium spp.*	Kviešu lapu dzeltenplankumainība *Drechslera tritici-repentis*	Graudzāļu miltrasa *Erysiphe graminis*	Sakņu puve *Fusarium spp.*	Stiebru lūšana *Pseudocercosporella herpotrichoides*	Brūnā rūsa *Puccinia recondita*	Dzeltenā rūsa *Puccinia striiformis*	Kviešu plēkšņu plankumainība *Septoria nodorum*	Kviešu lapu pelēkplankumainība *Septoria tritici*
Afrodyta 250 SC	0.8-1.0		[z]●	[z]●						[z]●
Amistar 250 SC	0.8-1.0						●	●	●	
Artina	0.7; 1.0*	●*	●				●	●	●	●
Artina EC	0.7; 1.0*	●*	●				●	●	●	●
Ascra Xpro	0.75-1.5		●	●			●	●	●	●
Avastel	1.0-1.25	●	●	●			●	●	●	●
Azaka	0.8-1.0		●	●			●			●
Azuba	0.8-1.0						●	●	●	

Balaya	0.5-1.5; 0.5-1.0		●	●			●	●	●	●
Benafar	0.6-0.8	●	●	●			●	●		●
Bolid 250 SE	1.0		z●				z●			z●
Capalo Revy	0.75-1.50		●	●		●	●	●		●
Cayunis	1.0; 0.8		●	●			●	●		●
Cezix	1.0	●	●	●			●		●	●
Comet Pro	1.25		●				●	●	●	●
Conclude AZT 250 SC	0.8-1.0						●	●	●	
Croton Flex	0.6-0.8	●	●	●		●	●	●	●	●
Curbatur	0.6-0.8	●	●	●		●	●	●	●	●
DARCOS	1.0	●	●	●			●		●	●
Delaro Forte	1.3	●	●	●		●	●	●	●	●
Dominic	1.0	●		●			●		●	●
Elatus Era	0.75-1.0	●					●	●	●	●
Elatus Plus	0.375-0.750						●	●	●	●
Entargo	0.7					●				●
Erasmus	1.0	●	●	●			●		●	●
Euskatel	0.8	●		●			●	●		●
Falcon Forte	0.6-0.8		●	●			●	●	●	●
Flexity	0.5			●						
Folicur	1.0	●	●	●			●	●	●	●
Glacis	0.6-0.8	●	●	●		●	●	●	●	●
Globaztar 250 SC	1.0; 0.5+0.5		●					●	●	●
Hutton Flex	0.6-1.0; 0.8-1.0*	●*	●	●			●		●	●
Imtrex XE	2.0		●	●			●	●	●	●
Innox	0.6-0.8	●	●	●			●	●		●
Input	0.8-1.0	●	●	●	●	●	●		●	●
Input Triple	0.75		●	●		●	●			●
Joust	0.6-0.8	●	●	●			●	●		●
Juventus 90	0.7; 1.0*	●*	●				●	●	●	●
Leander	0.5			●			●	●		
Lenvyor	0.75-1.5		●	●			●	●		●
Librax	1.0-2.0	●	●	●			●	●	●	●
Maxentis	0.4	●	●	●			●	●		●
Mirador 250 SC	0.8-1.0						●	●	●	
Mirador Forte	1.5-2.0		●	●			●	●	●	●
Orius 250 EW	1.0	●		●			●	●	●	●
Patel 300 EC	0.33-0.65	●	●	●			●	●	●	●
Pecari 300 EC	0.33-0.65	●	●	●			●	●	●	●
Pioli	2.0		●	●			●	●	●	●
Plexeo 90	0.7; 1.0*	●*	●				●	●	●	●
Plexeo 90 EC	0.7; 1.0*	●*	●				●	●	●	●
Poleposition 300 EC	0.33-0.65	●	●	●			●	●	●	●
Polyversum	0.1	●								
Praktis	0.8	●					●			●
Priaxor	0.75-1.5		●	●			●	●	●	●
Proline	0.6-0.8	●	●	●		●	●	●	●	●
Property 180 SC	0.5			●						
Prosaro	0.75-1.0	●	●	●			●	●	●	●
Protendo 300 EC	0.33-0.65	●	●	●			●	●	●	●
Protikon 250 EC	0.7-0.8	z●	z●	z●		z●	z●		z●	z●
Remocco 90	0.7; 1.0*	●*	●				●	●	●	●
Revystar XL	0.75-1.5		●	●			●	●		●
Revytrex	0.75-1.5		●	●			●	●		●
Riza 200 EC	1.25	●		●			●	●	●	●
Siltra Xpro	0.75-1.0	●	●	●			●	●	●	●
Silvron	0.75-1.25		●	●			●	●		●

Soratel	0.6-0.8	●	●	●			●	●		●
Syrius	1.0	●		●			●	●	●	●
Talius	0.1225-0.250			●						
Tebuplius	1.0	●		●			●		●	●
Tebusha 25 EW	1.0	●		●			●		●	●
Tesanto	0.375-0.750						●	●	●	●
Tetatra	0.6-0.8	●	●	●			●	●		●
Torero	0.8-1.0		●	●			●			●
Turret 90	0.7; 1.0*	●*	●				●	●	●	●
Univoq	1.2-1.5	●	●	●			●	●		●
Variano Xpro	1.0-1.25	●	●	●			●		●	●
Vazanti	1.0-1.25	●	●	●			●	●	●	●
Verben	0.6-1.0		●	●		●	●	●		●
Winotote	0.5			●			●	●		

RUDZI

Augu aizsardzības līdzeklis	Deva l, kg/ha	Kaitīgais organisms							
		Stiebru lūšana *Pseudocercrosporella herpotricoides*	Graudzāļu miltrasa *Erysiphe graminis*	Brūnā rūsa *Puccinia recondita*	Dzeltenā rūsa *Puccinia striiformis*	Stiebrzāļu gredzenplankumainība *Rhynchosporium secalis*	Vārpu fuzarioze *Fusarium spp.*	Kviešu lapu plēkplankumainība *Septoria tritici*	Kviešu plēkšņu plankumainība *Septoria nodorum*
Amistar 250 SC	0.8-1.0			●	●	●			
Artina	0.7			●	●	●			
Artina EC	0.7			●	●	●			
Ascra Xpro	0.75-1.5		●	●		●			
Avastel	1.0-1.25		●	●		●			
Azaka	0.8-1.0		●	●					
Azuba	0.8-1.0			●	●	●			
Balaya	0.5-1.5; 0.5-1.0		●	●		●			
Benafar	0.6-0.8			●		●			
Capalo Revy	0.75-1.50	●	●	●		●			
Cayunis	1.0; 0.8		●	●		●			
Conclude AZT 250 SC	0.8-1.0			●	●	●			
Croton Flex	0.6-0.8	●	●	●		●	●		
Curbatur	0.6-0.8	●	●	●		●	●		
Delaro Forte	1.3	●	●	●		●	●		●
Elatus Era	0.75-1.0			●		●			
Elatus Plus	0.375-0.750			●		●			
Euskatel	0.8		●	●		●			
Falcon Forte	0.6-0.8		●	●	●	●			
Flexity	0.5		●						
Glacis	0.6-0.8	●	●	●		●	●		
Globaztar 250 SC	1.0; 0.5+0.5		●			●			
Hutton Flex	0.6-1.0; 0.8-1.0*		●	●		●	●*		
Imtrex XE	2.0		●	●	●	●			
Innox	0.6-0.8			●		●			
Input	0.8-1.0			●	●		●		
Input Triple	0.75	●	●	●		●			
Juventus 90	0.7			●	●	●			

Leander	0.5		●	●					
Lenvyor	0.75-1.5		●	●		●			
Librax	1.0-2.0		●	●	●	●	●	●	
Maxentis	0.4		●	●		●	●		
Mirador 250 SC	0.8-1.0			●	●	●			
Mirador Forte	1.5-2.0		●	●		●			
Orius 250 EW	1.0		●	●		●	●		
Patel 300 EC	0.33-0.65		●	●		●	●		
Pecari 300 EC	0.33-0.65		●	●		●	●		
Pioli	2.0		●	●	●	●			
Plexeo 90	0.7			●	●	●			
Plexeo 90 EC	0.7			●	●	●			
Poleposition 300 EC	0.33-0.65		●	●		●	●		
Priaxor	0.75-1.5		●	●		●			
Proline	0.6-0.8	●	●	●		●	●		
Property 180 SC	0.5		●						
Prosaro	0.75-1.0		●	●	●	●	●		
Protendo 300 EC	0.33-0.65		●	●		●	●		
Protikon 250 EC	0.7-0.8		[v]●	[v]●					
Remocco 90	0.7			●	●	●			
Revystar XL	0.75-1.5		●	●		●			
Revytrex	0.75-1.5		●	●		●			
Riza 200 EC	1.25		●	●	●	●	●		
Siltra Xpro	0.75-1.0			●		●	●		
Silvron	0.75-1.25			●		●			
Soratel	0.6-0.8			●		●			
Syrius	1.0		●	●		●	●		
Talius	0.125-0.250		●						
Tetatra	0.6-0.8			●		●			
Torero	0.8-1.0		●	●					
Turret 90	0.7			●	●	●			
Univoq	1.2-1.5			●		●	●		
Variano Xpro	1.0-1.25		●	●		●	●		
Vazanti	1.0-1.25		●	●		●			
Verben	0.6-1.0	[z]●	●	●		●			
Winotote	0.5		●	●					

TRITIKĀLE

Augu aizsardzības līdzeklis	Deva l, kg/ha	Kaitīgais organisms									
		Graudzāļu miltrasa *Erysiphe graminis*	Sakņu puve *Fusarium spp.*	Brūnā rūsa *Puccinia recondita*	Stiebrzāļu gredzenplankumainība *Rhynchosporium secalis*	Kviešu plēkšņu plankumainība *Septoria nodorum*	Kviešu lapu pelēkplankumainība *Septoria tritici*	Dzeltenā rūsa *Puccinia striiformis*	Kviešu lapu dzeltenplankumainība *Drechslera tritici- repentis*	Vārpu fuzarioze *Fusarium spp.*	Stiebru lūšana *Pseudocercosporella herpotrichoides*
Amistar 250 SC	0.8-1.0			●	●			●			
Artina	0.7; 1.0*			●		●	●	●	●	●*	
Artina EC	0.7; 1.0*			●		●	●	●	●	●*	
Ascra Xpro	0.75-1.5	●		●	●	●	●	●	●		
Avastel	1.0-1.25	●		●		●	●	●	●		
Azaka	0.8-1.0	●		●							

Azuba	0.8-1.0			●	●			●			
Balaya	0.5-1.5; 0.5-1.0	●		●	●		●	●			
Benafar	0.6-0.8			●			●	●			
Bolid 250 SE	1.0			[z]●			[z]●		[z]●		
Capalo Revy	0.75-1.50	●		●	●		●	●			●
Cayunis	1.0; 0.8	●		●	●		●	●	●		
Conclude AZT 250 SC	0.8-1.0			●	●			●			
Croton Flex	0.6-0.8	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Curbatur	0.6-0.8	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Delaro Forte	1.3	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Elatus Era	0.75-1.0			●	●	●	●	●			
Elatus Plus	0.375-0.750			●	●	●	●	●			
Euskatel	0.8	●		●	●		●	●		●	
Falcon Forte	0.6-0.8	●		●	●	●	●	●	●		
Flexity	0.5	●									
Glacis	0.6-0.8	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Globaztar 250 SC	1.0; 0.5+0.5	●			●	●	●	●	●		
Hutton Flex	0.6-1.0; 0.8-1.0*	●		●	●	●	●		●	●*	
Imtrex XE	2.0	●		●		●	●	●	●		
Innox	0.6-0.8			●			●	●			
Input	0.8-1.0	●	●	●	●	●	●		●	●	●
Input Triple	0.75	●		●	●		●		●		●
Joust	0.6-0.8	●		●	●		●	●	●	●	
Juventus 90	0.7; 1.0*			●		●	●	●	●	●*	
Leander	0.5	●		●				●			
Lenvyor	0.75-1.5	[z]●		[z]●	[z]●		[z]●	[z]●			
Librax	0.75-1.0	●		●	●	●	●	●		●	
Maxentis	0.4	●		●	●		●		●	●	
Mirador 250 SC	0.8-1.0			●	●			●			
Mirador Forte	1.5-2.0	●		●		●	●	●			
Patel 300 EC	0.33-0.65	●		●	●	●	●	●	●	●	
Pecari 300 EC	0.33-0.65	●		●	●	●	●	●	●	●	
Pioli	2.0	●		●		●	●	●	●		
Plexeo 90	0.7; 1.0*			●		●	●	●	●	●*	
Plexeo 90 EC	0.7; 1.0*			●		●	●	●	●	●*	
Poleposition 300 EC	0.33-0.65	●		●	●	●	●	●	●	●	
Priaxor	0.75-1.5	●		●		●	●	●	●		
Proline	0.6-0.8	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Property 180 SC	0.5	●									
Prosaro	0.75-1.0	●		●	●	●	●	●		●	
Protendo 300 EC	0.33-0.65	●		●	●	●	●	●	●	●	
Remocco 90	0.7; 1.0*			●		●	●	●	●	●*	
Revystar XL	0.75-1.5	●		●	●		●	●	●		
Revytrex	0.75-1.5	●		●	●		●	●	●		
Riza 200 EC	1.25	●		●		●	●	●		●	
Siltra Xpro	0.75-1.0			●	●	●	●	●		●	
Silvron	0.75-1.25	●		●	●		●		●		
Soratel	0.6-0.8			●			●	●			
Talius	0.125-0.250	●									
Tetatra	0.6-0.8			●			●	●			
Torero	0.8-1.0	●		●							
Turret 90	0.7; 1.0*			●		●	●	●	●	●*	
Univoq	1.2-1.5	●		●		●	●	●		●	
Variano Xpro	1.0-1.25	●		●	●	●	●		●	●	
Vazanti	1.0-1.25	●		●		●	●	●	●		
Verben	0.6-1.0	●		●	●		●	●	●		[z]●
Winotote	0.5	●		●				●			

AUZAS

Augu aizsardzības līdzeklis	Deva l, kg/ha	Kaitīgais organisms				
		Auzu lapu brūnplankumainība *Drechslera avenae*	Graudzāļu miltrasa *Erysiphe graminis*	Auzu vainagrūsa *Puccinia coronata*	Auzu pelēkplankumainība *Stagonospora avenae*	Vārpu fuzarioze *Fusarium spp.*
Artina	0.7	●				
Artina EC	0.7	●				
Ascra Xpro	0.6-1.2	●	●	●		
Balaya	0.5-1.5; 0.5-1.0	●	●	●		
Benafar	0.45	●		●		
Capalo Revy	0.75-1.50		●	●		
Comet Pro	1.25			●		
Euskatel	0.8			●		
Flexity	0.5		●			
Globaztar 250 SC	1.0	●		●		
Hutton Flex	0.6-0.8; 0.8*		●			●*
Imtrex XE	1.0-2.0	●	●	●		
Innox	0.45	●		●		
Joust	0.6		●	●		
Juventus 90	0.7	●				
Lenvyor	0.75-1.5	●	●	●		
Librax	1.0-2.0	●				●
Maxentis	0.4					●
Mirador Forte	1.5-2.0		●			
Orius 250 EW	1.0		●	●		
Patel 300 EC	0.33-0.65	●		●		●
Pecari 300 EC	0.33-0.65	●		●		●
Pioli	1.0-2.0	●	●	●		
Plexeo 90	0.7	●				
Plexeo 90 EC	0.7	●				
Poleposition 300 EC	0.33-0.65	●		●		●
Priaxor	0.75-1.5	●				
Property 180 SC	0.5		●			
Prosaro	0.75-1.0		●	●	●	
Protendo 300 EC	0.33-0.65	●		●		●
Remocco 90	0.7	●				
Revystar XL	0.75-1.5	●				
Revytrex	0.75-1.5	●				
Siltra Xpro	0.75-1.0	●				●
Silvron	0.75-1.25	●		●		
Soratel	0.45	●		●		
Syrius	1.0		●	●		
Tetatra	0.45	●		●		
Turret 90	0.7	●				

FUNGICĪDI RAPSIM

ZIEMAS RAPSIS

Augu aizsardzības līdzeklis	Deva l, kg/ha	Kaitīgais organisms							
		Baltā puve *Sclerotinia sclerotiorum*	Pelēkā puve *Botrytis cinerea*	Krustziežu sausā puve *Phoma lingam*	Krustziežu sausplankumainība *Alternaria brassicae*	Krustziežu gaišplankumainība *Pyrenopeziza brassicae*	Nēsta miltrasa *Hyaloperonospora parasitica*	Krustziežu verticilārā vīte *Verticillium longisporium*	Krustziežu miltrasa *Erysiphe cruciferarum*
Amistar 250 SC	0.8-1.0	●			●				
Amistar Gold	0.75	●							
Artina	0.5			●	●				
	0.7	●			●				
Artina EC	0.5			●	●				
	0.7	●			●				
Azaka	1.0	●			●				
Azuba	0.8-1.0	●			●				
Benafar	0.6-0.7	●			●				
Bolid 250 SE	1.0	●	●		●				
Bonafide	0.5	●			●				
Bosca	0.5	●			●				
Cantus	0.5	●			●				
Cezix	0.75		●	●	●				
	1.0-1.5			●					
	1.0		●		●				
Conclude AZT 250 EC	0.8-1.0	●			●				
DARCOS	0.75		●	●	●				
	1.0-1.5			●					
	1.0		●		●				
Efilor	1.0			●					
	0.7-1.0	●			●				
Erasmus	0.75		●	●	●				
	1.0-1.5			●					
	1.0		●		●				
Folicur	0.5			●	●	●			
	1.0	●	●	●	●	●			
Innox	0.6-0.7	●			●				
Joust	0.6-0.7	●		●	●				
Juventus 90	0.5			●	●				
	0.7	●			●				
Maganic	0.8-1.0			●	●		●		
Maxentis	0.4	●		●	●				
Mirador 250 SC	0.8-1.0	●			●				
Mirador Forte	2.0	●	●		●				
Mirador Uni	0.75	●							
Orius 250 EW	0.5			●					
	1.0	●	●	●	●				
Patel 300 EC	0.3-0.6	●			●				

Pecari 300 EC	0.3-0.6	●			●				
Pictor Active	0.6-1.0	●			●				
	0.5+0.5	●			●				
Plexeo 90	0.5			●	●				
	0.7	●			●				
Plexeo 90 EC	0.5			●	●				
	0.7	●			●				
Poleposition 300 EC	0.3-0.6	●			●				
Polyversum	0.1	●		●					
Praktis	0.7	●							
Propulse	0.8-1.0	●	●		●				
Prosaro	1.0	●	●	●	●	●			
Protendo 300 EC	0.3-0.6	●			●				
Protikon 250 EC	0.7-0.8	●			●				
Rasput	0.3-0.5	●							
Revydas	0.6-1.0	●			●				●
Revyona	0.75-1.5; 0.75			●		●	●	●	
	1.0-2.0	●			●				
Riza 200 EC	1.25	●	●	●	●				
Soratel	0.6-0.7	●			●				
Syrius	0.5			●					
	1.0	●	●	●	●				
Tetatra	0.6-0.7	●			●				
Tilmor	0.8-1.2			●					
	0.8-1.0				●	●			
	1.0	●	●	●					
Toprex 375 SC	0.3			●	●	●			
	0.5			●	●	●			
Torero	1.0	●			●				
Treso	0.75	●							
Turret 90	0.5			●	●				
	0.7	●			●				
Vredmix	0.75	●							
Zenby	0.8	●							

VASARAS RAPSIS

Augu aizsardzības līdzeklis	Deva l, kg/ha	Kaitīgais organisms					
		Baltā puve *Sclerotinia sclerotiorum*	Pelēkā puve *Botrytis cinerea*	Krustziežu sausā puve *Phoma lingam*	Krustziežu sausplaunkumaiņība *Alternaria brassicae*	Krustziežu gaišplankumainība *Pyrenopeziza brassicae*	Krustziežu miltrasa *Erysiphe cruciferarum*
Amistar 250 SC	0.8-1.0	●			●		
Amistar Gold	0.75	●					
Artina	0.5				●		
	0.7	●			●		

Artina EC	0.5				●		
	0.7	●			●		
Azaka	1.0	●			●		
Azuba	0.8-1.0	●			●		
Benafar	0.6-0.7	●			●		
Bonafide	0.5	●			●		
Bosca	0.5	●			●		
Cantus	0.5	●			●		
Conclude AZT 250 EC	0.8-1.0	●			●		
Efilor	1.0			●			
	0.7-1.0	●			●		
Folicur	1.0	●	●	●	●	●	
Innox	0.6-0.7	●			●		
Joust	0.6-0.7	●		●	●		
Juventus 90	0.5				●		
	0.7	●			●		
Maxentis	0.4	●		●	●		
Mirador 250 SC	0.8-1.0	●			●		
Mirador Forte	2.0	●	●		●		
Mirador Uni	0.75	●					
Orius 250 EW	1.0	●	●	●	●		
Patel 300 EC	0.3-0.6	●			●		
Pecari 300 EC	0.3-0.6	●			●		
Pictor Active	0.6-1.0	●			●		
	0.5+0.5	●			●		
Plexeo 90	0.5				●		
	0.7	●			●		
Plexeo 90 EC	0.5				●		
	0.7	●			●		
Poleposition 300 EC	0.3-0.6	●			●		
Propulse	0.8-1.0	●	●		●		
Prosaro	1.0	●	●	●	●	●	
Protendo 300 EC	0.3-0.6	●			●		
Revydas	0.6-1.0	●			●		●
Revyona	0.75-1.5; 0.75			●		●	
	1.0-2.0	●			●		
Riza 200 EC	1.25		●	●	●		
Soratel	0.6-0.7	●			●		
Syrius	1.0	●	●	●	●		
Tetatra	0.6-0.7	●			●		
Tilmor	0.8-1.0				●	●	
	1.0	●	●	●			
Torero	1.0	●			●		
Treso	0.75	●					
Turret 90	0.5				●		
	0.7	●			●		
Vredmix	0.75	●					
Zenby	0.8	●					

APSTRĀDĀJAMO KULTŪRAUGU UN CITU OBJEKTU RĀDĪTĀJS

SATURS

Augļu koki 374
Ogulāji 376
Dārzeņi, garšaugi. 379
Cukurbietes, lopbarības bietes 389
Lopbarības kāposti. 390
Graudaugi ar/bez pasēju. 390
Rapsis, ripsis, sējas idra, eļļas augi, sinepes 404
Pākšaugi 407
Kartupeļi 409
Lini 410
Kukurūza 410
Saulespuķes. 411
Krāšņumaugi, dekoratīvie augi 411
Zālāji, ilggadīgās stiebrzāles un tauriņzieži. 413
Zāliens 414
Kokaudzētavas, stādaudzētavas, jaunaudzes. 414
Noliktavas 416
Dažādi 416
Fumigācija 418

Kultūra	Augu aizsardzības līdzeklis	Liet. Kat.	Lpp.
1	3	4	5
AUGĻU KOKI			
Augļu koki	Eupiods sistēma	Dz	338
	Wōbra	R	310
Aprikozes	Beloukha	H	57, 175
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Rodeo Plus	H	244
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Serenade Aso	F	321
	VitiSan	F	157, 159
Ābeles	Acetami 20 SG	I	287
	Acetazol 20 SG	I	287
	Acetazol Extra	I	272
	Agil 100 EC	H	165
	Barbarian Biograde 360	H	170
	Barbarian Hi-Aktiv	H	171
	Barbarian Super 360	H	170
	Beloukha	H	57, 175
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Candit	F	82
	Carnadine Extra	I	272
	Chorus 50 WG	F	85
	Clinic Up	H	170
	Coragen 20 SC	I	274
	Credit Xtreme	H	190
	Decis Forte	I	275
	Decis Mega	I	277
	Delan Pro	F	88
	Devrinols s.k.	H	191
	Difcor 250 EC	F	90
	Difenzone	F	92
	DiPel DF	I	311
	Dominator 480	H	193
	Dynamo	F	92
	Effector	F	92
	Emin dārzam Score 250 EC	F	141
	Evure	I	285
	Fibro	I/A	279
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Frooti	AR	44
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Gallup 360-K	H	208
	Gallup Super 360	H	170
	Gazelle 20 SG	I	287
	Gepard 50 EC	H	241
	Gift	AR	44
	Glyphomax 480	H	209
	Graminis	H	241
	Halvetic	H	213
	Isonet Z	FR	352
	Karate Zeon 5 CS	I	280
	Krypt 540	H	217
	Kudos	AR	46
	Kyleo	H	219
	Lalstop G46 WG	F	312
	Lima Oro	Lim	305
	Limgol	Lim	305
	Madex Pro	I	316, 317
	Mavita 250 EC	F	140
	Mavrik	I	285, 286
	Meridian	Lim	305
	Monex	AR	51
	Monosate G	H	170
	Mospilan 20 SG	I	287
	Naturalis	I	318
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	Nemasys	Dz	344
	Nemasys C	Dz	345
	Nissorun 250 SC	A	293
	Ouragan System 4	H	232, 233
	Quick 50 EC	H	241
	Regalis Plus	AR	53
	Revyona	F	136
	Rodeo Plus	H	244
	Rodeo TF	H	259
	Rosate 360 TF	H	170
	Rosate Clean 360 SL	H	177

1	3	4	5
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Scab 80 WG	F	140
	Score	F	141
	Score 250 EC	F	140, 141
	Supero	H	241
	Syllit 544 SC	F	149
	Taifun B	H	259, 261
	Teppeki	I	299
	Topas 100 EC	F	152
	Tracer	I	300
	Trihogramma	Dz	351
	VitiSan	F	157, 159
	Zetrola	H	165
Bumbieres	Acetami 20 SG	I	287
	Acetazol 20 SG	I	287
	Agil 100 EC	H	165
	Barbarian Biograde 360	H	170
	Barbarian Hi-Aktiv	H	171
	Barbarian Super 360	H	170
	Beloukha	H	57, 175
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Candit	F	82
	Chorus 50 WG	F	85
	Clinic Up	H	170
	Coragen 20 SC	I	274
	Credit Xtreme	H	190
	Decis Forte	I	275
	Decis Mega	I	277
	Delan Pro	F	88
	Devrinols s.k.	H	191
	Difcor 250 EC	F	90
	DiPel DF	I	311
	Dominator 480	H	193
	Dynamo	F	92
	Effector	F	92
	Emin dārzam Score 250 EC	F	141
	Evure	I	285
	Frooti	AR	44
	Fibro	I/A	279
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Gallup 360-K	H	208
	Gallup Super 360	H	170
	Gazelle 20 SG	I	287
	Gepard 50 EC	H	241
	Gift	AR	44
	Glyphomax 480	H	209
	Graminis	H	241
	Halvetic	H	213
	Isonet Z	FR	352
	Karate Zeon 5 CS	I	280
	Krypt 540	H	217
	Kyleo	H	219
	Lima Oro	Lim	305
	Limgol	Lim	305
	Madex Pro	I	316, 317
	Mavita 250 EC	F	140
	Mavrik	I	285, 286
	Meridian	Lim	305

1	3	4	5
	Monosate G	H	170
	Mospilan 20 SG	I	287
	Naturalis	I	318
	Nemasys	Dz	344
	Nemasys C	Dz	345
	Nissorun 250 SC	A	293
	Ouragan System 4	H	232, 233
	Quick 50 EC	H	241
	Regalis Plus	AR	53
	Revyona	F	136
	Rodeo Plus	H	244
	Rodeo TF	H	259
	Rosate 360 TF	H	170
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Scab 80 WG	F	140
	Score	F	141
	Score 250 EC	F	140, 141
	Serenade Aso	F	321
	Supero	H	241
	Syllit 544 SC	F	149
	Taifun B	H	259, 261
	Teppeki	I	299
	Topas 100 EC	F	152
	Tracer	I	300
	VitiSan	F	157, 159
	Zetrola	H	165
Ķirši	Acetami 20 SG	I	287
	Acetazol 20 SG	I	287
	Beloukha	H	57, 175
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Chorus 50 WG	F	85
	Credit Xtreme	H	190
	Devrinols s.k.	H	191
	DiPel DF	I	311
	Dominator 480	H	193
	Dynamo	F	92
	Effector	F	92
	Emin dārzam Score 250 EC	F	141
	Fibro	I/A	279
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Gallup 360-K	H	208
	Gazelle 20 SG	I	287
	Glyphomax 480	H	209
	Karate Zeon 5 CS	I	280
	Krypt 540	H	217
	Kyleo	H	219
	Mavita 250 EC	F	140
	Mospilan 20 SG	I	287
	Naturalis	I	318
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	Ouragan System 4	H	232, 233
	Revyona	F	136
	Rodeo Plus	H	244
	Rodeo TF	H	259
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247

1	3	4	5
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Score	F	141
	Score 250 EC	F	140, 141
	Serenade Aso	F	321
	Signum	F	142
	Syllit 544 SC	F	149
	Taifun B	H	259, 261
	Teppeki	I	299
	Topas 100 EC	F	152
	VitiSan	F	157, 159
	Zenby	F	161
Melnais plūškoks	T34 Biocontrol	F	326
	Trico	R	309
	VitiSan	F	157, 159
Persiki	Beloukha	H	57, 175
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Rodeo Plus	H	244
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Serenade Aso	F	321
	VitiSan	F	157, 159
Plūmes	Acetami 20 SG	I	287
	Acetazol 20 SG	I	287
	Beloukha	H	57, 175
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Chorus 50 WG	F	85
	Coragen 20 SC	I	274
	Credit Xtreme	H	190
	Devrinols s.k.	H	191
	DiPel DF	I	311
	Dominator 480	H	193
	Dynamo	F	92
	Effector	F	92
	Emin dārzam Score 250 EC	F	141
	Fibro	I/A	279
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Gallup 360-K	H	208
	Gazelle 20 SG	I	287
	Glyphomax 480	H	209
	Isonet Z	FR	352
	Karate Zeon 5 CS	I	280
	Krypt 540	H	217
	Kyleo	H	219
	Mavita 250 EC	F	140
	Mospilan 20 SG	I	287
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	Ouragan System 4	H	232, 233
	Revyona	F	136
	Rodeo Plus	H	244
	Rodeo TF	H	259
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Score	F	141
	Score 250 EC	F	140, 141

1	3	4	5
	Serenade Aso	F	321
	Signum	F	142
	Taifun B	H	259, 261
	Teppeki	I	299
	VitiSan	F	157, 159
	Zenby	F	161
Smiltsērkšķi	DiPel DF	I	311
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Naturalis	I	318
	Ouragan System 4	H	232, 233
	Rodeo TF	H	259
	Taifun B	H	259, 261
	Tracer	I	300
	VitiSan	F	157, 159
OGULĀJI			
Aronijas	DiPel DF	I	311
	VitiSan	F	157, 159
Avenes	Agil 100 EC	H	165
	Aliette	F	71
	Beloukha	H	57, 175
	Calif PRO5	Dz	332
	Calif PRO5 LS	Dz	332
	CBS sistēma	Dz	333
	Decis Forte	I	275
	Devrinols s.k.	H	191
	DiPel DF	I	311
	Dynamo	F	92
	Effector	F	92
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Kalifornikus sistēma	Dz	340
	Lalstop G46 WG	F	312
	Lima Oro	Lim	305
	Limgol	Lim	305
	Meridian	Lim	305
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	Nissorun 250 SC	A	293
	Serenade Aso	F	321
	Spotlight Plus	H	57, 255
	Switch 62.5 WG	F	147
	T34 Biocontrol	F	326
	Tracer	I	300
	Trianum-P	F	328
	VitiSan	F	157, 159
	Zetrola	H	165
Avenes tuneļos	Lalstop G46 WG	F	312
	Nissorun 250 SC	A	293
Dzērvenes	Candit	F	82
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Lalstop G46 WG	F	312
	Serenade Aso	F	321
	Signum	F	142
	T34 Biocontrol	F	326
Ērkšķogas	Agil 100 EC	H	165
	Beloukha	H	57, 175
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Candit	F	82
	Devrinols s.k.	H	191
	DiPel DF	I	311

1	3	4	5
	Dynamo	F	92
	Effector	F	92
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Isonet Z	FR	352
	Lima Oro	Lim	305
	Limgol	Lim	305
	Meridian	Lim	305
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	Nissorun 250 SC	A	293
	Rodeo Plus	H	244
	Rodeo TF	H	259
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Serenade Aso	F	321
	Spotlight Plus	H	57, 255
	T34 Biocontrol	F	326
	Taifun B	H	259, 261
	Topas 100 EC	F	152
	Tracer	I	300
	VitiSan	F	157, 159
	Zetrola	H	165
Jāņogas	Agil 100 EC	H	165
	Beloukha	H	57, 175
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Candit	F	82
	CBS sistēma	Dz	333
	Devrinols s.k.	H	191
	DiPel DF	I	311
	Dynamo	F	92
	Effector	F	92
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Isonet Z	FR	352
	Kalifornikus sistēma	Dz	340
	Lalstop G46 WG	F	312
	Lima Oro	Lim	305
	Limgol	Lim	305
	Meridian	Lim	305
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	Nissorun 250 SC	A	293
	Rodeo Plus	H	244
	Rodeo TF	H	259
	Rosate Clean 360 Sl	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Serenade Aso	F	321
	Spotlight Plus	H	57, 255
	T34 Biocontrol	F	326
	Taifun B	H	259, 261
	Topas 100 EC	F	152
	Tracer	I	300
	VitiSan	F	157, 159
	Zetrola	H	165

1	3	4	5
Kazenes	Beloukha	H	57, 175
	CBS sistēma	Dz	333
	DiPel DF	I	311
	Kalifornikus sistēma	Dz	340
	Lalstop G46 WG	F	312
	Lima Oro	Lim	305
	Limgol	Lim	305
	Meridian	Lim	305
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	Nissorun 250 SC	A	293
	Serenade Aso	F	321
	Spotlight Plus	H	57, 255
	Switch 62.5 WG	F	147
	T34 Biocontrol	F	326
	Tracer	I	300
	Trianum-P	F	328
	VitiSan	F	157, 159
Kazenes tuneļos	Lalstop G46 WG	F	312
	Nissorun 250 SC	A	293
Korintes	VitiSan	F	157, 159
Krūmcidonijas	Beloukha	H	57, 175
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Gepard 50 EC	H	241
	Graminis	H	241
	Madex Pro	I	316, 317
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	Quick 50 EC	H	241
	Supero	H	241
	Tracer	I	300
	VitiSan	F	157, 159
Krūmmellenes	Beloukha	H	57, 175
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Calif PRO5	Dz	332
	Calif PRO5 LS	Dz	332
	Candit	F	82
	CBS sistēma	Dz	333
	Devrinols s.k.	H	191
	DiPel DF	I	311
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Kalifornikus sistēma	Dz	340
	Lalstop G46 WG	F	312
	Naturalis	I	318
	Nissorun 250 SC	A	293
	Rodeo Plus	H	244
	Rodeo TF	H	259
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Serenade Aso	F	321
	Signum	F	142
	Spotlight Plus	H	57, 255
	T34 Biocontrol	F	326
	Taifun B	H	259, 261
	Trianum-P	F	328
	VitiSan	F	157, 159

1	3	4	5
Krūmmellenes tuneļos	Lalstop G46 WG	F	312
	Naturalis	I	318
	Nissorun 250 SC	A	293
Mespils, parastais	Gepard 50 EC	H	241
	Graminis	H	241
	Quick 50 EC	H	241
	Supero	H	241
Ogulāji	Eupiods sistēma	Dz	338
	Gusto	Lim	302
	Larvanem	Dz	340
	Mikromus sistēma	Dz	342
	Nemasys	Dz	344
	Trianum-P	F	328
	Vitrol GB	Lim	306, 307
Pīlādži	VitiSan	F	157, 159
Upenes	Agil 100 EC	H	165
	Beloukha	H	57, 175
	Candit	F	82
	CBS sistēma	Dz	333
	Devrinols s.k.	H	191
	DiPel DF	I	311
	Dynamo	F	92
	Effector	F	92
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Isonet Z	FR	352
	Kalifornikus sistēma	Dz	340
	Lima Oro	Lim	305
	Limgol	Lim	305
	Meridian	Lim	305
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	Nissorun 250 SC	A	293
	Rodeo Plus	H	244
	Rodeo TF	H	259
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Serenade Aso	F	321
	Spotlight Plus	H	57, 255
	T34 Biocontrol	F	326
	Taifun B	H	259, 261
	Topas 100 EC	F	152
	Tracer	I	300
	VitiSan	F	157, 159
	Zetrola	H	165
Vīnogas	Fopaz	F	100
	Gepard 50 EC	H	241
	Graminis	H	241
	Naturalis	I	318
	Nissorun 250 SC	A	293
	Quick 50 EC	H	241
	Serenade Aso	F	321
	Supero	H	241
	Topas 100 EC	F	152
	Trico	R	309
	VitiSan	F	157, 159
	Zenby	F	161

1	3	4	5
Vīnogulāji, vīnogulāji (neražojoši)	Gallup 360-K	H	208
	Krypt 540	H	217
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
Zemenes	Adalia sistēma (Adalia-E sistēma)	Dz	330
	Agil 100 EC	H	165
	Beloukha	H	57, 175
	Benevia 100 OD	I	270
	Betanal	H	177
	Candit	F	82
	Carpo sistēma	Dz	333
	CBS sistēma	Dz	333
	Centurion Plus	H	184
	Cliophar 600 SL	H	188
	Devrinols s.k.	H	191
	DiPel DF	I	311
	Eupiods sistēma	Dz	338
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Goltix Gold	H	211
	Gusto	Lim	302
	Heterorhabditis sistēma	Dz	339
	Lalstop G46 WG	F	312
	Larvanem	Dz	340
	Lontrel 72 SG	H	222
	Mizuki	H	57, 226
	Naturalis	I	318
	NemaFence Phasma	Dz	343
	Nemasys H	Dz	345
	Nemasys L	Dz	346
	Nervure	H	227
	Nissorun 250 SC	A	293
	Select Plus	H	184
	Serenade Aso	F	321
	Signum	F	142
	Spotlight Plus	H	57, 255
	Steinernema sistēma	Dz	348
	Switch 62.5 WG	F	147
	Topas 100 EC	F	152
	Tracer	I	300
	VitiSan	F	157, 159
	Vitrol GB	Lim	306, 307
	Zenby	F	161
	Zetrola	H	165
Zemenes segtās platībās	ABS sistēma	Dz	330
	Adalia sistēma (Adalia-E sistēma)	Dz	330
	Afidius sistēma	Dz	330
	Afidoletes sistēma	Dz	331
	Aliette	F	71
	Ambliseijus sistēma	Dz	331
	Calif PRO5	Dz	332
	Calif PRO5 LS	Dz	332
	Candit	F	82
	Carpo sistēma	Dz	333
	CBS sistēma	Dz	333
	Cidely Top	F	86
	Cucum PRO5	Dz	334
	Cucum PRO5 LS	Dz	334

1	3	4	5
	DiPel DF	I	311
	Enkarsijas sistēma	Dz	336
	Entonem	Dz	336
	Eretmiks sistēma	Dz	337
	Eretmocerus sistēma	Dz	337
	Eupiods sistēma	Dz	338
	Feltiella sistēma	Dz	338
	Fitoseiulus sistēma	Dz	339
	Gusto	Lim	302
	Lalstop G46 WG	F	312
	Larvanem	Dz	340
	Limonikus sistēma	Dz	341
	Mikromus sistēma	Dz	342
	Montdorensis sistēma	Dz	343
	Naturalis	I	318
	Nissorun 250 SC	A	293
	Orius sistēma	Dz	346
	Serenade Aso	F	321
	Steinernema sistēma	Dz	348
	Svirski sistēma	Dz	349
	Swir PRO5	Dz	349
	Swir PRO5 LS	Dz	349
	Switch 62.5 WG	F	147
	T34 Biocontrol	F	326
	Topas 100 EC	F	152
	Tracer	I	300
	Trianum-P	F	328
	VitiSan	F	157, 159
	Vitrol GB	Lim	306, 307
	Zenby	F	161
Zemenes stādu audzēšanai mātesaugu laukos	Aliette	F	71
Zemenes tuneļos	Carpo sistēma	Dz	333
	Heterorhabditis sistēma	Dz	339
	Lalstop G46 WG	F	312
	Naturalis	I	318
	NemaFence Phasma	Dz	343
	Nissorun 250 SC	A	293
	Vitrol GB	Lim	306, 307
Zīdkoks	T34 Biocontrol	F	326
DĀRZEŅI, GARŠAUGI			
Arbūzi	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Ironmax Pro	Lim	303
	Lalstop G46 WG	F	312
	Mirador 250 SC	F	73
	Serenade Aso	F	321
	Topas 100 EC	F	152
	VitiSan	F	157, 159
Arbūzi atklātā laukā	Naturalis	I	318
	Ranman Top	F	133
Arbūzi segtās platībās	Naturalis	I	318
	Nissorun 250 SC	A	293
	Ranman Top	F	133
Arbūzi tuneļos	Lalstop G46 WG	F	312
	Naturalis	I	318
Baklažāni atklātā laukā	Gusto	Lim	302
	NeemAzal	I/A	290

1	3	4	5
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	T34 Biocontrol	F	326
Baklažāni segtās platībās	CBS sistēma	Dz	333
	Daknusa sistēma	Dz	335
	DiPel DF	I	311
	Feltiella sistēma	Dz	338
	Gusto	Lim	302
	Ironmax Pro	Lim	303
	Kalifornikus sistēma	Dz	340
	Lalstop G46 WG	F	312
	Naturalis	I	318
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	Nissorun 250 SC	A	293
	Serenade Aso	F	321
	Sferoforia sistēma	Dz	347
	Steinernema sistēma	Dz	348
	Swirskii-Mite LD	Dz	350
	Switch 62.5 WG	F	147
	T34 Biocontrol	F	326
	Tracer	I	300
	VitiSan	F	157, 159
Baldriņi, salātu	T34 Biocontrol	F	326
Batātes	Serenade Aso	F	321
Baziliks	Serenade Aso	F	321
	T34 Biocontrol	F	326
Bietes, galda	Agil 100 EC	H	165
	Amistar Gold	F	77
	Bagira	H	234
	Benevia 100 OD	I	270
	Betanal	H	177
	Centurion Plus	H	184
	Cliophar 600 SL	H	188
	Coragen 20 SC	I	274
	Difcor 250 EC	F	90
	Emin dārzam Score 250 EC	F	141
	Evure	I	285
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Gepard 50 EC	H	241
	Graminis	H	241
	Goltix 700 SC	H	211
	Goltix Gold	H	211
	Ironmax Pro	Lim	303
	Lontrel 72 SG	H	222
	Mavita 250 EC	F	140
	Mavrik	I	285, 286
	Mirador Uni	F	77
	Nervure	H	227
	Nexide CS	I	292
	Panarex	H	234
	Pantera 4 EC	H	234
	Quick 50 EC	H	241
	Roundup Gold ST	H	249
	Score	F	141
	Score 250 EC	F	140, 141
	Select Plus	H	184
	Serenade Aso	F	321
	Supero	H	241
	Switch 62.5 WG	F	147
	T34 Biocontrol	F	326

1	3	4	5
	Teppeki	I	299
	Vantex CS	I	292
	Vredmix	F	77
	Zetrola	H	165
Bietes, lapu (atklātā laukā)	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
Brokoļi	Acetami 20 SG	I	287
	Acetazol 20 SG	I	287
	Afrodyta 250 SC	F	69
	Agil 100 EC	H	165
	Amistar 250 SC	F	73
	Benevia 100 OD	I	270
	Butisan 400	H	181
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Coragen 20 SC	I	274
	Decis Mega	I	277
	Devrinols s.k.	H	191
	Difcor 250 EC	F	90
	DiPel DF	I	311
	Emin dārzam Mavrik Vita	I	286
	Evure	I	285
	Gazelle 20 SG	I	287
	Gusto	Lim	302
	Infinito	F	103
	Ironmax Pro	Lim	303
	Karate Zeon 5 CS	I	280
	Lentagran WP	H	220
	Mavrik	I	285, 286
	Mirador 250 SC	F	73
	Mospilan 20 SG	I	287
	Rapsan 400 SC	H	181
	Serenade Aso	F	321
	T34 Biocontrol	F	326
	Tracer	I	300
	Vitrol GB	Lim	306, 307
	Zetrola	H	165
Brūnvālīte, mazā	T34 Biocontrol	F	326
Burkāni	Achiba	H	165
	Agil 100 EC	H	165
	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Bagira	H	234
	Beloukha	H	57, 175
	Benevia 100 OD	I	270
	Boxer 800 EC	H	179
	Clever	H	197
	Centurion Plus	H	184
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Coragen 20 SC	I	274
	Crown MH	AR	42
	Decis Forte	I	275
	Decis Mega	I	277
	Difcor 250 EC	F	90
	Eclaire	H	197
	Emin dārzam Score 250 EC	F	141
	Evure	I	285
	Fenix	H	197
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Gallup 360-K	H	208

1	3	4	5
	Gepard 50 EC	H	241
	Graminis	H	241
	Ironmax Pro	Lim	303
	Jenot Plus 050 EC	H	262
	Krypt 540	H	217
	Lalstop G46 WG	F	312
	Lentagran WP	H	220
	Leopard	H	221
	Linati 800 EC	H	179
	Mavita 250 EC	F	140
	Mavrik	I	285, 286
	Mirador 250 SC	F	73
	Nemasys	Dz	344
	Nervure	H	227
	Novitron DAMTec	H	229
	Panarex	H	234
	Pantera 4 EC	H	234
	Pilot	H	262
	Poleci	I	296
	Quick 50 EC	H	241
	Rango Max	H	242
	Rodeo TF	H	259
	Roundup Gold ST	H	249
	Roxy EC	H	179
	Score	F	141
	Score 250 EC	F	140, 141
	Select Plus	H	184
	Serenade Aso	F	321
	Signum	F	142
	Stomp CS	H	257
	Supero	H	241
	Switch 62.5 WG	F	147
	T34 Biocontrol	F	326
	Taifun B	H	259, 261
	Targa Super	H	262
	Toutatis DAMTec	H	229
	VitiSan	F	157, 159
	Zetrola	H	165
Cigoriņi	Coragen 20 SC	I	274
	T34 Biocontrol	F	326
Cigoriņi (lapu)	Lalstop G46 WG	F	312
Cigoriņi (sakņu)	Difcor 250 EC	F	90
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Serenade Aso	F	321
Cukīni atklātā laukā	Ironmax Pro	Lim	303
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	Ranman Top	F	133
	Serenade Aso	F	321
	Switch 62.5 WG	F	147
	T34 Biocontrol	F	326
	Topas 100 EC	F	152
Cukīni segtās platībās	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Cidely Top	F	86
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Emin dārzam Revus 250 SC	F	134
	Lalstop G46 WG	F	312
	Mirador 250 SC	F	73

1	3	4	5
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	Ranman Top	F	133
	Revus 250 SC	F	134
	Serenade Aso	F	321
	Switch 62.5 WG	F	147
	T34 Biocontrol	F	326
	Topas 100 EC	F	152
Cukīni tuneļos	Lalstop G46 WG	F	312
Dārzeņi	Adalia sistēma (Adalia-E sistēma)	Dz	330
	Beloukha	H	57, 175
	Beloukha Garden RTU	H	176
	Eupiods sistēma	Dz	338
	Larvanem	Dz	340
	NemaFence Phasma	Dz	343
	Nemaslug	Dz	343
	Nemasys	Dz	344
	Nemasys C	Dz	345
	Nemasys No Ants	Dz	346
Dārzeņi, augļu	Mycostop	F	317
	Trianum-P	F	328
Dārzeņi, bumbuļu	Lalstop G46 WG	F	312
	Trianum-P	F	328
Dārzeņi, lapu	Lalstop G46 WG	F	312
	Mycostop	F	317
	Trianum-P	F	328
	Vitrol GB	Lim	306, 307
Dārzeņi, segtās platībās	Adalia sistēma (Adalia-E sistēma)	Dz	330
	Aphidend	Dz	331
	Aphipar	Dz	332
	Aphiscout	Dz	332
	Calif PRO5	Dz	332
	Calif PRO5 LS	Dz	332
	Carpo sistēma	Dz	333
	Chrysopa	Dz	333
	Chrysopa-E	Dz	334
	Cryptobug	Dz	334
	Cryptobug-L	Dz	334
	Cucum PRO5	Dz	334
	Cucum PRO5 LS	Dz	334
	Daknusa sistēma	Dz	335
	Enermix	Dz	335
	En-strip	Dz	336
	Entomite-M	Dz	336
	Entonem	Dz	336
	Ercal	Dz	337
	Ervipar	Dz	337
	Hipoaspis sistēma	Dz	339
	Kriptolēmus-(L-) sistēma	Dz	340
	Limonikus sistēma	Dz	341
	Macro-Mite	Dz	341
	Miglyphus	Dz	342
	Mikromus sistēma	Dz	342
	Mirical	Dz	342
	Montdorensis sistēma	Dz	343
	Sferoforia sistēma	Dz	347
	Spical	Dz	347
	Spical-Plus	Dz	347
	Spidex Vital	Dz	348
	Spidend	Dz	348
	Steinernema sistēma	Dz	348

1	3	4	5
	Swir PRO5	Dz	349
	Swir PRO5 LS	Dz	349
	Swirskii-Mite	Dz	350
	Swirskii-Mite Plus	Dz	350
	Thripex (Thripex-plus)	Dz	351
	Thripor-L	Dz	351
Dārzeņi, sakņu	Lalstop G46 WG	F	312
	Mycostop	F	317
	Trianum-P	F	328
Dārzeņi, sīpolu	Lalstop G46 WG	F	312
Dārzeņi, stublāju	Lalstop G46 WG	F	312
	Trianum-P	F	328
Dilles	Clever	H	197
	Eclaire	H	197
	Fenix	H	197
	Serenade Aso	F	321
Dižzirdzene	T34 Biocontrol	F	326
Endīvijas	Gepard 50 EC	H	241
	Graminis	H	241
	Lalstop G46 WG	F	312
	Naturalis	I	318
	Quick 50 EC	H	241
	Serenade Aso	F	321
	Supero	H	241
	Switch 62.5 WG	F	147
	T34 Biocontrol	F	326
	VitiSan	F	157, 159
Estragons	T34 Biocontrol	F	326
Fenhelis (segtās platībās)	Serenade Aso	F	321
	T34 Biocontrol	F	326
Garšaugi	Acetami 20 SG	I	287
	Acetazol 20 SG	I	287
	Adalia sistēma (Adalia-E sistēma)	Dz	330
	Aphiscout	Dz	332
	Calif PRO5	Dz	332
	Calif PRO5 LS	Dz	332
	Carpo sistēma	Dz	333
	Cucum PRO5	Dz	334
	Cucum PRO5 LS	Dz	334
	DiPel DF	I	311
	Entonem	Dz	336
	Gazelle 20 SG	I	287
	Lalstop G46 WG	F	312
	Larvanem	Dz	340
	Limonikus sistēma	Dz	341
	Montdorensis sistēma	Dz	343
	Mospilan 20 SG	I	287
	Mycostop	F	317
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	NemaFence Phasma	Dz	343
	Nemasys	Dz	344
	Nemasys No Ants	Dz	346
	Pangodiņš	Dz	346
	Serenade Aso	F	321
	Steinernema sistēma	Dz	348
	Swir PRO5	Dz	349
	Swir PRO5 LS	Dz	349
	T34 Biocontrol	F	326
	Trianum-P	F	328
	VitiSan	F	157, 159

1	3	4	5
Gurķi atklātā laukā	Aliette	F	71
	CBS sistēma	Dz	333
	Eupiods sistēma	Dz	338
	Infinito	F	103
	Ironmax Pro	Lim	303
	Kalifornikus sistēma	Dz	340
	Mycostop	F	317
	Naturalis	I	318
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	Previcur Energy	F	121
	Ranman Top	F	133
	Roundup Gold ST	H	249
	Serenade Aso	F	321
	Switch 62.5 WG	F	147
	T34 Biocontrol	F	326
	Topas 100 EC	F	152
	VitiSan	F	157, 159
Gurķi segtās platībās	ABS sistēma	Dz	330
	Afidius sistēma	Dz	330
	Afidiuss	Dz	330
	Afidoletes sistēma	Dz	331
	Aliette	F	71
	Ambliseijus sistēma	Dz	331
	Ambliseiuss	Dz	331
	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	CBS sistēma	Dz	333
	Cidely Top	F	86
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Daknusa sistēma	Dz	335
	Decis Forte	I	275
	DiPel DF	I	311
	Emin dārzam Revus 250 SC	F	134
	Enkarsija	Dz	335
	Enkarsijas sistēma	Dz	336
	Eretmiks sistēma	Dz	337
	Eretmocerus sistēma	Dz	337
	Eupiods sistēma	Dz	338
	Feltiella sistēma	Dz	338
	Fitoseiulus sistēma	Dz	339
	Fitosējuluss	Dz	339
	Infinito	F	103
	Kalifornikus sistēma	Dz	340
	Lalstop G46 WG	F	312
	Mikromus sistēma	Dz	342
	Mirador 250 SC	F	73
	Nissorun 250 SC	A	293
	Mycostop	F	317
	Naturalis	I	318
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	Orius sistēma	Dz	346
	Pangodiņš	Dz	346
	Previcur Energy	F	121
	Ranman Top	F	133
	Revus 250 SC	F	134
	Serenade Aso	F	321
	Sferoforia sistēma	Dz	347
	Steinernema sistēma	Dz	348
	STS Cucurbitaceae	AR	55

1	3	4	5
	Svirski sistēma	Dz	349
	Swirskii-Mite LD	Dz	350
	Switch 62.5 WG	F	147
	T34 Biocontrol	F	326
	Topas 100 EC	F	152
	Tracer	I	300
	VitiSan	F	157, 159
Gurķi tuneļos	Lalstop G46 WG	F	312
	Naturalis	I	318
Gurķu mētra	Serenade Aso	F	321
Izops	T34 Biocontrol	F	326
Kabači	Ironmax Pro	Lim	303
	Switch 62.5 WG	F	147
Kabači atklātā laukā	Naturalis	I	318
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	Ranman Top	F	133
	Serenade Aso	F	321
	VitiSan	F	157, 159
Kabači segtās platībās	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Daknusa sistēma	Dz	335
	Emin dārzam Revus 250 SC	F	134
	Lalstop G46 WG	F	312
	Mirador 250 SC	F	73
	Naturalis	I	318
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	Nissorun 250 SC	A	293
	Ranman Top	F	133
	Revus 250 SC	F	134
	Serenade Aso	F	321
	Sferoforia sistēma	Dz	347
	Steinernema sistēma	Dz	348
	Switch 62.5 WG	F	147
	T34 Biocontrol	F	326
	VitiSan	F	157, 159
Kabači tuneļos	Lalstop G46 WG	F	312
	Naturalis	I	318
Kanavālijas	Prosaro	F	128
	Signum	F	142
Kāļi	Agil 100 EC	H	165
	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Barbarian Biograde 360	H	170
	Barbarian Hi-Aktiv	H	171
	Barbarian Super 360	H	170
	Benevia 100 OD	I	270
	Clinic Up	H	170
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Coragen 20 SC	I	274
	Decis Forte	I	275
	Decis Mega	I	277
	Difcor 250 EC	F	90
	DiPel DF	I	311
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Gallup Super 360	H	170
	Gepard 50 EC	H	241

1	3	4	5
	Graminis	H	241
	Ironmax Pro	Lim	303
	Mirador 250 SC	F	73
	Monosate G	H	170
	Nervure	H	227
	Quick 50 EC	H	241
	Rosate 360 TF	H	170
	Supero	H	241
	VextaDim 240 EC	H	267
	Zetrola	H	165
Kāpostaugi	Lalstop G46 WG	F	312
Kāposti	Agil 100 EC	H	165
	Mycostop	F	317
	Nemasys	Dz	344
	T34 Biocontrol	F	326
	Trianum-P	F	328
	Trihogramma	Dz	351
Kāposti, Āzijas	T34 Biocontrol	F	326
Kāposti, Briseles	Acetami 20 SG	I	287
	Acetazol 20 SG	I	287
	Afrodyta 250 SC	F	69
	Benevia 100 OD	I	270
	Butisan 400	H	181
	Centurion Plus	H	184
	Decis Forte	I	275
	Devrinols s.k.	H	191
	Difcor 250 EC	F	90
	DiPel DF	I	311
	Emin dārzam Mavrik Vita	I	286
	Evure	I	285
	Focus Ultra	H	200
	Gazelle 20 SG	I	287
	Gusto	Lim	302
	Infinito	F	103
	Ironmax Pro	Lim	303
	Karate Zeon 5 CS	I	280
	Lentagran WP	H	220
	Mavrik	I	285, 286
	Mospilan 20 SG	I	287
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	Rapsan 400 SC	H	181
	Select Plus	H	184
	Serenade Aso	F	321
	Signum	F	142
	T34 Biocontrol	F	326
	Teppeki	I	299
	Tracer	I	300
	Trianum-P	F	328
	Vitrol GB	Lim	306, 307
Kāposti, galviņu	Acetami 20 SG	I	287
	Acetazol 20 SG	I	287
	Afrodyta 250 SC	F	69
	Agil 100 EC	H	165
	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Benevia 100 OD	I	270
	Butisan 400	H	181
	Centurion Plus	H	184
	Ciperkils 500 e.k.	I	273
	Cliophar 600 SL	H	188
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Coragen 20 SC	I	274

1	3	4	5
	Decis Forte	I	275
	Decis Mega	I	277
	Delmetros 100 SC	I	278
	Devrinols s.k.	H	191
	Difcor 250 EC	F	90
	DiPel DF	I	311
	Emin dārzam Mavrik Vita	I	286
	Focus Ultra	H	200
	Evure	I	285
	Gazelle 20 SG	I	287
	Gusto	Lim	302
	Infinito	F	103
	Ironmax Pro	Lim	303
	Karate Zeon 5 CS	I	280
	Koron 100 SC	H	278
	Lentagran WP	H	220
	Lontrel 72 SG	H	222
	Mavrik	I	285, 286
	Mirador 250 SC	F	73
	Mospilan 20 SG	I	287
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	Nexide CS	I	292
	Previcur Energy	F	121
	Rapsan 400 SC	H	181
	Roundup Gold ST	H	249
	Select Plus	H	184
	Serenade Aso	F	321
	Signum	F	142
	T34 Biocontrol	F	326
	Teppeki	I	299
	Tracer	I	300
	Trianum-P	F	328
	Vantex CS	I	292
	Vitrol GB	Lim	306, 307
	Zetrola	H	165
Kāposti, Ķīnas	Afrodyta 250 SC	F	69
	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Butisan 400	H	181
	Devrinols s.k.	H	191
	DiPel DF	I	311
	Focus Ultra	H	200
	Mirador 250 SC	F	73
	Previcur Energy	F	121
	Rapsan 400 SC	H	181
	Serenade Aso	F	321
	T34 Biocontrol	F	326
	Tracer	I	300
	Trianum-P	F	328
Kāposti, lapu	Afrodyta 250 SC	F	69
	DiPel DF	I	311
	Focus Ultra	H	200
	Lentagran WP	H	220
	T34 Biocontrol	F	326
	Trianum-P	F	328
Kāposti, Pekinas	Afrodyta 250 SC	F	69
	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Butisan 400	H	181
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Mirador 250 SC	F	73

1	3	4	5
	Previcur Energy	F	121
	Rapsan 400 SC	H	181
	T34 Biocontrol	F	326
	Trianum-P	F	328
Kāposti, Savojas	Benevia 100 OD	I	270
	Centurion Plus	H	184
	Cliophar 600 SL	H	188
	Coragen 20 SC	I	274
	Focus Ultra	H	200
	Lentagran WP	H	220
	Lontrel 72 SG	H	222
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	Select Plus	H	184
	Trianum-P	F	328
Kārvele, lapu	T34 Biocontrol	F	326
Krustziežu dzimtas dārzeņi	Trihogramma	Dz	351
Kukurūza, saldā	Barracuda	H	173
	Basagran 480	H	173
	Coragen 20 SC	I	274
	Fraxion	H	173
	Ironmax Pro	Lim	303
	Lentagran WP	H	220
	Surrender	K	65
Ķimenes	Agil 100 EC	H	165
	Boxer 800 EC	H	179
	Clever	H	197
	Eclaire	H	197
	Fenix	H	197
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Goltix Gold	H	211
	Linati 800 EC	H	179
	Nervure	H	227
	Professional	H	239
	Roxy EC	H	179
	Serenade Aso	F	321
	T34 Biocontrol	F	326
	Zetrola	H	165
Ķiploki	Agil 100 EC	H	165
	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Basagran 480	H	173
	Benevia 100 OD	I	270
	Boxer 800 EC	H	179
	Centurion Plus	H	184
	Ciperkils 500 e.k.	I	273
	Clever	H	197
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Crown MH	AR	42
	DiPel DF	I	311
	Eclaire	H	197
	Emin dārzam Score 250 EC	F	141
	Fenix	H	197
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Gepard 50 EC	H	241
	Graminis	H	241
	Ironmax Pro	Lim	303
	Lalstop G46 WG	F	312
	Lentagran WP	H	220

1	3	4	5
	Linati 800 EC	H	179
	Mavita 250 EC	F	140
	Mirador 250 SC	F	73
	Quick 50 EC	H	241
	Roxy EC	H	179
	Score	F	141
	Score 250 EC	F	140, 141
	Select Plus	H	184
	Serenade Aso	F	321
	Signum	F	142
	Stomp CS	H	257
	Supero	H	241
	Switch 62.5 WG	F	147
	T34 Biocontrol	F	326
	Tracer	I	300
	VitiSan	F	157, 159
	Zetrola	H	165
Ķiploki tuneļos	Lalstop G46 WG	F	312
Ķirbjaugi	STS Cucurbitaceae	AR	55
Ķirbji	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Ironmax Pro	Lim	303
	Mirador 250 SC	F	73
	Roundup Gold ST	H	249
	Switch 62.5 WG	F	147
	Topas 100 EC	F	152
Ķirbji atklātā laukā	Naturalis	I	318
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	Ranman Top	F	133
	Serenade Aso	F	321
	T34 Biocontrol	F	326
	VitiSan	F	157, 159
Ķirbji segtās platībās	Ranman Top	F	133
	Emin dārzam Revus 250 SC	F	134
	Lalstop G46 WG	F	312
	Naturalis	I	318
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	Revus 250 SC	F	134
	T34 Biocontrol	F	326
	VitiSan	F	157, 159
Ķirbji tuneļos	Lalstop G46 WG	F	312
	Naturalis	I	318
Kolrābji	Benevia 100 OD	I	270
	Lentagran WP	H	220
	Serenade Aso	F	321
	T34 Biocontrol	F	326
Koriandrs	Serenade Aso	F	321
	T34 Biocontrol	F	326
Kressalāti	Serenade Aso	F	321
	T34 Biocontrol	F	326
Laurs	T34 Biocontrol	F	326
Lupstājs	T34 Biocontrol	F	326
Majorāns	Serenade Aso	F	321
	T34 Biocontrol	F	326
Mangolds	Difcor 250 EC	F	90
Maurloki	Lalstop G46 WG	F	312
	T34 Biocontrol	F	326
Maurloki tuneļos	Lalstop G46 WG	F	312

1	3	4	5
Mārrutki	Benevia 100 OD	I	270
	Coragen 20 SC	I	274
	Decis Forte	I	275
	Difcor 250 EC	F	90
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Gepard 50 EC	H	241
	Graminis	H	241
	Lentagran WP	H	220
	Quick 50 EC	H	241
	Serenade Aso	F	321
	Supero	H	241
	Switch 62.5 WG	F	147
	T34 Biocontrol	F	326
	VextaDim 240 EC	H	267
Melisa	T34 Biocontrol	F	326
Melnsakne	Switch 62.5 WG	F	147
Melones	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Ironmax Pro	Lim	303
	Lalstop G46 WG	F	312
	Mirador 250 SC	F	73
	Serenade Aso	F	321
	Switch 62.5 WG	F	147
	T34 Biocontrol	F	326
	Topas 100 EC	F	152
	VitiSan	F	157, 159
Melones atklātā laukā	Naturalis	I	318
	Ranman Top	F	133
Melones segtās platībās	Naturalis	I	318
	Nissorun 250 SC	A	293
	Ranman Top	F	133
Melones tuneļos	Lalstop G46 WG	F	312
	Naturalis	I	318
Mirris, smaržīgais	T34 Biocontrol	F	326
Oregano	T34 Biocontrol	F	326
Paprika	Eupiods sistēma	Dz	338
	T34 Biocontrol	F	326
Paprika segtās platībās	ABS sistēma	Dz	330
	Afidius sistēma	Dz	330
	Afidiuss	Dz	330
	Afidoletes sistēma	Dz	331
	Ambliseijus sistēma	Dz	331
	Ambliseiuss	Dz	331
	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Candit	F	82
	CBS sistēma	Dz	333
	Cidely Top	F	86
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Daknusa sistēma	Dz	335
	Decis Forte	I	275
	Diglifus sistēma	Dz	335
	DiPel DF	I	311
	Enkarsijas sistēma	Dz	336
	Eretmiks sistēma	Dz	337
	Eretmocerus sistēma	Dz	337
	Feltiella sistēma	Dz	338

1	3	4	5
	Fitoseiulus sistēma	Dz	339
	Ironmax Pro	Lim	303
	Kalifornikus sistēma	Dz	340
	Lalstop G46 WG	F	312
	Mikromus sistēma	Dz	342
	Mirador 250 SC	F	73
	Mycostop	F	317
	Naturalis	I	318
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	Nissorun 250 SC	A	293
	Orius sistēma	Dz	346
	Pangodiņš	Dz	346
	Previcur Energy	F	121
	Serenade Aso	F	321
	Sferoforia sistēma	Dz	347
	Steinernema sistēma	Dz	348
	Svirski sistēma	Dz	349
	Swirskii-Mite LD	Dz	350
	Switch 62.5 WG	F	147
	T34 Biocontrol	F	326
	Topas 100 EC	F	152
	Tracer	I	300
Pastinaki	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Benevia 100 OD	I	270
	Clever	H	197
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Coragen 20 SC	I	274
	Crown MH	AR	42
	Decis Forte	I	275
	Difcor 250 EC	F	90
	Eclaire	H	197
	Fenix	H	197
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Gepard 50 EC	H	241
	Graminis	H	241
	Lentagran WP	H	220
	Mirador 250 SC	F	73
	Nervure	H	227
	Quick 50 EC	H	241
	Serenade Aso	F	321
	Supero	H	241
	Switch 62.5 WG	F	147
Patisoni atklātā laukā	Ranman Top	F	133
Patisoni segtās platībās	Emin dārzam Revus 250 SC	F	134
	Ranman Top	F	133
	Revus 250 SC	F	134
	T34 Biocontrol	F	326
Pētersīļi	Afidiuss	Dz	330
	Beloukha	H	57, 175
	T34 Biocontrol	F	326
Pētersīļi, lapu	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Serenade Aso	F	321
Pētersīļi, sakņu	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Benevia 100 OD	I	270

1	3	4	5
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Coragen 20 SC	I	274
	Difcor 250 EC	F	90
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Gepard 50 EC	H	241
	Graminis	H	241
	Lentagran WP	H	220
	Mirador 250 SC	F	73
	Nervure	H	227
	Quick 50 EC	H	241
	Serenade Aso	F	321
	Stomp CS	H	257
	Supero	H	241
	Switch 62.5 WG	F	147
Piparguŗķīši	Serenade Aso	F	321
Piparmētra	Serenade Aso	F	321
	T34 Biocontrol	F	326
Portulaki (atklātā laukā)	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
Portulaki, dārza	T34 Biocontrol	F	326
Pupas, sviesta	Prosaro	F	128
	Signum	F	142
Pupiņas	Afrodyta 250 SC	F	69
	Corum	H	190
	Ironmax Pro	Lim	303
	Lalstop G46 WG	F	312
	Naturalis	I	318
	Serenade Aso	F	321
	Switch 62.5 WG	F	147
	T34 Biocontrol	F	326
	VitiSan	F	157, 159
Pupiņas, dārza	Basagran 480	H	173
	Gepard 50 EC	H	241
	Graminis	H	241
	Quick 50 EC	H	241
	Spectrum	H	255
	Supero	H	241
Pupiņas, dārza (graudiem)	Corum	H	190
	Spectrum	H	255
Pupiņas tuneļos	Lalstop G46 WG	F	312
Pupu mētra	Serenade Aso	F	321
Puravi	Afrodyta 250 SC	F	69
	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Ciperkils 500 e.k.	I	273
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Decis Forte	I	275
	Difcor 250 EC	F	90
	DiPel DF	I	311
	Focus Ultra	H	200
	Infinito	F	103
	Ironmax Pro	Lim	303
	Lalstop G46 WG	F	312
	Lentagran WP	H	220
	Mirador 250 SC	F	73
	Mycostop	F	317
	Roundup Gold ST	H	249
	Serenade Aso	F	321
	T34 Biocontrol	F	326
	Tracer	I	300

1	3	4	5
Puravi tuneļos	Lalstop G46 WG	F	312
Raudene	Serenade Aso	F	321
Rāceņi	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Barbarian Biograde 360	H	170
	Barbarian Hi-Aktiv	H	171
	Barbarian Super 360	H	170
	Benevia 100 OD	I	270
	Clinic Up	H	170
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Coragen 20 SC	I	274
	Decis Forte	I	275
	Difcor 250 EC	F	90
	DiPel DF	I	311
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Gallup Super 360	H	170
	Gepard 50 EC	H	241
	Graminis	H	241
	Ironmax Pro	Lim	303
	Mirador 250 SC	F	73
	Monosate G	H	170
	Quick 50 EC	H	241
	Rosate 360 TF	H	170
	Serenade Aso	F	321
	Supero	H	241
	VextaDim 240 EC	H	267
Redīsi	Benevia 100 OD	I	270
	Coragen 20 SC	I	274
	Gepard 50 EC	H	241
	Graminis	H	241
	Quick 50 EC	H	241
	Supero	H	241
Redīsi atklātā laukā	Ironmax Pro	Lim	303
	Serenade Aso	F	321
	T34 Biocontrol	F	326
Redīsi segtās platībās	Previcur Energy	F	121
	Serenade Aso	F	321
Redīsi, sēklai	Clematis	H	189
	Clomate	H	189
Rozmarīns	Serenade Aso	F	321
	T34 Biocontrol	F	326
Rukola	Gepard 50 EC	H	241
	Graminis	H	241
	Quick 50 EC	H	241
	Serenade Aso	F	321
	Supero	H	241
	T34 Biocontrol	F	326
Rutki	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
Rutki (eļļas)	Medax Top	AR	47
	Nexide CS	I	292
	Pictor Active	F	119
	Revydas	F	135
	Vantex CS	I	292
Rutki (melnie)	Difcor 250 EC	F	90
Sakņu dārzs pēc ražas novākšanas	Emin dārzam Taifun B	H	261
	Ouragan System 4	H	232, 233
	Taifun B	H	259, 261

1	3	4	5
Salāti	Acetami 20 SG	I	287
	Acetazol 20 SG	I	287
	Afidius sistēma	Dz	330
	Afidoletes sistēma	Dz	331
	Amistar 250 SC	F	73
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Gazelle 20 SG	I	287
	Gepard 50 EC	H	241
	Graminis	H	241
	Lalstop G46 WG	F	312
	Lima Oro	Lim	305
	Limgol	Lim	305
	Meridian	Lim	305
	Mospilan 20 SG	I	287
	Mycostop	F	317
	Previcur Energy	F	121
	Quick 50 EC	H	241
	Revus 250 SC	F	134
	Serenade Aso	F	321
	Supero	H	241
	Switch 62.5 WG	F	147
	T34 Biocontrol	F	326
	Trianum-P	F	328
	VitiSan	F	157, 159
Salāti atklātā laukā	Aliette	F	71
	Azuba	F	73
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Decis Forte	I	275
	DiPel DF	I	311
	Ironmax Pro	Lim	303
	Lalstop G46 WG	F	312
	Mirador 250 SC	F	73
	Naturalis	I	318
	T34 Biocontrol	F	326
	Vitrol GB	Lim	306, 307
	Zenby	F	161
Salāti segtās platībās	Afidiuss	Dz	330
	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	DiPel DF	I	311
	Ironmax Pro	Lim	303
	Lalstop G46 WG	F	312
	Mirador 250 SC	F	73
	Naturalis	I	318
	Pangodiņš	Dz	346
	Revus 250 SC	F	134
	Serenade Aso	F	321
	Svirski sistēma	Dz	349
	Trianum-P	F	328
	Vitrol GB	Lim	306, 307
	Zenby	F	161
Salāti tuneļos	Naturalis	I	318
	Vitrol GB	Lim	306, 307
Salātu dēsti (izstādīšanai atklātā laukā)	Aliette	F	71
Salvija	T34 Biocontrol	F	326
Selerijas	Afidiuss	Dz	330
	T34 Biocontrol	F	326

1	3	4	5
Selerijas, kātu	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Boxer 800 EC	H	179
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Difcor 250 EC	F	90
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Ironmax Pro	Lim	303
	Linati 800 EC	H	179
	Mirador 250 SC	F	73
	Roxy EC	H	179
	Serenade Aso	F	321
Selerijas, lapu	Focus Ultra	H	200
	Ironmax Pro	Lim	303
	Serenade Aso	F	321
	T34 Biocontrol	F	326
Selerijas, sakņu	Afrodyta 250 SC	F	69
	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Benevia 100 OD	I	270
	Boxer 800 EC	H	179
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Coragen 20 SC	I	274
	Difcor 250 EC	F	90
	Emin dārzam Score 250 EC	F	141
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Gepard 50 EC	H	241
	Graminis	H	241
	Ironmax Pro	Lim	303
	Linati 800 EC	H	179
	Mavita 250 EC	F	140
	Mirador 250 SC	F	73
	Nervure	H	227
	Quick 50 EC	H	241
	Roxy EC	H	179
	Score	F	141
	Score 250 EC	F	140, 141
	Serenade Aso	F	321
	Supero	H	241
	Switch 62.5 WG	F	147
	VextaDim 240 EC	H	267
Sinepes	T34 Biocontrol	F	326
Sinepes, Sareptas	T34 Biocontrol	F	326
Sīpoli	Afrodyta 250 SC	F	69
	Agil 100 EC	H	165
	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Barbarian Biograde 360	H	170
	Barbarian Hi-Aktiv	H	171
	Barbarian Super 360	H	170
	Basagran 480	H	173
	Beloukha	H	57, 175
	Benevia 100 OD	I	270
	Boxer 800 EC	H	179
	Centurion Plus	H	184
	Ciperkils 500 e.k.	I	273
	Clever	H	197
	Clinic Up	H	170
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Crown MH	AR	42

1	3	4	5
	DiPel DF	I	311
	Eclaire	H	197
	Emin dārzam Score 250 EC	F	141
	Fenix	H	197
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Gallup 360-K	H	208
	Gallup Super 360	H	170
	Gepard 50 EC	H	241
	Graminis	H	241
	Gusto	Lim	302
	Infinito	F	103
	Ironmax Pro	Lim	303
	Krypt 540	H	217
	Lalstop G46 WG	F	312
	Lentagran WP	H	220
	Linati 800 EC	H	179
	Mavita 250 EC	F	140
	Mirador 250 SC	F	73
	Monosate G	H	170
	Mycostop	F	317
	Nemasys	Dz	344
	Quick 50 EC	H	241
	Rodeo TF	H	259
	Rosate 360 TF	H	170
	Roundup Gold ST	H	249
	Roxy EC	H	179
	Score	F	141
	Score 250 EC	F	140, 141
	Select Plus	H	184
	Serenade Aso	F	321
	Signum	F	142
	Stomp CS	H	257
	Supero	H	241
	Switch 62.5 WG	F	147
	T34 Biocontrol	F	326
	Taifun B	H	259, 261
	Tracer	I	300
	VitiSan	F	157, 159
	Zetrola	H	165
Sīpoli (lokiem)	Benevia 100 OD	I	270
	Decis Forte	I	275
	Serenade Aso	F	321
Sīpoli tuneļos	Lalstop G46 WG	F	312
Sīpoli, vasaras	Ironmax Pro	Lim	303
Sīpoli, vasaras (lokiem)	Lentagran WP	H	220
Skābenes (atklātā laukā)	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
Sparģeļi	Difcor 250 EC	F	90
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Lentagran WP	H	220
	Roundup Gold ST	H	249
	Serenade Aso	F	321
	Spotlight Plus	H	57, 255
	T34 Biocontrol	F	326
	VitiSan	F	157, 159
Spināti (atklātā laukā)	Acetami 20 SG	I	287
	Acetazol 20 SG	I	287

1	3	4	5
	DiPel DF	I	311
	Gazelle 20 SG	I	287
	Mospilan 20 SG	I	287
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	Serenade Aso	F	321
	Zenby	F	161
Spināti (segtās platībās)	DiPel DF	I	311
	Serenade Aso	F	321
	T34 Biocontrol	F	326
	Zenby	F	161
Spināti, sēklai	Clematis	H	189
	Clomate	H	189
	Goltix Gold	H	211
Šalotes	Basagran 480	H	173
	Benevia 100 OD	I	270
	Centurion Plus	H	184
	Crown MH	AR	42
	Emin dārzam Score 250 EC	F	141
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Gepard 50 EC	H	241
	Graminis	H	241
	Gusto	Lim	302
	Lalstop G46 WG	F	312
	Lentagran WP	H	220
	Mavita 250 EC	F	140
	Quick 50 EC	H	241
	Score	F	141
	Score 250 EC	F	140, 141
	Select Plus	H	184
	Serenade Aso	F	321
	Supero	H	241
	Switch 62.5 WG	F	147
	T34 Biocontrol	F	326
	Tracer	I	300
	VitiSan	F	157, 159
Šalotes tuneļos	Lalstop G46 WG	F	312
Timiāns	Serenade Aso	F	321
	T34 Biocontrol	F	326
Tomāti atklātā laukā	CBS sistēma	Dz	333
	Emin dārzam Revus 250 SC	F	134
	Gusto	Lim	302
	Mycostop	F	317
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	Revus 250 SC	F	134
	T34 Biocontrol	F	326
Tomāti segtās platībās	Afidius sistēma	Dz	330
	Afidiuss	Dz	330
	Afidoletes sistēma	Dz	331
	Ambliseiuss	Dz	331
	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Candit	F	82
	Cidely Top	F	86
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Daknusa sistēma	Dz	335
	Decis Forte	I	275
	Diglifus sistēma	Dz	335

1	3	4	5
	DiPel DF	I	311
	Emin dārzam Revus 250 SC	F	134
	Enkarsija	Dz	335
	Enkarsijas sistēma	Dz	336
	Eretmiks sistēma	Dz	337
	Eretmocerus sistēma	Dz	337
	Feltiella sistēma	Dz	338
	Fitoseiulus sistēma	Dz	339
	Fitosējuluss	Dz	339
	Gusto	Lim	302
	Ironmax Pro	Lim	303
	Kalifornikus sistēma	Dz	340
	Lalstop G46 WG	F	312
	Makrolofus sistēma (Makrolofus-N sistēma)	Dz	341
	Mirador 250 SC	F	73
	Mycostop	F	317
	Naturalis	I	318
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	Nissorun 250 SC	A	293
	Pangodiņš	Dz	346
	PMV-01	V	320
	Previcur Energy	F	121
	Revus 250 SC	F	134
	Serenade Aso	F	321
	Sferoforia sistēma	Dz	347
	Steinernema sistēma	Dz	348
	Switch 62.5 WG	F	147
	T34 Biocontrol	F	326
	Topas 100 EC	F	152
	Tracer	I	300
	VitiSan	F	157, 159
Topinambūri	Benevia 100 OD	I	270
	Coragen 20 SC	I	274
	DiPel DF	I	311
	Gepard 50 EC	H	241
	Graminis	H	241
	Quick 50 EC	H	241
	Supero	H	241
Turnepši	Focus Ultra	H	200
Ziedkāposti	Acetami 20 SG	I	287
	Acetazol 20 SG	I	287
	Afrodyta 250 SC	F	69
	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Benevia 100 OD	I	270
	Butisan 400	H	181
	Ciperkils 500 e.k.	I	273
	Cliophar 600 SL	H	188
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Coragen 20 SC	I	274
	Decis Forte	I	275
	Decis Mega	I	277
	Devrinols s.k.	H	191
	Difcor 250 EC	F	90
	DiPel DF	I	311
	Emin dārzam Mavrik Vita	I	286
	Evure	I	285
	Focus Ultra	H	200
	Gazelle 20 SG	I	287
	Gusto	Lim	302
	Infinito	F	103

1	3	4	5
	Ironmax Pro	Lim	303
	Karate Zeon 5 CS	I	280
	Lentagran WP	H	220
	Lontrel 72 SG	H	222
	Mavrik	I	285, 286
	Mirador 250 SC	F	73
	Mospilan 20 SG	I	287
	Previcur Energy	F	121
	Rapsan 400 SC	H	181
	Serenade Aso	F	321
	T34 Biocontrol	F	326
	Tracer	I	300
	Vitrol GB	Lim	306, 307
CUKURBIETES, LOPBARĪBAS BIETES			
Bietes, lopbarības	Agil 100 EC	H	165
	Amistar Gold	F	77
	Bagira	H	234
	Betanal	H	177
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Butisan Pro	H	261
	Centurion Plus	H	184
	Cliophar 600 SL	H	188
	Evure	I	285
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Gepard 50 EC	H	241
	Goltix 700 SC	H	211
	Goltix Gold	H	211
	Graminis	H	241
	Gusto	Lim	302
	Ironmax Pro	Lim	303
	Jenot Plus 050 EC	H	262
	Leopard	H	221
	Lontrel 72 SG	H	222
	Mavrik	I	285, 286
	Mirador Uni	F	77
	Nexide CS	I	292
	Panarex	H	234
	Pantera 4 EC	H	234
	Pilot	H	262
	Quick 50 EC	H	241
	Rango Max	H	242
	Revystar XL	F	137
	Rodeo Plus	H	244
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Select Plus	H	184
	Supero	H	241
	Tanaris	H	261
	Targa Super	H	262
	Teppeki	I	299
	Vantex CS	I	292
	VextaDim 240 EC	H	267
	Vredmix	F	77
	Zetrola	H	165
Cukurbietes	Achiba	H	165
	Agil 100 EC	H	165
	Amistar Gold	F	77
	Bagira	H	234

1	3	4	5
	Barbarian Biograde 360	H	170
	Barbarian Hi-Aktiv	H	171
	Barbarian Super 360	H	170
	Beloukha	H	57, 175
	Betanal	H	177
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Butisan Pro	H	261
	Centurion Plus	H	184
	Clinic Up	H	170
	Cliophar 600 SL	H	188
	Decis Forte	I	275
	Evure	I	285
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Gallup Super 360	H	170
	Gepard 50 EC	H	241
	Goltix 700 SC	H	211
	Goltix Gold	H	211
	Graminis	H	241
	Gusto	Lim	302
	Ironmax Pro	Lim	303
	Jenot Plus 050 EC	H	262
	Karate Zeon 5 CS	I	280
	Leopard	H	221
	Lontrel 72 SG	H	222
	Mavrik	I	285, 286
	Mirador Uni	F	77
	Monosate G	H	170
	Nervure	H	227
	Nexide CS	I	292
	Panarex	H	234
	Pantera 4 EC	H	234
	Pilot	H	262
	Quick 50 EC	H	241
	Rango Max	H	242
	Revystar XL	F	137
	Rodeo Plus	H	244
	Rodeo TF	H	259
	Rosate 360 TF	H	170
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Select Plus	H	184
	Supero	H	241
	Taifun B	H	259, 261
	Tanaris	H	261
	Targa Super	H	262
	Teppeki	I	299
	Vantex CS	I	292
	VextaDim 240 EC	H	267
	Vredmix	F	77
	Zetrola	H	165
LOPBARĪBAS KĀPOSTI			
Kāposti, lopbarības	Agil 100 EC	H	165
	Butisan 400	H	181
	Lentagran WP	H	220
	Rapsan 400 SC	H	181

1	3	4	5
GRAUDAUGI AR/BEZ PASĒJU			
Auzas	2,4-D Nufarm	H	163
	Accurate 200 WG	H	164
	Acetazol Extra	I	272
	Arbiter	H	214
	Ariane S	H	167
	Arrva	H	216
	Artina	F	45, 109
	Artina EC	F	45, 109
	Ascra Xpro	F	77
	Balaya	F	80
	Banvel 4S	H	169
	Barbarian Biograde 360	H	170
	Barbarian Hi-Aktiv	H	171
	Barbarian Super 360	H	170
	Bariton Super	K	59
	Benafar	F	146
	Bertego	AR	50
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Calibre 50 SX	H	183
	Capalo Revy	F	83
	Carnadine Extra	I	272
	CCC	AR	42
	CDQ™ SX	H	184
	Celest Trio 060 FS	K	60
	Chwastox 750 SL	H	185
	Ciperkils 500 e.k.	I	273
	Cleave	H	186
	Clinic Up	H	170
	Comet Pro	F	86
	Cuadro NT	AR	43
	Cycocel 750	AR	43
	Darby	H	163
	Decis Forte	I	275
	Decis Mega	I	277
	DMA 600	H	193
	Elegant 2FD	H	195
	EMCEE	H	196
	Estet 600 EC	I	196
	Euskatel	F	97
	Evure	I	285
	Flexity	F	99
	Flurostar 180	H	198
	Flurostar Forte	H	199
	Fragma	H	253
	Galistop 200	H	214
	Gallup Super 360	H	170
	Globaztar 250 SC	F	100
	Granprotec	I	279
	Granstar Premia 50 SX	H	212
	Grodyl	H	213
	Gusto	Lim	302
	Hurler	H	214
	Hutton Flex	F	101
	Imtrex XE	F	102
	Innox	F	146
	Ironmax Pro	Lim	303
	Joust	H	107
	Juventus 90	F	45, 109
	Karate Zeon 5 CS	I	280
	Kinto Plus	K	61
	Kinvara	H	216

1	3	4	5
	Lancelot	H	219
	Legacy 500 SC	H	220
	Lenvyor	F	111
	Librax	F	112
	Lima Oro	Lim	305
	Limgol	Lim	305
	Maxentis	F	115
	Maxim Extra 050 FS	K	63
	Mavrik	I	285, 286
	MCPA 750	H	223
	MCPA Classic 750 SL	H	185
	MCPA Super	H	224
	Medax Top	AR	47
	Meridian	Lim	305
	Mezzo WG	H	225
	Mirador Forte	F	116
	Mixin	H	186
	Moddus 250 EC	AR	50
	Moddus Start	AR	50
	Monosate G	H	170
	Moxa	AR	51
	Mustangs s.e.	H	227
	Mustangs Forte s.e.	H	227
	Nexide CS	I	292
	Nuance 75 WG	H	230
	Orius 250 EW	F	118
	Patel 300 EC	F	130
	Pecari 300 EC	F	130
	Pioli	F	102
	Plexeo 90	F	45, 109
	Plexeo 90 EC	F	45, 109
	Poleposition 300 EC	F	130
	Pony 306 SE	H	235
	Priaxor	F	124
	Primme	H	237
	Primus	H	237
	Primus 250 WG	H	238
	Primus XL	H	239
	Pro	H	237
	Profi MCPA 750 SL	H	185
	Property 180 SC	F	127
	Prosaro	F	128
	Protendo 300 EC	F	130
	Quelex	H	240
	Redigo Pro	K	64
	Regucil	AR	50
	Regucil Start	AR	50
	Remocco 90	F	45, 109
	Revystar XL	F	137
	Revytrex	F	138
	Rodeo Plus	H	244
	Rosate 360 TF	H	170
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Saracen	H	253
	Seedron	F	65
	Sentrallas LQM	H	254
	Siltra Xpro	F	144
	Silvron	F	145
	Sitara	H	256

1	3	4	5
	Soratel	F	146
	Spitfire 333 HL	H	256
	Stabilan 400 SL	AR	53
	Stabilan 750 SL	AR	42
	Stakato 500 SC	H	220
	Stapler	H	163
	Starane 333 HL	H	256
	Starane XL	H	256
	Stemper	AR	54
	SuPrim	H	237
	Syrius	F	118
	Tandus	H	214
	TBM 75 WG	H	263
	Tempo	AR	50
	Teppeki	I	299
	Tetatra	F	146
	Tomahawk 200 EC	H	264
	Tribenocare 75 WG	H	230
	Trimmer 50 SG	H	212
	Trimmer 500 WG	H	265
	Tripali	H	266
	Turret 90	F	45, 109
	Vantex CS	I	292
	Vibrance Pro	K	67
	Vibrance Star	K	67
	Vibrance Trio	K	68
	Viking	H	230
Auzas ar āboliņa pasēju	MCPA 750	H	223
Auzas ar sarkanās auzenes vai ganību airenes pasēju	Trimmer 50 SG	H	212
Auzas ar stiebrzāļu pasēju	Ariane S	H	167
	Duplosan Super	H	195
	Primus	H	237
	Primus XL	H	239
	Pro	H	237
	Starane XL	H	256
	SuPrim	H	237
	Tomahawk 200 EC	H	264
Graudaugi	Vitrol GB	Lim	306, 307
Kvieši	Barbarian Biograde 360	H	170
	Barbarian Hi-Aktiv	H	171
	Barbarian Super 360	H	170
	Clinic Up	H	170
	Gallup Super 360	H	170
	Ironmax Pro	Lim	303
	Monosate G	H	170
Kvieši, cietie	Barbarian Biograde 360	H	170
	Barbarian Hi-Aktiv	H	171
	Barbarian Super 360	H	170
	Camposan Extra	AR	41
	Clinic Up	H	170
	Decis Forte	I	275
	Gallup Super 360	H	170
	Monosate G	H	170
	Rosate 360 TF	H	170
	Stabilan 400 SL	AR	53
Kvieši, speltas	Camposan Extra	AR	41
	Croton Flex	F	125
	Curbatur	F	125
	Diflanil 500 SC	H	192

1	3	4	5
	Glacis	F	125
	Input Triple	F	106
	Nexide CS	I	292
	Proline	F	125
	Property 180 SC	F	127
	Silvron	F	145
	Stabilan 400 SL	AR	53
	Univoq	F	154
	Vantex CS	I	292
	Verben	F	156
	Vibrance Pro	K	67
	Vibrance Star	K	67
Kvieši, vasaras	2,4-D Nufarm	H	163
	Accurate 200 WG	H	164
	Acetazol Extra	I	272
	Afrodyta 250 SC	F	69
	Amistar 250 SC	F	73
	Arbiter	H	214
	Ariane S	H	167
	Arrva	H	216
	Artina	F	45, 109
	Artina EC	F	45, 109
	Ascra Xpro	F	77
	Attribut	H	168
	Avastel	F	78
	Avoxa	H	168
	Axial 50 EC	H	168
	Axial One	H	169
	Azaka	F	79
	Azuba	F	73
	Balaya	F	80
	Banvel 4S	H	169
	Bariton Super	K	59
	Benafar	F	146
	Beret 025 FS	K	62
	Bertego	AR	50
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Broadway Star	H	180
	Calibre 50 SX	H	183
	Calma	AR	56
	Camposan Extra	AR	41
	Carnadine Extra	I	272
	Cayunis	F	84
	CCC	AR	42
	CDQ™ SX	H	184
	Celest Trio 060 FS	K	60
	Cerone	AR	42
	Cezix	F	87
	Chambel 6 FS	K	60
	Chwastox 750 SL	H	185
	Capalo Revy	F	83
	Ciperkils 500 e.k.	I	273
	Cleave	H	186
	Comet Pro	F	86
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Croton Flex	F	125
	Cuadro NT	AR	43
	Curbatur	F	125
	Cycocel 750	AR	43
	Darby	H	163
	DARCOS	F	87
	Decis Forte	I	275
	Decis Mega	I	277

1	3	4	5
	Delaro Forte	F	88
	Dicoherb Super 750 SL	H	192
	Difend	K	61
	DMA 600	H	193
	Dominic	F	150
	Elatus Era	F	94
	Elatus Plus	F	95
	Elegant 2FD	H	195
	EMCEE	H	196
	Entargo	F	96
	Erasmus	F	87
	Ergon	H	196
	Estet 600 EC	H	196
	Euskatel	F	97
	Evure	I	285
	Falcon Forte	F	98
	Flexity	F	99
	Flurostar 180	H	198
	Flurostar Forte	H	199
	Folicur	F	44, 99
	Foxtrot 69 EW	H	204
	Fragma	H	253
	Fragma Delta	H	253
	Galistop 200	H	214
	Glacis	F	125
	Globaztar 250 SC	F	100
	Glyphomax 480	H	209
	Granstar Premia 50 SX	H	212
	Grodyl	H	213
	Gusto	Lim	302
	Herbos 110 EC	H	214
	Hurler	H	214
	Hutton Flex	F	101
	Imtrex XE	F	102
	Incelo	H	215
	Innox	F	146
	Input	F	104
	Input Triple	F	106
	Joust	F	107
	Juventus 90	F	45, 109
	Kaiso 50 EG	I	280
	Karate Zeon 5 CS	I	280
	Kinto Plus	K	61
	Kinvara	H	216
	Lancelot	H	219
	Latitude XL	K	62
	Leander	F	111
	Legacy 500 SC	H	220
	Lenvyor	F	111
	Librax	F	112
	Lima Oro	Lim	305
	Limgol	Lim	305
	Mavrik	I	285, 286
	Maxentis	F	115
	Maxim 025 FS	K	62
	Maxim Extra 050 FS	K	63
	MCPA 750	H	223
	MCPA Classic 750 SL	H	185
	MCPA Super	H	224
	Medax Top	AR	47
	Meridian	Lim	305
	Mezzo WG	H	225
	Mirador 250 SC	F	73

1	3	4	5
	Mirador Forte	F	116
	Mixin	H	186
	Moddus 250 EC	AR	50
	Moddus Start	AR	50
	Monitor	H	226
	Moxa	AR	51
	Mustangs s.e.	H	227
	Mustangs Forte s.e.	H	227
	Nexide CS	I	292
	Nuance 75 WG	H	230
	Optica Trio	H	232
	Optimus	AR	56
	Orius 250 EW	F	118
	Panexion OD	H	234
	Patel 300 EC	F	130
	Pecari 300 EC	F	130
	Pioli	F	102
	Pixxaro EC	H	235
	Plexeo 90	F	45, 109
	Plexeo 90 EC	F	45, 109
	Poleposition 300 EC	F	130
	Polyversum	F	320
	Pony 306 SE	H	235
	Prepper	K	63
	Priaxor	F	124
	Primme	H	237
	Primus	H	237
	Primus 250 WG	H	238
	Primus XL	H	239
	Pro	H	237
	Profi MCPA 750 SL	H	185
	Proline	F	125
	Property 180 SC	F	127
	Protendo 300 EC	F	130
	Prosaro	F	128
	Puma Universal	H	240
	Quelex	H	240
	Redigo Pro	K	64
	Regucil	AR	50
	Regucil Start	AR	50
	Relenya	K	64
	Remocco 90	F	45, 109
	Revystar XL	F	137
	Revytrex	F	138
	Rexade 440	H	244
	Riza 200 EC	F	139
	Rodeo Plus	H	244
	Rosate 360 TF	H	170
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Saracen	H	253
	Saracen Delta	H	253
	Seedron	F	65
	Sekator OD	H	254
	Sentrallas LQM	H	254
	Siltra Xpro	F	144
	Silvron	F	145
	Sitara	H	256
	Soratel	F	146
	Spitfire 333 HL	H	256

1	3	4	5
	Stabilan 400 SL	AR	53
	Stabilan 750 SL	AR	42
	Stakato 500 SC	H	220
	Stapler	H	163
	Starane 333 HL	H	256
	Starane XL	H	256
	Stemper	AR	54
	Sunda	H	258
	SuPrim	H	237
	Syrius	F	118
	Systiva	K	66
	Talius	F	150
	Tandus	H	214
	TBM 75 WG	H	263
	Tebuplius	F	150
	Tebusha 25 EW	F	150
	Tempo	AR	50
	Teppeki	I	299
	Tesanto	F	151
	Tetatra	F	146
	Timeline FX	H	263
	Tomahawk 200 EC	H	264
	Tombo WG	H	265
	Torero	F	79
	Tribenocare 75 WG	H	230
	Trimaxx	AR	56
	Trimmer 50 SG	H	212
	Trimmer 500 WG	H	265
	Tripali	H	266
	Trolten	H	267
	Turret 90	F	45, 109
	Univoq	F	154
	Vantex CS	I	292
	Variano Xpro	F	155
	Vazanti	F	78
	Verben	F	156
	Vibrance Duo	K	66
	Vibrance Pro	K	67
	Vibrance Star	K	67
	Vibrance Trio	K	68
	Viking	H	230
	Winotote	F	111
	Zypar	H	268
Kvieši, vasaras ar āboliņa pasēju	MCPA 750	H	223
	Stomp CS	H	257
Kvieši, vasaras ar lucernas pasēju	Stomp CS	H	257
Kvieši, vasaras ar sarkanās auzenes vai ganību airenes pasēju	Trimmer 50 SG	H	212
Kvieši, vasaras ar stiebrzāļu pasēju	Ariane S	H	167
	Duplosan Super	H	195
	Primus	H	237
	Primus XL	H	239
	Pro	H	237
	Starane XL	H	256
	SuPrim	H	237
	Tomahawk 200 EC	H	264
Kvieši, vasaras un zirņu mistrs	Stomp CS	H	257

1	3	4	5
Kvieši, ziemas	2,4-D Nufarm	H	163
	Accurate 200 WG	H	164
	Acetazol Extra	I	272
	Afrodyta 250 SC	F	69
	Amistar 250 SC	F	73
	Arbiter	H	214
	Ariane S	H	167
	Arrva	H	216
	Artina	F	45, 109
	Artina EC	F	45, 109
	Ascra Xpro	F	77
	Attribut	H	168
	Avastel	F	78
	Avoxa	H	168
	Axial 50 EC	H	168
	Axial One	H	169
	Azaka	F	79
	Azuba	F	73
	Balaya	F	80
	Banvel 4S	H	169
	Bariton Super	K	59
	Beflex 500 SC	H	174
	Benafar	F	146
	Beret 025 FS	K	62
	Bertego	AR	50
	Boiler	H	252
	Bolid 250 SE	F	81
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Boxer 800 EC	H	179
	Broadway Star	H	180
	Cadou SC	H	183
	Calibre 50 SX	H	183
	Calma	AR	56
	Camposan Extra	AR	41
	Capalo Revy	F	83
	Carnadine Extra	I	272
	Cayunis	F	84
	CCC	AR	42
	CDQ™ SX	H	184
	Celest Trio 060 FS	K	60
	Cerone	AR	42
	Cezix	F	87
	Chambel 6 FS	K	60
	Chwastox 750 SL	H	185
	Ciperkils 500 e.k.	I	273
	Cleave	H	186
	Comet Pro	F	86
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Croton Flex	F	125
	Cuadro NT	AR	43
	Curbatur	F	125
	Cycocel 750	AR	43
	Darby	H	163
	DARCOS	F	87
	Decis Forte	I	275
	Decis Mega	I	277
	Delaro Forte	F	88
	Delmetros 100 SC	I	278
	Dicoherb Super 750 SL	H	192
	Difend	K	61
	Diflanil 500 SC	H	192
	DMA 600	H	193
	Dominic	F	150

1	3	4	5
	Duplosan Super	H	195
	Elatus Era	F	94
	Elatus Plus	F	95
	Elegant 2FD	H	195
	Elipris	H	195
	EMCEE	H	196
	Entargo	F	96
	Erasmus	F	87
	Ergon	H	196
	Estet 600 EC	H	196
	Etefone	AR	44
	Euskatel	F	97
	Everest	AR	42
	Evure	I	285
	Falcon Forte	F	98
	Flexity	F	99
	Flight Forte	H	198
	Flurostar 180	H	198
	Flurostar Forte	H	199
	Flyer	H	199
	Folicur	F	44, 99
	Foxtrot 69 EW	H	204
	Fragma	H	253
	Fragma Delta	H	253
	Galistop 200	H	214
	Gamelan 100 FS	K	61
	Glacis	F	125
	Globaztar 250 SC	F	100
	Glyphomax 480	H	209
	Granstar Premia 50 SX	H	212
	Grassrooter	AR	44
	Grodyl	H	213
	Gusto	Lim	302
	Herbistar 200 EC	H	213
	Herbos 110 EC	H	214
	Hurler	H	214
	Hussar Activ Plus OD	H	215
	Hutton Flex	F	101
	Imtrex XE	F	102
	Incelo	H	215
	Innox	F	146
	Input	F	104
	Input Triple	F	106
	Joust	F	107
	Juventus 90	F	45, 109
	Kaiso 50 EG	I	280
	Karate Zeon 5 CS	I	280
	Kinto Plus	K	61
	Kinvara	H	216
	Komplet	H	217
	Koron 100 SC	H	278
	Lancelot	H	219
	Latitude XL	K	62
	Leander	F	111
	Legacy 500 SC	H	220
	Legacy Pro	H	220
	Lenvyor	F	111
	Librax	F	112
	Lima Oro	Lim	305
	Limgol	Lim	305
	Linati 800 EC	H	179
	Mateno Duo	H	223
	Mavrik	I	285, 286

1	3	4	5
	Maxentis	F	115
	Maxim 025 FS	K	62
	Maxim Extra 050 FS	K	63
	MCPA 750	H	223
	MCPA Classic 750 SL	H	185
	MCPA Super	H	224
	Medax Top	AR	47
	Mepik 300 SL	AR	49
	Meridian	Lim	305
	Mezzo WG	H	225
	Mirador 250 SC	F	73
	Mirador Forte	F	116
	Mixin	H	186
	Moddus 250 EC	AR	50
	Moddus Start	AR	50
	Monitor	H	226
	Moxa	AR	51
	Mustangs s.e.	H	227
	Mustangs Forte s.e.	H	227
	Nexa 500 EC	AR	52
	Nexide CS	I	292
	Next	AR	53
	Nuance 75 WG	H	230
	Optica Trio	H	232
	Optimus	AR	56
	Orius 250 EW	F	118
	Panexion OD	H	234
	Patel 300 EC	F	130
	Pecari 300 EC	F	130
	Pico 750 WG	H	234
	Pioli	F	102
	Pixxaro EC	H	235
	Plexeo 90	F	45, 109
	Plexeo 90 EC	F	45, 109
	Poleposition 300 EC	F	130
	Polyversum	F	320
	Pontos	H	235
	Pony 306 SE	H	235
	Praktis	F	121
	Prepper	K	63
	Priaxor	F	124
	Primme	H	237
	Primus	H	237
	Primus 250 WG	H	238
	Primus XL	H	239
	Pro	H	237
	Professional	H	239
	Profi MCPA 750 SL	H	185
	Proline	F	125
	Property 180 SC	F	127
	Protendo 300 EC	F	130
	Protikon 250 EC	F	132
	Prosaro	F	128
	Puma Universal	H	240
	Quelex	H	240
	Rassel 100 SC	H	244
	Regucil	AR	50
	Regucil Start	AR	50
	Relenya	K	64
	Remocco 90	F	45, 109
	Revystar XL	F	137
	Revytrex	F	138
	Rexade 440	H	244

1	3	4	5
	Riza 200 EC	F	139
	Rodeo Plus	H	244
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Roxy EC	H	179
	Roxy 800 EC	H	252
	Saracen	H	253
	Saracen Delta	H	253
	Seedron	F	65
	Sekator OD	F	254
	Sentrallas LQM	H	254
	Siltra Xpro	F	144
	Silvron	F	145
	Sitara	H	256
	Soratel	F	146
	Spitfire 333 HL	H	256
	Stabilan 400 SL	AR	53
	Stabilan 750 SL	AR	42
	Stakato 500 SC	H	220
	Stapler	H	163
	Starane 333 HL	H	256
	Starane XL	H	256
	Stemper	AR	54
	Sunda	H	258
	SuPrim	H	237
	Syrius	F	118
	Systiva	K	66
	Talius	F	150
	Tandus	H	214
	TBM 75 WG	H	263
	Tebuplius	F	150
	Tebusha 25 EW	F	150
	Tempo	AR	50
	Teppeki	I	299
	Terpal	AR	55
	Tesanto	F	151
	Tetatra	F	146
	Timeline FX	H	263
	Tomahawk 200 EC	H	264
	Tombo WG	H	265
	Torero	F	79
	Tribenocare 75 WG	H	230
	Trimaxx	AR	56
	Trimmer 50 SG	H	212
	Trimmer 500 WG	H	265
	Trinity	H	220
	Tripali	H	266
	Tristar 50 SG	H	266
	Trolten	H	267
	Turret 90	F	45, 109
	Univoq	F	154
	Vantex CS	I	292
	Variano Xpro	F	155
	Vazanti	F	78
	Verben	F	156
	Vibrance Duo	K	66
	Vibrance Pro	K	67
	Vibrance Star	K	67
	Vibrance Trio	K	68
	Viking	H	230

1	3	4	5
	Winotote	F	111
	Xerton	H	268
	Yodo 100 OD	H	268
	Zypar	H	268
Kvieši, ziemas ar stiebrzāļu pasēju	Ariane S	H	167
	Primus	H	237
	Primus XL	H	239
	Pro	H	237
	Starane XL	H	256
	SuPrim	H	237
	Tomahawk 200 EC	H	264
Mieži	Barbarian Biograde 360	H	170
	Barbarian Hi-Aktiv	H	171
	Barbarian Super 360	H	170
	CCC	AR	42
	Clinic Up	H	170
	Gallup Super 360	H	170
	Granprotec	I	279
	Ironmax Pro	Lim	303
	Monosate G	H	170
	Rosate 360 TF	H	170
	Stabilan 750 SL	AR	42
Mieži ar pļavas auzenes pasēju	2,4-D Nufarm	H	163
	Darby	H	163
	Stapler	H	163
Mieži, vasaras	2,4-D Nufarm	H	163
	Accurate 200 WG	H	164
	Acetazol Extra	I	272
	Amistar 250 SC	F	73
	Arbiter	H	214
	Ariane S	H	167
	Arrva	H	216
	Artina	F	45, 109
	Artina EC	F	45, 109
	Ascra Xpro	F	77
	Avastel	F	78
	Axial 50 EC	H	168
	Axial One	H	169
	Azaka	F	79
	Azuba	F	73
	Balaya	F	80
	Banvel 4S	H	169
	Bariton Super	K	59
	Benafar	F	146
	Beret 025 FS	K	62
	Bertego	AR	50
	Bolid 250 SE	F	81
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Calibre 50 SX	H	183
	Calma	AR	56
	Camposan Extra	AR	41
	Capalo Revy	F	83
	Carnadine Extra	I	272
	Cayunis	F	84
	CDQ™ SX	H	184
	Celest Trio 060 FS	K	60
	Cerone	AR	42
	Cezix	F	87
	Chwastox 750 SL	H	185
	Ciperkils 500 e.k.	I	273
	Cleave	H	186

1	3	4	5
	Comet Pro	F	86
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Croton Flex	F	125
	Cuadro NT	AR	43
	Curbatur	F	125
	Cycocel 750	AR	43
	Darby	H	163
	DARCOS	F	87
	Decis Forte	I	275
	Decis Mega	I	277
	Delaro Forte	F	88
	Delmetros 100 SC	I	278
	Dicoherb Super 750 SL	H	192
	DMA 600	H	193
	Dominic	F	150
	Elatus Era	F	94
	Elatus Plus	F	95
	Elegant 2FD	H	195
	EMCEE	H	196
	Entargo	F	96
	Erasmus	F	87
	Ergon	H	196
	Estet 600 EC	H	196
	Etefone	AR	44
	Euskatel	F	97
	Everest	AR	42
	Evure	I	285
	Falcon Forte	F	98
	Flexity	F	99
	Flurostar 180	H	198
	Flurostar Forte	H	199
	Flyer	H	199
	Folicur	F	44, 99
	Foxtrot 69 EW	H	204
	Fragma	H	253
	Fragma Delta	H	253
	Galistop 200	H	214
	Glacis	F	125
	Globaztar 250 SC	F	100
	Glyphomax 480	H	209
	Granstar Premia 50 SX	H	212
	Grassrooter	AR	44
	Grodyl	H	213
	Gusto	Lim	302
	Herbos 110 EC	H	214
	Hurler	H	214
	Hutton Flex	F	101
	Imtrex XE	F	102
	Innox	F	146
	Input	F	104
	Input Triple	F	106
	Joust	F	107
	Juventus 90	F	45, 109
	Karate Zeon 5 CS	I	280
	Kinto Plus	K	61
	Kinvara	H	216
	Koron 100 SC	H	278
	Lancelot	H	219
	Leander	F	111
	Legacy 500 SC	H	220
	Lenvyor	F	111
	Librax	F	112
	Lima Oro	Lim	305

1	3	4	5
	Limgol	Lim	305
	Maxentis	F	115
	Maxim 025 FS	K	62
	Maxim Extra 050 FS	K	63
	Mavrik	I	285, 286
	MCPA 750	H	223
	MCPA Classic 750 SL	H	185
	MCPA Super	H	224
	Medax Top	AR	47
	Meridian	Lim	305
	Mezzo WG	H	225
	Mirador 250 SC	F	73
	Mirador Forte	F	116
	Mixin	H	186
	Moddus 250 EC	AR	50
	Moddus Start	AR	50
	Moxa	AR	51
	Mustangs s.e.	H	227
	Mustangs Forte s.e.	H	227
	Nexa 500 EC	AR	52
	Nexide CS	I	292
	Nuance 75 WG	H	230
	Optica Trio	H	232
	Optimus	AR	56
	Orius 250 EW	F	118
	Patel 300 EC	F	130
	Pecari 300 EC	F	130
	Pioli	F	102
	Pixxaro EC	H	235
	Plexeo 90	F	45, 109
	Plexeo 90 EC	F	45, 109
	Poleposition 300 EC	F	130
	Polyversum	F	320
	Pony 306 SE	H	235
	Prepper	K	63
	Priaxor	F	124
	Primme	H	237
	Primus	H	237
	Primus 250 WG	H	238
	Primus XL	H	239
	Pro	H	237
	Profi MCPA 750 SL	H	185
	Proline	F	125
	Property 180 SC	F	127
	Prosaro	F	128
	Protendo 300 EC	F	130
	Puma Universal	H	240
	Quelex	H	240
	Redigo Pro	K	64
	Regucil	AR	50
	Regucil Start	AR	50
	Remocco 90	F	45, 109
	Revystar XL	F	137
	Revytrex	F	138
	Riza 200 EC	F	139
	Rodeo Plus	H	244
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Saracen	H	253
	Saracen Delta	H	253

1	3	4	5
	Seedron	F	65
	Sekator OD	H	254
	Sentrallas LQM	H	254
	Silvron	F	145
	Siltra Xpro	F	144
	Sitara	H	256
	Soratel	F	146
	Spitfire 333 HL	H	256
	Stabilan 400 SL	AR	53
	Stakato 500 SC	H	220
	Stapler	H	163
	Starane 333 HL	H	256
	Starane XL	H	256
	Stemper	AR	54
	Sunda	H	258
	SuPrim	H	237
	Syrius	F	118
	Systiva	K	66
	Talius	F	150
	Tandus	H	214
	TBM 75 WG	H	263
	Tebuplius	F	150
	Tebusha 25 EW	F	150
	Tempo	AR	50
	Teppeki	I	299
	Terpal	AR	55
	Tetatra	F	146
	Timeline FX	H	263
	Tomahawk 200 EC	H	264
	Torero	F	79
	Tribenocare 75 WG	H	230
	Trimaxx	AR	56
	Trimmer 50 SG	H	212
	Trimmer 500 WG	H	265
	Tripali	H	266
	Tristar 50 SG	H	266
	Trolten	H	267
	Turret 90	F	45, 109
	Vantex CS	I	292
	Variano Xpro	F	155
	Vazanti	F	78
	Verben	F	156
	Vibrance Pro	K	67
	Vibrance Star	K	67
	Vibrance Trio	K	68
	Viking	H	230
	Winotote	F	111
	Zypar	H	268
Mieži, vasaras ar āboliņa pasēju	MCPA 750	H	223
	Stomp CS	H	257
Mieži, vasaras ar lucernas pasēju	Stomp CS	H	257
Mieži, vasaras ar sarkanās auzenes vai ganību airenes pasēju	Trimmer 50 SG	H	212
Mieži, vasaras ar stiebrzāļu pasēju	Ariane S	H	167
	Duplosan Super	H	195
	Primus	H	237
	Primus XL	H	239
	Pro	H	237
	Starane XL	H	256

1	3	4	5
	SuPrim	H	237
	Tomahawk 200 EC	H	264
Mieži, vasaras un zirņu mistrs	Stomp CS	H	257
Mieži, ziemas	2,4-D Nufarm	H	163
	Accurate 200 WG	H	164
	Acetazol Extra	I	272
	Amistar 250 SC	F	73
	Arbiter	H	214
	Ariane S	H	167
	Arrva	H	216
	Artina	F	45, 109
	Artina EC	F	45, 109
	Ascra Xpro	F	77
	Avastel	F	78
	Axial 50 EC	H	168
	Axial One	H	169
	Azaka	F	79
	Azuba	F	73
	Balaya	F	80
	Banvel 4S	H	169
	Bariton Super	K	59
	Beflex 500 SC	H	174
	Benafar	F	146
	Beret 025 FS	K	62
	Bertego	AR	50
	Boiler	H	252
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Boxer 800 EC	H	179
	Cadou SC	H	183
	Calibre 50 SX	H	183
	Calma	AR	56
	Camposan Extra	AR	41
	Capalo Revy	F	83
	Carnadine Extra	I	272
	Cayunis	F	84
	CDQ™ SX	H	184
	Celest Trio 060 FS	K	60
	Cerone	AR	42
	Cezix	F	87
	Chwastox 750 SL	H	185
	Ciperkils 500 e.k.	I	273
	Cleave	H	186
	Comet Pro	F	86
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Croton Flex	F	125
	Cuadro NT	AR	43
	Curbatur	F	125
	Darby	H	163
	DARCOS	F	87
	Decis Forte	I	275
	Decis Mega	I	277
	Delaro Forte	F	88
	Diflanil 500 SC	H	192
	DMA 600	H	193
	Dominic	F	150
	Duplosan Super	H	195
	Elatus Era	F	94
	Elatus Plus	F	95
	Elegant 2FD	H	195
	EMCEE	H	196
	Entargo	F	96
	Erasmus	F	87

1	3	4	5
	Etefone	AR	44
	Euskatel	F	97
	Everest	AR	42
	Evure	I	285
	Falcon Forte	F	98
	Flexity	F	99
	Flight Forte	H	198
	Flurostar 180	H	198
	Flurostar Forte	H	199
	Flyer	H	199
	Folicur	F	44, 99
	Foxtrot 69 EW	H	204
	Fragma	H	253
	Fragma Delta	H	253
	Galistop 200	H	214
	Glacis	F	125
	Globaztar 250 SC	F	100
	Glyphomax 480	H	209
	Granstar Premia 50 SX	H	212
	Grassrooter	AR	44
	Grodyl	H	213
	Gusto	Lim	302
	Herbos 110 EC	H	214
	Hurler	H	214
	Hutton Flex	F	101
	Imtrex XE	F	102
	Innox	F	146
	Input	F	104
	Input Triple	F	106
	Joust	F	107
	Juventus 90	F	45, 109
	Karate Zeon 5 CS	I	280
	Kinto Plus	K	61
	Kinvara	H	216
	Komplet	H	217
	Lancelot	H	219
	Leander	F	111
	Legacy 500 SC	H	220
	Legacy Pro	H	220
	Lenvyor	F	111
	Librax	F	112
	Lima Oro	Lim	305
	Limgol	Lim	305
	Linati 800 EC	H	179
	Mateno Duo	H	223
	Mavrik	I	285, 286
	Maxentis	F	115
	Maxim 025 FS	K	62
	Maxim Extra 050 FS	K	63
	MCPA 750	H	223
	MCPA Classic 750 SL	H	185
	MCPA Super	H	224
	Medax Top	AR	47
	Mezzo WG	H	225
	Mirador 250 SC	F	73
	Mirador Forte	F	116
	Mixin	H	186
	Meridian	Lim	305
	Moddus 250 EC	AR	50
	Moddus Start	AR	50
	Moxa	AR	51
	Mustangs s.e.	H	227
	Nexa 500 EC	AR	52

1	3	4	5
	Nexide CS	I	292
	Next	AR	53
	Nuance 75 WG	H	230
	Optimus	AR	56
	Orius 250 EW	F	118
	Patel 300 EC	F	130
	Pecari 300 EC	F	130
	Pico 750 WG	H	234
	Pioli	F	102
	Pixxaro EC	H	235
	Plexeo 90	F	45, 109
	Plexeo 90 EC	F	45, 109
	Poleposition 300 EC	F	130
	Pontos	H	235
	Pony 306 SE	H	235
	Prepper	K	63
	Priaxor	F	124
	Primme	H	237
	Primus	H	237
	Primus 250 WG	H	238
	Primus XL	H	239
	Pro	H	237
	Professional	H	239
	Profi MCPA 750 SL	H	185
	Proline	F	125
	Property 180 SC	F	127
	Prosaro	F	128
	Protendo 300 EC	F	130
	Puma Universal	H	240
	Quelex	H	240
	Regucil	AR	50
	Regucil Start	AR	50
	Remocco 90	F	45, 109
	Revystar XL	F	137
	Revytrex	F	138
	Riza 200 EC	F	139
	Rodeo Plus	H	244
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Roxy EC	H	179
	Roxy 800 EC	H	252
	Saracen	H	253
	Saracen Delta	H	253
	Seedron	F	65
	Sekator OD	H	254
	Sentrallas LQM	H	254
	Siltra Xpro	F	144
	Silvron	F	145
	Sitara	H	256
	Soratel	F	146
	Spitfire 333 HL	H	256
	Stabilan 400 SL	AR	53
	Stakato 500 SC	H	220
	Stapler	H	163
	Starane 333 HL	H	256
	Starane XL	H	256
	Stemper	AR	54
	Sunda	H	258
	SuPrim	H	237
	Syrius	F	118

1	3	4	5
	Systiva	K	66
	Talius	F	150
	Tandus	H	214
	TBM 75 WG	H	263
	Tebuplius	F	150
	Tebusha 25 EW	F	150
	Tempo	AR	50
	Teppeki	I	299
	Terpal	AR	55
	Tetatra	F	146
	Timeline FX	H	263
	Tomahawk 200 EC	H	264
	Torero	F	79
	Tribenocare 75 WG	H	230
	Trimaxx	AR	56
	Trimmer 50 SG	H	212
	Trimmer 500 WG	H	265
	Trinity	H	220
	Tripali	H	266
	Trolten	H	267
	Turret 90	F	45, 109
	Vantex CS	I	292
	Variano Xpro	F	155
	Vazanti	F	78
	Verben	F	156
	Vibrance Pro	K	67
	Vibrance Star	K	67
	Vibrance Trio	K	68
	Viking	H	230
	Winotote	F	111
	Zypar	H	268
Mieži, ziemas ar stiebrzāļu pasēju	Ariane S	H	167
	Primus	H	237
	Primus XL	H	239
	Pro	H	237
	Starane XL	H	256
	SuPrim	H	237
	Tomahawk 200 EC	H	264
Rudzi	2,4-D Nufarm	H	163
	Amistar 250 SC	F	73
	Arrva	H	216
	Artina	F	45, 109
	Artina EC	F	45, 109
	Ascra Xpro	F	77
	Attribut	H	168
	Avastel	F	78
	Avoxa	H	168
	Axial 50 EC	H	168
	Azuba	F	73
	Banvel 4S	H	169
	Bariton Super	K	59
	Beflex 500 SC	H	174
	Benafar	F	146
	Beret 025 FS	K	62
	Bertego	AR	50
	Boiler	H	252
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Boxer 800 EC	H	179
	Broadway Star	H	180
	Cadou SC	H	183
	Calibre 50 SX	H	183
	Camposan Extra	AR	41

1	3	4	5
	CCC	AR	42
	CDQ™ SX	H	184
	Celest Trio 060 FS	K	60
	Chwastox 750 SL	H	185
	Ciperkils 500 e.k.	I	273
	Cleave	H	186
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Croton Flex	F	125
	Cuadro NT	AR	43
	Curbatur	F	125
	Cycocel 750	AR	43
	Darby	H	163
	Decis Forte	I	275
	Decis Mega	I	277
	Dicoherb Super 750 SL	H	192
	Diflanil 500 SC	H	192
	DMA 600	H	193
	Duplosan Super	H	195
	Elatus Era	F	94
	Elatus Plus	F	95
	Elegant 2FD	H	195
	EMCEE	H	196
	Euskatel	F	97
	Evure	I	285
	Falcon Forte	F	98
	Flexity	F	99
	Flight Forte	H	198
	Flurostar 180	H	198
	Flurostar Forte	H	199
	Flyer	H	199
	Foxtrot 69 EW	H	204
	Fragma	H	253
	Fragma Delta	H	253
	Glacis	F	125
	Globaztar 250 SC	F	100
	Glyphomax 480	H	209
	Granprotec	I	279
	Granstar Premia 50 SX	H	212
	Grodyl	H	213
	Gusto	Lim	302
	Herbistar 200 EC	H	213
	Hussar Activ Plus OD	H	215
	Hutton Flex	F	101
	Imtrex XE	F	102
	Incelo	H	215
	Innox	F	146
	Input	F	104
	Input Triple	F	106
	Ironmax Pro	Lim	303
	Joust	F	107
	Juventus 90	F	45, 109
	Kaiso 50 EG	I	280
	Karate Zeon 5 CS	I	280
	Kinto Plus	K	61
	Kinvara	H	216
	Komplet	H	217
	Lancelot	H	219
	Leander	F	111
	Legacy 500 SC	H	220
	Legacy Pro	H	220
	Lenvyor	F	111
	Librax	F	112
	Lima Oro	Lim	305

1	3	4	5
	Limgol	Lim	305
	Linati 800 EC	H	179
	Mateno Duo	H	223
	Mavrik	I	285, 286
	Maxentis	F	115
	Maxim 025 FS	K	62
	Maxim Extra 050 FS	K	63
	MCPA 750	H	223
	MCPA Classic 750 SL	H	185
	Medax Top	AR	47
	Meridian	Lim	305
	Mezzo WG	H	225
	Mirador 250 SC	F	73
	Mirador Forte	F	116
	Mixin	H	186
	Moddus 250 EC	AR	50
	Moddus Start	AR	50
	Moxa	AR	51
	Mustangs Forte s.e.	H	227
	Nexa 500 EC	AR	52
	Nexide CS	I	292
	Nuance 75 WG	H	230
	Orius 250 EW	F	118
	Patel 300 EC	F	130
	Pecari 300 EC	F	130
	Pico 750 WG	H	234
	Pioli	F	102
	Pixxaro EC	H	235
	Plexeo 90	F	45, 109
	Plexeo 90 EC	F	45, 109
	Poleposition 300 EC	F	130
	Pony 306 SE	H	235
	Prepper	K	63
	Priaxor	F	124
	Primme	H	237
	Primus	H	237
	Primus 250 WG	H	238
	Primus XL	H	239
	Pro	H	237
	Professional	H	239
	Profi MCPA 750 SL	H	185
	Proline	F	125
	Property 180 SC	F	127
	Prosaro	F	128
	Protendo 300 EC	F	130
	Puma Universal	H	240
	Quelex	H	240
	Regucil	AR	50
	Regucil Start	AR	50
	Remocco 90	F	45, 109
	Revystar XL	F	137
	Revytrex	F	138
	Rexade 440	H	244
	Riza 200 EC	F	139
	Rodeo Plus	H	244
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Roxy EC	H	179
	Roxy 800 EC	H	252
	Saracen	H	253

1	3	4	5
	Saracen Delta	H	253
	Seedron	F	65
	Sekator OD	H	254
	Sentrallas LQM	H	254
	Siltra Xpro	F	144
	Sitara	H	256
	Soratel	F	146
	Spitfire 333 HL	H	256
	Stabilan 400 SL	AR	53
	Stabilan 750 SL	AR	42
	Stakato 500 SC	H	220
	Stapler	H	163
	Starane 333 HL	H	256
	Starane XL	H	256
	Sunda	H	258
	SuPrim	H	237
	Syrius	F	118
	Talius	F	150
	TBM 75 WG	H	263
	Tempo	AR	50
	Teppeki	I	299
	Terpal	AR	55
	Tetatra	F	146
	Timeline FX	H	263
	Tomahawk 200 EC	H	264
	Tombo WG	H	265
	Tribenocare 75 WG	H	230
	Trimmer 50 SG	H	212
	Trimmer 500 WG	H	265
	Trinity	H	220
	Tripali	H	266
	Trolten	H	267
	Turret 90	F	45, 109
	Vantex CS	I	292
	Vazanti	F	78
	Variano Xpro	F	155
	Vibrance Duo	K	66
	Vibrance Pro	K	67
	Vibrance Star	K	67
	Vibrance Trio	K	68
	Viking	H	230
	Winotote	F	111
	Yodo 100 OD	H	268
	Zypar	H	268
Rudzi ar stiebrzāļu pasēju	Ariane S	H	167
	Primus	H	237
	Primus XL	H	239
	Pro	H	237
	Starane XL	H	256
	SuPrim	H	237
	Tomahawk 200 EC	H	264
Rudzi, vasaras	Afrodyta 250 SC	F	69
	Azaka	F	79
	Balaya	F	80
	Capalo revy	F	83
	Cayunis	F	84
	Delaro Forte	F	88
	Protikon 250 EC	F	132
	Silvron	F	145
	Torero	F	79
	Univoq	F	154
	Verben	F	156

1	3	4	5
Rudzi, ziemas	Acetazol Extra	I	272
	Afrodyta 250 SC	F	69
	Ariane S	H	167
	Axial One	H	169
	Azaka	F	79
	Balaya	F	80
	Capalo Revy	F	83
	Carnadine Extra	I	272
	Cayunis	F	84
	Cerone	AR	42
	Delaro Forte	F	88
	Estet 600 EC	H	196
	Everest	AR	42
	Gamelan 100 FS	K	61
	MCPA Super	H	224
	Mustangs s.e.	H	227
	Panexion OD	H	234
	Pontos	H	235
	Silvron	F	145
	Stemper	AR	54
	Systiva	K	66
	Torero	F	79
	Univoq	F	154
	Verben	F	156
Tritikāle	2,4-D Nufarm	H	163
	Accurate 200 WG	H	164
	Amistar 250 SC	F	73
	Ariane S	H	167
	Ascra Xpro	F	77
	Azuba	F	73
	Banvel 4S	H	169
	Bertego	AR	50
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Boxer 800 EC	H	179
	Broadway Star	H	180
	Calibre 50 SX	H	183
	CCC	AR	42
	Celest Trio 060 FS	K	60
	Cerone	AR	42
	Chwastox 750 SL	H	185
	Ciperkils 500 e.k.	I	273
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Cuadro NT	AR	43
	Cycocel 750	AR	43
	Darby	H	163
	Decis Mega	I	277
	Diflanil 500 SC	H	192
	DMA 600	H	193
	Duplosan Super	H	195
	Elegant 2FD	H	195
	Estet 600 EC	H	196
	Everest	AR	42
	Flexity	F	99
	Flight Forte	H	198
	Foxtrot 69 EW	H	204
	Fragma	H	253
	Glyphomax 480	H	209
	Grodyl	H	213
	Gusto	Lim	302
	Imtrex XE	F	102
	Ironmax Pro	Lim	303
	Kaiso 50 EG	I	280
	Komplet	H	217

1	3	4	5
	Leander	F	111
	Legacy 500 SC	H	220
	Librax	F	112
	Lima Oro	Lim	305
	Limgol	Lim	305
	Linati 800 EC	H	179
	Meridian	Lim	305
	Mezzo WG	H	225
	Mirador 250 SC	F	73
	Moddus 250 EC	AR	50
	Moddus Start	AR	50
	Monitor	H	226
	Mustangs s.e.	H	227
	Mustangs Forte s.e.	H	227
	Nexide CS	I	292
	Pioli	F	102
	Pixxaro EC	H	235
	Priaxor	F	124
	Primme	H	237
	Primus	H	237
	Primus 250 WG	H	238
	Primus XL	H	239
	Pro	H	237
	Professional	H	239
	Prosaro	F	128
	Regucil	AR	50
	Regucil Start	AR	50
	Riza 200 EC	F	139
	Rodeo Plus	H	244
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Roxy EC	H	179
	Saracen	H	253
	Siltra Xpro	F	144
	Sitara	H	256
	Stabilan 400 SL	AR	53
	Stabilan 750 SL	AR	42
	Stakato 500 SC	H	220
	Stapler	H	163
	Starane XL	H	256
	SuPrim	H	237
	TBM 75 WG	H	263
	Tempo	AR	50
	Tomahawk 200 EC	H	264
	Tombo WG	H	265
	Trolten	H	267
	Vantex CS	I	292
	Variano Xpro	F	155
	Verben	F	156
	Winotote	F	111
	Zypar	H	268
Tritikāle ar stiebrzāļu pasēju	Ariane S	H	167
	Primus	H	237
	Primus XL	H	239
	Pro	H	237
	Starane XL	H	256
	SuPrim	H	237
	Tomahawk 200 EC	H	264

1	3	4	5
Tritikāle, vasaras	Acetazol Extra	I	272
	Afrodyta 250 SC	F	69
	Artina	F	45, 109
	Artina EC	F	45, 109
	Avastel	F	78
	Axial 50 EC	H	168
	Azaka	F	79
	Balaya	F	80
	Bariton Super	K	59
	Benafar	F	146
	Beret 025 FS	K	62
	Capalo Revy	F	83
	Carnadine Extra	I	272
	Cayunis	F	84
	Cleave	H	186
	Croton Flex	F	125
	Curbatur	F	125
	Delaro Forte	F	88
	Difend	K	61
	Elatus Era	F	94
	Elatus Plus	F	95
	Euskatel	F	97
	Evure	I	285
	Falcon Forte	F	98
	Flurostar 180	H	198
	Flurostar Forte	H	199
	Glacis	F	125
	Globaztar 250 SC	F	100
	Hutton Flex	F	101
	Innox	F	146
	Input	F	104
	Input Triple	F	106
	Joust	F	107
	Juventus 90	F	45, 109
	Kinto Plus	K	61
	Maxentis	F	115
	Maxim 025 FS	K	62
	Maxim Extra 050 FS	K	63
	Mavrik	I	285, 286
	MCPA Classic 750 SL	H	185
	Mirador Forte	F	116
	Mixin	H	186
	Moxa	AR	51
	Nuance 75 WG	H	230
	Panexion OD	H	234
	Patel 300 EC	F	130
	Pecari 300 EC	F	130
	Plexeo 90	F	45, 109
	Plexeo 90 EC	F	45, 109
	Poleposition 300 EC	F	130
	Profi MCPA 750 SL	H	185
	Proline	F	125
	Property 180 SC	F	127
	Protendo 300 EC	F	130
	Redigo Pro	K	64
	Remocco 90	F	45, 109
	Revystar XL	F	137
	Revytrex	F	138
	Seedron	F	65
	Sekator OD	H	254
	Silvron	F	145
	Soratel	F	146

1	3	4	5
	Talius	F	150
	Tetatra	F	146
	Torero	F	79
	Tribenocare 75 WG	H	230
	Trimmer 500 WG	H	265
	Turret 90	F	45, 109
	Univoq	F	154
	Vazanti	F	78
	Verben	F	156
	Vibrance Duo	K	66
	Vibrance Pro	K	67
	Vibrance Star	K	67
	Viking	H	230
Tritikāle, ziemas	Acetazol Extra	I	272
	Afrodyta 250 SC	F	69
	Arrva	H	216
	Artina	F	45, 109
	Artina EC	F	45, 109
	Attribut	H	168
	Avastel	F	78
	Avoxa	H	168
	Axial 50 EC	H	168
	Axial One	H	169
	Azaka	F	79
	Balaya	F	80
	Bariton Super	K	59
	Beflex 500 SC	H	174
	Benafar	F	146
	Beret 025 FS	K	62
	Boiler	H	252
	Bolid 250 SE	F	81
	Cadou SC	H	183
	Camposan Extra	AR	41
	Capalo Revy	F	83
	Carnadine Extra	I	272
	Cayunis	F	84
	CDQ™ SX	H	184
	Cleave	H	186
	Croton Flex	F	125
	Curbatur	F	125
	Decis Forte	I	275
	Delaro Forte	F	88
	Difend	K	61
	Elatus Era	F	94
	Elatus Plus	F	95
	EMCEE	H	196
	Euskatel	F	97
	Evure	I	285
	Falcon Forte	F	98
	Flurostar 180	H	198
	Flurostar Forte	H	199
	Fragma Delta	H	253
	Gamelan 100 FS	K	61
	Glacis	F	125
	Globaztar 250 SC	F	100
	Granstar Premia 50 SX	H	212
	Herbistar 200 EC	H	213
	Herbos 110 EC	H	214
	Hussar Activ Plus OD	H	215
	Hutton Flex	F	101
	Incelo	H	215
	Innox	F	146

1	3	4	5
	Input	F	104
	Input Triple	F	106
	Joust	F	107
	Juventus 90	F	45, 109
	Kinto Plus	K	61
	Kinvara	H	216
	Lancelot	H	219
	Legacy Pro	H	220
	Lenvyor	F	111
	Mateno Duo	H	223
	Maxentis	F	115
	Maxim 025 FS	K	62
	Maxim Extra 050 FS	K	63
	Mavrik	I	285, 286
	MCPA Classic 750 SL	H	185
	Medax Top	AR	47
	Mepik 300 SL	AR	49
	Mirador Forte	F	116
	Mixin	H	186
	Moxa	AR	51
	Nexa 500 EC	AR	52
	Nuance 75 WG	H	230
	Panexion OD	H	234
	Patel 300 EC	F	130
	Pecari 300 EC	F	130
	Pico 750 WG	H	234
	Plexeo 90	F	45, 109
	Plexeo 90 EC	F	45, 109
	Poleposition 300 EC	F	130
	Pontos	H	235
	Pony 306 SE	H	235
	Profi MCPA 750 SL	H	185
	Proline	F	125
	Property 180 SC	F	127
	Protendo 300 EC	F	130
	Puma Universal	H	240
	Quelex	H	240
	Rassel 100 SC	H	244
	Remocco 90	F	45, 109
	Revystar XL	F	137
	Revytrex	F	138
	Rexade 440	H	244
	Roxy 800 EC	H	252
	Saracen Delta	H	253
	Seedron	F	65
	Sekator OD	H	254
	Sentrallas LQM	H	254
	Silvron	F	145
	Soratel	F	146
	Spitfire 333 HL	H	256
	Starane 333 HL	H	256
	Stemper	AR	54
	Sunda	H	258
	Talius	F	150
	Teppeki	I	299
	Tetatra	F	146
	Timeline FX	H	263
	Torero	F	79
	Tribenocare 75 WG	H	230
	Trimmer 50 SG	H	212
	Trimmer 500 WG	H	265
	Trinity	H	220

1	3	4	5
	Tripali	H	266
	Tristar 50 SG	H	266
	Turret 90	F	45, 109
	Univoq	F	154
	Vazanti	F	78
	Verben	F	156
	Vibrance Duo	K	66
	Vibrance Pro	K	67
	Vibrance Star	K	67
	Vibrance Trio	K	68
	Viking	H	230
	Yodo 100 OD	H	268
Vasarāju graudaugi	Agroxone 75	H	167
	EMDEE	H	167
	Nufarm MCPA 750	H	231
Vasarāju graudaugi ar āboliņa pasēju	Agroxone 75	H	167
	Basagran 480	H	173
	EMDEE	H	167
	MCPA Super	H	224
	Nufarm MCPA 750	H	231
Vasarāju graudaugi ar lucernas pasēju	Basagran 480	H	173
Vasarāju graudaugi ar stiebrzāļu pasēju	Basagran 480	H	173
Ziemāju graudaugi	Agroxone 75	H	167
	EMDEE	H	167
	Nufarm MCPA 750	H	231
RAPSIS, RIPSIS, SĒJAS IDRA, EĻĻAS AUGI, SINEPES			
Eļļas augi	Vitrol GB	Lim	306, 307
Rapsis	Barbarian Biograde 360	H	170
	Barbarian Hi-Aktiv	H	171
	Barbarian Super 360	H	170
	Clinic Up	H	170
	Gallup Super 360	H	170
	Ironmax Pro	Lim	303
	Monosate G	H	170
	Rosate 360 TF	H	170
Rapsis, vasaras	Acetami 20 SG	I	287
	Acetazol 20 SG	I	287
	Acetazol Extra	I	272
	Agil 100 EC	H	165
	Amistar 250 SC	F	73
	Amistar Gold	F	77
	Artina	F/AR	45, 109
	Artina EC	F/AR	45, 109
	Azaka	F	79
	Azuba	F	73
	Bagira	H	234
	Benafar	F	146
	Bill	AR	41
	Bonafide	F	83
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Bosca	F	83
	Brasan 540 EC	H	180
	Buteo Start	K	60
	Butisan 400	H	181
	Butisan Avant	H	181
	Butisan Kombi	H	182
	Butisan Pro	H	261

1	3	4	5
	Butisan Star	H	182
	Cantus	F	83
	Carnadine Extra	I	272
	Caryx	AR	41
	Centurion Plus	H	184
	Ciperkils 500 e.k.	I	273
	Clamox	H	185
	Clap Forte	H	186
	Clentiga	H	186
	Cleravo	H	187
	Cleravo Flex	H	187
	Cliophar 600 SL	H	188
	Conaxis	H	189
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Decis Forte	I	275
	Decis Mega	I	277
	Devrinols s.k.	H	191
	Difcor 250 EC	F	90
	Efilor	F	94
	Evure	I	285
	Focus Ultra	H	200
	Folicur	F/AR	44, 99
	Fortune	H	205
	Fox 480 SC	H	204
	Fuego 500 SC	H	258
	Fuego Top	H	258
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Gazelle 20 SG	I	287
	Gepard 50 EC	H	241
	Glyphomax 480	H	209
	Graminis	H	241
	Gusto	Lim	302
	Innox	F	146
	Jenot Plus 050 EC	H	262
	Joust	F	107
	Juventus 90	F/AR	45, 109
	Kaiso 50 EG	I	280
	Kalif 360 CS	H	215
	Kalif Mega	H	216
	Karate Zeon 5 CS	I	280
	Leopard	H	221
	Lima Oro	Lim	305
	Limgol	Lim	305
	Lontrel 72 SG	H	222
	Mavrik	I	285, 286
	Maxentis	F	115
	Medax Top	AR	47
	Meridian	Lim	305
	Metazamix™	H	225
	Mirador 250 SC	F	73
	Mirador Forte	F	116
	Mirador Uni	F	77
	Mospilan 20 SG	I	287
	Nervure	H	227
	Nexide CS	I	292
	Nimbus SE	H	229
	Orius 250 EW	F	118
	Panarex	H	234
	Pantera 4 EC	H	234
	Patel 300 EC	F	130
	Pecari 300 EC	F	130
	Pictor Active	F	119
	Pilot	H	262

1	3	4	5
	Plexeo 90	F/AR	45, 109
	Plexeo 90 EC	F/AR	45, 109
	Poleci	I	296
	Poleposition 300 EC	F	130
	Propulse	F	127
	Prosaro	F	128
	Protendo 300 EC	F	130
	Quick 50 EC	H	241
	Rango Max	H	242
	Rapsan 400 SC	H	181
	Rapsan 500 SC	H	243
	Rapsan Plus	H	243
	Rapsan Plus SC	H	182
	Remocco 90	F/AR	45, 109
	Revydas	F	135
	Revyona	F	136
	Riza 200 EC	F	139
	Rodeo Plus	H	244
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Scenic Gold	K	64
	Select Plus	H	184
	Soratel	F	146
	Sultan 500 SC	H	258
	Sultan Super	H	258
	Supero	H	241
	Syrius	F	118
	Tanaris	H	261
	Targa Super	H	262
	Teridox 500 EC	H	263
	Tetatra	F	146
	Tilmor	F/AR	55, 151
	Torero	F	79
	Treso	F	154
	Trico	R	309
	Turret 90	F/AR	45, 109
	Vantex CS	I	292
	Vredmix	F	77
	Zenby	F	161
	Zetrola	H	165
Rapsis, ziemas	Acetami 20 SG	I	287
	Acetazol 20 SG	I	287
	Acetazol Extra	I	272
	Achiba	H	165
	Afrodyta 250 SC	F	69
	Agil 100 EC	H	165
	Amistar 250 SC	F	73
	Amistar Gold	F	77
	Artina	F/AR	45, 109
	Artina EC	F/AR	45, 109
	Azaka	F	79
	Azuba	F	73
	Bagira	H	234
	Belkar	H	175
	Benafar	F	146
	Bill	AR	41
	Bolid 250 SE	F	81
	Bonafide	F	83
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Bosca	F	83

1	3	4	5
	Brasan 540 EC	H	180
	Buteo Start	K	60
	Butisan 400	H	181
	Butisan Avant	H	181
	Butisan Kombi	H	182
	Butisan Pro	H	261
	Butisan Star	H	182
	Cantus	F	83
	Carnadine Extra	I	272
	Caryx	AR	41
	Centurion Plus	H	184
	Cezix	F	87
	Ciperkils 500 e.k.	I	273
	Clamox	H	185
	Clap	H	185
	Clap Forte	H	186
	Clematis	H	189
	Clentiga	H	186
	Cleravo	H	187
	Cleravo Flex	H	187
	Cliophar 600 SL	H	188
	Clomate	H	189
	Conaxis	H	189
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	DARCOS	F	87
	Decis Forte	I	275
	Decis Mega	I	277
	Delmetros 100 SC	I	278
	Devrinols s.k.	H	191
	Difcor 250 EC	F	90
	Efilor	F	94
	Erasmus	F	87
	Evure	I	285
	Focus Ultra	H	200
	Folicur	F/AR	44, 99
	Fortune	H	205
	Fox 480 SC	H	204
	Frequent	H	205
	Fuego 500 SC	H	258
	Fuego Top	H	258
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Galera	H	208
	Gazelle 20 SG	I	287
	Gepard 50 EC	H	241
	Glyphomax 480	H	209
	Graminis	H	241
	Gusto	Lim	302
	Hingios	AR	45
	Innox	F	146
	Jenot Plus 050 EC	H	262
	Joust	F	107
	Juventus 90	F/AR	45, 109
	Kaiso 50 EG	I	280
	Kalif 360 CS	H	215
	Kalif Mega	H	216
	Karate Zeon 5 CS	I	280
	Koron 100 SC	H	278
	Korvetto	H	217
	Leopard	H	221
	Lima Oro	Lim	305
	Limgol	Lim	305
	Lontrel 72 SG	H	222
	Lumiposa 625 FS	K	62

1	3	4	5
	Maganic	F	114
	Mavrik	I	285, 286
	Maxentis	F	115
	Medax Top	AR	47
	Mepik 300 SL	AR	49
	Meridian	Lim	305
	Metazamix™	H	225
	Mirador 250 SC	F	73
	Mirador Forte	F	116
	Mirador Uni	F	77
	Mospilan 20 SG	I	287
	Nervure	H	227
	Nexide CS	I	292
	Nimbus SE	H	229
	Orius 250 EW	F	118
	Panarex	H	234
	Pantera 4 EC	H	234
	Patel 300 EC	F	130
	Pecari 300 EC	F	130
	Pictor Active	F	119
	Pilot	H	262
	Plexeo 90	F/AR	45, 109
	Plexeo 90 EC	F/AR	45, 109
	Poleci	I	296
	Poleposition 300 EC	F	130
	Polyversum	F	320
	Praktis	F	121
	Propulse	F	127
	Prosaro	F	128
	Protendo 300 EC	F	130
	Protikon 250 EC	F	132
	Quick 50 EC	H	241
	Rango Max	H	242
	Rapsan 400 SC	H	181
	Rapsan 500 SC	H	243
	Rapsan Plus	H	243
	Rapsan Plus SC	H	182
	Rasput	F	133
	Remocco 90	F/AR	45, 109
	Revydas	F	135
	Revyona	F	136
	Riza 200 EC	F	139
	Rodeo Plus	H	244
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Scenic Gold	K	64
	Select Plus	H	184
	Soratel	F	146
	Sultan 500 SC	H	258
	Sultan Super	H	258
	Supero	H	241
	Syrius	F	118
	Tanaris	H	261
	Targa Super	H	262
	Teridox 500 EC	H	263
	Tetatra	F	146
	Tilmor	F/AR	55, 151
	Toprex 375 SC	AR	56, 153
	Torero	F	79
	Treso	F	154

1	3	4	5
	Trico	R	309
	Turret 90	F/AR	45, 109
	Vantex CS	I	292
	VextaDim 240 EC	H	267
	Vredmix	F	77
	Zenby	F	161
	Zetrola	H	165
	Zorro 300 SL	H	268
Ripsis	Ironmax Pro	Lim	303
	Rapsan 400 SC	H	181
Ripsis, vasaras	Acetami 20 SG	I	287
	Acetazol 20 SG	I	287
	Benafar	F	146
	Buteo Start	K	60
	Butisan 400	H	181
	Clentiga	H	186
	Cleravo	H	187
	Cleravo Flex	H	187
	Cliophar 600 SL	H	188
	Evure	I	285
	Focus Ultra	H	200
	Gazelle 20 SG	I	287
	Glyphomax 480	H	209
	Innox	F	146
	Joust	F	107
	Lontrel 72 SG	H	222
	Mavrik	I	285, 286
	Maxentis	F	115
	Medax Top	AR	47
	Metazamix™	H	225
	Mospilan 20 SG	I	287
	Nervure	H	227
	Patel 300 EC	F	130
	Pecari 300 EC	F	130
	Pictor Active	F	119
	Poleposition 300 EC	F	130
	Protendo 300 EC	F	130
	Revydas	F	135
	Scenic Gold	K	64
	Soratel	F	146
	Tetatra	F	146
	Zenby	F	161
Ripsis, ziemas	Acetami 20 SG	I	287
	Acetazol 20 SG	I	287
	Benafar	F	146
	Buteo Start	K	60
	Butisan 400	H	181
	Clentiga	H	186
	Cleravo Flex	H	187
	Cliophar 600 SL	H	188
	Evure	I	285
	Gazelle 20 SG	I	287
	Glyphomax 480	H	209
	Innox	F	146
	Joust	F	107
	Lontrel 72 SG	H	222
	Maganic	F	114
	Mavrik	I	285, 286
	Maxentis	F	115
	Medax Top	AR	47
	Mospilan 20 SG	I	287
	Nervure	H	227
	Patel 300 EC	F	130

1	3	4	5
	Pecari 300 EC	F	130
	Pictor Active	F	119
	Poleposition 300 EC	F	130
	Protendo 300 EC	F	130
	Revydas	F	135
	Scenic Gold	K	64
	Soratel	F	146
	Tetatra	F	146
	Zenby	F	161
Sējas idra	Medax Top	AR	47
Sinepes	Agil 100 EC	H	165
	Barbarian Biograde 360	H	170
	Barbarian Hi-Aktiv	H	171
	Barbarian Super 360	H	170
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Butisan 400	H	181
	Clinic Up	H	170
	Decis Forte	I	275
	Gallup Super 360	H	170
	Ironmax Pro	Lim	303
	Joust	F	107
	Medax Top	AR	47
	Monosate G	H	170
	Pictor Active	F	119
	Rapsan 400 SC	H	181
	Rodeo Plus	H	244
	Rosate 360 TF	H	170
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	VextaDim 240 EC	H	267
	Zetrola	H	165
Sinepes, baltās	Protikon 250 EC	F	132
Sinepes, brūnās	Gepard 50 EC	H	241
	Graminis	H	241
	Quick 50 EC	H	241
	Supero	H	241
PĀKŠAUGI			
Aunazirņi graudiem	Gepard 50 EC	H	241
	Graminis	H	241
	Quick 50 EC	H	241
	Supero	H	241
Lēcas	Corum	H	190
	Gepard 50 EC	H	241
	Graminis	H	241
	Quick 50 EC	H	241
	Supero	H	241
Lēcas graudiem	Elatus Era	F	94
	Teppeki	I	299
Lupīna	Beret 025 FS	H	62
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Maxim 025 FS	K	62
	Rodeo Plus	H	244
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
Lupīna graudiem	Boxer 800 EC	H	179
	Fortune	H	205

1	3	4	5
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Gepard 50 EC	H	241
	Graminis	H	241
	Linati 800 EC	H	179
	Quick 50 EC	H	241
	Roxy EC	H	179
	Supero	H	241
	Teppeki	I	299
Pākšaugi	Mycostop	F	317
	Trianum-P	F	328
Pupas	Agil 100 EC	H	165
	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Basagran 480	H	173
	Benz	H	177
	Butoxone	H	182
	CBS sistēma	Dz	333
	Centurion Plus	H	184
	Ciperkils 500 e.k.	I	273
	Conaxis	H	189
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Decis Mega	I	277
	Devrinols s.k.	H	191
	Dominator 480	H	193
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Frequent	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Glyphomax 480	H	209
	Gusto	Lim	302
	Ironmax Pro	Lim	303
	Jenot Plus 050 EC	H	262
	Kalifornikus sistēma	Dz	340
	Leopard	H	221
	Mirador 250 SC	F	73
	Nervure	H	227
	Novitron DAMTec	H	229
	Pilot	H	262
	Rango Max	H	242
	Select Plus	H	184
	Switch 62.5 WG	F	147
	Targa Super	H	262
	Toutatis DAMTec	H	229
Pupas graudiem	Agil 100 EC	H	165
	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Bagira	H	234
	Benz	H	177
	Centurion Plus	H	184
	Conaxis	H	189
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Emin dārzam Mavrik Vita	I	286
	Evure	I	285
	Frequent	H	205
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Gusto	Lim	302
	Mavrik	I	285, 286
	Mirador 250 SC	F	73
	Nexide CS	I	292
	Panarex	H	234
	Pantera 4 EC	H	234

1	3	4	5
	Teppeki	I	299
	Vantex CS	I	292
	Zetrola	H	165
Pupas, kāršu	Decis Forte	I	275
	Prosaro	F	128
	Serenade Aso	F	321
	Signum	F	142
Pupas, lauka	Acetami 20 SG	I	287
	Acetazol 20 SG	I	287
	Acetazol Extra	I	272
	Barbarian Biograde 360	H	170
	Barbarian Hi-Aktiv	H	171
	Barbarian Super 360	H	170
	Basagran 480	H	173
	Beret 025 FS	K	62
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Boxer 800 EC	H	179
	Carnadine Extra	I	272
	Clinic Up	H	170
	Corum	H	190
	Decis Forte	I	275
	Fenix	H	197
	Gallup Super 360	H	170
	Gazelle 20 SG	I	287
	Linati 800 EC	H	179
	Maxim 025 FS	K	62
	Monosate G	H	170
	Mospilan 20 SG	I	287
	Prosaro	F	128
	Rodeo Plus	H	244
	Rodeo TF	H	259
	Rosate 360 TF	H	170
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Roxy EC	H	179
	Signum	F	142
	Spectrum	H	255
	Stomp CS	H	257
	Taifun B	H	259, 261
Pupas, lauka (graudiem)	Clever	H	197
	Gepard 50 EC	H	241
	Graminis	H	241
	Eclaire	H	197
	Elatus Era	F	94
	Nervure	H	227
	Pictor Active	F	119
	Propulse	F	127
	Quick 50 EC	H	241
	Spectrum	H	255
	Supero	H	241
Pupas, lopbarībai	Prosaro	F	128
	Signum	F	142
Soja	Basagran 480	H	173
	Beloukha	H	57, 175
	Conaxis	H	189
	Corum	H	190
	Credit Xtreme	H	190
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205

1	3	4	5
	Gepard 50 EC	H	241
	Graminis	H	241
	Ironmax Pro	Lim	303
	Protikon 250 EC	F	132
	Quick 50 EC	H	241
	Serenade Aso	F	321
	Supero	H	241
Zirņi	Acetazol Extra	I	272
	Afrodyta 250 SC	F	69
	Agil 100 EC	H	165
	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Basagran 480	H	173
	Beloukha	H	57, 175
	Benz	H	177
	Beret 025 FS	K	62
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Boxer 800 EC	H	179
	Butoxone	H	182
	Carnadine Extra	I	272
	Ciperkils 500 e.k.	I	273
	Conaxis	H	189
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Corum	H	190
	Credit Xtreme	H	190
	Decis Forte	I	275
	Decis Mega	I	277
	Devrinols s.k.	H	191
	DiPel DF	I	311
	Dominator 480	H	193
	Emin dārzam Mavrik Vita	I	286
	Evure	I	285
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Frequent	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Glyphomax 480	H	209
	Gusto	Lim	302
	Ironmax Pro	Lim	303
	Jenot Plus 050 EC	H	262
	Karate Zeon 5 CS	I	280
	Lentagran WP	H	220
	Leopard	H	221
	Linati 800 EC	H	179
	Mavrik	I	285, 286
	Maxim 025 FS	K	62
	Mirador 250 SC	F	73
	Nervure	H	227
	Nexide CS	I	292
	Novitron DAMTec	H	229
	Pilot	H	262
	Professional	H	239
	Rango Max	H	242
	Rodeo Plus	H	244
	Rodeo TF	H	259
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Roxy EC	H	179
	Serenade Aso	F	321
	Signum	F	142

1	3	4	5
	Spectrum	H	255
	Stomp CS	H	257
	Switch 62.5 WG	F	147
	T34 Biocontrol	F	326
	Taifun B	H	259, 261
	Targa Super	H	262
	Teppeki	I	299
	Toutatis DAMTec	H	229
	Trihogramma	Dz	351
	Vantex CS	I	292
	VitiSan	F	157, 159
	Zetrola	H	165
Zirņi graudiem	Agil 100 EC	H	165
	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Bagira	H	234
	Barbarian Biograde 360	H	170
	Barbarian Hi-Aktiv	H	171
	Barbarian Super 360	H	170
	Basagran 480	H	173
	Benz	H	177
	Centurion Plus	H	184
	Clever	H	197
	Clinic Up	H	170
	Conaxis	H	189
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Corum	H	190
	Eclaire	H	197
	Elatus Era	F	94
	Emin dārzam Mavrik Vita	I	286
	Evure	I	285
	Fenix	H	197
	Frequent	H	205
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Gallup Super 360	H	170
	Gepard 50 EC	H	241
	Graminis	H	241
	Gusto	Lim	302
	Mavrik	I	285, 286
	Mirador 250 SC	F	73
	Monosate G	H	170
	Nervure	H	227
	Nexide CS	I	292
	Panarex	H	234
	Pantera 4 EC	H	234
	Pictor Active	F	119
	Propulse	F	127
	Prosaro	F	128
	Quick 50 EC	H	241
	Rosate 360 TF	H	170
	Select Plus	H	184
	Spectrum	H	255
	Supero	H	241
	Teppeki	I	299
	Vantex CS	I	292
	Zetrola	H	165
Zirņu mistri	Basagran 480	H	173
KARTUPEĻI			
Kartupeļi	1,4 SIGHT	AR	40
	Acetami 20 SG	I	287
	Acetazol 20 SG	I	287

1	3	4	5
	Acetazol Extra	I	272
	Achiba	H	165
	Agil 100 EC	H	165
	Allstar	F/K	59, 72
	Altima 500 s.k.	F	72
	Amistar 250 SC	F	73
	Argos	AR	40
	Azuba	F	73
	Bagira	H	234
	Basagran 480	H	173
	Beloukha	D	57, 175
	Benevia 100 OD	I	270
	Beret 025 FS	K	62
	Biox-M	AR	40
	Boiler	H	252
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Boxer 800 EC	H	179
	Carnadine Extra	I	272
	Centurion Plus	H	184
	Ciperkils 500 e.k.	I	273
	Clever	H	197
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Coragen 20 SC	I	274
	Crown MH	AR	42
	Decis Mega	I	277
	Delmetros 100 SC	I	278
	Eclaire	H	197
	Emin dārzam Mavrik Vita	I	286
	Emin dārzam Revus 250 SC	F	134
	Evagio Plus	F	98
	Evure	I	285
	Fenix	H	197
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Fibro	I/A	279
	Frowncide 500 s.k.	F	72
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Gachinko	F	111
	Gallup 360-K	H	208
	Gazelle 20 SG	I	287
	Gusto	Lim	302
	Infinito	F	103
	Jenot Plus 050 EC	H	262
	Kaiso 50 EG	I	280
	Kalif 360 CS	H	215
	Karate Zeon 5 CS	I	280
	Koron 100 SC	H	278
	Krypt 540	H	217
	Leimay SC	F	111
	Leopard	H	221
	Linati 800 EC	H	179
	Mavrik	I	285, 286
	Maxim 025 FS	K	62
	Mirador 250 SC	F	73
	Mizuki	D/H	57, 226
	Mospilan 20 SG	I	287
	Nando 500 SC	F	117
	Naturalis	I	318
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	Nervure	H	227
	Novitron DAMTec	H	229
	Ohayo 500 s.k.	F	72

1	3	4	5
	Ouragan System 4	H	232, 233
	Panarex	H	234
	Pantera 4 EC	H	234
	Pilot	H	262
	Professional	H	239
	Proman	H	240
	Propulse	F	127
	Rango Max	H	242
	Ranman Top	F	133
	Revus 250 SC	F	134
	Revus Top	F	135
	Revyona	F	136
	RIM 25 WG	H	244
	Rodeo Plus	H	244
	Rodeo TF	H	259
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Roxy EC	H	179
	Roxy 800 EC	H	252
	Select Plus	H	184
	Signum	F	142
	SoilGuard 0.5 GR	I	299
	Sporax	F	147
	Spotlight Plus	D	57, 255
	Širlans 500 s.k.	F	72
	Taifun B	H	259, 261
	Targa Super	H	262
	Teppeki	I	299
	Titus 25 d.g.	H	264
	Toutatis DAMTec	H	229
	Vitrol GB	Lim	306, 307
	Winby 500 s.k.	F	72
	Zetrola	H	165
	Zorvec Enicade	F	162
LINI			
Lini	Accurate 200 WG	H	164
	Agil 100 EC	H	165
	Agroxone 75	H	167
	Bagira	H	234
	Basagran 480	H	173
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Centurion Plus	H	184
	Cliophar 600 SL	H	188
	EMDEE	H	167
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Grodyl	H	213
	Ironmax Pro	Lim	303
	Joust	F	107
	Lontrel 72 SG	H	222
	MCPA 750	H	223
	MCPA Super	H	224
	Medax Top	AR	47
	Nervure	H	227
	Nufarm MCPA 750	H	231
	Panarex	H	234
	Pantera 4 EC	H	234
	Pictor Active	F	119
	Rodeo Plus	H	244

1	3	4	5
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Select Plus	H	184
	VextaDim 240 EC	H	267
	Zetrola	H	165
Lini, eļļas	Barbarian Biograde 360	H	170
	Barbarian Hi-Aktiv	H	171
	Barbarian Super 360	H	170
	Clinic Up	H	170
	Gallup Super 360	H	170
	Monosate G	H	170
	Rosate 360 TF	H	170
	Serenade Aso	F	321
KUKURŪZA			
Kukurūza	Banvel 4S	H	169
	Barracuda	H	173
	Basagran 480	H	173
	Beloukha	H	57, 175
	Benz	H	177
	Botiga	H	179
	Callisto 100 SC	H	183
	Coragen 20 SC	I	274
	Dicash	H	192
	Elumis 105 OD	H	195
	Estet 600 EC	H	196
	Flurostar Forte	H	199
	Fornet 4 OD	H	225
	Fornet Max 6 OD	H	226
	Fraxion	H	173
	Granprotec	I	279
	Gusto	Lim	302
	Halvetic	H	213
	Ironmax Pro	Lim	303
	Lima Oro	Lim	305
	Limgol	Lim	305
	Maister Power OD	H	223
	Meridian	Lim	305
	Milagro 4 OD	H	225
	Milagro Extra 6 OD	H	226
	Nicogan	H	229
	Onyx	H	231
	Pony 306 SE	H	235
	Propulse	F	127
	Revyona	F	136
	RIM 25 WG	H	244
	Rodeo Plus	H	244
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Samson 4 OD	H	225
	Samson Max 6 OD	H	226
	SoilGuard 0.5 GR	I	299
	Spitfire 333 HL	H	256
	Starane 333 HL	H	256
	Starship	H	257
	Stomp CS	H	257
	Surrender	K	65
	Temsa SC	H	263
	Titus 25 d.g.	H	264
	Trico	R	309

1	3	4	5
SAULESPUĶES			
Saulespuķes	Boxer 800 EC	H	179
	Clever	H	197
	Eclaire	H	197
	Fenix	H	197
	Gepard 50 EC	H	241
	Graminis	H	241
	Ironmax Pro	Lim	303
	Linati 800 EC	H	179
	Quick 50 EC	H	241
	Roxy EC	H	179
	Supero	H	241
	Surrender	K	65
	Trico	R	309
	VextaDim 240 EC	H	267
KRĀŠŅUMAUGI, DEKORATĪVIE AUGI			
Antūrijas	Feltiella sistēma	Dz	338
	Fitoseiulus sistēma	Dz	339
Atraitnītes	Karate Zeon 5 CS	I	280
Balzamīnes	CBS sistēma	Dz	333
	Kalifornikus sistēma	Dz	340
Begonijas (atklātā laukā)	Candit	F	82
Begonijas (segtās platībās)	Candit	F	82
Daturas	CBS sistēma	Dz	333
	Kalifornikus sistēma	Dz	340
Dekoratīvie kokaugi	Carpo sistēma	Dz	333
	Heterorhabditis sistēma	Dz	339
	Isonet Z	FR	352
	NemaFence Phasma	Dz	343
	Ranman Top	F	133
	Topas 100 EC	F	152
Dekoratīvie kokaugi un krūmi	Beloukha	H	57, 175
	Beloukha Garden RTU	H	176
	Coragen 20 SC	I	274
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Katoun Gold	H	216
	Pret nezālēm Hobby	H	236
	Pret nezālēm Ultra	H	236
	VitiSan	F	157, 159
	Wöbra	R	310
Dekoratīvās kultūras, augi	Decis Forte	I	275
	Detia Wühlmausgas	R	308
	DiPel DF	I	311
	Eupiods sistēma	Dz	338
	Ferramol	Lim	302
	Ferramol Limacide	Lim	302
	Gusto	Lim	302
	Kriptolēmus-(L-) sistēma	Dz	340
	Lalstop G46 WG	F	312
	Lima Oro	Lim	305
	Limgol	Lim	305
	Limonikus sistēma	Dz	341
	Meridian	Lim	305
	Mikromus sistēma	Dz	342
	Montdorensis sistēma	Dz	343
	Naturalis	I	318
	NeemAzal	I/A	290

1	3	4	5
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	Pangodiņš	Dz	346
	SLUXX^{HP}	Lim	306
	T34 Biocontrol	F	326
	Vitrol GB	Lim	306, 307
Dižkallas	CBS sistēma	Dz	333
	Kalifornikus sistēma	Dz	340
Frēzijas	CBS sistēma	Dz	333
	Kalifornikus sistēma	Dz	340
Fuksijas	CBS sistēma	Dz	333
	Kalifornikus sistēma	Dz	340
Gerberas	ABS sistēma	Dz	330
	Afidius sistēma	Dz	330
	Afidoletes sistēma	Dz	331
	Ambliseijus sistēma	Dz	331
	Diglifus sistēma	Dz	335
	Enkarsijas sistēma	Dz	336
	Eretmiks sistēma	Dz	337
	Eretmocerus sistēma	Dz	337
	Fitoseiulus sistēma	Dz	339
	Hipoaspis sistēma	Dz	339
	Karate Zeon 5 CS	I	280
	Mycostop	F	317
	Orius sistēma	Dz	346
Gerberas (atklātā laukā)	Candit	F	82
Gerberas (segtās platībās)	Candit	F	82
	CBS sistēma	Dz	333
	Daknusa sistēma	Dz	335
	Feltiella sistēma	Dz	338
	Kalifornikus sistēma	Dz	340
	Steinernema sistēma	Dz	348
	Swirskii-Mite LD	Dz	350
Koki	Beloukha Garden RTU	H	176
	Katoun Gold	H	216
Krāšņumaugi	Adalia sistēma (Adalia-E sistēma)	Dz	330
	Agil 100 EC	H	165
	Beloukha	H	57, 175
	Coragen 20 SC	I	274
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Gusto	Lim	302
	Mycostop	F	317
	Nemaslug	Dz	343
	Nemasys	Dz	344
	Nemasys C	Dz	345
	Nemasys No Ants	Dz	346
	Previcur Energy	F	121
	Teppeki	I	299
	Trianum-P	F	328
	VextaDim 240 EC	H	267
	VitiSan	F	157, 159
	Zetrola	H	165
Krāšņumaugi atklātā laukā	Acetami 20 SG	I	287
	Acetazol 20 SG	I	287
	Adalia sistēma (Adalia-E sistēma)	Dz	330
	Aliette	F	71
	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73

1	3	4	5
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Decis Forte	I	275
	Decis Mega	I	277
	Difcor 250 EC	F	90
	DiPel DF	I	311
	Emin dārzam Mavrik Vita	I	286
	Evure	I	285
	Gazelle 20 SG	I	287
	Larvanem	Dz	340
	Mavrik	I	285, 286
	Mirador 250 SC	F	73
	Mospilan 20 SG	I	287
	Naturalis	I	318
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	Nissorun 250 SC	A	293
	Previcur Energy	F	121
	Ranman Top	F	133
	Serenade Aso	F	321
	Sferoforia sistēma	Dz	347
	Switch 62.5 WG	F	147
	Topas 100 EC	F	152
Krāšņumaugi (līdz 50 cm augstumam – sējumi un stādījumi)	Ciperkils 500 e.k.	I	273
Krāšņumaugi segtās platībās	Aliette	F	71
	Amistar 250 SC	F	73
	Aphidend	Dz	331
	Aphipar	Dz	332
	Aphiscout	Dz	332
	Azuba	F	73
	Calif PRO5	Dz	332
	Calif PRO5 LS	Dz	332
	Carpo sistēma	Dz	333
	Chrysopa	Dz	333
	Chrysopa-E	Dz	334
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Cryptobug	Dz	334
	Cryptobug-L	Dz	334
	Cucum PRO5	Dz	334
	Cucum PRO5 LS	Dz	334
	Daknusa sistēma	Dz	335
	Decis Forte	I	275
	Difcor 250 EC	F	90
	DiPel DF	I	311
	Enermix	Dz	335
	En-strip	Dz	336
	Entomite-M	Dz	336
	Entonem	Dz	336
	Ercal	Dz	337
	Ervipar	Dz	337
	Larvanem	Dz	340
	Macro-Mite	Dz	341
	Miglyphus	Dz	342
	Mirador 250 SC	F	73
	Mirical	Dz	342
	Naturalis	I	318
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
	Nissorun 250 SC	A	293
	Ranman Top	F	133
	Serenade Aso	F	321

1	3	4	5
	Sferoforia sistēma	Dz	347
	Spical	Dz	347
	Spical-Plus	Dz	347
	Spidex Vital	Dz	348
	Spidend	Dz	348
	Steinernema sistēma	Dz	348
	Swir PRO5	Dz	349
	Swir PRO5 LS	Dz	349
	Swirskii-Mite	Dz	350
	Swirskii-Mite Plus	Dz	350
	Switch 62.5 WG	F	147
	Thripex (Thripex-plus)	Dz	351
	Thripor-L	Dz	351
	Topas 100 EC	F	152
	Tracer	I	300
	Trianum-P	F	328
Krāšņumaugi tuneļos	Naturalis	I	318
	Nissorun 250 SC	A	293
Krizantēmas	Afidius sistēma	Dz	330
	Afidoletes sistēma	Dz	331
	Diglifus sistēma	Dz	335
	Enkarsijas sistēma	Dz	336
	Eretmiks sistēma	Dz	337
	Eretmocerus sistēma	Dz	337
	Fitoseiulus sistēma	Dz	339
	Hipoaspis sistēma	Dz	339
	Karate Zeon 5 CS	I	280
	Topas 100 EC	F	152
Krizantēmas (atklātā laukā)	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Candit	F	82
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Emin dārzam Score 250 EC	F	141
	Mavita 250 EC	F	140
	Mirador 250 SC	F	73
	Score	F	141
	Score 250 EC	F	140, 141
Krizantēmas (segtās platībās)	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Candit	F	82
	CBS sistēma	Dz	333
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Daknusa sistēma	Dz	335
	Emin dārzam Score 250 EC	F	141
	Feltiella sistēma	Dz	338
	Kalifornikus sistēma	Dz	340
	Mavita 250 EC	F	140
	Mirador 250 SC	F	73
	Score	F	141
	Score 250 EC	F	140, 141
	Steinernema sistēma	Dz	348
Lilijas	Karate Zeon 5 CS	I	280
Narcises (atklātā laukā)	Stomp CS	H	257
Neļķes (atklātā laukā)	Candit	F	82
Neļķes (segtās platībās)	Candit	F	82
	T34 Biocontrol	F	326
Orhidejas	Aliette	F	71
Petūnijas	Karate Zeon 5 CS	I	280

1	3	4	5
Puansetijas	ABS sistēma	Dz	330
	Afidius sistēma	Dz	330
	Afidoletes sistēma	Dz	331
	Ambliseijus sistēma	Dz	331
	CBS sistēma	Dz	333
	Enkarsijas sistēma	Dz	336
	Eretmiks sistēma	Dz	337
	Eretmocerus sistēma	Dz	337
	Hipoaspis sistēma	Dz	339
	Kalifornikus sistēma	Dz	340
Prīmulas	Karate Zeon 5 CS	I	280
Rozes	ABS sistēma	Dz	330
	Afidius sistēma	Dz	330
	Afidoletes sistēma	Dz	331
	Ambliseijus sistēma	Dz	331
	Enkarsijas sistēma	Dz	336
	Eretmiks sistēma	Dz	337
	Eretmocerus sistēma	Dz	337
	Fitoseiulus sistēma	Dz	339
	Hipoaspis sistēma	Dz	339
	Karate Zeon 5 CS	I	280
	Orius sistēma	Dz	346
Rozes (atklātā laukā)	Candit	F	82
	Difcor 250 EC	F	90
Rozes (segtās platībās)	Candit	F	82
	CBS sistēma	Dz	333
	Difcor 250 EC	F	90
	Feltiella sistēma	Dz	338
	Fitosējuluss	Dz	339
	Kalifornikus sistēma	Dz	340
	Swirskii-Mite LD	Dz	350
Sīpolpuķes	Trianum-P	F	328
Tulpes	Stomp CS	H	257
ZĀLĀJI, ILGGADĪGĀS STIEBRZĀLES un TAURIŅZIEŽI			
Airene, daudzziedu	Cuadro NT	AR	43
Airene, ganību	Cuadro NT	AR	43
	Medax Top	AR	47
	Moxa	AR	51
Auzene, niedru	Cuadro NT	AR	43
	Medax Top	AR	47
Auzene, pļavas	2,4-D Nufarm	H	163
	Darby	H	163
	Moxa	AR	51
	Stapler	H	163
Auzene, sarkanā	Agil 100 EC	H	165
	Cuadro NT	AR	43
	Focus Ultra	H	200
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Medax Top	AR	47
	Moxa	AR	51
	Nervure	H	227
	Zetrola	H	165
Āboliņš	Agroxone 75	H	167
	EMDEE	H	167
	MCPA 750	H	223
	Nufarm MCPA 750	H	231
Āboliņš, baltais	Butoxone	H	182
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	MCPA Super	H	224

1	3	4	5
Āboliņš, bastarda	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
Āboliņš, sarkanais	Butoxone	H	182
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	MCPA Super	H	224
Āboliņš, sēklai	Agil 100 EC	H	165
	Basagran 480	H	173
	Focus Ultra	H	200
	Karate Zeon 5 CS	I	280
	Mizuki	D	57, 226
	Nervure	H	227
	Nexide CS	I	292
	Vantex CS	I	292
	Zetrola	H	165
Dižauza, augstā	2,4-D Nufarm	H	163
	Darby	H	163
	Stapler	H	163
Galega	Butoxone	H	182
Kamolzāle, parastā	2,4-D Nufarm	H	163
	Cuadro NT	AR	43
	Darby	H	163
	Medax Top	AR	47
	Stapler	H	163
Lāčauza, bezakotu	2,4-D Nufarm	H	163
	Darby	H	163
	Stapler	H	163
Lapsaste, pļavas	2,4-D Nufarm	H	163
	Darby	H	163
	Stapler	H	163
Lucerna	Agil 100 EC	H	165
	Zetrola	H	165
Lucerna sēklai	Basagran 480	H	173
	Focus Ultra	H	200
	Karate Zeon 5 CS	I	280
	Nexide CS	I	292
	Vantex CS	I	292
Skarene, pļavas	2,4-D Nufarm	H	163
	Darby	H	163
	Stapler	H	163
Stiebrzāles, daudzgadīgās	Agroxone 75	H	167
	Arbiter	H	214
	Ariane S	H	167
	EMDEE	H	167
	Estet 600 EC	H	196
	Flurostar Forte	H	199
	Galistop 200	H	214
	Grodyl	H	213
	Hurler	H	214
	MCPA 750	H	223
	MCPA Super	H	224
	Nufarm MCPA 750	H	231
	Tandus	H	214
Stiebrzāles – sēklu lauki	Ariane S	H	167
	Arrva	H	216
	Cleave	H	186
	Cliophar 600 SL	H	188
	Cycocel 750	AR	43
	Flurostar 180	H	198
	Flurostar Forte	H	199

1	3	4	5
	Kinvara	H	216
	Lontrel 72 SG	H	222
	Mixin	H	186
	Moddus Start	AR	50
	Primme	H	237
	Primus	H	237
	Primus 250 WG	H	238
	Primus XL	H	239
	Pro	H	237
	Regucil Start	AR	50
	Sitara	H	256
	Starane XL	H	256
	Stemper	AR	54
	SuPrim	H	237
	Tomahawk 200 EC	H	264
Stiebrzāles - lopbarībai	Arrva	H	216
	Cleave	H	186
	Kinvara	H	216
	Mixin	H	186
Stiebrzāles, daudzgadīgās – sēklu lauki	Arbiter	H	214
	Flurostar 180	H	198
	Fragma	H	253
	Fragma Delta	H	253
	Galistop 200	H	214
	Hurler	H	214
	Nufarm MCPA 750	H	231
	Saracen	H	253
	Saracen Delta	H	253
	Tandus	H	214
	Tomahawk 200 EC	H	264
Stiebrzāles, daudzgadīgās – lopbarībai	Arbiter	H	214
	Flurostar 180	H	198
	Flurostar Forte	H	199
	Galistop 200	H	214
	Hurler	H	214
	Tandus	H	214
	Tomahawk 200 EC	H	264
Stiebrzāles, viengadīgās	Arbiter	H	214
	Galistop 200	H	214
	Hurler	H	214
	Tandus	H	214
Timotiņš, pļavas	2,4-D Nufarm	H	163
	Cuadro NT	AR	43
	Darby	H	163
	Moxa	AR	51
	Stapler	H	163
Zālāji	Banvel 4S	H	169
	Barbarian Biograde 360	H	170
	Barbarian Hi-Aktiv	H	171
	Barbarian Super 360	H	170
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Clinic Up	H	170
	Gallup 360-K	H	208
	Gallup Super 360	H	170
	Krypt 540	H	217
	Lima Oro	Lim	305
	Limgol	Lim	305
	Meridian	Lim	305

1	3	4	5
	Monosate G	H	170
	Rodeo Plus	H	244
	Rodeo TF	H	259
	Rosate 360 TF	H	170
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Taifun B	H	259, 261
ZĀLIENS			
Zāliena atjaunošana	Credit Xtreme	H	190
	Emin dārzam Taifun B	H	261
	Ouragan System 4	H	232, 233
	Taifun B	H	259, 261
Zāliens	Amistar 250 SC	F	73
	Arrva	H	216
	Azuba	F	73
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Ferramol	Lim	302
	Ferramol Limacide	Lim	302
	Flurostar 180	H	198
	Heterorhabditis sistēma	Dz	339
	Ironmax Pro	Lim	303
	Kinvara	H	216
	Larvanem	Dz	340
	Lima Oro	Lim	305
	Limgol	Lim	305
	Meridian	Lim	305
	Mirador 250 SC	F	73
	NemaFence Phasma	Dz	343
	Nemasys No Ants	Dz	346
	Nufarm MCPA 750	H	231
	Tomahawk 200 EC	H	264
Zāliens golfa laukumā	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Lalstop G46 WG	F	312
	Larvanem	Dz	340
	Mirador 250 SC	F	73
	Switch 62.5 WG	F	147
	Tomahawk 200 EC	H	264
Zāliens sporta laukumā	Lalstop G46 WG	F	312
KOKAUDZĒTAVAS, STĀDAUDZĒTAVAS, JAUNAUDZES			
Augļu koku stādaudzētavas	Agil 100 EC	H	165
	Gusto	Lim	302
	T34 Biocontrol	F	326
	Zetrola	H	165
Baltegles kokaudzētavās	Cliophar 600 SL	H	188
	Lontrel 72 SG	H	222
Dekoratīvie krūmi kokaudzētavās	Carpo sistēma	Dz	333
	Heterorhabditis sistēma	Dz	339
	NemaFence Phasma	Dz	343
	Switch 62.5 WG	F	147
Egles kokaudzētavās	Clever	H	197
	Cliophar 600 SL	H	188
	Eclaire	H	197

1	3	4	5
	Fenix	H	197
	Goltix Gold	H	211
	Lontrel 72 SG	H	222
Egles, Ziemassvētku	Acetami 20 SG	I	287
	Acetazol 20 SG	I	287
	Clever	H	197
	Eclaire	H	197
	Fenix	H	197
	Gazelle 20 SG	I	287
	Mospilan 20 SG	I	287
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
Kārkli, stādījumi	Clever	H	197
	Eclaire	H	197
	Fenix	H	197
	VextaDim 240 EC	H	267
Kokaudzētavas	Boom efekt 360 SL	H	177
	Credit Xtreme	H	190
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
Kokaugi, atklātā laukā	Serenade Aso	F	321
Kokaugi kokaudzētavās	Serenade Aso	F	321
	Trianum-P	F	328
Kokaugi, segtās platībās	Serenade Aso	F	321
Koku jaunaudzes pēc ierīkošanas mežā	Barbarian Biograde 360	H	170
	Barbarian Hi-Aktiv	H	171
	Barbarian Super 360	H	170
	Clinic Up	H	170
	Gallup 360-K	H	208
	Gallup Super 360	H	170
	Krypt 540	H	217
	Monosate G	H	170
	Rosate 360 TF	H	170
Krūmi, atklātā laukā	Serenade Aso	F	321
Krūmi kokaudzētavās	Serenade Aso	F	321
	Trianum-P	F	328
Krūmi, segtās platībās	Serenade Aso	F	321
Lapegles kokaudzētavās	Clever	H	197
	Eclaire	H	197
	Fenix	H	197
Lapu koki kokaudzētavās	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	DiPel DF	I	311
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Karate Zeon 5 CS	I	280
	Lalstop G46 WG	F	312
	Mirador 250 SC	F	73

1	3	4	5
	Shyfo	H	254
	Switch 62.5 WG	F	147
	Topas 100 EC	F	152
Lapu koki kokaudzētavās (tuneļos)	Lalstop G46 WG	F	312
Lapu koku jaunaudzes	Cervacol extra	R	308
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Karate Zeon 5 CS	I	280
	Plantskydd	R	309
	Trico	R	309
	WAM extra	R	310
	Wōbra	R	310
Lapu koku jaunie sādījumi	Shyfo	H	254
Meža kultūru stādu audzētavas	Agil 100 EC	H	165
	Gusto	Lim	302
	Zetrola	H	165
Ogulāji stādaudzētavās	Agil 100 EC	H	165
	Zetrola	H	165
Pirms koku jaunaudžu ierīkošanas mežā	Barbarian Biograde 360	H	170
	Barbarian Hi-Aktiv	H	171
	Barbarian Super 360	H	170
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Clinic Up	H	170
	Credit Xtreme	H	190
	Gallup 360-K	H	208
	Gallup Super 360	H	170
	Krypt 540	H	217
	Monosate G	H	170
	Rosate 360 TF	H	170
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
Priedes kokaudzētavās	Clever	H	197
	Eclaire	H	197
	Fenix	H	197
Skuju koku jaunaudzes	Acetazol Extra	I	272
	Carnadine Extra	I	272
	Cervacol extra	R	308
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Imprid Skog	I	280
	Karate Zeon 5 CS	I	280
	Plantskydd	R	309
	Trico	R	309
	WAM extra	R	310
	Wōbra	R	310
Skuju koku jaunie stādījumi	Boom efekt 360 SL	H	177
	Credit Xtreme	H	190
	Dominator 480	H	193
	Glyphomax 480	H	209
	Ouragan System 4	H	232, 233
	Rodeo TF	H	259

1	3	4	5
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Shyfo	H	254
	Taifun B	H	259, 261
Skuju koki kokaudzētavās	Amistar 250 SC	F	73
	Azuba	F	73
	Conclude AZT 250 SC	F	73
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Karate Zeon 5 CS	I	280
	Lalstop G46 WG	F	312
	Mirador 250 SC	F	73
	Shyfo	H	254
	Switch 62.5 WG	F	147
Skuju koki kokaudzētavās (dēsti)	Imprid Skog	I	280
Skuju koki kokaudzētavās (tuneļos)	Lalstop G46 WG	F	312
Stādi kokaudzētavās un stādu audzētavās	ABS sistēma	Dz	330
	Adalia sistēma (Adalia-E sistēma)	Dz	330
	Ambliseijus sistēma	Dz	331
	Calif PRO5	Dz	332
	Calif PRO5 LS	Dz	332
	CBS sistēma	Dz	333
	Cucum PRO5	Dz	334
	Cucum PRO5 LS	Dz	334
	Daknusa sistēma	Dz	335
	Feltiella sistēma	Dz	338
	Fitoseiulus sistēma	Dz	339
	Hipoaspis sistēma	Dz	339
	Kalifornikus sistēma	Dz	340
	Orius sistēma	Dz	346
	Steinernema sistēma	Dz	348
	Swir PRO5	Dz	349
	Swir PRO5 LS	Dz	349
	T34 Biocontrol	F	326
NOLIKTAVAS			
Noliktavas	Actellic 50 EC	I/A	270
	K-Obiol	I	282
	Karate Zeon 5 CS	I	280
	SilicoSec	I/A	298
Noliktavas, kartupeļu	Menno Florades	Dez	58
Noliktavu apkārtne	Karate Zeon 5 CS	I	280
Sēklas materiāls (dažādu kultūru)	Actellic 50 EC	I/A	270
DAŽĀDI			
Apelsīni	Banarg	AR	40
Apiņi	Trico	R	309
Atmata	Kyleo	H	219
Augi, ārstniecības	Beloukha	H	57, 175
Augsne	Nemasys H	Dz	345
	Nemasys L	Dz	346
Banāni	Banarg	AR	40

1	3	4	5
Bārbeles	VitiSan	F	157, 159
Celmi	Barbarian Biograde 360	H	170
	Barbarian Hi-Aktiv	H	171
	Barbarian Super 360	H	170
	Clinic Up	H	170
	Dominator 480	H	193
	Gallup Super 360	H	170
	Glyphomax 480	H	209
	Monosate G	H	170
	Rodeo TF	H	259
	Rosate 360 TF	H	170
	Rotstop SC	F	321
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Taifun B	H	259, 261
Ceļa malas	Accurate 200 WG	H	164
	Nuance 75 WG	H	230
	Tribenocare 75 WG	H	230
	Viking	H	230
	Zypar	H	268
Ceļi, takas, laukumi, kuriem ir caurlaidīga virsma	Beloukha Garden RTU	H	176
	Katoun Gold	H	216
	Pret nezālēm Hobby	H	236
	Pret nezālēm Ultra	H	236
Citroni	Banarg	AR	40
Citrusaugļi	Banarg	AR	40
Daudzgadīgie augi	Trianum-P	F	328
Dažādu kultūru dēsti un stādi	Acetami 20 SG	I	287
	Acetazol 20 SG	I	287
	Gazelle 20 SG	I	287
	Lalstop G46 WG	F	312
	Mospilan 20 SG	I	287
	Trianum-P	F	328
Dzelzceļi	Banvel 4S	H	169
Ganības	Agroxone 75	H	167
	Ariane S	H	167
	Arrva	H	216
	Banvel 4S	H	169
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Cliophar 600 SL	H	188
	Credit Xtreme	H	190
	Detia Wühlmausgas	R	308
	EMDEE	H	167
	Estet 600 EC	H	196
	Fragma	H	253
	Ironmax Pro	Lim	303
	Kinvara	H	216
	Lima Oro	Lim	305
	Limgol	Lim	305
	Lontrel 72 SG	H	222
	MCPA 750	H	223
	MCPA Super	H	224
	Meridian	Lim	305
	Mixin	H	186
	Nufarm MCPA 750	H	231
	Primme	H	237
	Primus	H	237
	Primus 250 WG	H	238
	Primus XL	H	239

1	3	4	5
	Pro	H	237
	Rodeo Plus	H	244
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Saracen	H	253
	Sitara	H	256
	Starane XL	H	256
	SuPrim	H	237
Ganības (zelmenī stiebrzāles)	Cleave	H	186
	Flurostar 180	H	198
	Flurostar Forte	H	199
	Tomahawk 200 EC	H	264
Graudi (dažādu kultūru)	Actellic 50 EC	I/A	270
	K-Obiol	I	282
	SilicoSec	I/A	298
Greipfrūti	Banarg	AR	40
Griķi	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Ouragan System 4	H	232, 233
Kaņepes	Ironmax Pro	Lim	303
	Pictor Active	F	119
	Serenade Aso	F	321
	T34 Biocontrol	F	326
	VextaDim 240 EC	H	267
Klementīni	Banarg	AR	40
Koksne (kokmateriāli)	Karate Zeon 5 CS	I	280
Kultūraugu sējumi un stādījumi	Dominator 480	H	193
	Glyphomax 480	H	209
Kultūraugu sējumi rugainē pirms sadīgšanas	Rodeo TF	H	259
	Taifun B	H	259, 261
Kvinoja	Serenade Aso	F	321
Lauksaimniecības kultūras	Ferramol	Lim	302
	Ferramol Limacide	Lim	302
	SLUXX^{HP}	Lim	306
	Detia Wühlmausgas	R	308
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Accurate 200 WG	H	164
	Banvel 4S	H	169
	Barbarian Super 360	H	170
	Kyleo	H	219
	Nuance 75 WG	H	230
	Tribenocare 75 WG	H	230
	Viking	H	230
	Zypar	H	268
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības / industriālās teritorijas	Barbarian Biograde 360	H	170
	Barbarian Hi-Aktiv	H	171
	Barbarian Super 360	H	170
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Clinic Up	H	170
	Credit Xtreme	H	190

1	3	4	5
	Dominator 480	H	193
	Gallup 360-K	H	208
	Gallup Super 360	H	170
	Glyphomax 480	H	209
	Halvetic	H	213
	Katoun Gold	H	216
	Krypt 540	H	217
	Monosate G	H	170
	Ouragan System 4	H	232, 233
	Rodeo TF	H	259
	Rosate 360 TF	H	170
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Taifun B	H	259, 261
Lazdas	Boom efekt 360 SL	H	177
	Rodeo Plus	H	244
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
Magones	Medax Top	AR	47
	Serenade Aso	F	321
Mandarīni	Banarg	AR	40
Mežmalas	Accurate 200 WG	H	164
	Nuance 75 WG	H	230
	Tribenocare 75 WG	H	230
	Viking	H	230
	Zypar	H	268
Mežrozītes	DiPel DF	I	311
Ozoli	Candit	F	82
	NeemAzal	I/A	290
	NeemAzal-T/S	I/A	289, 290
Papuves	Banvel 4S	H	169
	Barbarian Biograde 360	H	170
	Barbarian Hi-Aktiv	H	171
	Barbarian Super 360	H	170
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Clinic Up	H	170
	Credit Xtreme	H	190
	Dominator 480	H	193
	Fortune	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	205
	Gallup 360-K	H	208
	Gallup Super 360	H	170
	Glyphomax 480	H	209
	Krypt 540	H	217
	Kyleo	H	219
	Monosate G	H	170
	Ouragan System 4	F	232, 233
	Rodeo Plus	H	244
	Rodeo TF	H	259
	Rosate 360 TF	H	170
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Taifun B	H	259, 261

1	3	4	5
Pirms dekoratīvo augu sējas vai stādīšanas	Shyfo	H	254
Pirms kukurūzas un cukurbiešu sadīgšanas	Credit Xtreme	H	190
Pirms kultūraugu sējas vai stādīšanas	Credit Xtreme	H	190
	Shyfo	H	254
Platību sagatavošana kultūraugu audzēšanai	Emin dārzam Taifun B	H	261
	Ouragan System 4	H	232, 233
	Taifun B	H	259, 261
Platību sagatavošana zāliena ierīkošanai	Emin dārzam Taifun B	H	261
	Ouragan System 4	H	232, 233
	Taifun B	H	259, 261
Pļavas	Agroxone 75	H	167
	Ariane S	H	167
	EMDEE	H	167
	Estet 600 EC	H	196
	MCPA 750	H	223
	MCPA Super	H	224
	Nufarm MCPA 750	H	231
	Detia Wühlmausgas	R	308
Podi, konteineri	Nemasys H	Dz	345
	Nemasys L	Dz	346
Prosa	Granprotec	I	279
Sēnes (segtās platībās)	Carpo sistēma	Dz	333
	Steinernema sistēma	Dz	348
Sorgo	Granprotec	I	279
Tīrumu apstrāde pēc zālāju sēklu lauku novākšanas	Dominator 480	H	193
	Glyphomax 480	H	209
Tīrumi pēc ražas novākšanas	Barbarian Biograde 360	H	170
	Barbarian Hi-Aktiv	H	171
	Barbarian Super 360	H	170
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Clinic Up	H	170
	Credit Xtreme	H	190
	Dominator 480	H	193
	Gallup 360-K	H	208
	Gallup Super 360	H	170
	Glyphomax 480	H	209
	Halvetic	H	213
	Krypt 540	H	217
	Kyleo	H	219
	Monosate G	H	170
	Ouragan System 4	H	232, 233
	Rodeo Plus	H	244
	Rodeo TF	H	259
	Rosate 360 TF	H	170
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Shyfo	H	254
	Taifun B	H	259, 261
Tīrumi pirms graudaugu un kukurūzas sējas	Kyleo	H	219
Tīrumi pirms kultūrauga dīgšanas/pēc sējas	Dominator 480	H	193
	Glyphomax 480	H	209
Tīrumi pirms kultūrauga sējas vai stādīšanas	Beloukha	H	57, 175
	Boom efekt 360 SL	H	177
	Dominator 480	H	193
	Glyphomax 480	H	209
	Ouragan System 4	H	232, 233
	Rodeo Plus	H	244
	Rodeo TF	H	259
	Rosate Clean 360 SL	H	177
	Roundup Biactive SL	H	246
	Roundup Dynamic	H	247
	Roundup Gold ST	H	249
	Roundup PowerMax	H	251
	Taifun B	H	259, 261
Valrieksti	Madex Pro	I	316, 317
Vilkābeles	VitiSan	F	157, 159
Virsmas, tara, darbarīki, iekārtas	Menno Florades	Dez	58
Zemes zem elektrolīniju pārvadiem	Accurate 200 WG	H	164
	Nuance 75 WG	H	230
	Tribenocare 75 WG	H	230
	Viking	H	230
	Zypar	H	268
FUMIGĀCIJA			
Apaļie kokmateriāli (zāģbaļķi, finierkluči, papīrmalka, stabi, mieti, malka)	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
Auzas	AGROPHOS PELLETS 56 GE	I/A	296
	Balticphos pellets GE	I	296
	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
	Quickphos pellets 56 GE	I/A	296
	Quickphos tablets 56 GE	I/A	297
Dārza pupiņas	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
Graudi kuģu tilpnēs (kvieši, mieži, rudzi, auzas, tritikāle, kukurūza)	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
Griķi	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
Iesaiņojamie materiāli	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
Iesaiņoti pārtikas produkti	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294

1	3	4	5
Kafijas pupiņas	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
Kakao pupiņas	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
Kaltēti augi	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
Kaltētas sēnes	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
Kokvilna ķīpās un saiņos	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
Koksnes un kokmateriālu izstrādājumi	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
Kukurūza	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
Kūdra	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
Kvieši	AGROPHOS PELLETS 56 GE	I/A	296
	Balticphos pellets GE	I	296
	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
	Quickphos pellets 56 GE	I/A	296
	Quickphos tablets 56 GE	I/A	297
Linsēklas	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
Lupīna	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
Mieži	AGROPHOS PELLETS 56 GE	I/A	296
	Balticphos pellets GE	I	296
	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
	Quickphos pellets 56 GE	I/A	296
	Quickphos tablets 56 GE	I/A	297
Mulča (sasmalcināta koku miza, koksne)	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
Prosa	AGROPHOS PELLETS 56 GE	I/A	296
	Balticphos pellets GE	I	296
	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
	Quickphos pellets 56 GE	I/A	296
	Quickphos tablets 56 GE	I/A	297
Pupas	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
Rapsis	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
Rieksti	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
Rīsi	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
Rudzi	AGROPHOS PELLETS 56 GE	I/A	296
	Balticphos pellets GE	I	296
	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
	Quickphos pellets 56 GE	I/A	296
	Quickphos tablets 56 GE	I/A	297
Saulespuķu sēkla	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
Soja	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
Sorgo	AGROPHOS PELLETS 56 GE	I/A	296
	Balticphos pellets GE	I	296
	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
	Quickphos pellets 56 GE	I/A	296
	Quickphos tablets 56 GE	I/A	297
Starplikas	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
Šķelda	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
Tabaka (iesaiņota)	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
Tritikāle	AGROPHOS PELLETS 56 GE	I/A	296
	Balticphos pellets GE	I	296
	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
	Quickphos pellets 56 GE	I/A	296
	Quickphos tablets 56 GE	I/A	297
Tukšas noliktavu telpas	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
Zāģmateriāli	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
Zālaugu sēklas	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
Zirņi	AGROPHOS PELLETS 56 GE	I/A	296
	Balticphos pellets GE	I	296
	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
	Quickphos pellets 56 GE	I/A	296
	Quickphos tablets 56 GE	I/A	297
Žāvēti augļi	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294
Žāvēti dārzeņi	MAGTOXIN TABLET	I/A	283
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	294

LATVIJAS TĪRUMOS IZPLATĪTĀKĀS NEZĀLES

ĪSMŪŽA DIVDĪGĻLAPJU NEZĀLES
VIENGADĪGĀS UN EFEMĒRĀS

Aklis, asais	*Galeopsis tetrahit*
Aklis, platlapu	*Galeopsis ladanum*
Aklis, raibais	*Galeopsis speciosa*
Aklis, šķeltais	*Galeopsis bifida*
Amarants, liektais	*Amaranthus retroflexus*
Balanda, baltā	*Chenopodium album*
Balanda, daudzsēklu	*Chenopodium polyspermum*
Balodene, izplestā	*Atriplex patula*
Dievkrēsliņš, saules	*Euphorbia helioscopia*
Gaurs, tīruma	*Spergula arvensis*
Kumelīte, maura	*Matricaria discoidea*
Madara, ķeraiņu	*Galium aparine*
Madara, neīstā	*Galium spurium subsp. Vaillantii*
Matuzāle, ārstniecības	*Fumaria officinalis*
Mīkstpiene, dārza	*Sonchus oleraceus*
Naktene, melnā	*Solanum, nigrum*
Nātre, kodīgā	*Urtica urens*
Pavirza, tīruma	*Anagallis arvensis*
Pērkone, tīruma	*Raphanus raphanistrum*
Sīkgalvīte, īsstaru	*Galinsoga parviflora*
Sinepe (zvēre), tīruma	*Sinapis arvensis*
Sunītis, trejdaivu	*Bidens tripartita*
Sūrene, blusu	*Polygonum persicaria*
Sūrene, maura	*Polygonum aviculare*
Sūrene mazā	*Polygonum minus*
Sūrene, mezglainā	*Polygonum lapathifolium*
Vanagzirnis, četrsēklu	*Vicia tetrasperma*
Veronika, lauka	*Veronica agrestis*
Vējagriķis	*Fallopia convolvulus*
Virza, parastā	*Stellaria media*

ZIEMOTSPĒJĪGĀS

Aitene, tīruma	*Lycopsis arvensis*
Atraitnīte (vijolīte), tīruma	*Viola arvensis*
Atraitnīte (vijolīte), trejkrāsu	*Viola tricolor*
Dievkrēsliņš, saules	*Euphorbia helioscopia*
Grābeklīte, velnarutku	*Erodium cicutarium*
Ilzīte, lauku	*Anthemis arvensis*
Krustaine, parastā	*Senecio vulgaris*
Kumelīte, tīruma (nesmaržīgā)	*Matricaria inodora*
Magone, lauka	*Papaver dubium*
Naudulis, tīruma	*Thlaspi arvense*
Neaizmirstule, tīruma	*Myosotis arvensis*
Panātre, sārtā	*Lamium purpureum*
Panātre, skaujošā	*Lamium amplexicaule*
Pērkonene, parastā	*Erysimum cheiranthoides*
Plikstiņš, ganu	*Capsella bursa-pastoris*
Rudzupuķe, parastā	*Centaurea cyanus*
Salātene, parastā	*Lapsana communis*
Spulgotne, baltā	*Melandrium album*
Veronika, efejlapu	*Veronica hederifolia*
Veronika, persijas	*Veronica persica*
Veronika, tīruma	*Veronica arvensis*

Virza, parastā	*Stellaria media*
Vīķis, četrsēklu	*Vicia tetrasperma*
Vīķis, smilts	*Vicia villosa*
Vīķis, spilvainais	*Vicia hirsuta*
Vīķis, šaurlapu	*Vicia angustifolia*

DIVGADĪGĀS

Burkāns, savvaļas	*Daucus carota*

DAUDZGADĪGĀS DIVDĪGĻLAPJU NEZĀLES

Ceļteka, lielā	*Plantago major*
Ceļteka, šaurlapu	*Plantago lanceolata*
Cūkpiene, ārstniecības	*Taraxacum officinale*
Gārsa, parastā	*Aegopodium podagraria*
Gundega, kodīgā	*Ranunculus acris*
Gundega, ložņu	*Ranunculus repens*
Latvānis, Sosnovska	*Heracleum sosnowskyi*
Māllēpe, parastā	*Tussilago farfara*
Mētra, tīruma	*Mentha arvensis*
Mīkstpiene, tīruma	*Sonchus arvensis*
Nātre, lielā	*Urtica dioica*
Pelašķis, parastais	*Achillea millefolium*
Pīpene, parastā	*Leuchanthemum vulgare*
Retējs, maura	*Potentilla anserina*
Sārmene, purva	*Stachys palustris*
Skābene, blīvā	*Rumex confertus*
Skābene, cirtainā	*Rumex crispus*
Skābene, mazā	*Rumex acetosella*
Skābene, struplapu	*Rumex obtusifolius*
Tītenis, tīruma	*Convolvulus arvensis*
Usne, tīruma	*Cirsium arvense*
Vīķis, vanagu	*Vicia cracca*
Vēlpiene, rudens	*Leontodon autumnalis*
Vībotne, parastā	*Artemisis vulgaris*
Zvērene, lokaugļu	*Barbarea arcuata*

KOSU KLASES DAUDZGADĪGĀS NEZĀLES

Kosa, tīruma	*Equisetum arvense*

ĪSMŪŽA VIENDĪGĻLAPJU NEZĀLES

Airene, daudzziedu	*Lolium multiflorum*
Airene, linu	*Lolium remotum*
Airene, reibuma	*Lolium temulentum*
Gaiļsāre, parastā	*Echinochloa crus-galli*
Lāčauza, rudzu	*Bromus secalinus*
Lāčauza, mīkstā	*Bromus mollis*
Rudzusmilga, parastā	*Apera spica-venti*
Sarene, zaļā	*Setaria viridis*
Sarene, zilganā	*Setaria glauca*
Skarene, maura	*Poa annua*
Vējauza	*Avena fatua*

DAUDZGADĪGĀS VIENDĪGĻLAPJU NEZĀLES

Airene, daudzgadīgā	*Lolium perenne*
Skarene, parastā	*Poa trivialis*
Skarene, pļavas	*Poa pratensis*
Vārpata, ložņu	*Elytrigia repens*

Stājās spēkā: 13.01.1999.
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 388/399 (1449/1460), 30.12.1998., "Ziņotājs", 2, 28.01.1999.

Grozījumi:
- 11.03.2004. likums/LV, 47 (2995), 25.03.2004./Stājas spēkā 01.05.2004.
- 12.05.2005. likums/LV, 85 (3243), 31.05.2005./Stājas spēkā 14.06.2005.
- 02.11.2006. likums/LV, 183 (3551), 15.11.2006./Stājas spēkā 01.01.2007.
- 17.07.2008. likums/LV, 116 (3900), 30.07.2008./Stājas spēkā 01.07.2009.
- 09.10.2008. likums/LV, 164 (3948), 22.10.2008./Stājas spēkā 23.10.2008.
- 04.03.2010. likums/LV, 43 (4235), 17.03.2010./Stājas spēkā 31.03.2010.
- 13.10.2011. likums/LV, 173 (4571), 02.11.2011./Stājas spēkā 03.11.2011.
- 07.11.2019. likums/LV, 235, 21.11.2019. / Stājas spēkā 05.12.2019.
- 03.10.2024. likums/LV, 204, 18.10.2024./Stājas spēkā 01.11.2024.

AUGU AIZSARDZĪBAS LIKUMS

Redakcija: [**01.01.2025.**]

I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini
Likumā ir lietoti šādi termini:
1) **augi** — dzīvi augi un dzīvas augu daļas (dārzeņi, bumbuļi, bumbuļsīpoli, sīpoli, sakneņi, griezti ziedi, zari ar lapām, nozāģēti koki ar lapotni, lapas, lapotne, augu audu kultūras, ziedputekšņi, potzari, spraudeņi, dzinumi, sēklas), izņemot sēklas, kas nav paredzētas sēšanai;
2) **augu produkti:**
   a) neapstrādāti vai vienkārši sagatavoti (malti, žāvēti vai presēti) augu valsts izcelsmes produkti,
   b) augu daļas, ieskaitot augļus un sēklas, kas nav paredzētas sēšanai;
3) **augu aizsardzības līdzeklis** — produkts, kurā ir darbīgās vielas, aizsargvielas vai sinerģisti vai kurš sastāv no tām un kurš paredzēts kādam no šādiem lietojumiem:
   a) augu vai augu produktu aizsardzībai pret kaitīgiem organismiem vai šādu organismu ietekmes nepieļaušanai, ja vien līdzekļa galvenais mērķis ir augu vai augu produktu aizsardzība, nevis higiēnas nodrošināšana,
   b) augu dzīvības procesu ietekmēšanai, piemēram, ar vielām, kas ietekmē augšanu un nav barības vielas,
   c) augu produktu saglabāšanai (izņemot konservantus),
   d) nevēlamu augu vai augu daļu (izņemot aļģes) iznīcināšanai, ja vien līdzekli nelieto augsnē vai ūdenī augu aizsardzībai,
   e) nevēlamu augu (izņemot aļģes) augšanas apturēšanai vai novēršanai, ja vien līdzekli neizmanto augsnē vai ūdenī augu aizsardzībai;
4) **augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas** — jebkuras iekārtas, kas ir īpaši paredzētas augu aizsardzības līdzekļu lietošanai, kā arī šo iekārtu efektīvai darbībai vajadzīgie piederumi, piemēram, sprauslas, manometri, filtri, sieti, tvertņu tīrīšanas ierīces;
5) **augu aizsardzības konsultants** — persona, kura kā komercpakalpojumu sniedz konsultācijas par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un ir ieguvusi apliecību par tiesībām sniegt šādas konsultācijas;
6) **augu aizsardzības līdzekļu pārdevējs** — persona, kura augu aizsardzības līdzekļu izplatītāja uzdevumā tirdzniecības vietā pirms augu aizsardzības līdzekļu pārdošanas sniedz pircējam augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū regulējošos normatīvajos aktos minētajā kārtībā informāciju par augu aizsardzības līdzekli un ir ieguvusi augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecību;
7) **augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operators** — persona, kas veic darbības ar pirmās vai otrās klases augu aizsardzības līdzekļiem (piemēram, augu aizsardzības līdzekļus lieto, atšķaida, gatavo to maisījumus) un ir ieguvusi apliecību par tiesībām veikt šādas darbības;
8) **dzīvie organismi** — kukaiņi, ērces, nematodes, kas sagatavoti piegādei lietotājam gatavā veidā un paredzēti augu vai augu produktu aizsardzībai pret kaitīgiem organismiem vai šādu organismu ietekmes nepieļaušanai;
9) **integrētā augu aizsardzība** — visu pieejamo augu aizsardzības paņēmienu rūpīga izvērtēšana un tādu atbilstošu paņēmienu lietošana, kuri novērš kaitīgo organismu populāciju vairošanos, vienlaikus saglabājot augu aizsardzības līdzekļu un citu ietekmes formu lietošanu ekonomiski un ekoloģiski pamatotā līmenī, samazinot vai minimalizējot risku cilvēka veselībai un videi. Integrētā augu aizsardzība paredz veselīgu kultūraugu audzēšanu ar iespējami mazāku nelabvēlīgo ietekmi uz agroekosistēmām un veicina kaitīgo organismu ierobežošanas dabisku mehānismu izmantošanu;
10) **izsmidzināšana no gaisa** — augu aizsardzības līdzekļu lietošana, izmantojot lidaparātus;
11) *(izslēgts ar 03.10.2024. likumu)*;
12) **kaitīgie organismi** — dzīvnieku vai augu valsts izcelsmes kaitīgie organismi (vīrusi, mikoplazma vai citi patogēni), kas apdraud augus vai augu produktus;
13) **profesionālais augu aizsardzības līdzekļu lietotājs** — persona, kas savā profesionālajā darbībā lieto pirmās vai otrās klases augu aizsardzības līdzekļus vai izsmidzina augu aizsardzības līdzekļus no gaisa un ir ieguvusi apliecību par tiesībām lietot augu aizsardzības līdzekļus.

(13.10.2011. likuma redakcijāar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.11.2011. un 03.10.2024. likumu, kas stājas spēkā 01.11.2024.)

2.pants. Likuma mērķis
Šā likuma mērķis ir reglamentēt fizisko un juridisko personu darbību augu aizsardzības jomā, lai nepieļautu kaitīgo organismu ievešanu, ieviešanos un izplatīšanos valsts teritorijā un Eiropas Savienībā, kā arī panākt, lai augu aizsardzības pasākumi un augu aizsardzības līdzekļi neatstātu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību, to sugu dzīvniekiem, kurus cilvēks audzē vai izmanto uzturā, un

vidi, novērst augu aizsardzības līdzekļu atlieku uzkrāšanos saražotajā produkcijā, augsnē un ūdenī virs pieļautajām normām.
(11.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)
3.pants. Augu aizsardzība
(1) Augu aizsardzība ir tiesisko, tehnisko, organizatorisko un praktisko pasākumu kopums, kas veicams, lai izpētītu augiem kaitīgo un konkurējošo organismu bioloģiskos un ekoloģiskos faktorus, noteiktu un īstenotu šo organismu izplatības ierobežošanu un apkarošanu.
(2) Augu aizsardzību valstī pārzina Zemkopības ministrija.

II nodaļa
Valsts institūciju kompetence augu aizsardzības jomā

4.pants. Valsts augu aizsardzības dienests un tā uzdevumi
(1) Valsts uzraudzību augu aizsardzības jomā organizē un veic Valsts augu aizsardzības dienests, kas ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešā pārvaldes iestāde.
(2) Valsts augu aizsardzības dienestu vada direktors. Kontroles funkcijas augu aizsardzības jomā veic dienesta inspektori.
(3) Valsts augu aizsardzības dienesta uzdevums ir laikus konstatēt kaitīgo organismu parādīšanos, prognozēt to attīstību, noteikt augu karantīnas pasākumus konkrētos gadījumos un vietās, kā arī veicināt augu aizsardzības pasākumu veikšanu tādā apjomā, lai likvidētu vai ierobežotu kaitīgo organismu izplatīšanos un samazinātu to negatīvo ietekmi.
(4) Valsts augu aizsardzības dienests savu uzdevumu veikšanai:
   1) pilda kompetentās iestādes funkcijas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra regulas (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (turpmāk — regula Nr. 1107/2009), 3.panta 30.punktu;
   2) izveido un kārto to personu reģistru, kuras nodarbojas ar fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu audzēšanu, augu un augu produktu pārstrādi, uzglabāšanu, tirdzniecību, ievešanu un izvešanu;
   3) izsniedz fitosanitāros dokumentus, kas apliecina augu un augu produktu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ieskaitot fitosanitāros sertifikātus augu un augu produktu izvešanai un atpakaļizvešanai;
   4) veic valsts uzraudzību un kontroli pār augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, lietošanu, izvešanu, uzglabāšanu un transportēšanu;
   5) veic augu pārbaudes, sniedz informāciju zemes lietotājiem (īpašniekiem) par kaitīgo organismu parādīšanos un izplatību, kā arī veicamajiem augu aizsardzības pasākumiem;
   6) veic fitosanitāro kontroli un nosaka fitosanitāros pasākumus;
   7) izsniedz atļauju kaitīgo organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanai vai pārvietošanai zinātnes, izmēģinājumu vai šķirņu selekcijas vajadzībām;
   8) pilda references laboratorijas funkcijas augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamo organismu diagnostikā, laboratoriski diagnosticē augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamos organismus, apstiprina citas laboratorijas konstatētu augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamo organismu un pēc pieprasījuma sniedz laboratoriskus pakalpojumus;
   9) veic kaitīgo organismu riska analīzi;
   10) izsniedz sertifikātu par tiesībām veikt augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumus;
   11) ievieš, izpilda, uzrauga un kontrolē Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības un Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas lēmumus augu aizsardzības jomā;
   12) veic Eiropas Savienības invazīvo sugu sarakstā iekļauto invazīvo sauszemes augu sugu monitoringu un izveido un uztur šo sugu datubāzi;
   13) veic Ministru kabineta noteikto invazīvo augu sugu izplatības valsts uzraudzību un kontroli.;
   14) izsniedz speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai;
   15) sagatavo novērtējumu par augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanā no gaisa iespējamo risku un izsniedz atļauju augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanai no gaisa;
   16) uzrauga koksnes iepakojamā materiāla marķēšanu, sertificēšanu un apriti, kārto koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistru, pieņem lēmumu par personas iekļaušanu koksnes iepakojuma marķētāju reģistrā un izsniedz atļauju sertificēt koksnes iepakojamā materiāla termisko apstrādi;
   17) kārto un uztur kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmu.
(5) Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoriem, veicot uzraudzību un kontroli, ir šādas tiesības:
   1) pārbaudīt, vai tiek ievērotas normatīvo aktu prasības augu aizsardzības jomā;
   2) bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēt personas, kuras darbojas augu aizsardzības jomā, pieprasīt un saņemt dokumentus un informāciju, kā arī ņemt paraugus laboratoriskai izmeklēšanai.
(6) Valsts augu aizsardzības dienests apkopo un izplata tehnisko informāciju par kaitīgajiem organismiem, izstrādā ieteikumus par to izplatības ierobežošanas un apkarošanas pasākumiem, kā arī nodrošina informācijas apmaiņu starp valstīm augu aizsardzības jomā un informācijas sniegšanu Eiropas Komisijai, Eiropas Savienības dalībvalstīm un starptautiskajām organizācijām.
(7) Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības dalībvalstu eksperti kopā ar Valsts augu aizsardzības dienesta amatpersonām var veikt kontroli augu aizsardzības jomā Latvijā.
(8) Valsts augu aizsardzības dienesta lēmumus var apstrīdēt un pārsūdzēt administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
(9) Valsts augu aizsardzības dienesta lēmums par fitosanitārā pasākuma piemērošanu un augu aizsardzības līdzekļa izplatīšanas vai lietošanas apturēšanu vai aizliegšanu izpildāms nekavējoties. Dienesta direktors ir tiesīgs ar rakstveida lēmumu apturēt adresātam nelabvēlīga administratīvā akta darbību, ja saņemts personas iesniegums par administratīvā akta darbības apturēšanu. Administratīvā soda uzlikšana, kā arī pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšana šā likuma prasību pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma nodrošināt Valsts augu aizsardzības dienesta noteikto fitosanitāro pasākumu izpildi.
(10) Iesnieguma iesniegšana augstākai iestādei vai pieteikuma iesniegšana tiesai, lai apstrīdētu lēmumu par fitosanitārā pasākuma piemērošanu, neaptur šā lēmuma darbību.

(11) Ja rodas kaitīgo organismu izplatīšanās risks, Valsts augu aizsardzības dienesta direktors ir tiesīgs noteikt fitosanitāros pasākumus attiecībā uz augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušu priekšmetu ievešanu, audzēšanu vai pārvietošanu. Lēmumu par minētajiem fitosanitārajiem pasākumiem publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.03.2004., 02.11.2006., 04.03.2010., 13.10.2011., 07.11.2019. un 03.10.2024. likumu, kas stājas spēkā 01.11.2024.)

5.pants. Ministru kabineta kompetence

Ministru kabinets augu aizsardzības jomā izdod:

1) noteikumus par augu karantīnu, nosakot fitosanitārās kontroles un uzraudzības kārtību, augu audzētāju, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu pārstrādātāju, uzglabātāju, tirgotāju, ievedēju un izvedēju reģistrācijas kārtību, piemērojamos fitosanitāros pasākumus, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanas un izplatīšanas kārtību, fitosanitāro dokumentu izsniegšanas kārtību, aizsargājamo zonu noteikšanas un uzturēšanas kārtību, kā arī augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu aprites kārtību šajās zonās, kārtību, kādā sniedzama informācija Eiropas Komisijai, un robežkontroles punktu minimālo aprīkojumu fitosanitārās kontroles veikšanai;
2) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ievērojot regulu Nr. 1107/2009;
3) noteikumus par pavairojamo materiālu, nosakot tā atbilstības kritērijus un aprites kārtību;
4) *(izslēgts ar 13.10.2011. likumu)*;
5) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un glabāšanu, tajos reglamentējot augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un glabāšanas prasības, integrētās augu aizsardzības principus un prasības, profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru pienākumus un tiesības, kārtību, kādā sagatavojams novērtējums par augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanā no gaisa iespējamo risku, kādā izsniedzama atļauja augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanai no gaisa, speciālos ūdens vides un dzeramā ūdens aizsardzības pasākumus;
6) *(izslēgts ar 13.10.2011. likumu)*;
7) noteikumus par kārtību, kādā persona sedz izdevumus, kas saistīti ar augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju, fitosanitārajai kontrolei pakļauto personu reģistrāciju, fitosanitārajām pārbaudēm, laboratoriskajiem izmeklējumiem vai dokumentu izsniegšanu, fitosanitāro pasākumu piespiedu veikšanu un fitosanitārās robežkontroles veikšanu;
8) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu;
9) noteikumus par kārtību, kādā tiek izsniegts sertifikāts augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veikšanai;
10) noteikumus par kaitīgo organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo, izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām paredzēto priekšmetu ievešanu vai pārvietošanu;
11) noteikumus par dzīvo organismu reģistrācijas kārtību;
12) noteikumus par kārtību, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai un maksā valsts nodevu par to izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī par valsts nodevas apmēru;
13) noteikumus par atsevišķu karantīnas organismu apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtību;
14) noteikumus par fitosanitārajiem pasākumiem un to piemērošanas kārtību augu vai augu produktu aizsardzībā pret kaitīgajiem organismiem;
15) noteikumus par invazīvo augu sugas latvāņa (Heracleum sosnowskyi Manden) (turpmāk — latvānis) ierobežošanas pasākumiem, kā arī iznīcināšanas kārtību un metodēm, par kārtību, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par latvāņa izplatību zemes lietošanas mērķu grupās, informācijas saturu, kas ir brīvi pieejams sabiedrībai par sugas izplatību, kā arī par darba aizsardzības prasībām, veicot ierobežošanas pasākumus;
16) *(izslēgts ar 03.10.2024. likumu)*;
17) *(izslēgts ar 03.10.2024. likumu)*;
18) noteikumus par kārtību, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi, nosakot augu karantīnas un kaitīgos organismus, par kuru apkarošanu un izplatības ierobežošanu maksājama kompensācija, tās apmēru un izmaksas kārtību;
19) noteikumus par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem un šā materiāla aprites kārtību, nosakot tās personas atzīšanas kārtību, kura veic vīrustestēšanu un izsniedz atzinumu par to, vai pavairošanas materiāls ir vīrusbrīvs vai vīrustestēts;
20) noteikumus par kārtību, kādā Valsts augu aizsardzības dienests veic references laboratorijas funkcijas augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamo organismu diagnostikā, reglamentējot laboratorijas funkcijas un pienākumus, kārtību, kādā tā atzīst citu laboratoriju tiesības diagnosticēt augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamos organismus, un šo laboratoriju uzraudzības kārtību;
21) noteikumus par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību, reglamentējot kārtību, kādā izsniedzama atļauja apmācības veikšanai, prasības atļaujas saņemšanai, apmācības kārtību, mācību programmas saturu, pārbaudījumu un apliecības izsniegšanas kārtību;
22) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām, reglamentējot šo iekārtu pārbaudes veikšanas un sertifikātu izsniegšanas kārtību, prasības augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām, izņēmumus attiecībā uz pārbaudēm, citu Eiropas Savienības dalībvalstu izsniegto sertifikātu atzīšanas kārtību, pārbaudes termiņus;
23) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, reglamentējot prasības augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū, tirdzniecības vietām izvirzāmos kritērijus, augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības, ievešanas, izvešanas, glabāšanas un transportēšanas prasības, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu pienākumus, kārtību, kādā sniedzama informācija augu aizsardzības līdzekļa pircējam, un tās saturu, kā arī augu aizsardzības līdzekļu aprites kontroles kārtību;
24) noteikumus par fitosanitārajiem pasākumiem un kārtību, kādā tie piemērojami koksnes iepakojamā materiāla aizsardzībai, reglamentējot šo pasākumu veikšanas un koksnes iepakojamā materiāla marķēšanas kārtību, piemērojamos izņēmumus, kārtību, kādā veicama un anulējama reģistrācija koksnes iepakojuma marķētāju reģistrā, koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes sertifikācijas noteikumus un kārtību, kādā sertifikācijas institūcijai izsniedz un anulē atļauju veikt koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesa sertifikāciju, kā arī fitosanitāro pasākumu veikšanas, koksnes iepakojamā materiāla marķēšanas un sertificēšanas uzraudzības kārtību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.03.2004., 12.05.2005., 02.11.2006., 09.10.2008., 04.03.2010., 13.10.2011. un 03.10.2024. likumu, kas stājas spēkā 01.11.2024.)

6.pants. Zemkopības ministra kompetence

Zemkopības ministrs augu aizsardzības jomā apstiprina konkrētu Latvijā audzējamu kultūraugu audzēšanas vadlīnijas, ievērojot integrētās augu aizsardzības principus.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)

III nodaļa
Augu aizsardzības līdzekļi un pasākumi

7.pants. Augu aizsardzības līdzekļi

(1) Augu aizsardzības līdzekļus atļauts laist tirgū, lietot un uzglabāt saskaņā ar regulu Nr. 1107/2009. Augu aizsardzības līdzekļu reģistru kārto Valsts augu aizsardzības dienests.

(2) Iesniegumu augu aizsardzības līdzekļa iekļaušanai reģistrā iesniedz persona, kura ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa pirmreizēju izplatīšanu Latvijā, vai tās pilnvarota persona (turpmāk — reģistrācijas pieteicējs). Reģistrācijas pieteicējam ir juridiskā adrese Eiropas Savienības teritorijā. Par augu aizsardzības līdzekļa reģistrāciju un uzturēšanu augu aizsardzības līdzekļu reģistrā maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(3) Lēmumu par augu aizsardzības līdzekļa iekļaušanu reģistrā Valsts augu aizsardzības dienests pieņem viena gada laikā no dienas, kad reģistrācijas pieteicējs iesniedzis dokumentus, kas nodrošina augu aizsardzības līdzekļa novērtējuma sagatavošanu.

(4) Iekļaujot augu aizsardzības līdzekļus reģistrā, tiem nosaka trīs reģistrācijas klases.

(5) Uz pirmās un otrās klases augu aizsardzības līdzekļiem attiecas šādi ierobežojumi:
1) tos atļauts lietot profesionālam augu aizsardzības līdzekļu lietotājam, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoram vai augu aizsardzības konsultantam;
2) tos atļauts iegādāties profesionālam augu aizsardzības līdzekļu lietotājam vai augu aizsardzības konsultantam.

(6) Trešās klases augu aizsardzības līdzekļus drīkst iegādāties un lietot visas personas.

(7) Augu aizsardzības līdzekļa izplatītājs nodrošina, ka augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības vietā ir pārdevējs, kurš ieguvis augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecību.

(8) Profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību veic juridiskā persona, kura profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņēmusi Valsts augu aizsardzības dienesta atļauju.

(9) Profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apliecības izsniedz Valsts augu aizsardzības dienests.

(10) Valsts augu aizsardzības dienests jebkurai ieinteresētajai personai nodrošina iespēju saņemt informāciju par augu aizsardzības līdzekļu reģistru un tajā iekļauto līdzekļu lietošanu, vispārēju informāciju par augu aizsardzības līdzekļiem, ar to lietošanu saistītajiem riskiem, augu aizsardzības līdzekļu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, kā arī par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas alternatīvām, kas nav saistītas ar ķīmisku vielu lietošanu, un reizi gadā izdod reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sarakstu. Informāciju par augu aizsardzības līdzekļu reģistru Valsts augu aizsardzības dienests publicē savā mājaslapā internetā.

(11.03.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.11.2006. un 13.10.2011. likumu, kas stājas spēkā 03.11.2011. Piektās, sestās, astotās un devītās daļas jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2013. Sk. pārejas noteikumu 19.punktu)

8.pants. Augu aizsardzības līdzekļu laišana tirgū un lietošana

(1) Augu aizsardzības līdzekļus drīkst laist tirgū augu aizsardzības līdzekļu izplatītāji — komersanti, kas saņēmuši Valsts augu aizsardzības dienesta izdotu speciālo atļauju (licenci).

(2) Augu aizsardzības līdzekļus atļauts laist tirgū vai lietot, ja tie ir klasificēti, iepakoti un marķēti augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un iepakoti oriģinālā iepakojumā ar ražotāja marķējumu latviešu valodā.

(3) Nav atļauts laist tirgū vai lietot augu aizsardzības līdzekļus, kuru kvalitāte neatbilst reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļa sastāvam. Ja rodas šaubas vai aizdomas par augu aizsardzības līdzekļa kvalitāti, Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoram ir tiesības ņemt augu aizsardzības līdzekļa paraugus un nosūtīt tos kvalitātes kontrolei.

(4) Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori var aizliegt augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū vai lietošanu, ja konstatēts, ka tie ir nekvalitatīvi vai neatbilst šā likuma prasībām, bet, ja rodas šaubas par to kvalitāti, — apturēt šo līdzekļu laišanu tirgū vai lietošanu līdz galīgai kvalitātes noskaidrošanai. Šādā gadījumā lēmums pieņemams ne vēlāk kā 30 dienas pēc tam, kad apturēta augu aizsardzības līdzekļa laišana tirgū vai lietošana.

(5) Komersants, kas laiž tirgū augu aizsardzības līdzekli, nodrošina tā apriti un uzskaiti augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu, glabāšanu un lietošanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestam informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, norādot, kuri augu aizsardzības līdzekļi un kādā daudzumā realizēti lietotājiem.

(6) Augu aizsardzības līdzekli, kuram beidzies derīguma termiņš, atļauts laist tirgū, ja tā paraugs atbilst reģistrācijas nosacījumiem un ir attiecīgs Valsts augu aizsardzības dienesta lēmums. Paraugs tiek ņemts, piedaloties Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoram, kas 30 dienu laikā pēc analīžu saņemšanas no akreditētās laboratorijas lemj par turpmāko rīcību ar šādu līdzekli. Ar paraugu analīzēm saistītos izdevumus sedz augu aizsardzības līdzekļa izplatītājs.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011. Panta jaunā redakcija stājas spēkā 26.11.2011. Sk. pārejas noteikumu 18.punktu)

9.pants. Augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšana

(1) Komersanti, kas minēti šā likuma 8.panta pirmajā daļā, nodrošina:
   1) augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanu oriģinālā iepakojumā un to marķējumā norādītajos apstākļos, turklāt atsevišķi no citiem produktiem un vielām, kas var ietekmēt attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa īpašības;
   2) to augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanu atsevišķi, kuriem beidzies derīguma termiņš vai kuru kvalitāte neatbilst reģistrācijas nosacījumiem.
(2) Šā panta pirmajā daļā minētajām augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas vietām izvirzāmās tehniskās prasības nosaka Ministru kabinets.
(3) Personas, kuras iegādājušās augu aizsardzības līdzekļus, ir atbildīgas par to uzglabāšanu aizslēdzamās, bērniem un dzīvniekiem nepieejamās vietās, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.05.2005. likumu, kas stājas spēkā 14.06.2005.)

10.pants. Augu aizsardzības līdzekļu lietošana

(1) Persona augu aizsardzības līdzekļus lieto, ievērojot norādes marķējumā, Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas noteiktos labas augu aizsardzības prakses principus (publicēti Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā) un augu aizsardzības līdzekļu lietošanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktos integrētās augu aizsardzības principus un prasības visos tajos paredzētajos gadījumos.
(2) Pēc Valsts augu aizsardzības dienesta pieprasījuma persona sniedz informāciju par kaitīgo organismu parādīšanos, izplatību, īstenotajiem to apkarošanas pasākumiem un lietotajiem augu aizsardzības līdzekļiem.
(3) Augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšana no gaisa ir atļauta augu aizsardzības līdzekļu lietošanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
(4) Lietošanai nederīgos ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus likvidē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu. Ar šīm darbībām saistītās izmaksas sedz ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu īpašnieks.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011. Panta jaunā redakcija stājas spēkā 26.11.2011. Sk. pārejas noteikumu 18. un 21.punktu)

11.pants. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas

(1) Atļauts izmantot tikai pārbaudītas un lietošanas kārtībā esošas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas.
(2) Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi veic reizi trijos gados.
(3) Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi veic kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām. Jaunu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi veic pēc pieciem gadiem no to iegādes brīža.
(4) Valsts augu aizsardzības dienests uzrauga augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes un izmantošanu.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011. Grozījumi pirmajā, otrajā, trešajā (attiecībā uz jaunu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi) un ceturtajā daļā stājas spēkā 26.11.2016. Sk. pārejas noteikumu 22.punktu)

IV nodaļa
Augu karantīna un pasākumi

12.pants. Augu karantīna

(1) Augu karantīna jeb fitosanitārija ir valsts organizētu pasākumu kopums, kas veicams, lai nodrošinātu augu aizsardzību, neļaujot ievest un izplatīt augu karantīnas organismus un citus augiem sevišķi bīstamus organismus, kuri nav sastopami vai ir ierobežoti izplatīti un kuriem piemērojami fitosanitārie pasākumi.
(2) Valsts augu aizsardzības dienests veic fitosanitāro kontroli vai tā uzraudzībā tiek veikta šī kontrole, lai noskaidrotu augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu atbilstību fitosanitārajām normām, un, ja nepieciešams, nosaka fitosanitāros pasākumus, lai novērstu augu karantīnas organismu ievešanu, ieviešanos un izplatīšanos.
(3) Ja valsts teritorijā rodas kaitīgo organismu izplatīšanās risks, Valsts augu aizsardzības dienests var ierosināt zemkopības ministram noteikt fitosanitāros pasākumus augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanai, audzēšanai un pārvietošanai.
(4) Personai ir pienākums nekavējoties informēt Valsts augu aizsardzības dienestu par augu karantīnas organismu vai citu nepazīstamu organismu vai simptomu parādīšanos.
(5) Valsts augu aizsardzības dienests izstrādā ilgtermiņa programmu noteiktu kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai.
(6) Persona var saņemt kompensāciju par tai uzdoto fitosanitāro pasākumu izpildi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Kompensācija tiek maksāta no valsts budžeta.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.03.2004. un 09.10.2008. likumu, kas stājas spēkā 23.10.2008.)

13.pants. Personu reģistrācija

(1) Personas, kas nodarbojas ar fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu audzēšanu, augu un augu produktu pārstrādi, uzglabāšanu, ievešanu, tirdzniecību, eksportu un pārvietošanu valsts iekšienē, reģistrējas Valsts augu aizsardzības dienestā. Par iesnieguma izvērtēšanu personas reģistrācijai vai izmaiņu veikšanu fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
(2) Reģistrēto personu pienākums ir:
   1) glabāt ar augiem un augu produktiem saistīto dokumentāciju un pēc pieprasījuma uzrādīt to Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoriem;
   2) vizuāli pārbaudīt augus un augu produktus un par augu karantīnas organismu vai citu nepazīstamu organismu vai simptomu parādīšanos nekavējoties informēt Valsts augu aizsardzības dienestu;
   3) ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu apriti;
   4) nodrošināt iespēju Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoriem piekļūt īpašumam, kurā tiek audzēti vai glabāti augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, un kontrolēt fitosanitāro pasākumu izpildi;
   5) informēt Valsts augu aizsardzības dienestu par izmaiņām reģistrā iekļautajā informācijā;
   6) nodrošināt Valsts augu aizsardzības dienestam nepieciešamo rakstveida informāciju par augu un augu produktu audzēšanas, ražošanas un uzglabāšanas vietām.
(3) Valsts augu aizsardzības dienests ne retāk kā reizi gadā kontrolē, kā reģistrētās personas ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu apriti.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.03.2004. un 02.11.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

14.pants. Augu un augu produktu ievešana

(1) Eiropas Savienībā un valstī aizliegts ievest augu karantīnas organismus, kā arī augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, ja tie neatbilst fitosanitārajām normām, kā arī tad, ja nav attiecīgu dokumentu.
(2) Personas, kas nodarbojas ar fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanu, nodrošina apstākļus fitosanitārās kontroles veikšanai.
(3) Pāri muitas robežai ievedamo fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu muitošanu var pabeigt tikai pēc to fitosanitārās kontroles.
(4) Atsevišķos gadījumos Valsts augu aizsardzības dienests var pakļaut fitosanitārajai kontrolei arī citus augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, ja pastāv augsta augu karantīnas organismu ievešanas riska iespēja.
(5) Ja fitosanitārās kontroles rezultātā konstatēta augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu neatbilstība fitosanitārajām normām, attiecībā uz tiem veic vienu no šādiem pasākumiem:
   1) nosūta atpakaļ attiecīgajai valstij vai izņem no kravas inficētu vai invadētu produkciju, pārējo kravas daļu atļauj ievest, ja tiek nodrošināts, ka nepastāv kaitīgā organisma izplatīšanās draudi;
   2) iznīcina Valsts augu aizsardzības dienesta noteiktajā kārtībā;
   3) novieto muitas kontrolē līdz brīdim, kamēr ievedējs veic Valsts augu aizsardzības dienesta noteiktos fitosanitāros pasākumus.
(6) Šā panta piektajā daļā minēto pasākumu izpildi kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests. Šo pasākumu izmaksas sedz augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievedējs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
(7) Zemkopības ministra noteiktā ievestā pavairojamā materiāla fitosanitārā kontrole notiek tā uzglabāšanas vai audzēšanas vietās. Šādu pavairojamo materiālu atļauts izplatīt vai pārvietot tikai pēc tam, kad Valsts augu aizsardzības dienests pieņēmis lēmumu par tā atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

15.pants. Augu un augu produktu tranzīts

(1) Ja augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu krava tiek vesta tranzītā cauri valsts teritorijai, šo kravu nesadalot, nepārsaiņojot, neuzglabājot un nodrošinot, ka nerodas iespēja ar to inficēt valsts teritoriju vai tai valsts teritorijā inficēties ar augu karantīnas organismiem, attiecīgo kravu nepakļauj fitosanitārajai kontrolei.
(2) Fitosanitārā kontrole tiek veikta, ja pastāv pamatotas aizdomas, ka tranzītkrava ir inficēta ar augu karantīnas organismiem un ir iespējama to izplatīšanās, kā arī tad, ja netiek ievēroti šā panta pirmās daļas noteikumi.

16.pants. Augu un augu produktu izvešana (eksports) un atpakaļizvešana (reeksports)

(1) Izvedamiem un atpakaļizvedamiem augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušiem priekšmetiem jāatbilst saņēmējas valsts fitosanitārajiem noteikumiem.
(2) Personas, kas nodarbojas ar augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izvešanu un atpakaļizvešanu, vismaz 48 stundas pirms nosūtīšanai paredzētās kravas sagatavošanas informē Valsts augu aizsardzības dienestu par fitosanitārās kontroles nepieciešamību.
(3) Pēc fitosanitārās kontroles veikšanas Valsts augu aizsardzības dienests izsniedz fitosanitāro sertifikātu izvešanai vai fitosanitāro sertifikātu atpakaļizvešanai, ja augu, augu produktu vai ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu krava atbilst saņēmējas valsts vai tranzītvalsts fitosanitārajiem noteikumiem.
(4) Aizliegts izvest augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus bez fitosanitārajiem dokumentiem, ja to nepieciešamību paredz saņēmējas valsts fitosanitārie noteikumi.
(5) Ja importētājvalsts normatīvie akti paredz, ka koksnes iepakojamais materiāls marķējams saskaņā ar Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu Nr.15 "Vadlīnijas koksnes iepakojamā materiāla reglamentācijai starptautiskajā tirdzniecībā", fitosanitāros pasākumus veic un koksnes iepakojamo materiālu marķē koksnes iepakojuma marķētāju reģistrā iekļauta persona. Iepakojamā materiāla termisko apstrādi veic persona, kas ir sertificēta kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos par fitosanitārajiem pasākumiem koksnes iepakojamam materiālam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.11.2006. un 13.10.2011. likumu, kas stājas spēkā 03.11.2011.)

17.pants. Augu un augu produktu iekšzemes aprite

(1) Aizliegts izplatīt un pārvietot augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, kas inficēti ar augu karantīnas organismiem, kā arī augus un augu produktus, kuri neatbilst fitosanitārajām normām.
(2) Valsts augu aizsardzības dienests pārbauda augus un augu produktus, analizē kaitīgo organismu ieviešanās vai izplatīšanās risku un, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, sniedz ierosinājumu Eiropas Komisijai atzīt par aizsargājamo zonu visu Latvijas teritoriju vai tās daļu, kurā eksistencei piemērotos apstākļos nav ieviesušies un izplatījušies viens vai vairāki noteikti kaitīgie organismi, bet pastāv draudi, ka šiem organismiem labvēlīgos ekoloģiskos apstākļos tie var ieviesties un izplatīties.
(3) Valsts augu aizsardzības dienests veic augaugļu, dekoratīvo kultūru un dārzeņu pavairojamā materiāla sertifikācijas uzraudzību un izsniedz atbilstības dokumentus.
(3^1) Augļu koku pavairošanas materiāla vīrustestēšanu veic persona, kuru dienests atzinis Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
(4) Ja konstatēta augu karantīnas organismu klātbūtne, personas pēc Valsts augu aizsardzības dienesta inspektora norādījumiem veic attiecīgo augu un augu

produktu iznīcināšanu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu dezinsekciju vai dezinfekciju un ievēro augu un augu produktu apritei noteiktos ierobežojumus.

(5) Augu karantīnas organismu un augiem sevišķi bīstamu organismu uzglabāšanu un pavairošanu, kā arī darbības, kas saistītas ar šo organismu ģenētisko modifikāciju, drīkst veikt tikai fitosanitārās pētniecības vai diagnosticēšanas mērķiem pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Valsts augu aizsardzības dienestu.

(6) Kaitīgo organismu masveida izplatīšanās (epifitotijas) gadījumā augu aizsardzības pasākumus veic saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu.

(7) Lai izplatītu fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus Latvijā un Eiropas Savienībā, augiem un augu produktiem pievieno augu pasi, kas apliecina augu un augu produktu atbilstību fitosanitārajām prasībām.

(8) Kaitīgos organismus, augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus zinātnes, izmēģinājumu vai šķirņu selekcijas vajadzībām ieved vai pārvieto, ja saņemta Valsts augu aizsardzības dienesta atļauja.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.03.2004. un 09.10.2008. likumu, kas stājas spēkā 23.10.2008.)

18.pants. Kontrole un uzraudzība pār augu un augu produktu apriti

(1) Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu apriti uzrauga un kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests. Ievedamo augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu kontrolei uz valsts robežas Ministru kabinets var noteikt citu institūciju, kura ievēro Valsts augu aizsardzības dienesta norādījumus fitosanitārās kontroles veikšanā.

(2) Veicot augu un augu produktu aprites uzraudzību un kontroli, Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori:

1) pārbauda augus un augu produktus noliktavās, transportlīdzekļos un ražošanas telpās, kā arī zemes platības neatkarīgi no to apsaimniekošanas veida, īpašuma formas, gadalaika un citiem apstākļiem;
2) nemaksājot atlīdzību personām, ņem augu un augu produktu, audzēšanas substrātu, sēklu un pavairojamā materiāla paraugus analīzēm saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta direktora apstiprinātiem metodiskajiem norādījumiem;
3) uzdod personām veikt augu un augu produktu iznīcināšanu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu apstrādi ar atbilstošiem augu aizsardzības līdzekļiem un dezinfekciju, ja konstatēti augu karantīnas organismi un augi un augu produkti neatbilst fitosanitārajām prasībām, kā arī uzdod lietot noteiktas ierīces, paņēmienus vai pārvietot augus un augu produktus uz zonām, kur tie neradīs papildu apdraudējumu, vai pārvietot augus un augu produktus uz rūpnieciskās pārstrādes vietām, kā arī nosaka augu audzēšanas un novākšanas kārtību, kontrolē šo pasākumu izpildi;
4) aizliedz noteiktu sēklu sēšanu, augu stādīšanu un audzēšanu, ar kaitīgiem organismiem piesārņotu augšņu izmantošanu uz laiku vai pavisam, inficētu sēklu vai pavairojamā materiāla izmantošanu, inficētu augu vai augu produktu transportēšanu un realizāciju, kā arī normatīvajos aktos noteiktajām prasībām neatbilstošu ģenētiski modificēto organismu apriti;
5) aizliedz vai nosaka ierobežojumus augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanai, izvešanai un iekšzemes apritei, ja konstatēta neatbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
6) ja pārkāpti noteiktie fitosanitārie pasākumi un pastāv augu karantīnas organismu izplatības draudi, nepieciešamos fitosanitāros pasākumus veic piespiedu kārtā. Ar šiem pasākumiem saistītās izmaksas sedz pārkāpējs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

IV[1] nodaļa
Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošana un izplatības apzināšana

(Nodaļa izslēgta ar 03.10.2024. likumu, kas stājas spēkā 01.11.2024.)

18.[1] pants. Invazīvo augu sugas un to izplatības ierobežošana

(Izslēgts ar 03.10.2024. likumu, kas stājas spēkā 01.11.2024.)

18.[2] pants. Invazīvo augu sugu izplatības apzināšana un datu apkopošana

(Izslēgts ar 03.10.2024. likumu, kas stājas spēkā 01.11.2024.)

V nodaļa
Sadarbība augu aizsardzībā

19.pants. Sadarbība augu aizsardzībā

(1) Zinātniskās pētniecības institūcijas un citas personas, kas veic zinātniskos pētījumus, pēc saskaņošanas ar Valsts augu aizsardzības dienestu veic pētījumus par augu karantīnas organismiem, augiem sevišķi bīstamiem organismiem un fitosanitārajiem pasākumiem minēto organismu izplatīšanās ierobežošanai.

(2) Policija, valsts un pašvaldību institūcijas pēc Valsts augu aizsardzības dienesta pieprasījuma sniedz palīdzību normatīvajos aktos noteikto prasību izpildes nodrošināšanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.10.2008. likumu, kas stājas spēkā 23.10.2008.)

VI nodaļa
Administratīvie pārkāpumi augu aizsardzības jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

(Nodaļa 07.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.12.2019. Nodaļas jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 27. punktu)

20. pants. Augu aizsardzības līdzekļu laišanas tirgū prasību pārkāpšana

(1) Par augu aizsardzības līdzekļu laišanas tirgū prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no četrpadsmit līdz divtūkstoš naudas soda vienībām.

(2) Par nereģistrētu augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū piemēro naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no septiņdesmit līdz divtūkstoš naudas soda vienībām.

(07.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.12.2019. Panta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 27. punktu)

21. pants. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasību pārkāpšana

(1) Par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no četrpadsmit līdz divtūkstoš naudas soda vienībām.

(2) Par nereģistrētu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no septiņdesmit līdz divtūkstoš naudas soda vienībām.

(07.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.12.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 27. punktu)

22. pants. Augu karantīnas prasību pārkāpšana

(1) Par fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu audzēšanu, augu un augu produktu pārstrādi, uzglabāšanu, tirdzniecību un pārvietošanu, nereģistrējoties fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no trim līdz simt piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no sešdesmit līdz sešsimt naudas soda vienībām.

(2) Par fitosanitāro pasākumu neīstenošanu augu karantīnas organismu vai kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai un apkarošanai vai fitosanitāro prasību neievērošanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no sešdesmit līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(3) Par koksnes iepakojamā materiāla marķējuma lietošanas nosacījumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no astoņdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(4) Par fitosanitārajai kontrolei vai attiecīgai apstrādei pakļauto augu un augu produktu izvešanu no Latvijas bez fitosanitārās pārbaudes un apstrādes piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit līdz simt piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no sešdesmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(07.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.12.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 27. punktu)

23. pants. Tādu augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu, kuriem nepieciešama augu pase vai etiķete, izplatīšanas prasību pārkāpšana

(1) Par normatīvajos aktos par augu karantīnu noteikto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izplatīšanu ar nederīgu augu pasi vai etiķeti vai bez tās piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no trim līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no sešdesmit līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(2) Par augu pasu sagatavošanu bez atļaujas saņemšanas piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(07.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.12.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 27. punktu)

24. pants. Neziņošana, ja konstatēti augu karantīnas organismi, citi nepazīstami organismi vai to simptomi

Par neziņošanu, ja konstatēti augu karantīnas organismi, citi nepazīstami organismi vai to simptomi, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no septiņdesmit līdz sešsimt naudas soda vienībām.

(07.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.12.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 27. punktu)

25. pants. Invazīvo augu sugu izplatības pieļaušana

(Izslēgts ar 03.10.2024. likumu, kas stājas spēkā 01.11.2024.)

26. pants. Augu karantīnas organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu un augu aizsardzības līdzekļu, kā arī invazīvo augu ievešanas prasību pārkāpšana

(1) Par augu aizsardzības līdzekļu ievešanai Latvijā noteikto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no četrpadsmit līdz divtūkstoš naudas soda vienībām.

(2) Par augu karantīnas organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanu Latvijā, ja tie neatbilst fitosanitārajām prasībām vai ir ievesti bez dokumentiem vai ar neatbilstošiem dokumentiem, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no sešdesmit līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(3) Par invazīvo augu sugu sarakstā iekļauto augu sugu ievešanu Latvijā piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz trīssimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no sešdesmit līdz sešsimt naudas soda vienībām.

(07.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.12.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 27. punktu)

27. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

(1) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 20., 21., 22., 23. un 24. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts augu aizsardzības dienests.

(2) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 26. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Pārtikas un veterinārais dienests.

(3) *(Izslēgta ar 03.10.2024. likumu)*

(07.11.2019. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.10.2024. likumu, kas stājas spēkā 01.11.2024.)

Pārejas noteikumi

1. Valsts augu aizsardzības dienests ir Valsts augu aizsardzības stacijas tiesību un saistību pārņēmējs.
2. Līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai izsniegtās speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecībai ir spēkā līdz tajās noteiktā derīguma termiņa beigām.
3. Līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai reģistrētajiem augu aizsardzības līdzekļiem saglabājas noteiktais darbības termiņš un reģistrācijas nosacījumi.
4. *(Izslēgts ar 11.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)*
5. *(Izslēgts ar 11.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)*

6. Ministru kabinets izdod līdz:
   1) 2004.gada 1.maijam noteikumus par dzīvo organismu reģistrācijas kārtību;
   2) 2004.gada 1.maijam noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai;
   3) 2004.gada 1.maijam noteikumus par kārtību, kādā persona sedz izdevumus, kas saistīti ar augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju, fitosanitārajai kontrolei pakļauto personu reģistrāciju, fitosanitārajām pārbaudēm, laboratoriskajiem izmeklējumiem vai dokumentu izsniegšanu, fitosanitāro pasākumu piespiedu veikšanu un fitosanitārās robežkontroles veikšanu;
   4) 2004.gada 1.maijam noteikumus par ķīmisku augu aizsardzības līdzekļu un mikroorganismus un vīrusus saturošu augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtību;
   5) 2004.gada 1.maijam noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu, glabāšanu un lietošanu, nosakot tirdzniecības vietām izvirzāmos kritērijus, personu pienākumus un tiesības, augu aizsardzības līdzekļu ievešanas un izvešanas kārtību, kā arī augu aizsardzības līdzekļu un nereģistrētu augu aizsardzības līdzekļu aprites kārtību un kontroli;
   6) 2004.gada 1.maijam noteikumus par kaitīgo organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo, izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām paredzēto priekšmetu ievešanu vai pārvietošanu;
   7) 2004.gada 1.jūlijam noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu;
   8) 2004.gada 1.jūlijam noteikumus par kārtību, kādā tiek izsniegts sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumus.

(11.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

7. Līdz 2004.gada 1.maijam izsniegtās speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecībai ir spēkā līdz tajās noteiktā derīguma termiņa beigām.

(11.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

8. Līdz 2004.gada 1.maijam reģistrētajiem augu aizsardzības līdzekļiem saglabājas noteiktais reģistrācijas termiņš un reģistrācijas nosacījumi.

(11.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

9. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim izdod šā likuma 5.panta 15. un 16.punktā minētos noteikumus.

(02.11.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

10. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.maijam izdod šā likuma 5.panta 17.punktā minētos noteikumus.

(02.11.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

11. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.decembrim izdod šā likuma 5.panta 18. un 19.punktā minētos noteikumus.

(09.10.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.10.2008.)

12. Ministru kabinets līdz 2009.gada 30.decembrim izdod šā likuma 5.panta 20.punktā minētos noteikumus.

(09.10.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.10.2008.)

13. Šā likuma 5.panta 20.punkts stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

(09.10.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.10.2008.)

14. Šā likuma 12.panta sestajā daļā paredzētā kompensācija 2008.gadā tiek maksāta no Finanšu ministrijas budžeta apakš¬programmai "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirtajiem līdzekļiem.

(09.10.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.10.2008.)

15. Zemkopības ministrijas izdotās speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai ir spēkā līdz tajās noteiktā derīguma termiņa beigām.

(04.03.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.03.2010.)

16. Šā likuma 5.panta 12.punkts stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām".

(04.03.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.03.2010.)

17. Līdz šā likuma 5.panta 12.punktā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai ir piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.470 "Kārtība, kādā izsniedzamas speciālas atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(04.03.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.03.2010.)

18. Grozījumi šā likuma 1.panta 1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 11. un 12.punktā, 4.panta ceturtās daļas 1., 4. un 15.punktā, 5.panta 5.punktā, 7.panta pirmajā, ceturtajā, septītajā un desmitajā daļā, 8. un 10.pantā, kas paredz to izteikšanu jaunā redakcijā, stājas spēkā 2011.gada 26.novembrī.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)

19. Grozījumi šā likuma 1.panta 5., 6. un 13.punktā, 7.panta piektajā, sestajā, astotajā un devītajā daļā, kas paredz to izteikšanu jaunā redakcijā, stājas spēkā 2013. gada 1.janvārī.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)

20. Grozījumi šā likuma 1.panta 4.punktā un 11.panta trešajā daļā attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)

21. Šā likuma 10.panta pirmajā daļā minētie integrētās augu aizsardzības principi un prasības piemērojamas no 2014.gada 1.janvāra.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)

22. Grozījumi šā likuma 11.panta pirmajā, otrajā, trešajā (attiecībā uz jaunu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi) un ceturtajā daļā, kas paredz to izteikšanu jaunā redakcijā, stājas spēkā 2016.gada 26.novembrī.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)

23. Līdz 2016.gada 26.novembrim augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas pārbaudāmas vismaz vienu reizi.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)

24. Līdz 2020.gada 1.janvārim augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu starplaiks nepārsniedz piecus gadus.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)

25. Ministru kabinets līdz 2011.gada 31.decembrim izdod šā likuma 5.panta 2.punktā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 31.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumi Nr.156 "Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra regulu Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)

26. Ministru kabinets līdz 2011.gada 26.novembrim izdod šā likuma 5.panta 5., 21., 22., 23. un 24.punktā minētos noteikumus. Integrētās augu aizsardzības principus un prasības Ministru kabinets izdod līdz 2014.gada 1.janvārim.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)

27. Grozījums šā likuma 4. panta devītajā daļā par tās papildināšanu ar teikumu un šā likuma VI nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

(07.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.12.2019.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Komisijas 1992.gada 30.jūlija direktīvas 92/70/EEK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz apsekojumiem, kas jāveic Kopienas aizsargājamo zonu atzīšanas nolūkā;
2) Komisijas 1992.gada 3.novembra direktīvas 92/90/EEK, ar ko nosaka augu, augu produktu vai citu objektu ražotāju un ievedēju pienākumus un ar ko nosaka informāciju, kura vajadzīga, lai tos reģistrētu;
3) Komisijas 1995.gada 26.jūlija direktīvas 95/44/EK, ar ko ievieš nosacījumus, kurus ievērojot dažus kaitīgos organismus, augus, augu produktus un citus Padomes direktīvas 77/93/EEK I līdz V pielikumā uzskaitītos objektus drīkst ievest vai pārvietot Kopienā vai dažās tās aizsargātās zonās izmēģinājumu vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām;
4) Padomes 1999.gada 31.maija direktīvas 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;
5) Padomes 2000.gada 8.maija direktīvas 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā;
6) Komisijas 2008.gada 17.jūnija direktīvas 2008/61/EK, ar ko ievieš nosacījumus, kurus ievērojot dažus kaitīgus organismus, augus, augu produktus un citus Padomes direktīvas 2000/29/EK I līdz V pielikumā uzskaitītos objektus drīkst ievest vai pārvietot Kopienā vai dažās tās aizsargātās zonās izmēģinājumu vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām (kodificētā versija);
7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra direktīvas 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai (Dokuments attiecas uz EEZ);
8) Padomes 2009.gada 26.novembra direktīvas 2009/143/EK, ar ko groza direktīvu 2000/29/EK attiecībā uz laboratorisko pārbaužu uzdevumu deleģēšanu.

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 17.decembrī.

Valsts prezidents **G.Ulmanis**

Rīgā 1998.gada 30.decembrī

Stājās spēkā: 24.12.2011.
Publicēts: „Latvijas Vēstnesis", 202 (4600), 23.12.2011.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 949
Rīgā 2011. gada 13. decembrī (prot. Nr.74 18.§)

Grozījumi:
• Ministru kabineta 04.10.2016. noteikumi Nr. 652/LV, 194 (5766), 06.10.2016./Stājas spēkā 07.10.2016.

NOTEIKUMI PAR AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LAIŠANU TIRGŪ

Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 23.punktu un 9.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:
   1.1. prasības augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū, tirdzniecības vietām izvirzāmos kritērijus, augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības, ievešanas, izvešanas, glabāšanas un transportēšanas prasības, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu pienākumus, informācijas sniegšanas kārtību augu aizsardzības līdzekļa pircējam un tās saturu, kā arī augu aizsardzības līdzekļu aprites kontroles kārtību;
   1.2. augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas vietām (turpmāk – uzglabāšanas vieta) izvirzāmās prasības.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

1.[1] Atļaujas sniegšanas pamatojumu augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK. Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtību Latvijā reglamentē saskaņā ar minēto regulu izdotie normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

2. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – dienests).

II. Augu aizsardzības līdzekļu laišana tirgū

3. Augu aizsardzības līdzekļu ievešanu no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk – trešā valsts), kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests robežkontroles punktā vai muitas noliktavā (atkarībā no muitošanas vietas). Muitas procedūru noformē pēc šajā punktā noteiktās kontroles.
4. Licences īpašnieks septiņu darbdienu laikā pēc augu aizsardzības līdzekļa ievešanas Latvijā par to informē dienestu, iesniedzot dienestā augu aizsardzības līdzekļa ražotāja izsniegtu augu aizsardzības līdzekļa kvalitāti apliecinošu dokumentu.
5. Augu aizsardzības līdzekli nosūta atpakaļ uz trešo valsti, no kuras tas Latvijā ievests, ja:
   5.1. augu aizsardzības līdzeklis nav reģistrēts Latvijā;
   5.2. augu aizsardzības līdzeklim beidzies derīguma termiņš;
   5.3. augu aizsardzības līdzeklis nav klasificēts, marķēts vai iepakots atbilstoši normatīvajiem aktiem par augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu;
   5.4. augu aizsardzības līdzeklis nav iepakots oriģinālā iepakojumā vai tam nav ražotāja marķējuma latviešu valodā.
6. Latvijā nereģistrētu augu aizsardzības līdzekli, ko paredzēts pārvest uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, nosūta atpakaļ uz Eiropas Savienības dalībvalsti vai trešo valsti, no kuras tas ievests, ja augu aizsardzības līdzeklis:
   6.1. nav reģistrēts Eiropas Savienības dalībvalstī, uz kuru to paredzēts pārvest;
   6.2. nav klasificēts, iepakots vai marķēts saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunkta prasībām.
7. Latvijā atļauts ievest, ražot, uzglabāt vai transportēt nereģistrētu augu aizsardzības līdzekli, ja tas paredzēts lietošanai:
   7.1. kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm un ir reģistrēts Eiropas Savienības dalībvalstī, uz kuru to paredzēts pārvest;
   7.2. kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm un ir klasificēts, marķēts un iepakots atbilstoši normatīvajiem aktiem par augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, izņemot prasību par marķējumu valsts valodā;
   7.3. trešajā valstī un licences īpašnieks piecu darbdienu laikā pēc augu aizsardzības līdzekļa izvešanas informē dienestu par katru no Latvijas izvesto augu aizsardzības līdzekļu partiju.
8. Nereģistrētus augu aizsardzības līdzekļus līdz to pārvietošanai uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai līdz izvešanai uz trešo valsti uzglabā noliktavā, kuras īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir saņēmis speciālu atļauju (licenci) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

9. Licences īpašnieks 10 darbdienas pirms tāda nereģistrēta augu aizsardzības līdzekļa ievešanas uzglabāšanas vietā, kurš paredzēts pārvietošanai uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, rakstiski iesniedz dienestā informāciju, norādot:
   9.1. Eiropas Savienības dalībvalsti, no kuras augu aizsardzības līdzekli ieved, tās juridiskās personas nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru, kura nosūta augu aizsardzības līdzekli;
   9.2. Eiropas Savienības dalībvalsti, uz kuru paredzēts pārvest augu aizsardzības līdzekli, tās juridiskās personas nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru, kura saņem augu aizsardzības līdzekli;
   9.3. partijas numuru, augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu, daudzumu, iepakojuma lielumu.
10. Par pārvietošanai paredzēto nereģistrēto augu aizsardzības līdzekli licences īpašnieka rīcībā ir šādi dokumenti:
   10.1. augu aizsardzības līdzekļa kvalitāti apliecinošs dokuments;
   10.2. dokuments, kas apliecina augu aizsardzības līdzekļa reģistrāciju attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī;
   10.3. dokuments, kurā ir šāda informācija:
      10.3.1. Eiropas Savienības dalībvalsts, no kuras augu aizsardzības līdzekli ieved, un tās juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, kura saņem augu aizsardzības līdzekli;
      10.3.2. Eiropas Savienības dalībvalsts, uz kuru paredzēts pārvest augu aizsardzības līdzekli, un tās juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, kura saņem augu aizsardzības līdzekli;
      10.3.3. partijas numurs, augu aizsardzības līdzekļa nosaukums, daudzums, iepakojuma lielums.
11. Persona, kas atbild par nereģistrēta augu aizsardzības līdzekļa pārvietošanu uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, nodrošina:
   11.1. augu aizsardzības līdzekļa kvalitāti apliecinoša dokumenta kopiju katrai partijai;
   11.2. dokumentu, kas apliecina šī augu aizsardzības līdzekļa reģistrāciju attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī, uz kuru to paredzēts pārvest.
12. Licences īpašnieks:
   12.1. nodrošina, lai katrai jebkura augu aizsardzības līdzekļa partijai būtu kvalitāti apliecinošs dokuments, ja viņš ir attiecīgās augu aizsardzības līdzekļa partijas ievedējs;
   12.2. nodrošina katram augu aizsardzības līdzeklim drošības datu lapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā aizpildāmas un nosūtāmas ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapas;
   12.3. nodrošina iespēju dienesta inspektoram iepazīties ar šo noteikumu 29. un 31.punktā minētajiem uzskaites datiem, kā arī kontrolēt tirdzniecības vai uzglabāšanas vietas;
   12.4. glabā augu aizsardzības līdzekļa kvalitāti apliecinošus dokumentus un šo noteikumu 29. un 31.punktā minēto informāciju vismaz piecus gadus;
   12.5. nodrošina, lai tirdzniecības vietā ir darbinieks, kurš saņēmis augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja vai otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību, vai augu aizsardzības konsultanta apliecību un kurš, pārdodot augu aizsardzības līdzekli, var konsultēt pircēju saskaņā ar šo noteikumu V nodaļas prasībām;
   12.6. pirms ievestā augu aizsardzības līdzekļa tālākas izplatīšanas pārbauda, vai augu aizsardzības līdzekļa marķējumā nav šo noteikumu 15.punktā minēto būtisko neatbilstību;
   12.7. 24 stundu laikā pēc tam, kad konstatēta neatbilstība augu aizsardzības līdzekļa marķējuma informācijā (turpmāk – neatbilstošs marķējums), par neatbilstošo marķējumu informē dienestu un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas apliecības īpašnieka pārstāvi un iesniedz dienestā iesniegumu par iespējamo neatbilstības novēršanas veidu. Dienests izvērtē iesniegumu un 15 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu saskaņā ar šo noteikumu 17.punktu.
   12.8. nodrošina, ka tirdzniecības vietā ir dienesta lēmums (kopija), kurā paredzētas izmaiņas reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas vai izplatīšanas nosacījumos, kā arī nodrošina minētā lēmuma kopijas izsniegšanu personai, kas pērk šo augu aizsardzības līdzekli, ja tas paredzēts dienesta lēmumā.

(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 652)

13. Persona, kas ieved augu aizsardzības līdzekli, pēc licences īpašnieka pieprasījuma nekavējoties tam nodod augu aizsardzības līdzekļa kvalitāti apliecinošā dokumenta kopiju.
14. Licences īpašniekam aizliegts:
   14.1. izplatīt augu aizsardzības līdzekli personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem;
   14.2. izplatīt pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus personām, kurām nav speciālas atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai vai apliecības par tiesībām konsultēt par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, vai apliecības par tiesībām lietot augu aizsardzības līdzekļus;
   14.3. izplatīt augu aizsardzības līdzekli, kura iepakojums ir bojāts (izņemot šo noteikumu 70.punktā minēto gadījumu) vai bez marķējuma, kā arī tad, ja marķējums ir nesalasāms, bojāts, neatbilstošs vai labots (daļēji dzēsts, papildināts), ja nav saņemts šo noteikumu 17.punktā minētais dienesta lēmums;
   14.4. pārbērt vai pārliet augu aizsardzības līdzekļus citā iepakojumā;
   14.5. izplatīt augu aizsardzības līdzekli, kam beidzies derīguma termiņš, ja vien dienests nav pieņēmis lēmumu par atļaujas izsniegšanu šāda augu aizsardzības līdzekļa izplatīšanai.
15. Marķējumu par būtiski neatbilstošu uzskata, ja:
   15.1. marķējuma teksts nav latviešu valodā;
   15.2. norādītās darbīgās vielas nav reģistrētas Latvijas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā;
   15.3. norādīts Latvijā nereģistrēts augu aizsardzības līdzekļa lietojums.
16. Licences īpašnieks, kas Latvijā ievedis augu aizsardzības līdzekļa partiju, kam ir šo noteikumu 15. punktā minētais būtiski neatbilstošais marķējums, atsauc partiju no izplatīšanas šo noteikumu 20. punktā minētajā kārtībā, kā arī divu mēnešu laikā pēc neatbilstošā marķējuma konstatēšanas dienas to izved no Latvijas vai nodod apsaimniekošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu un iesniedz dienestā apliecinājumu par augu aizsardzības līdzekļa partijas izvešanu no Latvijas vai nodošanu apsaimniekošanai saskaņā ar minētajiem normatīvajiem aktiem.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

17. Augu aizsardzības līdzekļa partiju, kurai konstatēts neatbilstošs marķējums, atļauts izplatīt ar labotu marķējumu, ja neatbilstība saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu nav būtiska un dienests ir pieņēmis lēmumu par atļauju labot augu aizsardzības līdzekļa marķējumu (turpmāk – dienesta lēmums).
18. Licences īpašnieks dienesta lēmuma kopiju glabā katrā augu aizsardzības līdzekļa tirdzniecības vietā un nodrošina augu aizsardzības līdzekļa marķējuma izlabošanu septiņu darbdienu laikā pēc dienesta lēmuma saņemšanas.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

19. Augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas apliecības īpašnieka pārstāvja pienākums ir nekavējoties informēt citus licences īpašniekus, kas Latvijā ieveduši attiecīgo augu aizsardzības līdzekļa partiju ar neatbilstošu marķējumu.
20. Lai atsauktu no izplatīšanas augu aizsardzības līdzekļa partiju ar neatbilstošu marķējumu vai partiju, kuras izplatīšanu dienests ir aizliedzis, licences īpašnieks nosūta paziņojumu citiem licences īpašniekiem, kam konkrētā augu aizsardzības līdzekļa partija ir izplatīta. Paziņojumā norāda:
   20.1. augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu, reģistrācijas numuru Latvijas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā, iepakojuma lielumu, partijas numuru;
   20.2. izplatīšanas aizlieguma iemeslu;
   20.3. tirdzniecības vai uzglabāšanas vietu, kurā augu aizsardzības līdzeklis atdodams, tās darba laiku un atbildīgā darbinieka tālruņa numuru.

(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 652)

21. Lai dienesta inspektors varētu piedalīties tāda augu aizsardzības līdzekļa parauga noņemšanā, kuram beidzies derīguma termiņš, licences īpašnieks vismaz piecas darbdienas pirms parauga noņemšanas iesniedz dienestā attiecīgu iesniegumu (pielikums).
22. Licences īpašnieks šo noteikumu 14.5.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanai iesniedz dienestā iesniegumu, kam pievienoti akreditētas laboratorijas augu aizsardzības līdzekļa parauga analīzu rezultāti.
23. Dienests, pamatojoties uz šo noteikumu 22.punktā minētajiem dokumentiem, pieņem lēmumu par izplatīšanas termiņa pagarināšanu augu aizsardzības līdzeklim, kam beidzies derīguma termiņš, uz vienu gadu no dienas, kad parakstīti augu aizsardzības līdzekļa paraugu analīzu rezultāti, ja saskaņā ar tiem augu aizsardzības līdzekļa sastāvs joprojām atbilst reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļa sastāvam.
24. Ja saskaņā ar augu aizsardzības līdzekļa paraugu analīzu rezultātiem augu aizsardzības līdzekļa sastāvs neatbilst reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļa sastāvam, dienests atsaka atļaujas izsniegšanu augu aizsardzības līdzekļa izplatīšanai, kuram beidzies derīguma termiņš.
25. Augu aizsardzības līdzekļus aizliegts izplatīt:
    25.1. izmantojot tirdzniecības automātus vai pašapkalpošanās sistēmas;
    25.2. izstādēs un citos publiskos pasākumos, ielu tirdzniecības vietās un tirgos.
26. Augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības vietā ir aizliegta pārtikas, lopbarības un zāļu tirdzniecība, ja vien augu aizsardzības līdzekļi nav izvietoti atsevišķā telpā.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

27. Tirdzniecībai paredzētos augu aizsardzības līdzekļus izvieto slēgtā skapī vai plauktā atsevišķi no citām precēm. Šī prasība neattiecas uz šādiem trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem:
    27.1. augu un dzīvnieku valsts izcelsmes augu aizsardzības līdzekļiem;
    27.2. mikrobioloģiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem.
28. Gaistošus augu aizsardzības līdzekļus atļauts izvietot tikai vēdināmās telpās.
29. Licences īpašnieks reģistrācijas žurnālā uzskaita:
    29.1. saņemtos augu aizsardzības līdzekļus, kā arī augu aizsardzības līdzekļus, kuri ir bojāti vai kuriem beidzies derīguma termiņš, norādot:
        29.1.1. saņemšanas datumu, augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu, iepakojuma lielumu un daudzumu – iegādātajiem augu aizsardzības līdzekļiem;
        29.1.2. nosaukumu, daudzumu, iepakojuma lielumu, no noliktavas izsniegto daudzumu un atlikumu – augu aizsardzības līdzekļiem, kas atrodas noliktavā;
        29.1.3. nosaukumu, daudzumu, iepakojuma lielumu, derīguma termiņa beigu datumu, parauga ņemšanas datumu, datumu, kad pieņemts lēmums par atļauju izplatīt augu aizsardzības līdzekli, kam beidzies derīguma termiņš, – augu aizsardzības līdzekļiem, kam beidzies derīguma termiņš;
        29.1.4. nosaukumu, iepakojuma lielumu, daudzumu un bojājuma raksturu – augu aizsardzības līdzekļiem, kam bojāts iepakojums;
    29.2. nereģistrētos augu aizsardzības līdzekļus, kas saņemti un izvesti no noliktavas, norādot:
        29.2.1. saņemšanas datumu, nosaukumu, daudzumu, iepakojuma lielumu, partijas numuru – iegādātajiem augu aizsardzības līdzekļiem;
        29.2.2. nosaukumu, daudzumu, iepakojuma lielumu, partijas numuru – augu aizsardzības līdzekļiem, kas tiek glabāti noliktavā;
        29.2.3. izvešanas datumu, nosaukumu, daudzumu, iepakojuma lielumu, partijas numuru – izvestajiem augu aizsardzības līdzekļiem.
30. Šo noteikumu 29.punktā minēto uzskaiti var veikt elektroniski.
31. Personām izplatītos pirmās vai otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus licences īpašnieks reģistrē šo noteikumu 29.punktā minētajā reģistrācijas žurnālā, atzīmējot pircēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, apliecības numuru par tiesībām lietot augu aizsardzības līdzekli vai konsultēt par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu vai speciālās atļaujas (licences) numuru augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai, pārdotā augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu un daudzumu.
32. Persona, kas iegādājusies augu aizsardzības līdzekli, reģistrācijas žurnālā ar parakstu apliecina šo noteikumu 31.punktā minētās ziņas.
32.[1] Licences īpašnieks katru gadu līdz 1. aprīlim, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu, elektroniski iesniedz dienestam informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem realizētajiem augu aizsardzības līdzekļiem un to realizācijas apjomu.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2017., sk. 75. punktu)

III. Augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšana

33. Augu aizsardzības līdzekļus uzglabā speciāli iekārtotā uzglabāšanas vietā, ievērojot augu aizsardzības līdzekļa ražotāja noteiktos uzglabāšanas apstākļus un temperatūras režīmu.

(MK 0410.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

33.[1] Augu aizsardzības līdzekļus glabā atsevišķi atbilstoši to lietošanas kategorijai.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

34. Ja vairākiem licences īpašniekiem speciālajā atļaujā (licencē) ir norādīta viena tirdzniecības vietas adrese, uzglabāšanas vietu iekārto tā, lai varētu identificēt augu aizsardzības līdzekļu izplatītāju un tam piederošos augu aizsardzības līdzekļus.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

35. Par augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas vietām aizliegts izmantot degvielas noliktavas, dzīvojamās vai administratīvās telpas, dzīvnieku novietnes, būves, kurām pastāv acīmredzams applūšanas risks, un pagrabus, izņemot tos, kas ir būvēti virs zemes.
36. Lai garantētu darba drošību, darbības ar pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem uzglabāšanas vietā vienlaikus veic vismaz divas personas.
37. Uzglabāšanas vietā nedrīkst atrasties nepiederošas personas.
38. Uzglabāšanas vietā aizliegts glabāt pārtikas produktus, lopbarību un medikamentus.
39. Pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus uzglabā slēgtā vēdināmā telpā atsevišķi no pārējiem augu aizsardzības līdzekļiem.
40. Ja uzglabāšanas vietā kopā ar augu aizsardzības līdzekļiem tiek glabātas citas preces, augu aizsardzības līdzekļus norobežo no pārējām precēm vai izvieto tos skapjos, nodrošinot ventilāciju. Šī prasība neattiecas uz šādiem trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem:
    40.1. augu un dzīvnieku valsts izcelsmes augu aizsardzības līdzekļiem;
    40.2. mikrobioloģiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem.

41. Augu aizsardzības līdzekli novieto plauktos (statīvos) vai uz paliktņiem tā, lai starp plauktu vai paliktņu rindām būtu vismaz vienu metru plata eja.
42. Ja augu aizsardzības līdzekļus:
    42.1. novieto plauktā (ar vai bez paliktņiem), krāvuma augstums vienā plauktā nedrīkst pārsniegt 2,5 metrus;
    42.2. novieto ar paliktņiem uz grīdas, krāvuma augstums uz viena paliktņa nedrīkst pārsniegt 1,6 metrus;
    42.3. novieto ar paliktņiem citu uz cita, kopējais krāvuma augstums nedrīkst pārsniegt 2,6 metrus.
43. Uzglabāšanas vietu iekārto atbilstoši šādām tehniskajām prasībām:
    43.1. ieklāj grīdu no ūdensnecaurlaidīga materiāla vai betona;
    43.2. ierīko ventilāciju ar atbilstošu gaisa cirkulāciju;
    43.3. ierīko ūdensvadu vai speciālu ierīci roku mazgāšanai.
44. *(Svītrots ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 652)*
45. Uzglabāšanas vietā izvieto labi redzamus uzrakstus uz balta pamata ar vismaz 10 centimetru lieliem burtiem tumši sarkanā krāsā "UZMANĪBU, PESTICĪDI" un "NESMĒĶĒT, NEĒST, NEDZERT".
46. Nereģistrētu augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas vietā papildus šo noteikumu 45.punktā minētajiem uzrakstiem izvieto labi redzamus uzrakstus uz balta pamata ar vismaz 10 centimetru lieliem burtiem tumši sarkanā krāsā "NEREĢISTRĒTI AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI".
47. Augu aizsardzības līdzekļus, kuriem beidzies derīguma termiņš vai kuru kvalitāte neatbilst reģistrācijas nosacījumiem, vai kuru marķējums neatbilst augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtību regulējošo normatīvo aktu prasībām, vai kuriem bojāts iepakojums, uzglabā atsevišķi. Šo līdzekļu uzglabāšanas vietā izvieto uzrakstu uz balta pamata ar vismaz 10 centimetru lieliem burtiem tumši sarkanā krāsā "PĀRDOT AIZLIEGTS". Augu aizsardzības līdzekļus, kuru iepakojums ir bojāts, likvidē atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.
48. Uzglabāšanas vietā nodrošina:
    48.1. individuālos aizsardzības līdzekļus (piemēram, respiratoru, aizsargbrilles, aizsargapģērbu, cimdus);
    48.2. absorbējošu materiālu (piemēram, sausas zāģu skaidas vai kūdru);
    48.3. atsevišķu inventāru (slotu, spaini, liekšķeri), kas nepieciešams glābšanas pasākumiem, ja augu aizsardzības līdzekļi izbirst vai izlīst.
49. Uzglabāšanas vietā novieto labi redzamus norādījumus par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu, kā arī tās personas uzvārdu, adresi un tālruņa numuru, ar kuru var sazināties, ja noticis nelaimes gadījums vai avārija.
50. Nereģistrētus augu aizsardzības līdzekļus uzglabā atsevišķā telpā, ievērojot šo noteikumu 36., 37., 38., kā arī 41., 42., 43., 45. un 46.punktā minētās prasības.

(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 652)

IV. Augu aizsardzības līdzekļu transportēšana

51. Augu aizsardzības līdzekli pārvadā:
    51.1. oriģinālā nebojātā un marķētā iepakojumā;
    51.2. vietējos vai tranzīta pārvadājumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē bīstamo kravu pārvadājumus.
52. Aizliegts pārvadāt augu aizsardzības līdzekli vienā kravas nodalījumā ar pārtikas produktiem, lopbarību un medikamentiem.

V. Pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu pienākumi

53. Augu aizsardzības līdzekļu pārdevējs vai otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājs, vai augu aizsardzības konsultants, kas ieguvis šo noteikumu 12.5. apakšpunktā minēto apliecību, pircējam sniedz augu aizsardzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļu marķējumam atbilstošu informāciju par:
    53.1. iespējamo konkrētā augu aizsardzības līdzekļa radīto risku cilvēku veselībai un videi, īpaši par tā bīstamību un kaitīgu iedarbību;
    53.2. augu aizsardzības līdzekļa lietošanas un uzglabāšanas prasībām un drošu izlietoto augu aizsardzības līdzekļu iepakojumu apglabāšanu;
    53.3. citām kaitīgo organismu ierobežošanas iespējām ar mazu risku;
    53.4. citiem pircēju interesējošiem jautājumiem.

(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 652)

54. Augu aizsardzības līdzekļu pārdevējs vai konsultants pircējam, kas iegādājas trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekli un nav profesionāls augu aizsardzības līdzekļa lietotājs, sniedz šo noteikumu 53.punktā minēto informāciju, bet profesionālam augu aizsardzības līdzekļa lietotājam – pēc tā pieprasījuma.
55. Ja augu aizsardzības konsultants sniedzis normatīvajiem aktiem, augu aizsardzības līdzekļa reģistrētajiem lietošanas noteikumiem vai Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas noteiktajiem labas augu aizsardzības prakses principiem (publicēti Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļa vietnē) neatbilstošas konsultācijas, persona ir tiesīga vērsties dienestā.

VI. Augu aizsardzības līdzekļu aprites kontrole

56. Kontrolējot augu aizsardzības līdzekļu apriti, dienests ņem paraugus no augu aizsardzības līdzekļiem, augsnes, augiem, augu produktiem, augu aizsardzības līdzekļu sagatavotiem darba šķidrumiem un priekšmetiem, kas varētu būt nonākuši saskarē ar augu aizsardzības līdzekļiem. Lai noteiktu augu aizsardzības līdzekļu kvalitāti, paraugus analizē laboratorijā, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditācijas institūcijā akreditētā laboratorijā, vai laboratorijā, kurai pesticīdu noteikšanas jomā ir ieviesta kvalitātes sistēma "Laba laboratorijas prakse".

(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 652)

57. Lai pārbaudītu augu aizsardzības līdzekļu kvalitāti, dienests ņem kontroles iepakojumu.
58. Kontroles iepakojums ir augu aizsardzības līdzekļa vienas partijas viena iepakojuma vienība, ko dienests iesniedz šo noteikumu 56.punktā minētajā laboratorijā augu aizsardzības līdzekļa kvalitātes analīzei.
59. Par analizējamo paraugu izmanto vismaz 200 mililitru augu aizsardzības līdzekļa. Ja augu aizsardzības līdzekļa iepakojuma tilpums ir mazāks par 200 mililitriem, ņem vairākus kontroles iepakojumus.
60. Kontroles iepakojumu dienests ņem, piedaloties augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam. Ja augu aizsardzības līdzekļa īpašnieks atsakās piedalīties kontroles iepakojuma ņemšanas procedūrā, dienesta inspektors paraugu ņem bez augu aizsardzības līdzekļa īpašnieka klātbūtnes un pārbaudes aktā izdara atzīmi par īpašnieka atteikšanos piedalīties pārbaudē.

61. Par parauga vai kontroles iepakojuma ņemšanu dienesta inspektors sastāda aktu trijos eksemplāros. Vienu akta eksemplāru kopā ar paraugu vai kontroles iepakojumu ievieto iesaiņojumā. Iesaiņojumu noslēdz tā, lai to nevarētu atvērt nesabojājot. Otrs akta eksemplārs paliek dienesta inspektoram, bet trešais – augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam.
62. Kontroles iepakojumu līdz nodošanai laboratorijā uzglabā atbilstoši augu aizsardzības līdzekļa uzglabāšanas prasībām.
63. Pamatojoties uz šo noteikumu 56. punktā minētās laboratorijas analīžu rezultātiem, dienests triju darbdienu laikā pēc rezultātu saņemšanas sagatavo atzinumu par augu aizsardzības līdzekļa atbilstību reģistrācijas nosacījumiem.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

64. Atzinums par augu aizsardzības līdzekļa atbilstību reģistrācijas nosacījumiem attiecināms uz visu augu aizsardzības līdzekļa partiju.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

65. Ja saskaņā ar atzinumu augu aizsardzības līdzeklis atbilst reģistrācijas nosacījumiem, dienests triju darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas izsniedz atzinuma kopiju augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas īpašnieka pārstāvim Latvijā.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

66. Ja dienests pieņem lēmumu apturēt augu aizsardzības līdzekļa partijas izplatīšanu vai lietošanu Latvijā uz laiku, līdz pilnībā tiek noskaidrota augu aizsardzības līdzekļa atbilstība reģistrācijas nosacījumiem, dienests triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 63. punktā minētā atzinuma parakstīšanas nosūta:
    66.1. lēmumu augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas pārstāvim Latvijā;
    66.2. kontroles iepakojumu augu aizsardzības līdzekļa atkārtotām analīzēm uz citu šo noteikumu 56. punktā minētajām prasībām atbilstošu laboratoriju, kurā atkārtoti analizē tos augu aizsardzības līdzekļa kvalitātes rādītājus, kas neatbilda prasībām.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

67. Ja saskaņā ar atzinumu pēc atkārtoto analīžu rezultātiem augu aizsardzības līdzeklis atbilst augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas nosacījumiem, dienests triju darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas atceļ lēmumu par augu aizsardzības līdzekļa partijas izplatīšanas vai lietošanas apturēšanu Latvijā. Lēmumu nosūta augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas pārstāvim Latvijā.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

68. Ja saskaņā ar atzinumu pēc atkārtoto analīžu rezultātiem augu aizsardzības līdzeklis neatbilst augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas nosacījumiem, dienests pieņem lēmumu par aizliegumu izplatīt vai lietot augu aizsardzības līdzekļa partiju Latvijā un uzliek par pienākumu augu aizsardzības līdzekļa partiju izvest no Latvijas vai nodot apsaimniekošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, kā arī segt visus ar augu aizsardzības līdzekļa kontroles parauga testēšanu saistītos izdevumus. Lēmumu triju darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas nosūta augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas pārstāvim Latvijā, kā arī publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un dienesta tīmekļvietnē www.vaad.gov.lv.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

69. Ja, veicot analīzes, augu aizsardzības līdzeklis nav izlietots vai nodots apsaimniekošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, dienests atdod kontroles iepakojuma daļu augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam un par to sastāda aktu divos eksemplāros. Viens akta eksemplārs paliek dienesta inspektoram, otrs – augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

70. Šo noteikumu 69.punktā minēto kontroles iepakojuma daļu kopā ar vienu akta eksemplāru ievieto iesaiņojumā un noslēdz tā, lai to nevarētu atvērt nesabojājot. Šādu augu aizsardzības līdzekļa iepakojumu ir atļauts izplatīt.
71. Ja dienests pieņēmis lēmumu aizliegt izplatīt nekvalitatīvā augu aizsardzības līdzekļa partiju, augu aizsardzības līdzekļa īpašnieks un pārējie licences īpašnieki, kas ieveduši un izplatījuši augu aizsardzības līdzekli Latvijā, šo augu aizsardzības līdzekļa partiju atsauc no izplatīšanas un divu mēnešu laikā pēc šajā punktā minētā dienesta lēmuma saņemšanas izved no Latvijas vai nodod apsaimniekošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu. Licences īpašnieki piecu darbdienu laikā pēc šajā punktā minētā dienesta lēmuma izpildes iesniedz dienestā dokumentu, kas apliecina augu aizsardzības līdzekļa partijas izvešanu no Latvijas vai nodošanu apsaimniekošanai saskaņā ar minētajiem normatīvajiem aktiem.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

72. Lai atsauktu no izplatīšanas nekvalitatīvo augu aizsardzības līdzekļa partiju, licences īpašnieks nosūta paziņojumu personām, kurām attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa partija ir izplatīta. Paziņojumā norāda:
    72.1. augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu, reģistrācijas numuru Latvijas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā, iepakojuma apjomu, partijas numuru;
    72.2. izplatīšanas aizlieguma iemeslu;
    72.3. tirdzniecības vai uzglabāšanas vietu, kurā augu aizsardzības līdzeklis atdodams, tās darba laiku, atbildīgā darbinieka tālruņa numuru un citu informāciju, kura konkrētajā gadījumā ir būtiska.

(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 652)

73. Ja dienests pieņēmis lēmumu par nekvalitatīvā augu aizsardzības līdzekļa lietošanas aizliegumu, augu aizsardzības līdzekļa lietotājs konkrēto neizlietoto augu aizsardzības līdzekli nodod licences īpašniekam divu mēnešu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās. Licences īpašnieki piecu darbdienu laikā pēc šajā punktā minētā dienesta lēmuma izpildes iesniedz dienestā dokumentus, kas apliecina augu aizsardzības līdzekļa izvešanu vai nodošanu apsaimniekošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

74. Licences īpašniekam ir pienākums pieņemt pārdoto nekvalitatīvo augu aizsardzības līdzekli atpakaļ no pircēja un segt viņam radušos zaudējumus.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Direktīvas 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai.

VII. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

75. Noteikumu 32.1 punkts stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents **V.Dombrovskis**

Zemkopības ministre **L.Straujuma**

Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 13.decembra
noteikumiem Nr.949

Valsts augu aizsardzības dienestam

Iesniegums par parauga noņemšanu augu aizsardzības līdzeklim, kam beidzies derīguma termiņš

Iesnieguma iesniedzējs _____
(nosaukums, adrese)

Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas vieta _____
(adrese)

Speciālās atļaujas (licences) Nr. _____
Augu aizsardzības līdzekļa:
nosaukums _____
darbīgās vielas nosaukums _____, daudzums % _____
_____, daudzums % _____
reģistrācijas numurs _____
partijas numurs _____
iepakojuma lielums _____ (l), (kg)

Iesniegumu aizpildīja _____ _____
(vārds, uzvārds) (paraksts*)

Datums* _____

Iesniegumu pieņēma _____ _____
(amats, vārds, uzvārds) (paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministre **L.Straujuma**

Stājās spēkā: 24.12.2011.
Publicēts: „Latvijas Vēstnesis", 202 (4600), 23.12.2011.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 950
Rīgā 2011. gada 13. decembrī (prot. Nr.74 19.§)

Grozījumi:
- MK 26.02.2013. noteikumi Nr.104 / LV, 42 (4848), 28.02.2013. / Stājas spēkā 01.03.2013.
- MK 19.11.2014. noteikumi Nr.706 / LV, 232 (5292), 22.11.2014. / Stājas spēkā 23.11.2014.
- MK 13.06.2017. noteikumi Nr. 330/LV, 119 (5946), 15.06.2017./Stājas spēkā 16.06.2017.

AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 5.punktu un 9.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:
   1.1. augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un uzglabāšanas prasības;
   1.2. profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru pienākumus un tiesības;
   1.3. novērtējuma sagatavošanas kārtību par iespējamo risku augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanā no gaisa;
   1.4. atļaujas izsniegšanas kārtību augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšanai no gaisa;
   1.5. speciālos pasākumus ūdens vides un dzeramā ūdens aizsardzībai.
2. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – dienests).

II. Augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas prasības

3. Augu aizsardzības līdzekļus uzglabā oriģinālā iepakojumā, ievērojot marķējumā noteiktos uzglabāšanas apstākļus, kā arī Augu aizsardzības likuma 9.panta trešās daļas un Aizsargjoslu likuma prasības.
4. Augu aizsardzības līdzekļus uzglabā plauktos vai uz paletēm. Ja uzglabāšanas vieta ir telpa, kurā persona var uzturēties, lai veiktu darbības ar augu aizsardzības līdzekļiem (piemēram, kārtotu, pārvietotu), tajā nodrošina gaisa apmaiņu.

(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.706 redakcijā)

5. Par augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas vietām aizliegts izmantot degvielas noliktavas, dzīvojamās vai administratīvās telpas, dzīvnieku novietnes, būves, kuras var applūst, un pagrabus, izņemot tos, kas ir būvēti virs zemes.
6. Pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus uzglabā slēgtā, vēdināmā telpā atsevišķi no pārējiem augu aizsardzības līdzekļiem.
7. Izlietoto augu aizsardzības līdzekļu iepakojumus līdz to apglabāšanai tur kopā ar augu aizsardzības līdzekļiem un apglabā saskaņā ar normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteikto kārtību. Šo prasību var neievērot, ja izlietotā augu aizsardzības līdzekļa iepakojums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus, vairs nav uzskatāms par bīstamu atkritumu.

III. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības

8. Saimniecībā, kurā tiek uzglabāti vai lietoti augu aizsardzības līdzekļi, darbā iesaistītajām personām ir pieejami:
   8.1. individuālie aizsardzības līdzekļi (piemēram, respirators, aizsargbrilles, aizsargapģērbs, cimdi);
   8.2. absorbējošie materiāli (piemēram, sausas zāģu skaidas vai kūdra);
   8.3. inventārs, kas nepieciešams glābšanas pasākumiem, ja augu aizsardzības līdzekļi izbirst vai izlīst (piemēram, slota, spainis, liekšķere).
9. Augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot tikai tam mērķim un pret tiem kaitīgajiem organismiem, kas minēti marķējumā, nepārsniedzot norādīto devu, kā arī ievērojot marķējuma prasības par augu aizsardzības līdzekļu atšķaidīšanu un maisījumu gatavošanu pirms lietošanas, kultūrauga attīstības stadiju, apstrāžu skaitu sezonā, nogaidīšanas laiku no pēdējās apstrādes līdz ražas novākšanai un ierobežojumus attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību.
10. Par prasību ievērošanu attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību ir atbildīgs ikviens augu aizsardzības līdzekļu lietotājs, kā arī augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operators.
11. Lietošanai pēc iespējas izvēlas tādus augu aizsardzības līdzekļus, kuri potenciāli var radīt mazāku risku videi un cilvēku un dzīvnieku veselībai, kuri nav kvalificēti kā bīstami ūdens videi un kuros nav prioritāro bīstamo vielu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdens apsaimniekošanu. Informāciju par augu aizsardzības līdzekļiem un to iespējamo blakusiedarbību uz cilvēku veselību un vidi dienests ievieto un aktualizē savā tīmekļa vietnē.
12. Lai aizsargātu ūdens vidi un dzeramā ūdens ņemšanas vietas, augu aizsardzības līdzekļus lieto, ievērojot normatīvajos aktos par aizsargjoslām minētās prasības.
13. Pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājs kārto reģistrācijas žurnālu. Reģistrācijas žurnālā uzskaita gan iegādātos augu aizsardzības līdzekļus (norāda saņemšanas datumu, augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu, iepakojuma lielumu un daudzumu), gan izlietotos augu aizsardzības līdzekļus (norāda informāciju par apstrādāto kultūraugu sugu vai objektu (piemēram, labības noliktava), apstrādāto teritoriju, tās platību, apstrādes datumu, lietotā augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu un devu). Reģistrācijas žurnālu glabā vismaz trīs gadus.

13.[1] Ja augu aizsardzības līdzekļi lietoti, izmantojot profesionāla augu aizsardzības līdzekļu lietotāja sniegtu pakalpojumu, tad pakalpojuma sniedzējs apstrādātā objekta īpašniekam izsniedz izrakstu no reģistrācijas žurnāla par apstrādāto objektu, norādot tajā šo noteikumu 13. punktā un 23.2. apakšpunktā minēto informāciju, kā arī pakalpojumu sniedzēja vārdu, uzvārdu, adresi un lietotāja apliecības numuru. Izrakstu sagatavo divos eksemplāros, un uz eksemplāra, kas paliek pie pakalpojumu sniedzēja, jābūt apstrādātā objekta īpašnieka parakstam. Objekta īpašnieks izrakstu glabā trīs gadus un pēc pieprasījuma uzrāda dienestam.

(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.706 redakcijā)

14. Lietojot augu aizsardzības līdzekļus, aizliegts:
   14.1. iesaistīt darbā personas, kas jaunākas par 18 gadiem, grūtnieces un mātes, kas baro bērnu ar krūti;
   14.2. izmantot bojātas, nenoregulētas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas, kā arī iekārtas, kas nav pārbaudītas normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām noteiktajā kārtībā;
   14.3. atstāt bez uzraudzības sagatavotus darba šķidrumus un neizlietotus augu aizsardzības līdzekļus;
   14.4. izliet smidzināšanai paredzētā darba šķidruma atlikumu;
   14.5. nepiederošām personām uzturēties vietā, kur strādā ar augu aizsardzības līdzekļiem;
   14.6. ēst, dzert un smēķēt.

(14.2. apakšpunktā minētās prasības attiecībā uz iekārtu pārbaudi stājas spēkā 26.11.2016., sk. 44.punktu)

15. Iztukšoto augu aizsardzības līdzekļa iepakojumu darba šķidruma gatavošanas laikā trīs reizes izskalo ar tīru ūdeni un skalojamo ūdeni iepilda darba šķidruma tvertnē. Darbīgo vielu magnija un alumīnija fosfīdu saturošu augu aizsardzības līdzekļu iepakojumu apsaimnieko atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu apsaimniekošanu un saskaņā ar norādēm šo augu aizsardzības līdzekļu marķējumā.

(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.706 redakcijā)

16. Pēc augu aizsardzības līdzekļa lietošanas darba šķidruma atlikumu atšķaida ar lielu ūdens daudzumu un izsmidzina uz apstrādāta lauka. Darbu beidzot, iekārtas tvertni izskalo ar tīru ūdeni vai ar lietotā augu aizsardzības līdzekļa marķējumā norādīto mazgāšanas līdzekli, ko izsmidzina uz apstrādāta lauka.
17. Aizliegts atkārtoti izmantot izlietoto augu aizsardzības līdzekļu iepakojumus.
18. Lietojot augu aizsardzības līdzekļus sējumu un stādījumu apsmidzināšanai, ievēro šādus drošības pasākumus:
   18.1. augus drīkst apsmidzināt, ja vēja ātrums nepārsniedz četrus metrus sekundē. Ja smidzinātājs ir aprīkots ar rūpnieciski komplektētām palīgierīcēm (palīgiekārtām), kas mazina vēja ietekmi uz smidzinājumu, nodrošinot smidzinājuma nokļūšanu tikai uz paredzētās apstrādājamās virsmas, augus drīkst apsmidzināt tad, ja vēja ātrums nepārsniedz astoņus metrus sekundē;
   18.2. strādājot seko smidzinātāja darba kvalitātei, kā arī preparāta izlietojumam.
19. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, persona, lietojot augu aizsardzības līdzekļus, ievēro marķējumā noteiktās īpašās drošības prasības, ja tajā ir:
   19.1. norāde "Toksisks bitēm" vai ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums *R57*;
   19.2. standartfrāze *Spe8*;
   19.3. citas norādes par bišu un citu apputeksnētāju aizsardzību.
20. Ja persona lieto augu aizsardzības līdzekli, kura marķējumā ir norāde "Toksisks bitēm" vai ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums *R57*, tā trīs dienas pirms sējumu vai stādījumu apstrādes brīdina tos bišu saimju tiesiskos valdītājus, kuru bišu dravas (vai stropi) atrodas divu kilometru rādiusā no apstrādājamās vietas un kuru bišu saimes ir reģistrētas normatīvajos aktos par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu noteiktajā kārtībā.
21. Lietojot augu aizsardzības līdzekļus sēklu kodināšanā, ievēro šādus drošības pasākumus:
   21.1. sēklas kodina speciāli iekārtotās telpās, nojumēs, laukumos un kodināšanai piemērotās iekārtās;
   21.2. kodināšanas darbos iesaistītās personas izmanto individuālos aizsardzības līdzekļus;
   21.3. kodināto sēklu pārpalikumus uzglabā sausā aizslēgtā noliktavā atsevišķi no pārtikas un lopbarības graudiem iepakojumā ar norādi "KODINĀTS", norādot arī kodnes vai darbīgās vielas nosaukumu;
   21.4. pēc sēklu kodināšanas un sējas pabeigšanas kodināšanas vietu, sēklu kodināšanas iekārtas, sējmašīnas, sēklu iepildītājus un citas iekārtas, kurām ir bijusi saskare ar kodinātām sēklām, kā arī individuālos aizsardzības līdzekļus neitralizē, ievērojot norādes attiecīgās kodnes marķējumā;
   21.5. kodinātās sēklas aizliegts lietot pārtikā, izbarot dzīvniekiem un putniem, kā arī mazgāt vai attīrīt no kodnes, lai tās realizētu pārtikas vai lopbarības vajadzībām;
   21.6. kodinātās sēklas drīkst pārvadāt tikai šo noteikumu 21.3.apakšpunktā minētajos iepakojumos vai speciālos sējmašīnu uzpildītājos, kā arī sējmašīnu tvertnēs.
21.[1] Pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot tikai personām, kurām izsniegta profesionāla augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība darbībām ar pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem.

(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.706 redakcijā)

22. Ja pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus lieto par fumigantiem fumigācijā (objekta apstrādē ar augu aizsardzības līdzekli gāzveida stāvoklī), ievēro šādas darba drošības prasības:
   22.1. fumigāciju drīkst veikt tikai hermētiski noslēdzamā objektā, ja tas atrodas ne tuvāk par 50 metriem no dzīvojamām, administratīvajām un publiskajām ēkām un ne tuvāk par 30 metriem no plašai sabiedrībai pieejamām teritorijām (piemēram, parka, sporta laukuma, atpūtas vietas);
   22.2. vienu dienu pirms fumigācijas sākšanas par fumigāciju un tās veikšanas laiku brīdina cilvēkus, kas atrodas objektam piegulošajā teritorijā;
   22.3. pirms fumigācijas sākšanas veic objekta hermetizāciju. Objekta hermētiskumu nodrošina visa procesa laikā;
   22.4. objektu norobežo un izvieto labi saredzamus brīdinājuma uzrakstus "BĪSTAMI DZĪVĪBAI" un "IEEJA AIZLIEGTA";
   22.5. lai garantētu darba drošību, fumigāciju veic vismaz divas personas;
   22.6. nodrošina personas klātbūtni objektā no fumigācijas sākuma līdz pilnīgai fumiganta neitralizācijai un telpu izvēdināšanai pēc fumigācijas beigām (turpmāk – degazācija);
   22.7. fumigācijā iesaistītās personas nodrošina ar gāzmaskām;
   22.8. fumigācijas sagatavošanu un fumiganta palaišanu veic diennakts gaišajā laikā;

22.9. pirms degazācijas sākšanas mēra fumiganta koncentrāciju objektā, lai konstatētu, vai fumigācijas laikā sasniegta nepieciešamā fumiganta koncentrācija;

22.10. degazāciju veic pakāpeniski, neļaujot izplūst atmosfērā lielam fumiganta daudzumam;

22.11. objekta degazāciju veic, līdz fumiganta koncentrācija sasniedz attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumā paredzētos rādītājus.

(Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.706)

23. Fumigācijas un degazācijas laikā:

23.1. mēra fumiganta koncentrāciju gaisā un nodrošina, lai augu aizsardzības līdzekļu koncentrācija nepārsniedz attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumā norādītās pieļaujamās normas;

23.2. reģistrācijas žurnālā papildus šo noteikumu 13. punktā minētajam norāda fumigācijas laiku, izmantotā augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu, apstrādāto produkciju, norādot produkcijas nosaukumu un apstrādāto apjomu, temperatūru pēc Celsija, kādā veikta apstrāde, mērījumu izdarīšanas laiku un fumiganta koncentrāciju.

(Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.706)

24. Pēc degazācijas mēra fumiganta koncentrāciju visās telpās, kurās veikta fumigācija, ja šī koncentrācija norādīta augu aizsardzības līdzekļa marķējumā, un sastāda aktu par fumigācijas un degazācijas veikšanu. Aktu paraksta visas personas, kas piedalījušās fumigācijā.

(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.706 redakcijā)

25. Ja augu aizsardzības līdzekli lieto segtās platībās, tad pēc attiecīgā līdzekļa lietošanas tās noslēdz un pie durvīm pieliek brīdinājuma zīmi ar informāciju par lietoto augu aizsardzības līdzekli, kā arī norāda laiku, kad telpā atkal drīkstēs uzturēties, un par augu aizsardzības līdzekļa lietošanu atbildīgās personas tālruņa numuru.

26. Teritorijās, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai arī mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra (EK) Regulas Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK, 3.pantu (piemēram, parkā, sporta laukumā, atpūtas vietā, skolu teritorijā, slimnīcu teritorijā), augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot tikai tad, ja citādi nav iespējams ierobežot augiem kaitīgo organismu izplatību un lietošanas instrukcijā ir atļauts šāds konkrētā augu aizsardzības līdzekļa lietojums. Augu aizsardzības līdzekli plašai sabiedrībai pieejamās teritorijās lieto pēc iespējas tādā laikā, kad tajās neuzturas cilvēki.

27. Vismaz divas dienas pirms augu aizsardzības līdzekļu lietošanas šo noteikumu 26.punktā minētajās vietās atbildīgā persona vietējos novada vai pagasta laikrakstos vai savā tīmekļa vietnē ievieto paziņojumu par paredzēto augu aizsardzības līdzekļu lietošanu vai citādi publisko šo informāciju.

28. Šo noteikumu 26.punktā minētajos gadījumos augu aizsardzības līdzekļa lietošanas laikā, kā arī pēc tā lietošanas apstrādāto teritoriju norobežo ar brīdinājuma zīmēm, kurās norādīta informācija par lietoto augu aizsardzības līdzekli, nogaidīšanas periodu un par to, kad atkal drīkst apmeklēt apstrādāto teritoriju.

29. Dzelzceļa līnijas, autoceļu daļas un ļoti caurlaidīgas teritorijas, kā arī necaurlaidīgas teritorijas, kas ir tuvu virszemes vai pazemes ūdeņiem, ir atļauts apstrādāt ar augu aizsardzības līdzekļiem, tikai ievērojot normatīvajos aktos par aizsargjoslām minētās prasības un nodrošinot, ka augu aizsardzības līdzekļi nenokļūst virszemes ūdeņos vai noteku sistēmās.

IV. Augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšana no gaisa

30. Augu aizsardzības līdzekļus atļauts izsmidzināt no gaisa, ja saņemta dienesta atļauja augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšanai no gaisa (turpmāk – atļauja).

31. Dienests, ievērojot šo noteikumu 34.punktā minētos nosacījumus, atļauju izsniedz šādos gadījumos:

31.1. ja tas nepieciešams zinātniskām institūcijām pētījumu veikšanai lauksaimniecības nozarē;

31.2. lauksaimnieciskajā ražošanā iesaistītajām personām ārkārtas gadījumā;

31.3. mežu apstrādei kokiem kaitīgo organismu masveida savairošanās gadījumā.

32. Lai saņemtu atļauju, ieinteresētā persona dienestā iesniedz:

32.1. pieteikumu atļaujas saņemšanai. Pieteikumā pamatota atļaujas nepieciešamība, kā arī norādīta kaitīgā organisma identitāte, kultūrauga apdraudējuma apjoms, nozīmīgums, ekonomiskais apdraudējums, lietošanai paredzētā augu aizsardzības līdzekļa nosaukums, tā deva, apstrādājamā platība, paredzamais izsmidzināšanas laiks, kā arī pamatojums, kādēļ konkrētajā situācijā nav izmantojamas citas kaitīgā organisma apkarošanas metodes;

32.2. karti, kurā iezīmēta apsmidzināšanai no gaisa paredzētā teritorija;

32.3. informāciju par personu, kura veiks smidzināšanas darbus, kā arī par lietošanas iekārtām.

33. Dienests, pamatojoties uz iesniegto un citu dienesta rīcībā esošo informāciju, sagatavo novērtējumu par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku un dzīvnieku veselību un veic riska analīzi ne ilgāk kā:

33.1. divu nedēļu laikā, ja augu aizsardzības līdzeklis nav atļauts lietošanai Latvijā;

33.2. vienas nedēļas laikā, ja augu aizsardzības līdzeklis ir atļauts lietošanai Latvijā.

34. Dienests pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu, ja:

34.1. nav citas piemērotas alternatīvas vai arī izsmidzināšanai no gaisa salīdzinājumā ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanu uz zemes ir lielākas priekšrocības, lai mazinātu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi;

34.2. ir veikta riska analīze un gūts apstiprinājums tam, ka pozitīvais efekts no šāda augu aizsardzības līdzekļu lietojuma būs lielāks nekā iespējamais risks videi un cilvēku un dzīvnieku veselībai;

34.3. operators, kas veic smidzinājumu no gaisa, ir apmācīts un ieguvis apliecību par tiesībām lietot augu aizsardzības līdzekļus;

34.4. lietošanas iekārtas ir pārbaudītas un atbilst normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām noteiktajām prasībām;

34.5. lidaparāts ir reģistrēts normatīvajos aktos par aviācēju noteiktajā kārtībā un aprīkots ar piederumiem, kas atbilst labākai pieejamai tehnoloģijai, lai samazinātu augu aizsardzības līdzekļu nonesi ar vēju;

34.6. apstrādājamā teritorija neatrodas dzīvojamo zonu tuvumā.

(34.4. apakšpunktā minētās prasības attiecībā uz iekārtu pārbaudi stājas spēkā 26.11.2016., sk. 44.punktu)

35. Atļaujā dienests iekļauj šādas ziņas:

35.1. izmantošanai atļautā augu aizsardzības līdzekļa nosaukums;

35.2. izmantošanai atļautā teritorija, norādot precīzu tās vietu un platību;

35.3. augu aizsardzības līdzekļa lietošanas nosacījumi, ietverot riska ierobežošanas pasākumus;

35.4. par augu aizsardzības līdzekļa lietošanu atbildīgā persona;

35.5. plānotais augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanas datums, laiks un nogaidīšanas laiks – laika intervāls no apstrādes līdz laikam, kad teritorijā drīkst atkal uzturēties un veikt saimnieciskas darbības (piemēram, ogot, sēņot).

36. Persona, kas saņēmusi atļauju, pirms darbu veikšanas informē attiecīgās apkārtnes iedzīvotājus šo noteikumu 27.punktā minētajā kārtībā, kā arī veic šo noteikumu 28.punktā minētos drošības pasākumus.

37. Ja tiek izsniegta atļauja izsmidzināt augu aizsardzības līdzekļus no gaisa, dienests lēmumu publicē savā tīmekļa vietnē, kā arī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.706 redakcijā)

38. Persona ne vēlāk kā divu dienu laikā pēc augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanas no gaisa iesniedz dienestā pārskatu par smidzinājumu, norādot datumu un laiku, kad notika izsmidzināšana, izlietotā augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu, tā daudzumu un devu, kā arī informāciju par apstrādāto teritoriju.

39. Persona sedz visus izdevumus, kuri saistīti ar dienesta sagatavoto novērtējumu par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku un dzīvnieku veselību un riska analīzi un kuri nepieciešami lēmuma pieņemšanai par atļaujas izsniegšanu augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšanai no gaisa, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

V. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas kontrole

40. Kontrolējot augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, dienests augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu klātbūtnes konstatēšanai var ņemt paraugus no augu aizsardzības līdzekļiem, augsnes, augiem, augu produktiem, sagatavotiem augu aizsardzības līdzekļu darba šķidrumiem un citiem priekšmetiem, kas varētu būt nonākuši saskarē ar augu aizsardzības līdzekļiem. Paraugus analizē laboratorijā, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditācijas institūcijā akreditētā laboratorijā, vai laboratorijā, kurai pesticīdu noteikšanas jomā ir ieviesta kvalitātes sistēma "Laba laboratorijas prakse".

(MK 13.06.2017. noteikumu Nr. 330 redakcijā)

41. Paraugus ņem reprezentatīvā (pietiekamā) daudzumā izlases kārtībā. Augu aizsardzības līdzekļa paraugu dienests ņem saskaņā ar normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū noteikto kārtību.

41.[1] Ja dienests šo noteikumu 40. punktā minētos paraugus ņem, pamatojoties uz personas lūgumu, ārpus dienesta īstenotās kontroles, ar parauga ņemšanu un novērtējuma sagatavošanu saistītos izdevumus sedz persona saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.706 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.02.2015., sk 46.punktu)

VI. Noslēguma jautājumi

42. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004. gada 29.aprīļa noteikumus Nr.463 "Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69.nr.; 2009, 70., 166.nr.; 2010, 174.nr.).

43. Līdz 2013.gada 31.maijam vai apliecības derīguma termiņa beigām (līdz ilgākajam no minētajiem termiņiem) pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot un iegādāties personām, kas saņēmušas apliecību par augu aizsardzības zināšanu minimuma apgūšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.463 "Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi" minētajām prasībām.

(MK 26.02.2013. noteikumu Nr.104 redakcijā)

44. Šo noteikumu 14.2. un 34.4.apakšpunktā minētās prasības attiecībā uz iekārtu pārbaudi stājas spēkā 2016. gada 26.novembrī.

45. Šo noteikumu 34.5.apakšpunkta prasības attiecībā uz lidaparātu aprīkojumu stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

46. Šo noteikumu 41.[1] punkts stājas spēkā 2015. gada 1. februārī.

(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.706 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Direktīvas 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai.

Ministru prezidents **V.Dombrovskis**

Zemkopības ministre **L.Straujuma**

Stājas spēkā: 11.03.1997.
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 56/57 (771/772), 25.02.1997., "Ziņotājs", 6, 27.03.1997.

Grozījumi:
- 21.02.2002. likums/LV, 39, 12.03.2002./Stājas spēkā 26.03.2002.
- 19.06.2003. likums/LV, 101, 08.07.2003./Stājas spēkā 22.07.2003.
- 22.06.2005. likums/LV, 108, 12.07.2005./Stājas spēkā 15.07.2005.
- 06.03.2008. likums/LV, 43, 18.03.2008./Stājas spēkā 01.04.2008.
- 14.05.2009. likums/LV, 82, 27.05.2009./Stājas spēkā 10.06.2009.
- 16.12.2010. likums/LV, 205, 29.12.2010./Stājas spēkā 01.01.2011.
- 13.10.2011. likums/LV, 169, 26.10.2011./Stājas spēkā 09.11.2011.
- 14.03.2013. likums/LV, 61, 27.03.2013./Stājas spēkā 10.04.2013.
- 18.04.2013. likums/LV, 87, 08.05.2013./Stājas spēkā 22.05.2013.
- 23.05.2013. likums/LV, 106, 04.06.2013./Stājas spēkā 18.06.2013.
- 28.11.2013. likums/LV, 243, 12.12.2013./Stājas spēkā 01.03.2014.
- 23.10.2014. likums/LV, 220, 05.11.2014./Stājas spēkā 19.11.2014.
- 19.11.2015. likums/LV, 240, 08.12.2015./Stājas spēkā 22.12.2015.
- 19.05.2016. likums/LV, 108, 06.06.2016./Stājas spēkā 20.06.2016.
- 18.06.2020. likums/LV, 123, 30.06.2020./Stājas spēkā 01.07.2020.
- 22.12.2021. likums/LV, 4, 06.01.2022./Stājas spēkā 20.01.2022.
- 06.10.2022. likums/LV, 204, 20.10.2022./Stājas spēkā 03.11.2022.
- 23.11.2023. likums/LV, 237, 07.12.2023./Stājas spēkā 01.01.2024.

AIZSARGJOSLU LIKUMA IZRAKSTS

Redakcija: [01.01.2025.]

34.pants. Aizsargjoslu pārklāšanās
Gadījumos, kad vienā vietā pārklājas vairāku veidu aizsargjoslas, spēkā ir stingrākās prasības un lielākais minimālais platums. Visu veidu rīcība šajās vietās jāsaskaņo ieinteresētajām institūcijām.

35.pants. Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās
(1) Vispārīgos aprobežojumus aizsargjoslās nosaka likumi un Ministru kabineta noteikumi, tos var noteikt arī ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kas izdoti to kompetences ietvaros.
(2) Ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam vai valdītājam ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, atjaunošanai, pārbūvei nepieciešamos darbus. Par to rakstveidā brīdināms zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas, izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus, kurus var veikt jebkurā laikā bez brīdinājuma.
(3) Aizsargjoslās, kas ir lauksaimniecības zemēs, plānotie ekspluatācijas, remonta, atjaunošanas un pārbūves darbi veicami laikposmā, kad šīs platības neaizņem lauksaimniecības kultūras vai kad ir iespējama lauksaimniecības kultūru saglabāšana, izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidācijas darbus, kurus var veikt jebkurā laikā.
(4) Pēc darbu veikšanas objekta īpašnieks vai valdītājs sakārto zemes platības, lai tās būtu derīgas izmantošanai paredzētajām vajadzībām, kā arī atlīdzina zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam darbu izpildes gaitā nodarītos zaudējumus. Zaudējumu apmēru nosaka un zaudējumus atlīdzina likumos noteiktajā kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās.
(5) Ja aizsargjoslas sakrīt vai krustojas, ar attiecīgo objektu ekspluatāciju un remontu saistītos darbus kopīgajos aizsargjoslu iecirkņos veic attiecīgo objektu īpašnieki vai valdītāji pēc savstarpējas vienošanās.
(6) Juridiskās un fiziskās personas, veicot aizsargjoslās darbus, kuru dēļ ir nepieciešams objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas darbus veic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku vai valdītāju. Ar minētajām darbībām saistītās izmaksas sedz attiecīgā juridiskā vai fiziskā persona vai — pēc savstarpējas vienošanās — objekta īpašnieks vai valdītājs.
(7) Juridiskajām un fiziskajām personām aizsargjoslās jāizpilda attiecīgā objekta īpašnieka vai valdītāja likumīgās prasības.
(8) Pašvaldību un atbildīgo valsts institūciju dienestiem kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kontroles veikšanas kārtību. Objektu īpašnieku vai valdītāju dienestiem kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā, iepriekš par to brīdinot zemes īpašnieku, bet, ja tiesības lietot zemi nodotas citai personai, — zemes lietotāju.
(9) Tāda objekta īpašnieks vai valdītājs, kuram noteikta aizsargjosla, izmanto šo aizsargjoslu, nemaksājot atlīdzību par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu. Šis nosacījums neierobežo nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja vai lietotāja tiesības prasīt viņam radīto tiešo zaudējumu atlīdzību.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.02.2002., 19.06.2003., 22.06.2005., 14.05.2009. un 19.05.2016. likumu, kas stājas spēkā 20.06.2016.)

36.pants. Aprobežojumi Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes aizsargjoslā
(1) Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes aizsargjoslā noteikti šādi aprobežojumi:
1) pilsētās un ciemos jaunveidojamās zemes vienības platību un apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā;
2) ārpus pilsētām un ciemiem uz katra zemes īpašuma atļauts izvietot vienu viensētu ar palīgēkām, viesnīcu un tai līdzīga lietojuma ēku, tūrismam nepieciešamo skatu torni, šajā pantā minēto infrastruktūras vai inženierkomunikāciju būvi atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam. Sadalot zemes gabalu vairākos zemes gabalos, katra zemes gabala platība nedrīkst būt mazāka par trim hektāriem, izņemot gadījumus, kad atdalāmais zemes gabals ir nepieciešams šajā pantā minētās infrastruktūras vai inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un tā apbūves nosacījumus paredz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā;
3) ja, atsavinot vai iznomājot valsts vai pašvaldības īpašumā esošo zemi, paredzēta zemes lietojuma veida maiņa, kas nav noteikta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, katru reizi nepieciešams Ministru kabineta rīkojums;
4) aizliegts ierīkot meliorācijas būves bez saskaņošanas ar Valsts vides dienestu;
5) apdzīvotās vietās, lai saglabātu piekrastei raksturīgu kultūrvēsturisko ainavu, vietējā pašvaldība teritorijas plānojumā var iekļaut papildu arhitektūras prasības jaunajai būvniecībai.
(2) Krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē papildus šā panta pirmajā daļā minētajiem aprobežojumiem aizliegts celt jaunas ēkas un būves un paplašināt esošās, izņemot gadījumus, kad:
1) atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam tiek:
a) atjaunotas vai restaurētas esošās ēkas un būves;
b) būvētas palīgēkas pie esošajām dzīvojamām ēkām vai būvēm;
c) pārbūvētas esošās ēkas vai būves, nepārsniedzot esošo būvapjomu, bet, pārbūvējot esošās dzīvojamās ēkas, kuru platība ir mazāka par 150 kvadrātmetriem, to kopējā platība pēc pārbūves nedrīkst pārsniegt 150 kvadrātmetrus;
2) tiek attīstīta osta vai attīstīti un pārbūvēti esošie zvejniecības un zivju pārstrādes uzņēmumi, tai skaitā uzņēmumi, kas veic komerciālo zveju piekrastes ūdeņos;
3) ēku un būvju celtniecība vai paplašināšana ir paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā un notiek pilsētas teritorijā;
4) ēku un būvju celtniecība vai paplašināšana notiek šā likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā apstiprinātajās un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās ciema robežās vietās, kur bijusi iepriekšējā apbūve, minētās darbības ir paredzētas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā;
5) tiek veikta krastu nostiprināšana esošo būvju un infrastruktūras aizsardzībai;
6) tiek veikta mehānisko transportlīdzekļu stāvlaukumu un glābšanas staciju būvniecība un tiem nepieciešamo pievedceļu un teritorijas labiekārtošanai nepieciešamo mazēku būvniecība;
7) tiek veikta ielu un autoceļu būvniecība vai pārbūve, lai nodrošinātu piekļuvi esošām dzīvojamām ēkām vai šajā pantā atļautās apbūves (ja tur bijusi iepriekšējā apbūve) vajadzībām, ja nepastāv citas piekļuves iespējas;
8) tiek veikta ārējo inženiertīklu būvniecība esošās apbūves vai šajā pantā atļautās apbūves vajadzībām;
9) tiek veikta nobrauktuvju būvniecība pludmalē, lai nodrošinātu piekļuvi pludmalei vai jūrai šā panta trešās daļas 6. punktā minētajos gadījumos;
10) tiek veikta publiski pieejamu dabas tūrisma, izziņas un atpūtas infrastruktūras objektu būvniecība (takas, veloceļi, skatu torņi, atpūtas vietas, informācijas stendi, norādes zīmes u. c.) un sanitāro ēku būvniecība.
(2[1]) Šā panta otrajā daļā minētās darbības veic, ja:
1) veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums un saņemts Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par novērtējuma ziņojumu vai izdoti tehniskie noteikumi saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" prasībām;
2) attiecīgā apbūve paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā.
(3) Krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē papildus šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajam aizliegts:
1) atsavināt valsts vai pašvaldības īpašumā esošo zemi, izņemot likumos noteiktos gadījumus, kad personai ir tiesības iegūt īpašumā zemi zem ēkas (būves), ievērojot nosacījumu, ka īpašuma tiesības uz ēku (būvi) attiecīgajai personai ir nostiprinātas zemesgrāmatā, kā arī gadījumos, kad valstij piederošo zemi nodod bez atlīdzības pašvaldības īpašumā un pašvaldībai piederošo zemi nodod bez atlīdzības valstij, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteikto kārtību nekustamā īpašuma nodošanai bez atlīdzības vai maiņai;
2) pludmalē un tauvas joslā norobežot ar žogiem pieeju jūrai, kā arī traucēt tur kājāmgājēju brīvu pārvietošanos un atrašanos, izņemot ostas teritoriju atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam. Lēmumi par nožogojumu nojaukšanu pieņemami un izpildāmi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
3) izvietot un ierīkot minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas materiālu, bīstamo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu, kokmateriālu, kā arī bīstamās ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus saturošu materiālu glabātavas un degvielas uzpildes stacijas, izņemot atbilstoši teritoriju plānojumiem — ostas teritorijā, kā arī būves lopbarības glabāšanai (izņemot siena šķūņus bez vienlaidu pamatiem);
4) iegūt un izmantot derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdeņu ieguvi ūdensapgādes vai rekreācijas vajadzībām;
5) ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;
6) ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pārvietoties, apstāties un stāvēt ārpus autoceļiem, kā arī pārvietoties pa nobrauktuvēm pludmalē, izņemot gadījumus, kad pārvietošanās ir saistīta ar teritorijas apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzību, vai cilvēku glābšanu un meklēšanu, vai ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanu, robežuzraudzību vai sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu, kā arī gadījumus, kad ir saņemta pašvaldības rakstveida atļauja rūpnieciskās zvejas vajadzībām vai ir saņemta jūras piekrastes joslas valdītāja rakstveida atļauja publisko pasākumu nodrošināšanai, ūdens sporta un kuģošanas līdzekļu pievešanai un tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā paredzētajās vietās un vides monitoringa un zinātnisko pētījumu veikšanai. Papildus iepriekš minētajiem izņēmuma gadījumiem atļauts pārvietoties pa dabiskām brauktuvēm (ne vairāk kā četrus metrus plata neizbūvēta brauktuve meža zemes apsaimniekošanas un aizsardzības vajadzībām) tikai tādēļ, lai piekļūtu dzīvojamām ēkām vai vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētām tūrisma un atpūtas vietām, ja nepastāv citas piekļuves iespējas;
7) rīkot publiskus sporta, izklaides vai atpūtas pasākumus, kas nav saskaņoti ar vietējo pašvaldību, bet, ja aizsargjosla atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, — ar šīs teritorijas administrāciju;
8) novietot speciālās dzīvojamās piekabes, jebkādas konstrukcijas, pagaidu un saliekamās būves, izņemot pludmales labiekārtošanas elementus, ārpus šim nolūkam vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētajām vietām;
9) pārveidot reljefu, bojāt un iznīcināt dabisko zemsedzi, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams šajā pantā atļauto darbību veikšanai.
(4) Krasta kāpu aizsargjoslā papildus šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētajam aizliegts:
1) veikt galveno cirti, izņemot koku ciršanu ārkārtas situācijas seku likvidēšanai, kā arī vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai;
2) mežā veikt būvniecību, parku, mežaparku un lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu, kuras rezultātā platība tiek atmežota, un laucēs veikt būvniecību, parku, mežaparku un lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu bez Ministru

kabineta ikreizēja rīkojuma. Ikreizēju rīkojumu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai krasta kāpu aizsargjoslā esošā mežā Ministru kabinets izdod sešu mēnešu laikā no dienas, kad iesniegums saņemts vietējā pašvaldībā. Koku ciršanas kārtību krasta kāpu aizsargjoslā esošā mežā šajā punktā minēto darbību īstenošanai nosaka Ministru kabinets;

3) kurt ugunskurus ārpus šim nolūkam iekārtotām vietām un māju pagalmiem, izņemot gadījumus, kad jāiznīcina sausie, vēja izgāztie vai lauztie koki un slimību inficētie vai kaitēkļu invadētie materiāli;

4) novietot teltis ārpus šim nolūkam iekārtotām vai norādītām vietām bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

(5) Pašvaldībai vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā ir jāparedz iespēja kājāmgājējiem piekļūt pludmalei un vietas automašīnu (transportlīdzekļu) stāvvietu ierīkošanai. Vietējā pašvaldība organizē gājēju ceļu ierīkošanu un attiecīgu norāžu izvietošanu, ņemot vērā esošo apbūvi un īpašumu robežas, kā arī prasību, ka pilsētās un ciemos jābūt vismaz diviem gājēju ceļiem uz vienu kilometru, bet ārpus pilsētām un ciemiem gājēju ceļi nedrīkst atrasties tālāk par vienu kilometru cits no cita, izņemot gadījumu, kad to nav iespējams nodrošināt dabisko apstākļu dēļ. Ja ne vairāk kā divus metrus platu gājēju ceļu ar mīksto segumu vai koka dēļu klājumu ierīko mežā, tā platību neatmežo. Ja nepieciešams, pašvaldība vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā var noteikt īpašuma tiesību aprobežojumu par labu sabiedrības iespējai piekļūt pludmalei arī bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas. Zemes īpašniekiem ir tiesības uz zaudējumu atlīdzību, ja tādi radušies aprobežojuma noteikšanas dēļ. Zaudējumu atlīdzības veidu, apmēru un aprēķināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(6) Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī kultūras un vēstures pieminekļu teritorijās kājāmgājēju pārvietošanos regulē šo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

(7) Ja ir paredzēts celt valsts nozīmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju objektus, kuri nav paredzēti vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, apbūve krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē ir pieļaujama tikai ar Ministru kabineta ikreizēju rīkojumu.

(8) Jūras aizsargjoslā ierīkotajās peldvietās aizliegts braukt ar motorlaivām un ūdens motocikliem, ja tas nav saistīts ar specializēto dienestu darbību, šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību. Vietējā pašvaldība nosaka speciāli iezīmētas vietas, kurās atļauts braukt ar ūdens motocikliem.

(19.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.06.2005., 14.05.2009., 13.10.2011., 14.03.2013., 19.05.2016., 18.06.2020., 22.12.2021., 06.10.2022. un 23.11.2023. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2024.)

37.pants. Aprobežojumi virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās

(1) Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās papildus šā likuma 35.pantā minētajam tiek noteikti šādi aprobežojumi:

1) aizliegts izvietot būves lopbarības glabāšanai (izņemot siena šķūņus), minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas materiālu, bīstamo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu, kokmateriālu, kā arī bīstamās ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus saturošu materiālu glabātavas, izņemot šim nolūkam teritoriju plānojumos vai lokālplānojumos paredzētās vietas;

2) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;

3) aizliegts veikt kailcirtes 50 metrus platā joslā vai visā aizsargjoslas platumā, ja aizsargjosla ir šaurāka par 50 metriem, izņemot mežaudzē, kurā valdošā koku suga ir baltalksnis, koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai un vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai, kā arī palieņu pļavu atjaunošanai un apsaimniekošanai. Veicot kailcirti mežaudzē, kurā valdošā koku suga ir baltalksnis, ievēro šādus nosacījumus:

a) saglabā ozolus, liepas, vīksnas, gobas, kļavas, priedes, melnalkšņus, vītolus un mežābeles,

b) aizliegta koku ciršana nogāzēs, kuru slīpums pārsniedz 30 grādus,

c) aizliegta koku ciršana no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam,

d) kailcirtes platība virszemes ūdens objekta aizsargjoslā nepārsniedz vienu hektāru,

e) atjaunojot mežaudzi, egļu īpatsvars nepārsniedz 80 procentus no kopējā ieaugušo koku skaita;

4) applūstošajās teritorijās aizliegts veikt teritorijas uzbēršanu, būvēt ēkas un būves, arī aizsargdambjus, izņemot:

a) īslaicīgas lietošanas būvju un mazēku būvniecību,

b) esošo būvju atjaunošanu,

c) kultūras pieminekļu restaurāciju,

d) transporta un elektronisko sakaru tīklu būvju būvniecību, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, ūdens ņemšanas ietaišu un maģistrālo cauruļvadu būvniecību, enerģijas pārvades un sadales būvju būvniecību,

e) peldvietu, eliņu, laivu un motorizēto ūdens transportlīdzekļu piestātņu būvniecību,

f) jahtu ostu būvniecību, kurās paredzētas ne mazāk kā 25 atpūtas kuģu stāvvietas ūdenī, un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju un infrastruktūras objektu būvniecību,

g) valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu staciju un posteņu un citu stacionāru valsts nozīmes monitoringa punktu un posteņu būvniecību,

h) biotopu apsaimniekošanai nepieciešamo īslaicīgas lietošanas būvju un dabas tūrismam nepieciešamo skatu torņu, laipu u.tml. objektu būvniecību,

i) inženieraizsardzības un hidrotehnisko būvju izbūvi esošās apbūves aizsardzībai pret paliem vai plūdiem un stacionārās aizsardzības būves piesārņojuma aizturēšanai un savākšanai,

j) teritorijas uzbēršanu šā punkta "d", "e", "f", "g" un "i" apakšpunktā noteiktās būvniecības īstenošanai;

4[1]) ostu applūstošajās teritorijās aizliegts veikt teritorijas uzbēršanu, būvēt ēkas un būves, izņemot hidrotehniskās būves, piestātnes, infrastruktūras, inženierkomunikācijas un citas ar ostu darbību saistītās būves un veikt minētajām būvēm nepieciešamo teritorijas uzbēršanu, arī esošo būvju atjaunošanu, ja šādas darbības nav pretrunā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un ir ievērotas normatīvo aktu prasības, arī prasības, kas noteiktas attiecībā uz ietekmes uz vidi novērtējumu;

5) 10 metrus platā joslā papildus šīs daļas 1., 2., 3., 4. un 4.1 punktā minētajam aizliegts:

a) izvietot degvielas uzpildes stacijas,

b) būvēt un izvietot jebkādas ēkas un būves, tai skaitā nožogojumus (izņemot esošo būvju atjaunošanu; kultūras pieminekļu restaurāciju; transporta un elektronisko sakaru tīklu būvniecību, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, ūdens ņemšanas ietaišu un maģistrālo cauruļvadu būvniecību, enerģijas pārvades un sadales būvju būvniecību; peldvietu, eliņu, laivu un motorizēto ūdens transportlīdzekļu piestātņu būvniecību; valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu staciju un posteņu un citu stacionāru valsts nozīmes monitoringa punktu un posteņu būvniecību, kā arī krastu nostiprināšanu; ostu teritorijā esošo hidrotehnisko būvju, piestātņu, infrastruktūras, inženierkomunikācijas, kā arī citu ar ostu darbību saistītu būvju būvniecību; jahtu ostu un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju un infrastruktūras objektu būvniecību, kā arī šīs daļas 4. un 4.1 punktā minētajos gadījumos paredzēto teritorijas uzbēršanu),

c) lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus,

d) ierīkot meliorācijas būves bez saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi,

e) veikt galveno cirti, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai, vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai, kā arī mežaudzē, kurā valdošā koku suga ir baltalksnis,

f) iegūt un izmantot derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdeņu ieguvi ūdensapgādes vai rekreācijas vajadzībām aizsargjoslā esošai dzīvojamai vai atpūtnieku aprūpei paredzētai ēkai,

g) mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus un lauksaimniecības tehniku,

h) veikt teritorijas atmežošanu, ja tā nav saistīta ar šā punkta "b" apakšpunktā minētajiem izņēmuma gadījumiem,

i) kurt ugunskurus un novietot teltis ārpus šim nolūkam norādītām vietām bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju,

j) ierīkot tehnoloģiskos koridorus kokmateriālu pievešanai;

6) aizliegts novietot iegūto grunti pēc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veiktas virszemes ūdensobjekta padziļināšanas vai tīrīšanas ārpus tam paredzētajām vietām;

7) aizliegts ierīkot mehānisko transportlīdzekļu sacīkšu trases un izmēģinājumu vietas;

(1[1])Šā panta pirmās daļas 4.punktā minētās darbības drīkst veikt, ja tās nav pretrunā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un ir ievērotas normatīvo aktu prasības, arī prasības, kas noteiktas attiecībā uz ietekmes uz vidi novērtējumu.

(2) Virszemes ūdensobjektos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierīkotajās peldvietās aizliegts braukt ar motorlaivām un ūdens motocikliem, ja tas nav saistīts ar specializēto dienestu darbību, šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību.

(3) Vietējā pašvaldība pieņem attiecīgu lēmumu par jebkādu nelikumīgu nožogojumu nojaukšanu virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās. Vietējā pašvaldība veic vai organizē nožogojumu nojaukšanu, ja īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pēc pašvaldības lēmuma pieņemšanas nožogojumu viena mēneša laikā nav nojaucis. Ar nojaukšanu saistītos izdevumus sedz nožogojuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

(21.02.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2003., 06.03.2008., 14.05.2009., 13.10.2011., 19.11.2015. un 19.05.2016. likumu, kas stājas spēkā 20.06.2016.)

37.[1] pants. Aprobežojumi aizsargjoslās ap purviem

Aprobežojumus aizsargjoslās ap purviem kā mitrzemēm nosaka Meža likums.

(21.02.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.03.2002.)

38.pants. Aprobežojumi aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem

Aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem papildus šā likuma 35.pantā minētajam tiek noteikti šādi aprobežojumi:

1) jebkuru saimniecisko darbību aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un kultūras pieminekļa īpašnieka atļauju;

2) pārdodot vienam īpašniekam piederošu kultūras pieminekļa un tā aizsargjoslas zemi, aizliegts to sadalīt;

3) aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu, ķīmisko vielu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas, izņemot šim nolūkam īpaši paredzētas un iekārtotas vietas;

4) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;

5) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas pie kultūras pieminekļa;

6) aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas.

39.pants. Aprobežojumi aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām

Aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām papildus šā likuma 35.pantā minētajam tiek noteikti šādi aprobežojumi:

1) stingra režīma aizsargjoslā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, izņemot to, kura saistīta ar ūdens ieguvi konkrētā ūdensapgādes urbumā vai ūdensgūtnē attiecīgo ūdens ieguves un apgādes objektu uzturēšanai un apsaimniekošanai;

2) bakterioloģiskajā aizsargjoslā būvju būvniecībai jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteiktajos gadījumos. Ja centralizētajai ūdensapgādei izmanto pazemes (no virszemes piesārņojuma infiltrācijas neaizsargātu) ūdens horizontu, kā arī pazemes ūdens resursu mākslīgas papildināšanas metodi, jāievēro šā panta 1.punktā minētie aprobežojumi. Bakterioloģiskajā aizsargjoslā aizliegts:

a) izvietot lopbarības, minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas materiālu, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas, izņemot teritoriju plānojumos vai lokālplānojumos paredzētās vietas,

b) ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus,

c) izvietot degvielas uzpildes stacijas,

d) aizkraut pievedceļus un pieejas pie ūdens ņemšanas ietaisēm,

e) veikt darbus ar triecienmehānismiem, izmest un izliet kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus,

f) veikt jebkāda veida derīgo izrakteņu iegūšanas, iekraušanas un izkraušanas, gultnes padziļināšanas, zemes smelšanas un spridzināšanas darbus,

g) glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas,

h) lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

3) ķīmiskajā aizsargjoslā būvju būvniecībai jāsaņem Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;

4) ja centralizētajai ūdensapgādei izmanto gruntsūdeņu (neaizsargātu) ūdens horizontu vai pazemes ūdens krājumu mākslīgas papildināšanas metodi, ķīmiskajā aizsargjoslā 500 metru platā joslā ap stingrā režīma aizsargjoslu aizliegts:

a) veikt meža un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņu, izņemot zemes lietošanas kategorijas maiņu esošo ciemu teritorijās un ēku un būvju būvniecībai viensētās ārpus ciema teritorijas robežām, kā arī gadījumos, kad tas nepieciešams ūdensapgādes būvju būvniecībai,

b) veidot jaunus ciemus un paplašināt esošos,

c) ārpus esošajiem ciemiem sadalīt zemi zemes vienībās, kas mazākas par 2400 kvadrātmetriem,

d) no jauna projektējamos un pārbūvējamos būvobjektos novadīt notekūdeņus (arī pēc attīrīšanas lokālajās attīrīšanas iekārtās) gruntī un virszemes ūdens¬objektos,

e) ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus.

(21.02.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.2009., 13.10.2011., 23.10.2014., 19.05.2016. un 23.11.2023. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2024.)

VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTA TELEFONA NUMURI

Direktore 67027098
Galvenā eksperte (dokumentu pārvaldības jomā) 67027406
Agroķīmijas departaments 67551272

AUGU AIZSARDZĪBAS DEPARTAMENTS

Direktore 67550945
Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļa 67185481, 67185479
Augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības daļa 67550923
Integrētās augu aizsardzības daļa 67185478

AUGU KARANTĪNAS DEPARTAMENTS

Direktors 67550931
Fitosanitārās uzraudzības daļa 67550926
Nacionālā fitosanitārā laboratorija 67550950

VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTA REĢIONĀLĀS NODAĻAS

Rīgas reģionālā nodaļa 67325849
Kurzemes reģionālā nodaļa 63222552
Talsi 63232248
Kuldīga 63348239
Liepāja 63425068
Saldus 63821377
Ventspils 63628548
Zemgales reģionālā nodaļa 63022541
Jelgava 63010920
Bauska 63926692
Dobele 63791288
Aizkraukle 65123591
Jēkabpils 65233164

Vidzemes reģionālā nodaļa 64221594
Valmiera 64221591, 64221137
Priekuļi 64130977, 64130300
Gulbene 64471050
Madona 64822541
Latgales reģionālā nodaļa 65444113
Daugavpils 65440058
Rēzekne 64623110, 64622728
Balvi 64522971
Preiļi 65307405
Krāslava 65624592, 65623832
Ludza 65723565

Tīmekļvietne: **http://www.vaad.gov.lv**

Informāciju par 2025. gadā reģistrētajiem augu aizsardzības līdzekļiem un to lietojumu un apstiprinātajām izmaiņām iepriekš reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu lietojumā var atrast Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļvietnē **http://registri.vaad.gov.lv/reg/aal_saraksts.aspx**

registri.vaad.gov.lv > Augu aizsardzības līdzekļu saraksts

Rapša fenoloģiskās attīstības stadijas
(BBCH identifikācijas skala)

Dīgļlapu atraisīšanās **10**

Pirmā lapiņu pāra attīstība **11**

Otrā lapiņu pāra attīstība **13**

Astotā lapu pāra attīstība **18**

Divu starpmezglu posmu attīstība **32**

Ziedkopas veidošanās **51**

10 % ziedu galvenajā dzinumā **61**

Ziedēšanas beigas **69**

Nogatavošanās **79**

89

Sēkleņu augļu koku fenoloģiskās attīstības stadijas
(BBCH identifikācijas skala)

Miera periods	**00**
Pumpuru briešana	**51**
Zaļais konuss	**53**
Peļausu stadija	**54**
Ziedpumpuru parādīšanās	**55**
Ziedpumpuru uzbriešana	**59**
Ziedēšanas sākums	**61**
Augļaizmetņu augšana (līdz 10 mm diametrā)	**71**
Augļa augšana	**75**